



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Disposición**

**Número:** DI-2018-3606-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Lunes 16 de Abril de 2018

**Referencia:** 1-0047-0000-001527-18-5

---

VISTO el Expediente N° 1-0047-0000-001527-18-5 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones la firma CELGENE EUROPE LIMITED REPRESENTADA EN EL PAIS POR MONTE VERDE S.A., solicita la aprobación de nuevos proyectos de prospectos e información para el paciente para la Especialidad Medicinal denominada REVLIMID / LENALIDOMIDA, Forma farmacéutica y concentración: CAPSULAS / LENALIDOMIDA 5, 10, 15 Y 25 mg; aprobada por Certificado N° 54.360

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición N°: 5904/96 y Circular N° 4/13.

Que la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 de fecha 16 de Diciembre de 2015.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. – Autorízase a la firma CELGENE EUROPE LIMITED REPRESENTADA EN EL PAIS POR MONTE VERDE S.A. propietaria de la Especialidad Medicinal denominada REVLIMID / LENALIDOMIDA, Forma farmacéutica y concentración: CAPSULAS / LENALIDOMIDA 5, 10, 15 Y 25

mg, el nuevo proyecto de prospecto obrante en el documento IF-2018-12042984-APN-DERM#ANMAT; e información para el paciente obrante en el documento IF-2018-12043104-APN-DERM#ANMAT.

ARTICULO 2º. – Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 54.360, cuando el mismo se presente acompañado de la presente Disposición.

ARTICULO 3º. - Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición y prospecto e información para el paciente. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-0047-0000-001527-18-5

Digitally signed by LEDE Roberto Luis  
Date: 2018.04.16 09:09:30 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede  
SubAdministrador  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

PROYECTO DE PROSPECTO  
REVLIMID®  
LENALIDOMIDA  
Cápsulas 5 mg, 10 mg, 15 mg y 25 mg



A.N.M.A.T. - MESA DE ENTRADAS

Venta Bajo receta archivada Refoliado N° 150

Las cápsulas de REVLIMID® de 5 mg, 10 mg, 15 mg y 25 mg se suministrarán bajo las condiciones del "Programa de Minimización de Riesgos".

**FÓRMULA CUALICUANTITATIVA:**

Las cápsulas de 5 mg contienen:

Lenalidomida.....5 mg

Excipientes: lactosa anhidra 147 mg, celulosa microcristalina 40 mg, croscarmelosa sódica 6 mg, estearato de magnesio 2 mg, gelatina 57.5 mg, dióxido de titanio (E 171) 3.5 mg

Las cápsulas de 10 mg contienen:

Lenalidomida.....10 mg

Excipientes: lactosa anhidra 294 mg, celulosa microcristalina 80 mg, croscarmelosa sódica 12 mg, estearato de magnesio 4 mg, gelatina 91.9 mg, dióxido de titanio (E 171) 3.70 mg, índigo carmín (E 132) 0.018 mg, óxido de hierro amarillo (E 172) 0.33 mg

Las cápsulas de 15 mg contienen:

Lenalidomida.....15 mg

Excipientes: lactosa anhidra 289 mg, celulosa microcristalina 80 mg, croscarmelosa sódica 12 mg, estearato de magnesio 4 mg, gelatina 91.3 mg, dióxido de titanio (E 171) 4.7 mg, índigo carmín (E 132) 0.016 mg

Las cápsulas de 25 mg contienen:

Lenalidomida.....25 mg

Excipientes: lactosa anhidra 200 mg, celulosa microcristalina 159 mg, croscarmelosa sódica 12 mg, estearato de magnesio 4 mg, gelatina 93.2 mg, dióxido de titanio (E 171) 2.8 mg

**ACCIÓN TERAPÉUTICA**

Agente inmunomodulador con propiedades antiangiogénicas y antineoplásicas, análogo de la talidomida  
Código ATC: L04 AX04

**INDICACIONES**

**Mieloma múltiple**

REVLIMID en combinación con dexametasona está indicado para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple (MM).

REVLIMID está indicado como terapia de mantenimiento en pacientes con MM luego del trasplante

REV PI AR-005 (REV 22)\_Ene 2017  
CCAMQRA-011/17

IF-2018-12042984-APN-DEPROFARMAT

FARM. KARINA A. FLORES  
COORDINADORA TÉCNICA  
DEPROFARMAT  
MEX. 11.562 - MP 14128  
MONTE YERRE S.A.

autólogo de células madre hematopoyéticas (auto-HSCT).



#### Síndromes mielodisplásicos

REVLIMID está indicado para el tratamiento de pacientes con anemia dependiente de transfusión debido a síndromes mielodisplásicos (SMD) de riesgo bajo o intermedio-I vinculados con una anomalía citogenética por delección del 5q con o sin anomalías citogenéticas adicionales.

#### Linfoma de células del manto

REVLIMID está indicado para el tratamiento de pacientes con linfoma de células del manto (LCM) cuya enfermedad ha recidivado o progresado luego de dos terapias previas, una de las cuales incluyó bortezomib.


#### Limitaciones de uso

- REVLIMID no está indicado y no está recomendado para el tratamiento de pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC) por fuera de los estudios clínicos controlados.

#### DESCRIPCIÓN

REVLIMID, un análogo de talidomida, es un agente inmunomodulador con propiedades antiangiogénicas y antineoplásicas. El nombre químico es 3-(4-amino-1-oxo-1,3-dihidro-2H-isoindol-2-yl) piperidina-2,6-diona y tiene la siguiente estructura química:

Estructura Química de Lenalidomida



La fórmula empírica para lenalidomida es  $C_{13}H_{13}N_3O_3$ , y el peso molecular en gramos es 259,3.

Lenalidomida es un polvo sólido de color blancuzco a amarillo pálido. Es soluble en mezclas de solvente orgánico/agua, y solventes acuosos buffer. Lenalidomida es más soluble en solventes orgánicos y soluciones de pH bajo. La solubilidad fue significativamente menor en buffers menos ácidos, variando entre 0,4 y 0,5 mg/mL. Lenalidomida tiene un átomo de carbono asimétrico y puede existir como las formas óptimamente activas S(-) y R(+), y se produce como una mezcla racémica con una rotación óptica neta de cero.

REVLIMID® está disponible en cápsulas de 5 mg, 10 mg, 15 mg y 25 mg para administración oral. Cada cápsula contiene lenalidomida como ingrediente activo y los siguientes ingredientes inactivos: lactosa anhidra, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, y estearato de magnesio. La carcasa de las cápsulas de 5 mg y 25 mg contiene gelatina, dióxido de titanio y tinta negra. La carcasa de la cápsula de 10 mg




contiene gelatina, dióxido de titanio, indigo carmín, óxido de hierro amarillo, y tinta negra. La careasa de la cápsula de 15 mg contiene gelatina, dióxido de titanio, indigo carmín, y tinta negra.

## ACCION FARMACOLÓGICA

### Mecanismo de acción

La lenalidomida es un análogo de la talidomida con propiedades inmunomodulatorias, antiangiogénicas y antineoplásicas. Las actividades celulares de lenalidomida están mediadas a través de su cereblon objetivo, un componente de un complejo enzimático de ubiquitina ligasa E3 anillo cullin. *In vitro*, en presencia de la droga, las proteínas sustrato (incluyendo Aiolos, Ikaros y CK1 $\alpha$ ) están dirigidas a la ubiquitinación y posterior degradación que conduce a efectos citotóxicos directos e inmunomoduladores. La lenalidomida inhibe la proliferación e induce la apoptosis de determinadas células tumorales hematopoyéticas incluyendo MM, linfoma de células de manto y síndromes mielodisplásicos *in vitro* por delección del 5q. La lenalidomida provoca una demora en el crecimiento del tumor en algunos modelos de tumores hematopoyéticos no clínicos *in vivo*, que incluyen el MM. Las propiedades inmunomoduladoras de lenalidomida incluyen una cantidad incrementada y la activación de linfocitos T y de las células asesinas naturales (NK), el aumento de números de células NKT dando lugar a la citotoxicidad celular directa y reforzada dependiente de anticuerpos mediados por células (ADCC) a través de la secreción aumentada de interleukina-2 e interferón gamma, cantidades incrementadas de células NKT y la inhibición de citocinas proinflamatorias (por ejemplo, TNF- $\alpha$  e IL-6) por monocitos. En las células de MM, la combinación de lenalidomida y dexametasona sinergiza la inhibición de la proliferación de células y la inducción de apoptosis.



### Farmacodinamia

#### Electrofisiología Cardíaca

Se evaluó el efecto de lenalidomida en el intervalo QTc en 60 hombres sanos en un estudio, riguroso de QT. A una dosis dos veces superior a la dosis máxima recomendada, lenalidomida no prolongó el intervalo QTc. El límite superior más grande del IC bilateral del 90 % de las diferencias entre lenalidomida y el placebo fue menor a 10 ms.

## FARMACOCINÉTICA

### Absorción

Lenalidomida se absorbe rápidamente después de la administración oral. Después de dosis únicas y múltiples de REVLIMID en pacientes con MM o SMD, las concentraciones plasmáticas máximas se produjeron entre 0,5 y 6 horas después de la dosis. La disposición farmacocinética de dosis únicas y múltiples de lenalidomida es lineal con los valores de AUC y  $C_{max}$  que se incrementan proporcionalmente con la dosis. La administración de dosis múltiples de REVLIMID a la dosis recomendada no tiene como resultado acumulación del fármaco.

La administración de una dosis única de 25 mg de REVLIMID con una comida rica en materia grasa en sujetos sanos reduce el grado de absorción, con una disminución aproximada del 20% en el AUC y una disminución del 50% en la  $C_{max}$ . En los ensayos clínicos en los que se establecieron la eficacia y la seguridad



de REVLIMID, el fármaco se administró sin considerar la ingesta de alimentos. REVLIMID puede administrarse con o sin alimentos.

La absorción oral de lenalidomida en pacientes con MCL es similar a la observada en pacientes con MM o SMD.

#### **Distribución**

La unión *in vitro* de [<sup>14</sup>C]-lenalidomida a las proteínas plasmáticas es de aproximadamente un 30%.

Lenalidomida está presente en el semen a las 2 horas (1379 ng/eyaculado) y a las 24 horas (35 ng/eyaculado) de la administración de REVLIMID 25 mg diarios.

#### **Eliminación**

La semivida media de lenalidomida es de 3 horas en sujetos sanos y de 3 a 5 horas en pacientes con MM, MDS o MCL.

#### **Metabolismo**

Lenalidomida tiene un metabolismo limitado. Lenalidomida sin metabolizar es el componente predominante en circulación en humanos. Dos son los metabolitos identificados, 5-hidroxi-lenalidomida y N-acetil-lenalidomida; cada uno constituye menos del 5% de los niveles circulantes totales de droga.

#### **Excreción**

La eliminación es principalmente renal. Después de la administración única por vía oral de [<sup>14</sup>C]-lenalidomida (25 mg) a sujetos sanos, aproximadamente el 90% y el 4% de la dosis radioactiva se eliminó dentro de los diez días en la orina y las heces, respectivamente. Aproximadamente el 82% de la dosis radioactiva se excretó como lenalidomida en la orina dentro de las 24 horas. Hidroxil lenalidomida y N-acetil-lenalidomida representó el 4,6% y el 1,8% de la dosis excretada, respectivamente. El aclaramiento renal de lenalidomida supera la velocidad de filtración glomerular.

La semivida media de lenalidomida es 3 horas en sujetos sanos y de 3 a 5 horas en pacientes con MM, SMD o MCL.

#### **Poblaciones específicas**

**Insuficiencia renal:** Ocho sujetos con insuficiencia renal leve (aclaramiento de creatinina (CLcr) de 50 a 79 ml / min calculados con Cockcroft-Gault), 9 sujetos con insuficiencia renal moderada (CLcr de 30 a 49 ml / min), 4 sujetos con insuficiencia renal grave (CLcr <30 ml / min), y 6 pacientes con enfermedad renal terminal (ESRD) que requirieron diálisis se les administró una sola dosis de 25 mg de REVLIMID. Tres sujetos sanos de edad similar con función renal normal (CLcr > 80 ml / min) también recibieron una dosis única de 25 mg de REVLIMID. Cuando la CLcr disminuyó, la vida media aumentó y el aclaramiento de la droga disminuyó linealmente. Los pacientes con insuficiencia moderada y grave tuvieron un aumento de 3 veces la vida media y una disminución de 66% a 75% en el aclaramiento de la droga en comparación con sujetos sanos. Los pacientes en hemodiálisis (n = 6) tuvieron un aumento aproximado de 4,5 veces en la vida media y una disminución del 80% en el aclaramiento de la droga en comparación con sujetos sanos. Aproximadamente el 30% de la droga en el cuerpo se eliminó durante una sesión de hemodiálisis de 4 horas.



Ajuste la dosis inicial de REVLIMID en pacientes con insuficiencia renal basándose en el valor  $Cl_{cr}$  (ver 227).

**Posología y Administración.**

**Insuficiencia hepática:** La insuficiencia hepática leve (definida como bilirrubina total > 1 a 1,5 veces el límite superior normal (ULN) o cualquier aspartato transaminasa mayor que la ULN) no influyó en la disposición de la lenalidomida. No hay datos farmacocinéticos disponibles para pacientes con insuficiencia hepática moderada a grave.

A.N.M.A.T. - MESA DE ENTRADAS  
Refoliado N° 152

**Otros Factores Intrínsecos:** La edad (39 a 85 años), el peso corporal (33 a 135 kg), el sexo, la raza y el tipo de neoplasias hematológicas (MM, MDS o MCL) no tuvieron un efecto clínicamente relevante en el aclaramiento de lenalidomida en pacientes adultos.

**Interacciones medicamentosas**

La coadministración de una dosis individual o múltiple de dexametasona (40 mg) no tuvo un efecto clínico en la farmacocinética de dosis múltiple de REVLIMID (25 mg).

La coadministración de REVLIMID (25 mg) después de dosis múltiples de un inhibidor de la P-gp tal como quinidina (600 mg dos veces/día) no aumentó significativamente la Cmax o la AUC de lenalidomida.

La coadministración del inhibidor de la P-gp y del sustrato temsirolimus (25 mg) con REVLIMID (25 mg) no alteró significativamente la farmacocinética de lenalidomida, temsirolimus o sirolimus (metabolito del temsirolimus).

Estudios *in vitro* demostraron que REVLIMID es un sustrato de la P-glicoproteína (P-gp). REVLIMID no es un sustrato de la proteína de resistencia del cáncer de mama humano (BCRP), de los transportadores de proteína de resistencia a múltiples fármacos (MRP) MRP1, MRP2 o MRP3, de transportadores de anión orgánico (OAT) OAT1 y OAT3, polipéptido IB1 de transporte de anión orgánico (OATP1B1), transportadores de catión orgánico (OCT) OCT1 y OCT2, proteína de toxina de extrusión y múltiples fármacos (MATE) MATE1, y transportadores nuevos de catión orgánico (OCTN) OCTN1 y OCTN2. Lenalidomida no es un inhibidor de la bomba exportadora de P-GP, bomba exportadora de sales biliares (BSEP), BCRP, MRP2, OAT1, OAT3, OATP1B1, OATP1B3, u OCT2. Lenalidomida no inhibe o induce las isoenzimas CYP450. La lenalidomida tampoco inhibe la formación de la glucuronidación de bilirrubina en los microsomas de hígado humano con UGT1A1 genotipado como UGT1A1\*1/\*1, UGT1A1\*1/\*28 y UGT1A1\*28/\*28

**ESTUDIOS CLÍNICOS**

**Mieloma Múltiple**

**Ensayo clínico abierto, aleatorizado, en pacientes con MM recientemente diagnosticado:**

Se realizó un ensayo aleatorizado, de centros múltiples, abierto, de 3 ramas de 1.623 pacientes para comparar la eficacia y la seguridad de REVLIMID y dosis baja de dexametasona (Rd) administrado por 2 duraciones de tiempo diferentes a melfalán, prednisona y talidomida (MPT) en pacientes con MM recientemente diagnosticado que no eran candidatos para trasplante de células madre (SCT). En la primera rama del estudio, se administró Rd de forma continua hasta progresión de la enfermedad [rama Rd Continuo]. En la segunda rama, se administró Rd por hasta dieciocho ciclos de 28 días [72 semanas, rama Rd18]. En la tercera rama, se administró melfalán, prednisona y talidomida (MPT) por un máximo de doce



ciclos de 42 días (72 semanas). A los fines de este estudio, un paciente que tenía < 65 años de edad no era candidato para un SCT si el paciente se negaba a someterse a terapia de SCT o el paciente no tenía acceso al SCT debido al costo o a otros motivos. Los pacientes fueron estratificados en la aleatorización por edad ( $\leq 75$  vs.  $>75$  años), etapa (etapas I y II de ISS vs. etapa III) y país.

Los pacientes en las ramas Rd Continuous y Rd18 recibieron REVLIMID 25 mg una vez por día los Días 1 a 21 de ciclos de 28 días. Se administró dexametasona 40 mg una vez por día los Días 1, 8, 15 y 22 de cada ciclo de 28 días. Para los pacientes  $> 75$  años de edad, la dosis inicial de dexametasona fue de 20 mg por vía oral una vez por día los días 1, 8, 15 y 22 de ciclos repetidos de 28 días. La dosis inicial y los regímenes para Rd Continuous y Rd18 se ajustaron de acuerdo con la edad y la función renal. Todos los pacientes recibieron anticoagulación profiláctica, siendo la aspirina la utilizada con mayor frecuencia.

Las características basales demográficas y relacionadas con la enfermedad de los pacientes estaban balanceadas entre las 3 ramas. En general, los pacientes del estudio tenían enfermedad en etapa avanzada. De la población total del estudio, la mediana de la edad fue 73 en las 3 ramas, con el 35% de los pacientes totales  $> 75$  años de edad; el 59% tenía etapa ISS I/II; el 41% tenía etapa ISS III; el 9% tenía insuficiencia renal severa (clearance de creatinina [CLcr]  $< 30$  ml/min); 23% tenía insuficiencia renal moderada (CLcr  $> 30$  a 50 ml/min; 44% tenía insuficiencia renal leve (CLcr  $> 50$  a 80 ml/min). En cuanto al estado funcional según ECOG, el 29% tenía Grado 0, el 49% tenía Grado 1, el 21% Grado 2, y 0,4%  $\geq$  Grado 3.

El criterio de valoración de eficacia primaria, Supervivencia libre de progresión (PFS), se definió como el tiempo desde la aleatorización hasta la primera documentación de la progresión de la enfermedad según determinó el Comité independiente de adjudicación de respuesta (IRAC), en base a los criterios del Grupo de trabajo internacional sobre mieloma múltiple (IMWG) o muerte por cualquier causa, lo que se produjera primero durante el estudio hasta el final de la fase de seguimiento de PFS. Para el análisis de eficacia de todos los criterios de valoración, la comparación primaria fue entre las ramas Rd Continuous y MPT. Los resultados de eficacia se resumen en la tabla a continuación. La PFS fue significativamente más prolongada con Rd Continuous que con MPT: HR 0,72 (IC del 95%: 0,61-0,85 p  $< 0,0001$ ). Un menor porcentaje de sujetos en la rama Rd Continuous en comparación con la rama MPT tuvo eventos de PFS (52% vs. 61%, respectivamente). La mejoría en la mediana del tiempo de PFS en la rama Rd Continuous en comparación con la rama MPT fue de 4,3 meses. La tasa de respuesta del mieloma fue mayor con Rd Continuous en comparación con MPT (75,1% vs. 62,3%); con una respuesta completa en 15,1% de los pacientes en la rama Rd Continuous vs. 9,3% en la rama MPT. La mediana del tiempo hasta la primera respuesta fue de 1,8 meses en la rama Rd Continuous vs. 2,8 meses en la rama MPT.

Para el análisis intermedio de sobrevida total (OS), con corte de datos el 3 de marzo de 2014, la mediana del tiempo de seguimiento para todos los pacientes sobrevivientes es de 45,5 meses, con 697 eventos de muerte, lo que representa el 78% de los eventos preespecificados necesarios para el análisis final planificado de sobrevida total (697/896 de los eventos de OS finales). La HR de la OS observada fue 0,75 para Rd Continuous vs. MPT (IC del 95% = 0,62; 0,90).

Tabla 1: Resumen de resultados clínicos – Estudio MM-020 (población con intención de tratar- ITT-)







Fecha de corte de datos = 1º de marzo de 2015.

El criterio principal de valoración de la eficacia de ambos estudios fue la PFS definida por la MESA DE ENTRADAS

	Estudio de Mantenimiento 1		Estudio de Mantenimiento 2	
	REVLIMID N = 231	Placebo N = 229	REVLIMID N = 307	Placebo N = 307
<b>Edad (años)</b>				
Promedio	58.0	58.0	57.5	58.1
(Min. max)	(29.0, 71.0)	(39.0, 71.0)	(22.7, 68.3)	(32.3, 67.0)
<b>Sexo, n (%)</b>				
Masculino	121 (52)	129 (56)	169 (55)	181 (59)
Femenino	110 (48)	100 (44)	138 (45)	126 (41)
<b>Etapa ISS al momento del diagnóstico, n (%)</b>				
Etapa I o II	120 (52)	131 (57)	232 (76)	250 (81)
Etapa I	62 (27)	85 (37)	128 (42)	143 (47)
Etapa II	58 (25)	46 (20)	104 (34)	107 (35)
Etapa III	39 (17)	35 (15)	66 (21)	46 (15)
Faltante	72 (31)	63 (28)	9 (3)	11 (4)
<b>CrCl en el Post-auto-HSCT, n (%)</b>				
< 50 mL/min	23 (10)	16 (7)	10 (3)	9 (3)
≥ 50 mL/min	201 (87)	204 (89)	178 (58)	200 (65)
Faltante	7 (3)	9 (4)	119 (39)	98 (32)

Hoja N° 154

aleatorización a la fecha de progresión o muerte, lo que tuvo lugar primero; los estudios individuales no fueron impulsados para un criterio de valoración de la supervivencia general. Ambos estudios fueron desenmascarados por las recomendaciones de sus respectivos comités de monitoreo de datos y después de superar los umbrales respectivos para los análisis provisionales preestablecidos de PFS. Después del desenmascaramiento, los pacientes siguieron siendo monitoreados como antes. Se permitió a los pacientes en el grupo placebo del Estudio de Mantenimiento 1 cruzarse para recibir REVLIMID antes de la progresión de la enfermedad (76 pacientes [33%] cruzaron a REVLIMID); a los pacientes en el Estudio de Mantenimiento 2 no se les recomendó cruzar. Los resultados de la eficacia se resumen en la siguiente tabla. En ambos estudios, el análisis primario de la PFS al momento de desenmascaramiento fue significativamente más largo con REVLIMID comparado con placebo: el Estudio de Mantenimiento 1 HR 0,38 (IC del 95%: 0.27-0.54 p <0,001) y el Estudio de Mantenimiento 2 HR 0,50 (IC del 95%: 0,39- 0,64 p <0,001). Para ambos estudios, la PFS se actualizó con una fecha de corte el 1º de marzo de 2015, como se muestra en la tabla y los siguientes gráficos de Kaplan Meier. Con un seguimiento más prolongado (promedio 72,4 y 86,0 meses, respectivamente), los análisis actualizados de la PFS para ambos estudios continúan mostrando una ventaja de la PFS para REVLIMID comparado con placebo: el Estudio de Mantenimiento 1 HR 0,38 (IC del 95%: 0.28-0,50) con la PFS promedio de 68,6 meses y el Estudio de Mantenimiento 2 HR 0,53 (IC del 95%: 0,44-0,64) con una PFS promedio de 46,3 meses.


El análisis descriptivo de los datos de la OS (supervivencia general, por sus siglas en inglés) con fecha de corte el 1º de febrero de 2016 se proporciona en la Tabla 3. El tiempo promedio de seguimiento fue de 81,6 y 96,7 meses para el Estudio de Mantenimiento 1 y el Estudio de Mantenimiento 2, respectivamente. La OS promedio fue de 111,0 y 84,2 meses para REVLIMID y placebo, respectivamente, para el Estudio de Mantenimiento 1 y 105,9 y 88,1 meses para REVLIMID y placebo, respectivamente, para el Estudio de Mantenimiento 2.



**Curvas de Kaplan-Meier de sobrevida total (población ITT) entre ramas**

**Rd Continuous, Rd18 y MPT**

**Fecha de corte: 3 de marzo de 2014**



	0	6	12	16	24	30	36	42	46	54	60	66	72
1	535	466	457	433	403	366	337	246	156	74	13	0	0
2	541	505	465	425	394	362	329	236	146	72	18	0	0
3	547	484	448	416	375	347	310	230	130	58	10	0	0

**Number of Subjects at Risk**

OS Events: Rd Continuous=208/535 ( 38.9%) Rd18=228/541 ( 42.1%) MPT=261/547 ( 47.7%)

IC = intervalo de confianza; d = dosis baja de dexametasona; HR = hazard ratio; M = melfalán; P = prednisona; R = lenalidomida; Rd Continuous = Rd administrada hasta documentación de enfermedad progresiva; Rd18 = Rd administrada por ≤ 18 ciclos; T = talidomida

**Ensayos clínicos aleatorizados, controlados con placebo - Mantenimiento después del auto-HSCT:**

Se realizaron dos estudios multicéntricos, aleatorizados, doble ciego, de grupos paralelos y controlados con placebo para evaluar la eficacia y la seguridad de la terapia de mantenimiento con REVLIMID en el tratamiento de pacientes con MM después del auto-HSCT. En el estudio de mantenimiento 1, los pacientes entre 18 y 70 años de edad que habían sido sometidos a terapia de inducción seguida de auto-HSCT. fueron elegibles. La terapia de inducción debe haber ocurrido dentro de los 12 meses. Dentro de 90 a 100 días después del auto-HSCT, los pacientes con al menos una respuesta estable de la enfermedad fueron aleatorizados 1: 1 para recibir REVLIMID o mantenimiento con placebo. En el Estudio de Mantenimiento 2, los pacientes con edades <65 años al momento del diagnóstico que habían sido sometidos a terapia de inducción seguida de auto-HSCT y habían logrado al menos una respuesta estable de la enfermedad en el momento de la recuperación hematológica, fueron elegibles. Dentro de los 6 meses después del auto-HSCT, los pacientes fueron aleatorizados 1: 1 para recibir REVLIMID o mantenimiento con placebo. Los pacientes elegibles para ambos ensayos tuvieron CLcr de ≥ 30 ml / minuto.



En ambos estudios, la dosis de mantenimiento de REVLIMID fue de 10 mg una vez al día, los días 1 y 3 de los ciclos repetidos de 28 días, podría aumentarse a 15 mg una vez al día, después de 3 meses en ausencia de toxicidad limitante de la dosis y el tratamiento debía ser continuado hasta la progresión de la enfermedad o la retirada del paciente por otra razón. La dosis se redujo, o el tratamiento se interrumpió temporalmente o se detuvo, según fue necesario para manejar la toxicidad. Un aumento de dosis a 15 mg una vez al día se realizó para 135 pacientes (58%) en el estudio de mantenimiento 1 y en 185 pacientes (60%) en el estudio de mantenimiento 2.

A.N.M.A.T. - MESA DE ENTRADAS  
15

La demografía y las características basales relacionadas con la enfermedad de los pacientes fueron similares en los dos estudios y reflejaron una población típica de MM después del auto-HSCT (ver Tabla 4).

**Tabla 3: Supervivencia libre de progresión y supervivencia general de la aleatorización en los Estudios de Mantenimiento 1 y 2 (población ITT post-auto-HSCT)**


	Estudio de Mantenimiento 1		Estudio de Mantenimiento 2	
	REVLIMID N = 231	Placebo N = 229	REVLIMID N = 307	Placebo N = 307
<b>PFS en el desenmascaramiento</b>				
Eventos PFS n (%)	46 (20)	98 (43)	103 (34)	160 (52)
Promedio en meses [IC del 95%]	33.9 [NE, NE]	19.0 [16.2, 25.6]	41.2 [38.3, NE]	23.0 [21.2, 28.0]
Cociente de riesgo [IC del 95%]	0.38 [0.27, 0.54]		0.50 [0.39, 0.64]	
Prueba del orden logaritmico valor de p	<0.001		<0.001	
<b>PFS en el análisis de actualización 1 Marzo 2015 (Estudios 1 y 2)</b>				
Eventos PFS n (%)	97 (42)	116 (51)	191 (62)	248 (81)
Promedio en meses [IC del 95%]	68.6 [52.8, NE]	22.5 [18.8, 30.0]	46.3 [40.1, 56.6]	23.8 [21.0, 27.3]
Cociente de riesgo [IC del 95%]	0.38 [0.28, 0.50]		0.53 [0.44, 0.64]	
<b>OS en el análisis de actualización 1 Feb 2016 (Estudios 1 y 2)</b>				
Eventos OS n (%)	82 (35)	114 (50)	143 (47)	160 (52)
Promedio en meses [IC del 95%]	111.0 [101.8, NE]	84.2 [71.0, 102.7]	105.9 [88.8, NE]	88.1 [80.7, 108.4]
Cociente de riesgo [IC del 95%]	0.59 [0.44, 0.78]		0.90 [0.72, 1.13]	

Fecha del desenmascaramiento en el Estudio de Mantenimiento 1 y 2 = 17 de diciembre de 2009 y 7 de julio de 2010, respectivamente.  
Auto-HSCT = trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas; IC = intervalo de confianza;  
ITT = intención de tratar; NE = no estimable; PFS = supervivencia libre de progresión



La PFS en el momento del desenmascaramiento para el Estudio de Mantenimiento 2 se basó en la evaluación por un Comité de Revisión Independiente. Todos los demás análisis de la PFS se basaron en la evaluación por el investigador.  
 Nota: El promedio se basa en la estimación de Kaplan-Meier, con IC del 95% sobre el promedio del tiempo total de la PFS. El cociente de riesgo se basa en un modelo de riesgo proporcional estratificado por factores de estratificación que comparan las funciones de riesgo asociadas con los grupos de tratamiento (lenalidomida: placebo).

**Curvas Kaplan-Meier de supervivencia libre de progresión de la aleatorización (Población ITT Post-Auto-HSCT) en el Estudio de Mantenimiento 1 entre los grupos REVLIMID y Placebo (Fecha de corte de datos actualizada el 1 de marzo de 2015)**



	0	12	24	36	48	60	72	84	96	108
1	231	194	158	121	102	82	40	16	5	0
2	229	116	57	29	20	18	11	3	0	0

Number of Subjects at Risk


PFS Events: Lenalidomide = 97/231 (42%), Placebo = 116/229 (51%)

Auto-HSCT = trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas; IC = intervalo de confianza; HR = cociente de riesgo; ITT = intención de tratar; KM = Kaplan - Meier; PFS = supervivencia libre de progresión; Vs = versus

**Curvas Kaplan-Meier de supervivencia libre de progresión de la aleatorización (Población ITT Post-Auto-HSCT población) en el Estudio de Mantenimiento 2 entre los grupos REVLIMID y Placebo (Fecha de corte de datos actualizada el 1 de marzo de 2015)**



A.N.M.A.T. - MESA DE ENTRADAS  
 Refollado N° 156



1	231	194	158	121	102	82	40	16	5	0
2	229	116	57	29	20	18	11	3	0	0

Number of Subjects at Risk

PFS Events: Lenalidomide = 97/231 (42%), Placebo = 116/229 (51%)

Auto-HSCT = trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas; IC = intervalo de confianza; HR = cociente de riesgo; ITT = intención de tratar; KM = Kaplan - Meier; PFS = supervivencia libre de progresión; Vs = versus

**Estudios clínicos abiertos, aleatorizados en pacientes con MM después de al menos una terapia previa.**

Se realizaron dos estudios aleatorizados (Estudios 1 y 2) para evaluar la eficacia y seguridad de REVLIMID. Estos estudios de centros múltiples, multinacionales, a doble-ciego, controlados con placebo compararon REVLIMID más terapia de pulsos con dexametasona en dosis alta por vía oral con la terapia con dexametasona sola en pacientes con mieloma múltiple que habían recibido por lo menos un tratamiento anterior. Estos estudios incluyeron a pacientes con recuentos absolutos de neutrófilos (ANC)  $\geq 1000/\text{mm}^3$ , recuento de plaquetas  $\geq 75.000/\text{mm}^3$ , creatinina sérica  $\leq 2,5 \text{ mg/dL}$ , SGOT/AST o SGT/ALT en sangre  $\leq 3 \times$  límite superior de lo normal (ULN) y bilirrubina directa sérica  $\leq 2 \text{ mg/dL}$ .

En ambos estudios, los pacientes en el grupo REVLIMID/dexametasona tomaron 25 mg de REVLIMID por vía oral una vez por día en los días 1 a 21 y una cápsula de placebo similar una vez por día en los días 22 a 28 de cada ciclo de 28 días. Los pacientes en el grupo placebo/dexametasona tomaron 1 cápsula de placebo en los días 1 a 28 de cada ciclo de 28 días. Los pacientes en ambos grupos de tratamiento tomaron 40 mg de dexametasona por vía oral una vez por día en los días 1 a 4, 9 a 12, y 17 a 20 de cada ciclo de 28 días durante los primeros 4 ciclos de terapia.

FARM. KARINA A. FLORES  
 DIRECTORA TÉCNICA  
 APODERADA  
 IF-2018-12042987  
 MN 1.562 - MP 14128  
 MONTE VIDEOS



La dosis de dexametasona se redujo a 40 mg por vía oral una vez por día en los días 1 a 4 de cada ciclo de 28 días después de los primeros 4 ciclos de terapia. En ambos estudios, el tratamiento continuó hasta la progresión de la enfermedad.

En ambos estudios, se permitieron ajustes de dosis en base a resultados clínicos y de laboratorio. Se permitieron reducciones secuenciales de dosis a 15 mg diarios, 10 mg diarios y 5 mg diarios, por toxicidad [Ver Posología y Administración].

La tabla 4 resume las características basales del paciente y de la enfermedad en los dos estudios. En ambos estudios, las características basales demográficas y relacionadas con la enfermedad fueron comparables entre los grupos REVLIMID/dexametasona y placebo/dexametasona.

<b>Tabla 4: Características basales demográficas y relacionadas con la enfermedad – Estudios 1 y 2</b>				
	<b>Estudio 1</b>		<b>Estudio 2</b>	
	<b>Revlimid/Dex N=177</b>	<b>Placebo/Dex N=176</b>	<b>Revlimid/Dex N=176</b>	<b>Placebo/Dex N=175</b>
<b>Características del paciente</b>				
Edad (años)				
Mediana	64	62	63	64
Mín - Máx	36-86	37-85	33-84	40-82
Sexo				
Hombres	106 (60 %)	104 (59 %)	104 (59 %)	103 (59 %)
Mujeres	71 (40 %)	72 (41 %)	72 (41 %)	72 (41 %)
Raza/etnicidad				
Blanca	141 (80%)	148 (84 %)	172 (98 %)	175 (100 %)
Otra	36 (20 %)	28 (16 %)	4 (2 %)	0 (0 %)
Desempeño ECOG				
Estado 0-I	157 (89 %)	163 (95 %)	150 (85 %)	144 (82 %)
<b>Características de la enfermedad</b>				
Estadio basal de mieloma múltiple (Durie-Salmon)				
I	3 %	3 %	6 %	5 %
II	32 %	31 %	28 %	33 %
III	64 %	66 %	65 %	63 %
B2-microglobulina (mg/L)				
≤ 2,5 mg/L	52 (29%)	51 (29%)	51 (29%)	48 (27%)
> 2,5 mg/L	125 (71%)	125 (71%)	125 (71%)	127 (73%)
<b>Número de terapias anteriores</b>				
Nro. de terapias anteriores antimieloma				
1	38 %	38 %	32 %	33 %
≥2	62 %	62 %	68 %	67 %



Tipos de terapias anteriores				
Transplante de célula madre	62 %	61 %	55 %	54 %
Talidomida	42 %	46 %	30 %	38 %
Dexametasona	81 %	71 %	66 %	69 %
Bortezomib	11 %	11 %	5 %	4 %
Melfalán	33 %	31 %	56 %	52 %
Doxorubicina	55 %	51 %	56 %	57 %

ANMAT - MESA DE ENTRADAS  
152

El objetivo primario de eficacia en ambos estudios fue el tiempo hasta la progresión (TTP, *Time To Progression*). TTP se definió como el tiempo desde la aleatorización hasta la primera manifestación de enfermedad progresiva.

Los análisis intermedios previamente planificados de ambos estudios mostraron que la combinación de REVLIMID/dexametasona fue significativamente superior a dexametasona sola para TTP. Los estudios fueron subsiguientemente abiertos para permitir que los pacientes del grupo placebo/dexametasona aún en estudio recibieran tratamiento con la combinación REVLIMID/dexametasona. Para ambos estudios, se analizaron los datos de seguimiento prolongado acerca de la sobrevida con entrecruzamientos. En el estudio 1, la mediana del tiempo de sobrevida fue 39,4 meses (IC 95%: 32,9; 47,4) en el grupo REVLIMID/dexametasona y 31,6 meses (IC 95%: 24,1; 40,9) en el grupo placebo/dexametasona con un cociente de riesgo de 0,79 (IC 95%: 0,61 -1,03). En el estudio 2, la mediana del tiempo de sobrevida fue 37,5 meses (IC 95%: 29,9; 46,6) en el grupo REVLIMID/dexametasona y 30,8 meses (IC 95%: 23,5-40,3) en el grupo placebo/dexametasona, con un cociente de riesgo de 0,86 (IC 95%: 0,65-1,14).

Tabla 5: Resultados del TTP en el estudio 1 y en el estudio 2

	Estudio 1		Estudio 2	
	REVLIMID/Dex N=177	Placebo/Dex N=176	REVLIMID/Dex N=176	Placebo/Dex N=175
<b>TTP</b>				
Eventos n (%)	73 (41)	120 (68)	68 (39)	130 (74)
TTP mediano en meses [IC 95%]	13,9 [9,5; 18,5]	4,7 [3,7; 4,9]	12,1 [9,5; NE]	4,7 [3,8; 4,8]
Cociente de riesgos instantáneos ( <i>hazard ratio</i> ) [IC 95%]	0,285 [0,210; 0,386]		0,324 [0,240; 0,438]	
Prueba del orden logarítmico valor de p 3	<0,001		<0,001	
<b>Respuesta</b>				



Respuesta completa (CR) n (%)	23 (13)	1 (1)	27 (15)	7 (4)
Respuesta parcial (RR/PR) n (%)	84 (48)	33 (19)	77 (44)	34 (19)
Respuesta global n (%)	107 (61)	34 (19)	104 (59)	41 (23)
Valor de p	<0,001		<0,001	
Cociente de posibilidades [IC 95%]	6,38 [3,95; 10,32]		4,72 [2,98; 7,49]	

Figura : Valor estimado según Kaplan-Meier del tiempo hasta la progresión – Estudio 1





Figura : Valor estimado según Kaplan-Meier del tiempo hasta la progresión – Estudio 2





**Tiempo hasta la progresión (meses)**

**Síndromes mielodisplásicos con anomalía citogenética por delección del 5q**

A.N.M.A.T. - MESA DE ENTRADAS  
 TRANSFUSIÓN N.º..... **988**

Se evaluó la eficacia y seguridad de REVLIMID en pacientes con anemia dependiente de transfusión en MDSSMD de riesgo bajo o Intermedio 1 con una anomalía citogenética por delección del 5q (q31-33) en aislamiento o con anomalías citogenéticas adicionales, en una dosis de 10 mg una vez por día o 10 mg una vez por día durante 21 días cada 28 días en un estudio abierto, de grupo único, en múltiples centros. El estudio principal no fue diseñado ni tenía la potencia para comparar de forma prospectiva la eficacia de los dos regímenes de administración. Se permitieron reducciones secuenciales de dosis a 5 mg diarios y 5 mg día por medio, así como retrasos de dosis, por toxicidad (*Posología y administración*).

Este estudio principal reclutó a 148 pacientes que tenían anemia dependiente de transfusión de glóbulos rojos. La dependencia de la transfusión de glóbulos rojos se definió como haber recibido  $\geq 2$  unidades de glóbulos rojos dentro de las 8 semanas anteriores al tratamiento del estudio. El estudio incorporó a pacientes con recuentos absolutos de neutrófilos (ANC)  $\geq 500$  células/mm<sup>3</sup>, recuentos plaquetarios  $\geq 50.000$ /mm<sup>3</sup>, creatinina sérica  $\leq 2,5$  mg/dL, SGOT/AST o SGPT/ALT séricos  $\leq 3$  x límite superior del normal (ULN), y bilirrubina directa sérica  $\leq 2,0$  mg/dL. Se permitió el factor estimulante de colonias de granulocitos para los pacientes que manifestaron neutropenia o fiebre asociada con neutropenia. Las características basales de los pacientes y relacionadas con la enfermedad se resumen en la tabla 6.

**Tabla 6: Características basales demográficas y relacionadas con la enfermedad en el estudio sobre SMD**

Global (N=148)		
<b>Edad (años)</b>		
Mediana	71,0	
Mín, Máx	37,0	95,0
<b>Género</b>		
	n	(%)
Hombres	51	(34,5)
Mujeres	97	(65,5)
<b>Raza</b>		
	n	(%)
Blanca	143	(96,6)
Otra	5	(3,4)
<b>Duración de SMD (años)</b>		
Mediana	2,5	
Mín, Máx	0,1	20,7
<b>Anomalía citogenética Del 5 (q31-33)</b>		
	n	(%)



	148	(100,0)
Otras anomalías citogenéticas	37	(25,2)
<b>Puntaje IPSS [a]</b>	<b>n</b>	<b>(%)</b>
Bajo (0)	55	(37,2)
Intermedio-1 (0,5-1,0)	65	(43,9)
Intermedio-2 (1,5-2,0)	6	(4,1)
Alto ( $\geq 2,5$ )	2	(1,4)
Faltante	20	(13,5)
<b>Clasificación FAB [b] de revisión central</b>	<b>n</b>	<b>(%)</b>
RA	77	(52,0)
RARS	16	(10,8)
RAEB	30	(20,3)
CMMML	3	(2,0)

<sup>[a]</sup> Categoría de riesgo IPSS: Bajo (puntaje combinado = 0), Intermedio-1 (puntaje combinado = 0,5 a 1,0), Intermedio-2 (puntaje combinado = 1,5 a 2,0), Alto (puntaje combinado  $\geq 2,5$ ); Puntaje combinado = (puntaje de blastos en médula + puntaje cariotipo + puntaje citopenia).

<sup>[b]</sup> Clasificación francesa-norteamericana-británica (FAB) del SMD.

La frecuencia de independencia de transfusión de glóbulos rojos se modificó a partir de los criterios de respuesta del Grupo de Trabajo Internacional (IWG, *International Working Group*) para SMD. La independencia de transfusión de glóbulos rojos se definió como la ausencia de toda transfusión de glóbulos rojos durante 56 días (8 semanas) consecutivos "sucesivos" durante el período de tratamiento.

La independencia de transfusión se observó en 99/148 (67%) pacientes (IC 95% [59, 74]). La mediana de la duración desde la fecha cuando se declaró por primera vez la independencia de transfusión de glóbulos rojos (es decir, el último día del periodo de 56 días libre de transfusión) hasta la fecha cuando se recibió una transfusión adicional luego del periodo de 56 días libre de transfusión entre los 99 respondedores fue de 44 semanas (rango de 0 a >67 semanas). El 90% de los pacientes que lograron un beneficio en sus transfusiones lo hicieron al completar tres meses en el estudio.

Las tasas de independencia de transfusión de glóbulos rojos no se vieron afectadas por la edad o el género.

La dosis de REVLIMID se redujo o se interrumpió por lo menos una vez debido a un evento adverso en 118 (79,7%) de los 148 pacientes; la mediana de tiempo hasta la primera reducción o interrupción de dosis fue de 21 días (media, 35,1 días; rango, 2-253 días), y la mediana de la duración de la primera interrupción de dosis fue de 22 días (media, 28,5 días; rango, 2-265 días). Una segunda reducción o interrupción de dosis debido a eventos adversos fue necesaria en 50 (33,8%) de los 148 pacientes. La mediana del intervalo entre la primera y la segunda reducción o interrupción de dosis fue de 51 días (media, 59,7 días; rango, 15-205 días) y la mediana de la duración de la segunda interrupción de dosis fue de 21 días (media, 26 días; rango, 2-148 días).





Características basales de la enfermedad y terapia previa contra el linfoma	Total de pacientes (N=134)
Carga tumoral alta <sup>c</sup> , n (%)	77 (57)
Enfermedad voluminosa <sup>d</sup> , n (%)	44 (33)
Enfermedad extranodal, n (%)	101 (75)
Número de terapias sistemáticas anti-linfoma previas, n (%)	
Mediana (rango)	4 (2, 10)
1 <sup>a</sup>	0 (0)
2	29 (22)
3	34 (25)
≥ 4	71 (53)
Número de sujetos que recibieron una terapia previa conteniendo, n (%):	
Antraciclina/mitoxantrona	133 (99)
Ciclofosfamida	133 (99)
Rituximab	134 (100)
Bortezomib	134 (100)
Resistente a terapia previa con bortezomib, n (%)	81 (60)
Resistente a la última terapia, n (%)	74 (55)
Trasplante autólogo previo de células madre o médula ósea	39 (29)

<sup>a)</sup> ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group

<sup>b)</sup> MIPI = MCL International Prognostic Index

<sup>c)</sup> La carga tumoral alta se define como al menos una lesión que es  $\geq 5$  cm de diámetro o 3 lesiones que son  $\geq 3$  cm de diámetro

<sup>d)</sup> La enfermedad voluminosa se define como al menos una lesión que es  $\geq 7$  cm del diámetro más largo.

Los criterios de valoración en el ensayo de LCM fueron índice de respuesta global (ORR) y duración de la respuesta (DOR). Un comité de revisión independiente determinó la respuesta sobre la base de la revisión de los escaneos radiográficos de acuerdo con una versión modificada de los Criterios de respuesta a los linfomas del taller internacional (Cheson, 1999). La DOR se define como el tiempo desde la respuesta inicial (al menos PR) hasta la progresión documentada de la enfermedad. Los resultados de eficacia de la población de LCM se basaron en todos los pacientes evaluables que recibieron al menos una dosis de la droga en estudio y se presentan en la Tabla 8. La mediana de tiempo hasta la respuesta fue de 2,2 meses (rango 1,8 a 13 mcses).

**Tabla 8: Resultados de respuesta en el ensayo pivotal del linfoma de células de manto**

REV PI AR-005 (REV 22)\_Ene 2017  
CCAMQRA-011/17

20



A.N.M.A.T. - MESA DE ENTRADAS  
 Refoliado N° 160

Análisis de respuesta (N = 133)	N (%)	CI 95%
Índice de respuesta global (IWRC) (CR + CRu + PR)	34 (26)	(18.4 : 33.9)
Respuesta completa (CR + CRu)	9 (7)	(3.1 : 12.5)
CR	1 (1)	
CRu	8 (6)	
Respuesta parcial (PR)	25 (19)	
Duración de la respuesta (meses)	Mediana	IC 95%
Duración de la respuesta global (CR + CRu + PR) (N = 34)	16.6	(7.7; 26.7)

**POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN**

REVLIMID debe tomarse por vía oral a aproximadamente la misma hora todos los días, con o sin la ingesta de alimentos. Las cápsulas de REVLIMID deben tragarse enteras con agua. Las cápsulas no deben abrirse, romperse o masticarse.

**Mieloma múltiple**

**Terapia de combinación con REVLIMID**

La dosis inicial recomendada de REVLIMID es 25 mg una vez por día por vía oral los días 1-21 de ciclos repetidos de 28 días en combinación con dexametasona. En el caso de pacientes > 75 años de edad, puede reducirse la dosis inicial de dexametasona. El tratamiento se debe continuar hasta la progresión de la enfermedad o la aparición de toxicidad inaceptable.

En los pacientes que no son elegibles para auto-HSCT el tratamiento debe continuarse hasta la progresión de enfermedad o la aparición de toxicidad inaceptable. Para pacientes que son elegibles para auto-HSCT la movilización de células madre hematopoyéticas debe ocurrir dentro de los cuatro ciclos de tratamiento que contengan de Revlimid (Vcr Advertencias y Precauciones)

**Ajustes de dosis por toxicidades hematológicas durante el tratamiento del MM**

Se recomiendan los lineamientos de modificación de dosis, tal como se resumen en la Tabla 9 a continuación, para manejar la neutropenia o trombocitopenia grados 3 o 4 u otra toxicidad grado 3 o 4 que se considere en relación con REVLIMID.

Tabla 9: Ajustes de dosis por toxicidades hematológicas para MM

Recuentos plaquetarios	
Trombocitopenia en MM	
Quando las plaquetas:	Acción recomendada:
Caen a < 30.000/mcL	<b>Días 1-21 de ciclos repetidos de 28 días</b> Interrumpir el tratamiento con REVLIMID, seguir con un hemograma completo semanal
Regresan a ≥ 30.000/mcL	Reanudar REVLIMID con una reducción de 5mg de

KARINA A. FLORES  
 COORDINADORA GENERAL  
 APODERADA  
 MN 11.562 - MP 14128  
 MONTE VERDE



	la dosis anterior.
Para cada caída posterior < 30.000/mcL Regresan a $\geq$ 30.000/mcL	Interrumpir el tratamiento con REVLIMID Reanudar REVLIMID con una reducción de 5mg de la dosis anterior. No dosificar por debajo de 5 mg diarios.
<b>Recuento absoluto de neutrófilos (ANC)</b>	
<b>Neutropenia en MM</b>	
<b>Cuando los neutrófilos:</b>	<b>Acción recomendada:</b> <b>Días 1-21 de ciclos repetidos de 28 días</b>
Caen a < 1000/mcL Regresan a $\geq$ 1000/mcL y neutropenia es la única toxicidad	Interrumpir el tratamiento con REVLIMID, seguir con un CBC semanal Reanudar REVLIMID en 25 mg diarios o en la dosis inicial
Regresan a $\geq$ 1000/mcL y hay otra toxicidad	Reanudar REVLIMID en 5 mg menos que la dosis anterior. No dosificar por debajo de 5 mg diarios.
Para cada caída posterior < 1000/mcL Regresan a $\geq$ 1000/mcL	Interrumpir el tratamiento con REVLIMID Reanudar REVLIMID en 5 mg menos que la dosis anterior. No dosificar por debajo de 5 mg diarios.

#### Terapia de mantenimiento con REVLIMID luego del auto-HSCT

Después de realizar el auto-HSCT, iniciar el tratamiento de mantenimiento con REVLIMID luego de una adecuada recuperación hematológica (ANC  $\geq$  1000/mcl y/o recuento de plaquetas  $\geq$  75.000/mcl). La dosis inicial de REVLIMID recomendada es 10 mg diarios en forma continua (Días 1-28 de ciclos repetidos de 28 días) hasta la progresión de la enfermedad o la aparición de toxicidad inaceptable. Después de 3 ciclos de terapia de mantenimiento, la dosis puede aumentarse a 15 mg diarios si es tolerada.

#### Ajuste de dosis para toxicidades hematológicas durante el tratamiento de MM

Para manejar la neutropenia o la trombocitopenia de Grado 3 o 4 u otra toxicidad de Grado 3 o 4 que se considere relacionada con REVLIMID, se recomienda seguir las directrices para la modificación de dosis resumidas en la Tabla 10 que está a continuación.

**Tabla 10: Ajustes de dosis para toxicidades hematológicas para MM**

#### Recuentos plaquetarios

<b>Trombocitopenia en MM</b>	
<b>Cuando las plaquetas:</b>	<b>Acción recomendada:</b>
Caen a < 30.000/mcl	Interrumpir el tratamiento con REVLIMID, realizar un hemograma completo semanal
Regresan a $\geq$ 30.000/mcL	Reanudar REVLIMID en la dosis inmediatamente



inferior, en forma continua los Días 1-28 de ciclos repetidos de 28 días.

Si la dosis diaria es de 5 mg,  
Para una caída posterior < 30.000/mcL

Interrumpir el tratamiento con REVLIMID. No dosificar por debajo de 5 mg diarios los Días 1 a 21 del ciclo de 28 días.

A.N.M.A.T. - MESA DE ENTRADAS  
Refoliado N° 161

Regresan a  $\geq$  30.000/mcL

Reanudar REVLIMID con 5 mg diarios los Días 1 a 21 del ciclo de 28 días. No dosificar por debajo de 5 mg diarios los Días 1 a 21 del ciclo de 28 días.

**Recuento absoluto de neutrófilos (ANC)**

**Neutropenia en MM**

<b>Cuando los neutrófilos:</b>	<b>Acción recomendada:</b>
Caen a < 500/mcL	Interrumpir el tratamiento con REVLIMID, hacer un hemograma completo semanal
Regresan a $\geq$ 500/mcL	Reanudar REVLIMID con la dosis inmediatamente inferior, en forma continua los Días 1-28 de ciclos repetidos de 28 días.
Si la dosis diaria es de 5 mg Para cada caída posterior < 1000/mcL	Interrumpir el tratamiento con REVLIMID. No dosificar por debajo de 5 mg diarios los Días 1 a 21 del ciclo de 28 días.
Regresan a $\geq$ 500/mcL	Reanudar REVLIMID con 5 mg diarios los Días 1 a 21 del ciclo de 28 días. No dosificar por debajo de 5 mg diarios los Días 1 a 21 del ciclo de 28 días.

**Otras toxicidades en MM**

En cuanto a otras toxicidades grados 3/4 que se consideran relacionadas con REVLIMID, suspender el tratamiento y reiniciar, según el criterio del médico, en el próximo nivel de dosis más bajo cuando se resuelva la toxicidad a  $\leq$  grado 2.

**Ajuste de la dosis inicial para insuficiencia renal en mieloma múltiple**

(ver Tabla 11)

**Síndromes mielodisplásicos**

La dosis inicial recomendada de REVLIMID es 10 mg diarios. El tratamiento se continúa o modifica sobre la base de resultados clínicos y de laboratorio.

**Ajustes de dosis por toxicidades hematológicas durante el tratamiento del síndrome mielodisplásico**



Los pacientes que reciben una dosis inicial de 10 mg y que experimentan trombocitopenia deben tener un ajuste de dosis de la siguiente manera:

<b>Recuento de plaquetas</b>	
<b>Si se manifiesta trombocitopenia DENTRO de las 4 semanas de iniciar el tratamiento con 10 mg diarios en SMD:</b>	
<b>Si el basal es <math>\geq 100.000/\text{mcL}</math></b>	
<b>Cuando las plaquetas:</b>	<b>Acción recomendada:</b>
Caen a $< 50.000/\text{mcL}$	Interrumpir tratamiento con REVLIMID
Regresan a $\geq 50.000/\text{mcL}$	Reanudar REVLIMID en 5 mg diarios
<b>Si el basal es <math>&lt; 100.000/\text{mcL}</math></b>	
<b>Cuando las plaquetas:</b>	<b>Acción recomendada:</b>
Caen a 50% del valor basal	Interrumpir tratamiento con REVLIMID
Si el basal es $\geq 60.000/\text{mcL}$ y regresa a $\geq 50.000/\text{mcL}$	Reanudar REVLIMID en 5 mg diarios
Si el basal es $< 60.000/\text{mcL}$ y regresa a $\geq 30.000/\text{mcL}$	Reanudar REVLIMID en 5 mg diarios
<b>Si se manifiesta trombocitopenia DESPUÉS de 4 semanas de iniciar el tratamiento en 10 mg diarios en SMD:</b>	
<b>Cuando las plaquetas:</b>	<b>Acción recomendada:</b>
$< 30.000/\text{mcL}$ ó $< 50.000/\text{mcL}$ y transfusiones plaquetarias	Interrumpir tratamiento con REVLIMID
Regresan a $\geq 30.000/\text{mcL}$ (sin insuficiencia hemostática)	Reanudar REVLIMID en 5 mg diarios

Los pacientes que experimentan trombocitopenia con 5 mg diarios deben tener un ajuste de dosis de la siguiente manera:

<b>Si se manifiesta trombocitopenia durante el tratamiento con 5 mg diarios en SMD:</b>	
<b>Cuando las plaquetas:</b>	<b>Acción recomendada:</b>
$< 30.000/\text{mcL}$ ó $< 50.000/\text{mcL}$ y transfusiones plaquetarias	Interrumpir tratamiento con REVLIMID
Regresan a $\geq 30.000/\text{mcL}$ (sin insuficiencia hemostática)	Reanudar REVLIMID en 5 mg día por medio

Los pacientes que reciben una dosis inicial de 10 mg y que experimentan neutropenia deben tener un ajuste de dosis de la siguiente manera:

<b>Recuento absoluto de neutrófilos (ANC)</b>	
<b>Si se manifiesta neutropenia DENTRO de las 4 semanas de iniciar el tratamiento en 10 mg diarios en SMD:</b>	
<b>Si el ANC basal es <math>\geq 1000/\text{mcL}</math></b>	



<b>Cuando los neutrófilos:</b>	<b>Acción recomendada:</b>	
Caen a < 750/mcL Regresan a $\geq$ 1000/mcL	Interrumpir tratamiento con REVLIMID Reanudar REVLIMID en 5 mg diarios	
<b>Si el ANC basal &lt; 1000/mcL</b>		A.N.M.A.T. MESA DE ENTRADAS
<b>Cuando los neutrófilos:</b>	<b>Acción recomendada:</b>	Refoliado N. 162
Caen a < 500/mcL Regresan a $\geq$ 500/mcL	Interrumpir tratamiento con REVLIMID Reanudar REVLIMID en 5 mg diarios	
<b>Si se manifiesta neutropenia DESPUÉS de 4 semanas de iniciar tratamiento en 10 mg diarios en SMD:</b>		
<b>Cuando los neutrófilos:</b>	<b>Acción recomendada:</b>	
< 500/mcL por $\geq$ 7 días ó < 500/mcL asociado con fiebre ( $\geq$ 38,5°C) Regresan a $\geq$ 500/mcL	Interrumpir tratamiento con REVLIMID Reanudar REVLIMID en 5 mg diarios	

Los pacientes que experimentan neutropenia en 5 mg diarios deben tener un ajuste de dosis de la siguiente manera:

<b>Si se manifiesta neutropenia durante el tratamiento con 5 mg diarios en SMD:</b>	
<b>Cuando los neutrófilos:</b>	<b>Acción recomendada:</b>
< 500/mcL por $\geq$ 7 días ó < 500/mcL asociado con fiebre ( $\geq$ 38,5°C) Regresan a $\geq$ 500/mcL	Interrumpir tratamiento con REVLIMID Reanudar REVLIMID en 5 mg día por medio

**Otras toxicidades grados 3/4 en SMD**

En cuanto a otras toxicidades grados 3/4 que se consideran relacionadas con REVLIMID, suspender el tratamiento y reiniciar, según el criterio del médico, en el próximo nivel de dosis más bajo cuando la toxicidad se haya resuelto a  $\leq$  grado 2.

**Ajuste de la dosis inicial para insuficiencia renal en SMD:**

(ver Tabla 11)

**Linfoma de células del manto**

La dosis inicial recomendada de REVLIMID es de 25 mg/día por vía oral en los días 1-21 de ciclos repetidos de 28 días para el linfoma de células del manto en recidiva o refractario. El tratamiento debe continuar hasta la progresión de la enfermedad o hasta que se manifieste una toxicidad inaceptable.

El tratamiento continúa, se modifica o se discontinúa sobre la base de los hallazgos clínicos o de laboratorio.

**Ajustes de dosis por toxicidades hematológicas durante el tratamiento de LCM**

Se recomiendan los lineamientos de modificación de dosis, tal como se resumen a continuación, para manejar la neutropenia o trombocitopenia grados 3 o 4 u otras toxicidades grado 3 o 4 que se consideren en relación con REVLIMID.



Recuento de plaquetas	
Si se manifiesta trombocitopenia durante el tratamiento en LCM:	
Cuando las plaquetas:	Acción recomendada:
Caen a < 50.000/mcL	Interrumpir tratamiento con REVLIMID y realizar un hemograma completo de forma semanal
Regresan a $\geq$ 50.000/mcL	Reanudar REVLIMID en 5 mg menos que la dosis anterior. No dosificar por debajo de 5 mg diarios.

Recuento absoluto de neutrófilos (ANC)	
Neutropenia durante el tratamiento en LCM:	
Cuando los neutrófilos:	Acción recomendada:
Caen a <1000/mcL por al menos 7 días	Interrumpir tratamiento con REVLIMID y realizar un hemograma completo de forma semanal
o Caen a <1.000/mcL con una temperatura asociada $\geq$ 38,5° C	
o Caen a <500/mcL	
Regresan a $\geq$ 1.000/mcL	Reanudar REVLIMID en 5 mg menos que la dosis anterior. No dosificar por debajo de 5 mg diarios.

**Otras toxicidades grados 3/4 en LCM**

En cuanto a otras toxicidades grados 3/4 que se consideran relacionadas con REVLIMID, suspender el tratamiento y reiniciar, según el criterio del médico, en el próximo nivel de dosis más bajo cuando la toxicidad se haya resuelto a  $\leq$  grado 2.

**Ajuste de dosis inicial para insuficiencia renal en LCM:**

(Ver Tabla 11)

**Dosis inicial para insuficiencia renal**

Las recomendaciones para las dosis iniciales para pacientes con insuficiencia renal se indican en la siguiente tabla (ver *Poblaciones Especificas*).

**Tabla 11. Ajuste de dosis inicial para insuficiencia renal**

Función renal (Cockcroft-Gault)	Dosis en terapia de combinación con REVLIMID para MM y para LCM	Dosis en terapia de mantenimiento con REVLIMID después de auto-HSCT para MM y para SMD



CLcr 30 a 60 mL/min	10 mg una vez por día	5 mg una vez por día
CLcr < 30 mL/min (no requiere diálisis)	15 mg día por medio	5 mg Día por medio
CLcr < 30 mL/min (requiere diálisis)	5 mg una vez por día. Los días de diálisis, administrar la dosis después de la diálisis.	5 mg Tres veces por semana, administrar luego de la diálisis

A.N.M.T. - MESA DE ENTRADAS  
Folio N° 163

Terapia de combinación con REVLIMID para MM: para CLcr 30 a 60 mL/min, considerar la escalada de la dosis a 15 mg después de 2 ciclos si el paciente tolera la dosis de 10 mg de lenalídomida sin toxicidad limitante de la dosis.

Terapia de mantenimiento con REVLIMID después del auto-HSCT para MM y para MCL, y SMD: basar el aumento o la disminución subsiguiente de la dosis de REVLIMID en la tolerancia al tratamiento de cada paciente (ver *Posología y administración*).

**CONTRAINDICACIONES**

**Embarazo**

REVLIMID puede provocar daños al feto si se administra a una mujer embarazada. Se observaron anomalías en las extremidades de las crías de monas que recibieron lenalídomida durante la organogénesis. Este efecto se observó en todas las dosis analizadas. Debido a los resultados de este estudio del desarrollo en monos y la semejanza estructural de lenalídomida con talidomida, un teratógeno humano conocido, lenalídomida está contraindicado en mujeres embarazadas. Si este fármaco se utiliza durante el embarazo o si la paciente queda embarazada durante el tratamiento con esta medicación, el paciente debe ser notificado respecto del riesgo potencial para el feto.

**Reacciones severas de hipersensibilidad**

REVLIMID está contraindicado en pacientes que demostraron hipersensibilidad (por ejemplo, angioedema, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica) a lenalídomida.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

**Toxicidad embrionaria y fetal**

REVLIMID es un análogo de talidomida y está contraindicado su uso durante el embarazo. Talidomida es un conocido teratógeno humano que provoca defectos congénitos que pueden poner en peligro la vida. Un estudio de desarrollo embriofetal en monos indica que lenalídomida produjo malformaciones en la cría de monas que recibieron el medicamento durante el embarazo, lo cual se asemeja a los defectos congénitos observados en humanos tras la exposición a talidomida durante el embarazo.

REVLIMID sólo está disponible por medio del Programa de Minimización de Riesgo.

IF-2018-12042984  
 KARINA A. FLORES  
 CO-DIRECTORA TÉCNICA  
 ANMAT  
 11.582 - MP 14128  
 MONTE VERDE S.A.



#### **Pacientes femeninas en edad reproductiva:**

Las mujeres en edad reproductiva deben evitar el embarazo por al menos 4 semanas antes de comenzar la terapia con REVLIMID, durante la terapia, durante las interrupciones de la dosis y por 4 semanas luego de completar el tratamiento.

Las pacientes femeninas deben comprometerse a mantener una abstinencia sexual heterosexual o a usar dos métodos anticonceptivos confiables, a partir de 4 semanas antes de iniciar el tratamiento con REVLIMID, durante la terapia, durante las interrupciones de dosis y continuar por 4 semanas luego de la discontinuación de la terapia con REVLIMID.

Se debe obtener una prueba de embarazo negativa antes de iniciar el tratamiento. La prueba de embarazo debe realizarse dentro de las 72 horas previas a la prescripción de la terapia de REVLIMID, y luego en forma mensual en mujeres con ciclos menstruales regulares o cada 2 semanas en mujeres con ciclos menstruales irregulares [*Ver Uso en Poblaciones Específicas*].

#### **Pacientes masculinos:**

Lenalidomida está presente en el semen de pacientes que reciben el fármaco. Por tal motivo, los pacientes masculinos siempre deben usar preservativo de látex o sintético durante cualquier contacto sexual con mujeres en edad reproductiva mientras reciben REVLIMID y por hasta 4 semanas después de discontinuar REVLIMID, incluso si se han sometido a una vasectomía exitosa. Los pacientes masculinos que toman REVLIMID no deben donar esperma [*Ver Uso en Poblaciones Específicas*].

#### **Donación de sangre:**

Los pacientes no deben donar sangre durante el tratamiento con REVLIMID y durante 4 semanas tras la discontinuación del medicamento ya que la sangre podría darse a una paciente embarazada cuyo feto no debe exponerse a REVLIMID.

#### **Riesgo reproductivo y requisitos especiales de prescripción**

##### **(Programa de Minimización de Riesgo)**

Debido al riesgo embrionario y fetal [*Ver Uso en Poblaciones Específicas*], REVLIMID sólo está disponible por medio de un programa restringido bajo un Plan de Minimización de Riesgo.

Los componentes requeridos del Programa son los siguientes:

- Los médicos deben estar registrados por el programa al inscribirse y cumplir con los requerimientos.
- Los pacientes deben firmar un Consentimiento informado y cumplir con los requerimientos. En particular, las pacientes en edad reproductiva que no están embarazadas deben cumplir con los requerimientos en relación con las pruebas de embarazo y los métodos anticonceptivos.

Solo debe entregarse REVLIMID a pacientes que están autorizados para recibir este producto y cumplen con los requerimientos del Programa de Minimización de Riesgo

Para mayor información acerca del programa comunicarse con Laboratorio Raffo al telefono: 4509-7100 y/o por e-mail: [fvigilancia@raffo.com.ar](mailto:fvigilancia@raffo.com.ar)

Si se produce un embarazo durante el tratamiento, debe suspenderse de inmediato el tratamiento con REVLIMID.

REV PI AR-005 (REV 22)\_Ene 2017  
CCAMQRA-011/17

28

FARM. KARINA A. FLORES  
C. DIRECTORA TÉCNICA  
APODERADA  
IF-2018-12042984-ANN-1563-18-1128  
MONTE VERDE S.A.



Toda sospecha de exposición del feto a REVLIMID debe ser informada a la ANMAT y al Laboratorio de Diagnóstico de la ANMAT. Raífo al teléfono: 4509-7100 y/o por e-mail: fvigilancia@raffo.com.ar

A.N.M.A.T. - MESA DE ENTRADAS
Refollado N° 169

### Toxicidad hematológica

REVLIMID puede causar neutropenia y trombocitopenia significativas.

Controlar a los pacientes con neutropenia para detectar signos de infección. Indicar a los pacientes que observen si hay sangrado o hematomas, particularmente con el uso de medicamentos concomitantes que pueden aumentar el riesgo de sangrado. Los pacientes que toman REVLIMID deben realizarse recuentos sanguíneos completos de forma periódica según se describe a continuación.

Los pacientes que toman REVLIMID en combinación con dexametasona o como terapia de mantenimiento DE REVLIMID para MM deben realizarse recuentos sanguíneos completos cada 7 días (semanalmente) por los primeros 2 ciclos, en los Días 1 y 15 del Ciclo 3, y cada 28 días (4 semanas) de ahí en adelante. Puede ser necesaria una interrupción y/o reducción de dosis. En estudios clínicos sobre terapia de mantenimiento para MM, se informó neutropenia grado 3 o 4 en hasta el 59% de pacientes tratados con REVLIMID y trombocitopenia grado 3 o 4 en hasta el 38% de los pacientes tratados con REVLIMID.

Los pacientes que toman REVLIMID para el síndrome mielodisplásico (SMD) deben realizarse recuentos sanguíneos completos semanalmente durante las primeras 8 semanas y por lo menos mensualmente de ahí en adelante. Los pacientes que toman REVLIMID para mieloma múltiple deben realizarse recuentos sanguíneos completos cada dos semanas durante las primeras 12 semanas y luego mensualmente de ahí en adelante. Se observó toxicidad hematológica grado 3 o 4 en el 80% de los pacientes incluidos en el estudio sobre síndrome mielodisplásico. En el 48% de los pacientes que desarrollaron neutropenia grado 3 o 4, la mediana de tiempo hasta la manifestación fue de 42 días (rango, 14-411 días) y la mediana de tiempo hasta la recuperación documentada fue de 17 días (rango, 2-170 días). En el 54% de los pacientes que desarrollaron trombocitopenia grado 3 o 4, la mediana de tiempo hasta la manifestación fue de 28 días (rango, 8-290 días) y la mediana de tiempo hasta la recuperación documentada fue de 22 días (rango, 5-224 días).

Los pacientes que toman REVLIMID para LCM deben realizarse recuentos sanguíneos completos semanalmente durante el primer ciclo (28 días), cada 2 semanas durante los ciclos 2-4, y luego mensualmente de ahí en adelante. Los pacientes pueden requerir la interrupción de la dosis y/o la reducción de la dosis.

En el ensayo de LCM, se informó neutropenia grado 3 y 4 en el 43 % de los pacientes. Se informó trombocitopenia grado 3 o 4 en el 28 % de los pacientes.

### Tromboembolia venosa y arterial

Los eventos tromboembólicos venosos [ETV (TVP y TEP)], y eventos tromboembólicos arteriales (TEA, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular) aumentan en pacientes tratados con REVLIMID. Un riesgo significativamente aumentado de trombosis venosa profunda (7,4%) y de embolia pulmonar (3,7%) surgió en pacientes con MM, después de por lo menos una terapia previa, que fueron tratados con REVLIMID y terapia de dexametasona en comparación con pacientes tratados en el grupo con placebo y dexametasona



(3,1% y 0,9%) en ensayos clínicos con uso variable de terapias anticoagulantes. En el estudio de mieloma múltiple recientemente diagnosticado (NDMM) en el cual casi todos los pacientes recibieron profilaxis antitrombótica, se informó TVP como reacción adversa seria (3,6%; 2,0% y 1,7%) en las ramas Rd Continuous, Rd18 y MPT, respectivamente. La frecuencia de reacciones adversas serias de EI<sup>3</sup> fue similar entre las ramas Rd Continuous, Rd18 y MPT (3,8%; 2,8% y 3,7%, respectivamente).

El infarto de miocardio (1,7%) y el accidente cerebrovascular ACV (2,3%) aumentan en pacientes con MM después de por lo menos una terapia previa en la que fueron tratados con REVLIMID y dexametasona en comparación con pacientes tratados con placebo y dexametasona (0,6% y 0,9%) en los estudios clínicos. En el estudio NDMM, se informó infarto de miocardio (incluido el agudo) como una reacción adversa seria (2,3%; 0,6% y 1,1%) en las ramas Rd Continuous, Rd18 y MPT, respectivamente. La frecuencia de reacciones adversas serias de ACV fue similar entre las ramas Rd Continuous, Rd18 y MPT (0,8%; 0,6% y 0,6%, respectivamente). Los pacientes con factores de riesgo conocidos, incluyendo trombosis previas, pueden estar en un riesgo mayor y se deben tomar acciones para tratar de minimizar todos los factores modificables (por ejemplo, hiperlipidemias, hipertensión, tabaquismo).

En ensayos clínicos controlados que no utilizaron tromboprolifaxis concomitante, el 21,5% de los eventos trombóticos globales (eventos embólicos y trombóticos de consulta estándar en el Diccionario Médico para Actividades Regulatorias) ocurrió en pacientes con MM refractario y en recaída que fueron tratados con REVLIMID y dexametasona en comparación con 8,3% de trombosis en pacientes tratados con placebo y dexametasona. La mediana de tiempo hasta el primer evento de trombosis fue 2,8 meses. En el estudio NDMM, en el cual casi todos los pacientes recibieron profilaxis antitrombótica, la frecuencia global de eventos trombóticos fue del 17,4% en pacientes en las ramas Rd Continuous y Rd18 combinadas, y del 11,6% en la rama MPT. La mediana del tiempo hasta el primer evento de trombosis fue de 4,3 meses en las ramas Rd Continuous y Rd18 combinadas. Se recomienda tromboprolifaxis. El régimen de tromboprolifaxis se debe hacer sobre la base de una evaluación de los riesgos subyacentes del paciente. Instruya a los pacientes para que informen de inmediato cualquier signo o síntoma que podría sugerir eventos trombóticos. Los agentes estimuladores de la eritropoyesis (ESA) y los estrógenos podrían, además, aumentar el riesgo de trombosis y su uso se debe basar en una decisión sobre el riesgo-beneficio en pacientes que reciben REVLIMID.

#### **Aumento de mortalidad en pacientes con LLC**

En un ensayo clínico prospectivo aleatorizado (1:1) en el tratamiento de primera línea de pacientes con leucemia linfocítica crónica, el tratamiento con el agente único REVLIMID aumentó el riesgo de muerte en comparación con el agente único clorambucilo. En un análisis intermedio, hubo 34 muertes entre 210 pacientes en la rama de tratamiento con REVLIMID en comparación con 18 muertes entre 211 pacientes en la rama de tratamiento con clorambucilo, y el hazard ratio para la supervivencia global fue de 1,92 [IC del 95%: 1,08 – 3,41], consistente con un aumento del 92% en el riesgo de muerte. El ensayo se suspendió por cuestiones de seguridad en julio de 2013.

Las reacciones adversas cardiovasculares serias, incluidos fibrilación auricular, infarto de miocardio y falla cardíaca, ocurrieron más frecuentemente en la rama de tratamiento de REVLIMID. REVLIMID no está indicado ni tampoco recomendado para LLC fuera de los ensayos clínicos controlados.



### Segundas neoplasias primarias

En ensayos clínicos en pacientes con MM que recibían REVLIMID, se observó un aumento de segundas neoplasias primarias hematológicas más tumor sólido (SPM, por sus siglas en inglés), particularmente LMA y SMD. El aumento SPM hematológicas, incluyendo de casos de LMA y SMD se produjeron en 5,3% de los pacientes con NDMM que recibían REVLIMID en combinación con melfalán oral, en comparación con 1,3% de pacientes que recibían melfalán sin REVLIMID. La frecuencia de casos de LMA y SMD en pacientes con NDMM tratados con REVLIMID en combinación con dexametasona sin melfalán se observó en 0,4% de los casos.

En pacientes que recibieron terapia de mantenimiento con REVLIMID seguida de dosis alta de melfalán intravenoso y auto-HSCT, se produjeron SPM hematológicas en 7,5 % de los casos, en comparación con 3,3 % de pacientes que recibieron placebo. La incidencia de SPM de tumores hematológicos además de tumores sólidos (excluyendo carcinoma de células escamosas y carcinoma de células basales) fue de 14,9 % en comparación con 8,8 % en pacientes que recibieron placebo con un seguimiento promedio de 91,5 meses. La SPM de cáncer de piel no melanoma, incluyendo carcinoma de células escamosas y carcinoma de células basales se produjo en 3,9 % de los pacientes que recibían terapia de mantenimiento con REVLIMID, en comparación con 2,6 % de la rama placebo.

En pacientes con MM recurrente o refractario tratados con REVLIMID/dexametasona, la incidencia de SPM de tumores hematológicos además de tumores sólidos (excluyendo carcinoma de células escamosas y carcinoma de células basales) fue de 2,3 % versus 0,6 % en la rama de dexametasona sola. La SPM de cáncer de piel no melanoma, incluyendo carcinoma de células escamosas y carcinoma de células basales se produjo en 3,1 % de los pacientes que recibían terapia de mantenimiento con REVLIMID/dexametasona, en comparación con 0,6 % de la rama dexametasona sola.

Los pacientes que recibieron terapia con REVLIMID hasta la progresión de la enfermedad no mostraron una mayor incidencia de segundas neoplasias primarias invasivas que los pacientes tratados en las ramas con REVLIMID de duración fija. Seguir de cerca a los pacientes a fin de detectar el desarrollo de segundas neoplasias primarias. Tener en cuenta tanto el posible beneficio de REVLIMID como el riesgo de segundas neoplasias primarias cuando se considera el tratamiento con REVLIMID.

### Hepatotoxicidad

Se han presentado casos de insuficiencia hepática, incluyendo casos fatales, en los pacientes tratados con lenalidomida en combinación con dexametasona. En estudios clínicos el 15 % de los pacientes experimentó hepatotoxicidad (con características hepatocelulares, colestáticas y mixtas); 2 % de los pacientes con MM y el 1 % de los pacientes con Mielodisplasia tuvieron eventos serios de hepatotoxicidad.. Se desconoce el mecanismo de la hepatotoxicidad inducida por el medicamento. Entre los posibles factores de riesgo destacan las enfermedades virales hepáticas preexistentes, los elevados niveles iniciales de enzimas hepáticas y las medicaciones concomitantes. Se debe realizar un control periódico de las enzimas hepáticas e interrumpir la administración de Revlimid si se detecta elevación de dichas enzimas. Una vez alcanzados nuevamente los valores iniciales, se puede considerar la reanudación del tratamiento con una dosis más baja.



**Reacciones cutáneas severas que incluyen reacciones de hipersensibilidad** Se informaron angioedema y reacciones cutáneas severas, incluso síndrome de Stevens-Johnson necrólisis epidérmica tóxica (TEN) y reacción farmacológica con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS). DRESS puede presentarse con una reacción cutánea (como erupción cutánea o dermatitis exfoliativa), eosinofilia, fiebre y / o linfadenopatía con complicaciones sistémicas como hepatitis, nefritis, neumonitis, miocarditis y / o pericarditis. Estos eventos pueden ser fatales. Los pacientes con antecedentes de erupción cutánea grado 4 asociada con el tratamiento con talidomida no deben recibir REVLIMID. Debe considerarse la interrupción o suspensión de REVLIMID por erupción cutánea grado 2-3. REVLIMID debe suspenderse en caso de angioedema, erupción cutánea grado 4, erupción cutánea exfoliativa o bullosa o si hay sospechas de síndrome de Stevens-Johnson, TEN o DRESS y no debe reanudarse después de la suspensión debido a estas reacciones.

#### **Síndrome de lisis tumoral**

Se informaron instancias fatales de síndrome de lisis tumoral durante el tratamiento con lenalidomida. Los pacientes en riesgo de síndrome de lisis tumoral son aquellos con alta carga tumoral antes del tratamiento. Estos pacientes deben seguirse de cerca y se deben tomar las precauciones debidas.

#### **Reacción de llamarada en el tumor**

Se produjo la reacción de llamarada en el tumor durante el uso de lenalidomida en la fase de investigación para tratar la leucemia linfocítica crónica (CLL, *Chronic Lymphocytic Leukemia*) y linfoma, y se caracteriza por una inflamación de los ganglios linfáticos, febrícula, dolor y erupción cutánea. REVLIMID no está indicado ni tampoco recomendado para LLC fuera de los ensayos clínicos controlados

Se recomienda el monitoreo y la evaluación de las reacciones de llamarada en el tumor en pacientes con LCM. La reacción de llamarada en el tumor puede imitar la progresión de la enfermedad (PE). En el ensayo de LCM, 13/134 (10%) de los pacientes experimentaron reacciones de llamarada; todos los casos notificados fueron de grado 1 o 2. Todos los episodios tuvieron lugar en el ciclo 1 y un paciente desarrolló reacciones de llamarada nuevamente en el ciclo 11. Se puede continuar la administración de lenalidomida en pacientes con reacciones de llamarada de grados 1 y 2 sin interrupción o modificación, según el criterio del médico. Los pacientes con reacciones de llamarada de grado 1 o 2 también pueden recibir tratamiento con corticoides, antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y/o analgésicos narcóticos para el manejo de los síntomas de la reacción de llamarada. En los pacientes con reacción de llamarada grado 3 o 4, se recomienda suspender el tratamiento con lenalidomida hasta que se resuelva la reacción de llamarada a  $\leq$  grado 1. Los pacientes con reacciones de llamarada de grado 3 o 4 pueden recibir tratamiento para el manejo de los síntomas según las directrices para el tratamiento de las reacciones de llamarada de grados 1 y 2.

#### **Alteración de la movilización de células madre**

Se informó una disminución de la cantidad de células CD34+ recolectadas después del tratamiento (> 4 ciclos) con REVLIMID. En pacientes que son candidatos al auto-HSCT, la derivación a un centro de trasplantes se debe realizar al principio del tratamiento para optimizar el momento de la recolección de



células madre. En pacientes que recibieron más de 4 ciclos de un tratamiento de REVLIMID o para quienes se ha recolectado una cantidad inadecuada de células CD34+ con G-CSF solo, se puede considerar G-CSF con ciclofosfamida o la combinación de G-CSF con un inhibidor CXCR4.

A.N.M.A.T. - MESA DE ENTRADAS
Refoliado N° 166

#### Trastornos tiroideos

Se han reportado hipotiroidismo e hipertiroidismo. Medir la función tiroidea antes del inicio del tratamiento con REVLIMID y durante la terapia.

#### Mortalidad prematura en pacientes con MCL

En otro estudio MCL, hubo un aumento en las muertes prematuras (dentro de las 20 semanas), 12.9% en el grupo REVLIMID versus 7.1% en el grupo control. En el análisis exploratorio multivariable, los factores de riesgo de muerte prematura incluyen una carga tumoral alta, una puntuación MIPI en el momento del diagnóstico y un recuento alto de leucocitos (WBC) al inicio ( $\geq 10 \times 10^9 / l$ ).

Uso en pacientes con falla de la función tiroidea: [Ver Reacciones Adversas].

Neuropatía periférica: [Ver Reacciones Adversas].

### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

#### Digoxina

Al co-administrar digoxina con dosis múltiples de REVLIMID (10 mg/día), la  $C_{max}$  y el  $AUC_{0-\infty}$  de digoxina se incrementaron en un 14%. Durante la administración de REVLIMID, se recomienda el monitoreo periódico de los niveles plasmáticos de digoxina de acuerdo con el criterio clínico y sobre la base de la práctica clínica estándar en pacientes que reciben este medicamento.

#### Terapias concomitantes que pueden incrementar el riesgo de trombosis

Los agentes eritropoyéticos u otros agentes que pueden incrementar el riesgo de trombosis, como terapias que contienen estrógenos, deberían utilizarse con precaución luego de hacer una evaluación de riesgo-beneficio en pacientes con mieloma múltiple que reciben REVLIMID.

#### Warfarina

La co-administración de dosis múltiples de REVLIMID (10 mg/día) con una dosis única de warfarina (25 mg) no tuvo efecto sobre la farmacocinética de lenalidomida y R- y S-warfarina. Se observaron cambios esperados en las evaluaciones de laboratorio de tiempo de protrombina (PT, *Prothrombin Time*) y rango internacional normalizado (INR, *International Normalized Ratio*) luego de la administración de warfarina, pero estos cambios no se vieron afectados por la administración concomitante de REVLIMID. Se desconoce si hay interacción entre dexametasona y warfarina. En pacientes con MM que reciben warfarina en forma concomitante, se recomienda controlar el PT y el INR.

### FERTILIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA

#### Registro de exposición

REV PI AR-005 (REV 22)\_Ene 2017  
CCAMQRA-011/17

33

FARM. KARINA A. FLORES  
CO-DIRECTORA TÉCNICA  
APODERADA  
M/ 11.562 - MP 16128  
IF-2018-204298-ANMAT  
ANMAT



## Embarazo

Hay un registro de exposición del embarazo que supervisa los resultados del embarazo en las mujeres expuestas a REVLIMID durante el embarazo, así como las parejas femeninas de los pacientes varones que están expuestos a REVLIMID. Este registro también se utiliza para entender la causa raíz para el embarazo.

### *Resumen de riesgo*

Basándose en el mecanismo de acción y hallazgos de estudios en animales [ver Datos en animales], **REVLIMID puede causar daño embrionario y fetal cuando se administra a una mujer embarazada y está contraindicado durante el embarazo. REVLIMID es un análogo de la talidomida.**

Talidomida es un teratógeno humano, que induce una frecuencia alta de daños congénitos severos y con riesgo de vida, tales como amelia (ausencia de miembros), focomelia (miembros cortos), hipoplasia de los huesos, ausencia de huesos, anomalías externas del oído (incluidas anotía, micropinna, canales auditivos externos pequeños o ausentes), parálisis facial, anomalías del ojo (anoftalmía, microftalmía) y defectos cardíacos congénitos. También se han documentado malformaciones del tracto alimentario, urinario y de los genitales, y se ha reportado mortalidad en el nacimiento o inmediatamente después en aproximadamente el 40 % de los recién nacidos.

Lenalidomida provocó defectos en las extremidades similares a los provocados por talidomida en las crías de monas. La lenalidomida cruzó la placenta después de la administración a conejas embarazadas y ratas preñadas [ver datos en animales]. Si este fármaco se utiliza durante el embarazo o si la paciente queda embarazada mientras toma este fármaco, la paciente debe estar advertida respecto del posible riesgo para el feto.

**Si el embarazo se produce durante el tratamiento, suspender el fármaco inmediatamente. Bajo estas condiciones, derive el paciente a un obstetra/ginecólogo experto en toxicidad reproductiva para mayor evaluación y asesoramiento. Cualquier sospecha de exposición fetal a REVLIMID debe informarse a la ANMAT y al Laboratorio Raffo al teléfono: 4509-7100 y /o por e-mail: [fvigilancia@raffo.com.ar](mailto:fvigilancia@raffo.com.ar)**

Se desconoce el riesgo de fondo estimado de los principales defectos congénitos y abortos espontáneos para la población indicada. El riesgo de fondo estimado en la población general de los Estados Unidos de los principales defectos de nacimiento es del 2% -4% y de aborto espontáneo es del 15%-20% de los embarazos clínicamente reconocidos.

### *Datos en animales*

En un estudio de toxicidad del desarrollo embriofetal en monos, se produjo teratogenicidad, incluso defectos en las extremidades similares a los causados por talidomida, en la cría cuando monas embarazadas recibieron lenalidomida oral durante la organogénesis. La exposición (AUC) en monos en la dosis más baja fue de 0,17 veces la exposición a la máxima dosis recomendada en humanos (MRHD, *Maximum Recommended Human Dose, por sus siglas en inglés*) de 25 mg. Estudios similares en conejas y ratas embarazadas a 20 veces y 200 veces la dosis máxima recomendada en humanos (MRHD) respectivamente evidenciaron embriofetalidad en conejas y ningún efecto adverso relacionado con la reproducción en ratas. En un estudio de desarrollo pre- y posnatal en ratas, los animales recibieron lenalidomida desde la

REV PI AR-005 (REV 22)\_Ene 2017  
CCAMQRA-011/17

34



organogénesis hasta la lactancia. El estudio reveló algunos efectos adversos en las crías de las ratas hembras tratadas con lenalidomida en dosis de hasta 500 mg/kg (aproximadamente 200 veces la dosis humana de 2 mg sobre la base del área de superficie corporal). Las crías macho exhibieron un leve retraso en la madurez sexual y las crías hembra tuvieron aumentos de peso corporal levemente más bajos durante la gestación que las crías macho. Al igual que con talidomida, es posible que el modelo en ratas no aborde, de manera adecuada, todo el espectro de posibles efectos de lenalidomida sobre el desarrollo embrionario en humanos. Después de la administración oral diaria de lenalidomida desde el día 7 de la gestación hasta el día 20 de la Gestación en conejas embarazadas, las concentraciones de lenalidomida en plasma fetal fueron de aproximadamente el 20-40% de la C<sub>max</sub> materna. Después de una sola dosis oral a ratas embarazadas, se detectó lenalidomida en el plasma fetal y tejidos; las concentraciones de radiactividad en los tejidos fetales fueron generalmente inferiores a las de los tejidos maternos. Estos datos indicaron que la lenalidomida atravesaba la placenta.

en la Madurez Sexual	DE ENTRADAS
gestación que	167
retrasado N°	

**Mujeres y varones de potencial reproductivo**

Pruebas de Embarazo

REVLIMID puede causar daño fetal cuando se administra durante el embarazo (*ver Uso en Poblaciones Específicas*). Verifique el estado del embarazo de las mujeres con potencial reproductivo antes de iniciar el tratamiento con REVLIMID y durante el tratamiento. Aconseje a las mujeres con potencial reproductivo que deben evitar el embarazo 4 semanas antes del tratamiento, mientras están tomando REVLIMID, durante las interrupciones de la dosis y durante al menos 4 semanas después de completar el tratamiento.

Las mujeres con potencial reproductivo deben tener una (1) prueba de embarazo negativa antes de iniciar el tratamiento. La prueba de embarazo debe realizarse dentro de las 72 horas previas a la prescripción de la terapia de REVLIMID, y luego en forma mensual en mujeres con ciclos menstruales regulares o cada 2 semanas en mujeres con ciclos menstruales irregulares [*Ver Uso en Poblaciones Específicas*].

Una vez que el tratamiento ha comenzado y durante las interrupciones de la dosis, las pruebas de embarazo deben repetirse cada 4 semanas en mujeres con ciclos menstruales regulares. Si los ciclos menstruales son irregulares, la prueba de embarazo debe realizarse cada 2 semanas. Se debe realizar la prueba de embarazo y brindar asesoramiento si una paciente no tiene su período o si hay alguna anomalía en su sangrado menstrual. El tratamiento con REVLIMID debe ser discontinuado durante esta evaluación.

Anticoncepción

Mujeres.

Las mujeres con potencial reproductivo deben comprometerse a la abstención de forma continua de tener relaciones sexuales heterosexuales o al uso de 2 métodos de control de natalidad confiable simultáneamente: una forma altamente efectiva de anticoncepción: ligadura de trompas, DIU, hormonal (píldoras anticonceptivas, inyecciones, parches hormonales, anillos vaginales o implantes) y 1 método anticonceptivo eficaz adicional: látex masculino o preservativo sintético, diafragma o capuchón cervical. La anticoncepción

FARM. KARINA A. FLORES  
IF-2018-12042984-REP-08-BR-ANMAT  
APODERADA  
11.582 - MP 14128



debe comenzar 4 semanas antes de iniciar el tratamiento con REVLIMID, durante la terapia, durante las interrupciones de la dosis y continuar durante 4 semanas después de discontinuar el tratamiento con REVLIMID. La anticoncepción fiable está indicada incluso cuando ha habido un historial de infertilidad, a menos que sea consecuencia de una histerectomía. Las mujeres con potencial reproductivo deben ser referenciadas a un proveedor calificado de métodos anticonceptivos de ser necesario.

#### Varones

La lenalidomida está presente en el semen de los hombres que toman REVLIMID. Por lo tanto, los hombres deben usar siempre un condón de látex o sintético durante cualquier contacto sexual con las mujeres con potencial reproductivo mientras toman REVLIMID y hasta 4 semanas después de suspender REVLIMID, incluso si se han sometido a una vasectomía exitosa. Los pacientes varones que toman REVLIMID no deben donar esperma.

#### **Lactancia**

##### Resumen del riesgo

No hay información sobre la presencia de lenalidomida en la leche humana, los efectos de REVLIMID en el lactante amamantado, o los efectos de REVLIMID sobre la producción de leche. Debido a que muchos fármacos se excretan en la leche humana y debido a la posibilidad de reacciones adversas en lactantes de producidas por REVLIMID, aconseje a las mujeres a que no amamenten durante el tratamiento con REVLIMID.

### **TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA**

#### **Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad**

No se han realizado estudios de carcinogenicidad con lenalidomida.

Lenalidomida no fue mutagénica en la prueba de Ames de mutación bacteriana inversa y no indujo aberraciones cromosómicas en linfocitos de sangre periférica humana cultivados, o mutación en el locus timidina kinasa (tk) de células de linfoma de ratón L5178Y. Lenalidomida no incrementó la transformación morfológica en ensayo de embrión de hámster sirio ni indujo los micronúcleos en los eritrocitos polieromáticos de médula ósea de ratas macho.

Un estudio de fertilidad y desarrollo embrionario temprano en ratas, con administración de lenalidomida hasta 500 mg/kg (aproximadamente 200 veces la dosis humana de 25 mg sobre la base del área de superficie corporal) no produjo toxicidad parental ni efectos adversos sobre la fertilidad.

En un estudio de toxicidad del desarrollo embriofetal en monos, se produjo teratogenicidad, incluso defectos en las extremidades similares a los causados por talidomida, en la cría cuando monas embarazadas recibieron lenalidomida oral durante la organogénesis. La exposición (AUC) en monos en la dosis más baja fue de 0,17 veces la exposición a la máxima dosis recomendada en humanos (MRHD, *Maximum Recommended Human Dose, por sus siglas en inglés*) de 25 mg. Estudios similares en conejas y ratas embarazadas a 20 veces y 200 veces la dosis máxima recomendada en humanos (MRHD) respectivamente evidenciaron embrioletalidad en conejas y ningún efecto adverso relacionado con la reproducción en ratas.



En un estudio de desarrollo pre- y posnatal en ratas, los animales recibieron lenalidomida desde la organogénesis hasta la lactancia. El estudio reveló algunos efectos adversos en las crías de las ratas hembra tratadas con lenalidomida en dosis de hasta 500 mg/kg (aproximadamente 200 veces la dosis humana de 25 mg.sobre la base del área de superficie corporal). Las crías macho exhibieron un leve retraso en la madurez sexual y las crías hembra tuvieron aumentos de peso corporal levemente más bajos durante la gestación que las crías macho. Al igual que con talidomida, es posible que el modelo en ratas no aborde de manera adecuada, todo el espectro de posibles efectos de lenalidomida sobre el desarrollo embriofetal en humanos.

Madurez - MESA DE ENTRADAS  
 Gestación que  
 Metoluido N° 168

**USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS**

**Uso pediátrico**

No se ha establecido la seguridad y eficacia en pacientes pediátricos.

**Uso geriátrico**

MM en combinación: En general, de los 1613 pacientes del estudio de NDMM que recibieron tratamiento en el estudio, el 94% (1521/1613) tenía 65 años de edad o más, mientras que el 35% (561/1613) tenía más de 75 años de edad. El porcentaje de pacientes mayores de 75 años fue similar entre los grupos del estudio (Rd Continuous: 33%, Rd18: 34%, MPT: 33%). En general, en todos los grupos del tratamiento, la frecuencia en la mayoría de las categorías de AEs (por ejemplo, todos los AEs, AEs de grado 3/4 y AEs graves) fue más elevada en los mayores (> 75 años) que en los sujetos más jóvenes de (≤ 75 años de edad). Los AEs de Grado 3 o 4 en el sistema corporal de los trastornos generales y condiciones del sitio de la administración se informaron de forma consistente a una mayor frecuencia (con una diferencia de al menos el 5%) en los sujetos mayores que en los sujetos más jóvenes en todos los grupos de tratamiento. Los TEAEs de grado 3 o 4 de los sistema corporales en las infecciones e infestaciones, los trastornos cardíacos (incluyendo insuficiencia cardíaca e insuficiencia cardíaca congestiva), los trastornos de la piel y de los tejidos subcutáneos y los trastornos renales y urinarios (incluyendo la insuficiencia renal) también se informaron ligeramente, pero consistentemente, con más con más frecuencia (<5% de diferencia), en sujetos mayores que en sujetos más jóvenes en todos los grupos de tratamiento. Para otros sistemas corporales (por ej., trastornos del sistema sanguíneo y linfático, infecciones e infestaciones, trastornos cardíacos y trastornos vasculares), hubo una tendencia menos consistente de la frecuencia incrementada de los AEs de grado 3/4 en sujetos mayores frente a sujetos más jóvenes en todos los grupos de tratamiento. Los AEs graves se informaron generalmente con una frecuencia más alta en los sujetos mayores que en los sujetos más jóvenes en todos los grupos de tratamiento.

Terapia de mantenimiento para MM: En general, el 10% (106/1018) de los pacientes tenía 65 años de edad o más, mientras que ningún paciente tenía más de 75 años de edad. Los AEs de grado 3 o 4 fueron más altos en el grupo REVLIMID (más del 5% más alto) en los pacientes de 65 años de edad o más en comparación con los pacientes más jóvenes. La frecuencia de los AEs de grado 3 o 4 en los trastornos de la sangre y del sistema linfático fueron mayores en el grupo de REVLIMID (más alto del 5% más alto) en los pacientes de 65 años de edad o más en comparación con los pacientes más jóvenes. No hubo un número suficiente de pacientes de 65 años de edad o mayores en los estudios de mantenimiento de REVLIMID que experimentaran un AE grave o que discontinuaran la terapia debido a una AE para determinar si los pacientes ancianos responden de manera diferente a la seguridad, que los pacientes más jóvenes.

FABIAN KARINA A. FLORES  
 IF-2018-12042984-CA-PR-001-2018-AN.M.A.T.  
 APODERADA  
 MN 11.562 - MP 14128



El MM después de por lo menos una terapia previa: De los 703 pacientes con MM que recibieron el tratamiento experimental en los estudios 1 y 2, el 45% tenían 65 años o más, mientras que el 12% de los pacientes tenían 75 años o más. El porcentaje de pacientes de 65 años o más no fue significativamente diferente entre los grupos con REVLIMID/dexametasona y placebo/dexametasona. De los 353 pacientes que recibieron REVLIMID/dexametasona, el 46% tenía 65 años o más. En ambos estudios, los pacientes >65 años de edad fueron más propensos que los pacientes ≤65 años a experimentar trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, fibrilación auricular e insuficiencia renal luego del uso de REVLIMID. No se observaron diferencias en cuanto a la eficacia entre los pacientes mayores de 65 años de edad y los pacientes más jóvenes.

De los 148 pacientes con SMD relacionado con delección del 5q reclutados en el estudio principal, el 38% tenían 65 años o más, mientras que el 33% tenía 75 años o más. Aunque la frecuencia global de eventos adversos (100%) fue la misma en pacientes mayores de 65 años de edad que en pacientes más jóvenes, la frecuencia de eventos adversos graves fue mayor en pacientes mayores de 65 años de edad que en pacientes más jóvenes (54% vs. 33%). Una mayor proporción de pacientes de más de 65 años de edad discontinuaron los estudios clínicos debido a eventos adversos en comparación con la proporción de pacientes más jóvenes (27% vs. 16%). No se observaron diferencias en cuanto a la eficacia entre los pacientes mayores de 65 años de edad y los pacientes más jóvenes.

De los 314 pacientes con MCL inscriptos en el ensayo de MCL, el 63 % tenía 65 años o más, mientras que el 22 % de los pacientes tenía 75 años o más. La frecuencia global de eventos adversos fue similar en pacientes de más de 65 años de edad y en pacientes más jóvenes (98 % vs. 100 %). La incidencia global de los eventos adversos de grado 3 y 4 también fue similar en estos 2 grupos de pacientes (79 % vs. 78 %, respectivamente). La frecuencia de eventos adversos fue más alta en pacientes de más de 65 años de edad que en pacientes más jóvenes (55 % vs. 41 %). No se observaron diferencias en la eficacia entre pacientes de más de 65 años de edad y pacientes más jóvenes.

Como es más probable que en los pacientes de edad avanzada disminuya la función renal, se debe tener cuidado al elegir la dosis. Controlar la función renal.

#### **Insuficiencia renal**

Ajuste la dosis inicial de REVLIMID basándose en el valor de aclaramiento de creatinina y para los pacientes en diálisis (ver *Posología y Administración*).

#### **REACCIONES ADVERSAS**

Las siguientes reacciones adversas se describen en detalle en otras secciones de la información de prescripción:

- o Toxicidad embrionaria y fetal; [Ver *Advertencias y Precauciones*]
- o Toxicidad hematológica; [Ver *Advertencias y Precauciones*]
- o Tromboembolia venosa y arterial; [Ver *Advertencias y Precauciones*]

REV PI AR-005 (REV 22)\_Ene 2017  
CCAMQRA-01/17

38

FARM. KARINA A. FLORES  
COORDINADORA TÉCNICA  
APROBADA  
IF-2018-1284298  
MONTAÑA VERDE S.A.  
MONTAÑA VERDE S.A.



- Aumento de la mortalidad en pacientes con LLC; [Ver Advertencias y Precauciones]
- Segundas neoplasias primarias; [Ver Advertencias y Precauciones]
- Hepatotoxicidad; [Ver Advertencias y Precauciones]
- Reacciones cutáneas severas que incluyen hipersensibilidad; [Ver Advertencias y Precauciones]
- Síndrome de lisis tumoral; [Ver Advertencias y Precauciones]
- Reacciones de llamarada en el tumor; [Ver Advertencias y Precauciones]
- Alteración de la movilización de células madre. [Ver Advertencias y Precauciones]
- Trastornos tiroideos [Ver Advertencias y Precauciones]
- Mortalidad prematura en pacientes con MCK [ver Advertencias y Precauciones]

A.N.M.A.T. - MESA DE ENTRADAS	
Refinado N°	169

### Experiencia en ensayos clínicos

Dado que los ensayos clínicos se llevan a cabo bajo condiciones muy diversas, las tasas de reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos de un fármaco no pueden compararse directamente con las tasas de ensayos clínicos de otro fármaco y pueden no reflejar las tasas observadas en la práctica.

### MM recientemente diagnosticado – Terapia de combinación con REVLIMID

Se evaluaron datos de 1613 pacientes en un estudio fase 3 de gran volumen que recibieron por lo menos una dosis de REVLIMID con dosis baja de dexametasona (Rd) administrada en 2 duraciones de tiempo diferentes (es decir, hasta enfermedad progresiva [Rama Rd Continuous; N = 532] o por hasta dieciocho ciclos de 28 días [72 semanas, Rama Rd18; N = 540] o que recibieron melfalán, prednisona y talidomida (Rama MPT; N = 541) por un máximo de doce ciclos de 42 días (72 semanas). La mediana de la duración del tratamiento en la rama Rd Continuous fue de 80,2 semanas (rango 0,7 a 246,7) o 18,4 meses (rango 0,16 a 56,7).

En general, las reacciones adversas informadas con más frecuencia fueron comparables en la rama Rd Continuous y en la rama Rd18, e incluyeron diarrea, anemia, constipación, edema periférico, neutropenia, fatiga, dolor de espalda, náuseas, astenia e insomnio. Las reacciones de Grado 3 o 4 informadas con más frecuencia incluyeron neutropenia, anemia, trombocitopenia, neumonía, astenia, fatiga, dolor de espalda, hipocalcemia, erupción cutánea, cataratas, linfopenia, disnea, TVP, hiperglucemia y leucopenia. La mayor frecuencia de infecciones se produjo en la rama Rd Continuous (75%) en comparación con la rama MPT (56%). Hubo más reacciones adversas por infecciones grado 3,4 y serias en la rama Rd Continuous que en la rama MPT o en la Rd18.

En la rama Rd Continuous, las reacciones adversas más frecuentes que conducen a la interrupción de la dosis de REVLIMID fueron eventos de infección (28,8%); en total, la mediana del tiempo hasta la primera interrupción de la dosis de REVLIMID fue de 7 semanas. Las reacciones adversas más frecuentes que condujeron a reducción de la dosis de Revlimid en la rama Rd Continuous fueron los eventos hematológicos (10,7%); en total, la mediana del tiempo hasta la primera reducción de la dosis de REVLIMID fue de 16 semanas. En la rama Rd Continuous, las reacciones adversas más frecuentes que condujeron a la



discontinuación de REVLIMID fueron los eventos de infección (3,4%).

En ambas ramas Rd, las frecuencias de la aparición de reacciones adversas fueron en general mayores en los primeros 6 meses de tratamiento, y luego las frecuencias disminuyeron a lo largo del tiempo o se mantuvieron estables durante todo el tratamiento, excepto por las cataratas. La frecuencia de la aparición de cataratas aumentó a lo largo del tiempo con 0,7% durante los primeros 6 meses y hasta 9,6% hacia el segundo año de tratamiento con Rd Continuous.

La Tabla 12 resume las reacciones adversas informadas para las ramas de tratamiento Rd Continuous, Rd18 y MPT.

**Tabla 12: Todas las reacciones adversas en  $\geq 5,0\%$  y reacciones adversas de grado 3/4 en  $\geq 1,0\%$  de los pacientes en las ramas Rd Continuous o Rd18\***

Sistema corporal Reacción Adversa	Todas las reacciones adversas <sup>a</sup>			Reacciones adversas grado 3/4 <sup>b</sup>		
	Rd Continuous (N = 532)	Rd18 (N = 540)	MPT (N = 541)	Rd Continuous (N = 532)	Rd18 (N = 540)	MPT (N = 541)
<b>Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración</b>						
Fatiga <sup>55</sup>	173 (32,5)	177 (32,8)	154 (28,5)	39 (7,3)	46 (8,5)	31 (5,7)
Astenia	150 (28,2)	123 (22,8)	124 (22,9)	41 (7,7)	33 (6,1)	32 (5,9)
Pirexia <sup>c</sup>	114 (21,4)	102 (18,9)	76 (14,0)	13 (2,4)	7 (1,3)	7 (1,3)
Dolor de tórax no cardíaco <sup>†</sup>	29 (5,5)	31 (5,7)	18 (3,3)	<1%	<1%	<1%
<b>Trastornos gastrointestinales</b>						
Diarrea	242 (45,5)	208 (38,5)	89 (16,5)	21 (3,9)	18 (3,3)	8 (1,5)
Dolor abdominal <sup>56,†</sup>	109 (20,5)	78 (14,4)	60 (11,1)	7 (1,3)	9 (1,7)	<1%
Dispepsia <sup>†</sup>	57 (10,7)	28 (5,2)	36 (6,7)	<1%	<1%	0 (0,0)
<b>Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo</b>						
Dolor de espalda <sup>c</sup>	170 (32,0)	145 (26,9)	116 (21,4)	37 (7,0)	34 (6,3)	28 (5,2)
Espasmos musculares <sup>†</sup>	109 (20,5)	102 (18,9)	61 (11,3)	<1%	<1%	<1%
Artralgia <sup>†</sup>	101 (19,0)	71 (13,1)	66 (12,2)	9 (1,7)	8 (1,5)	8 (1,5)
Dolor óseo <sup>†</sup>	87 (16,4)	77 (14,3)	62 (11,5)	16 (3,0)	15 (2,8)	14 (2,6)
Dolor en las extremidades <sup>†</sup>	79 (14,8)	66 (12,2)	61 (11,3)	8 (1,5)	8 (1,5)	7 (1,3)
Dolor musculoesquelético <sup>†</sup>	67 (12,6)	59 (10,9)	36 (6,7)	<1%	<1%	<1%
Dolor de tórax musculoesquelético <sup>†</sup>	60 (11,3)	51 (9,4)	39 (7,2)	6 (1,1)	<1%	<1%
Debilidad muscular <sup>†</sup>	43 (8,1)	35 (6,5)	29 (5,4)	<1%	8 (1,5)	<1%
Dolor de cuello <sup>†</sup>	40 (7,5)	19 (3,5)	10 (1,8)	<1%	<1%	<1%
<b>Infecciones e infestaciones</b>						
Bronquitis <sup>c</sup>	90 (16,9)	59 (10,9)	43 (7,9)	9 (1,7)	6 (1,1)	3 (0,6)
Nasofaringitis <sup>†</sup>	80 (15,0)	54 (10,0)	33 (6,1)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Infección del tracto urinario <sup>†</sup>	76 (14,3)	63 (11,7)	41 (7,6)	8 (1,5)	8 (1,5)	<1%



Sistema corporal Reacción Adversa	Todas las reacciones adversas <sup>a</sup>			Reacciones adversas graves <sup>b</sup>		
	Rd Continuoas (N = 532)	Rd18 (N = 540)	MPT (N = 541)	Rd Continuoas (N = 532)	Rd18 (N = 540)	MPT (N = 541)
Infección del tracto respiratorio superior <sup>c,d,f</sup>	69 (13,0)	53 (9,8)	31 (5,7)	< 1%	8 (1,5)	< 1%
Neumonía <sup>c,d</sup>	93 (17,5)	87 (16,1)	56 (10,4)	60 (11,3)	57 (10,5)	41 (7,6)
Infección del tracto respiratorio <sup>g</sup>	35 (6,6)	25 (4,6)	21 (3,9)	7 (1,3)	4 (0,7)	1 (0,2)
Gripe <sup>f</sup>	33 (6,2)	23 (4,3)	15 (2,8)	< 1%	< 1%	0 (0,0)
Gastroenteritis <sup>f</sup>	32 (6,0)	17 (3,1)	13 (2,4)	0 (0,0)	< 1%	< 1%
Infección del tracto respiratorio inferior	29 (5,5)	14 (2,6)	16 (3,0)	10 (1,9)	3 (0,6)	3 (0,6)
Rinitis <sup>f</sup>	29 (5,5)	24 (4,4)	14 (2,6)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Celulitis <sup>e</sup>	< 5%	< 5%	< 5%	8 (1,5)	3 (0,6)	2 (0,4)
Sepsis <sup>c,d</sup>	33 (6,2)	26 (4,8)	18 (3,3)	26 (4,9)	20 (3,7)	13 (2,4)
<b>Trastornos del sistema nervioso</b>						
Dolor de cabeza <sup>f</sup>	75 (14,1)	52 (9,6)	56 (10,4)	< 1%	< 1%	< 1%
Disgeusia <sup>f</sup>	39 (7,3)	45 (8,3)	22 (4,1)	< 1%	0 (0,0)	< 1%
<b>Trastornos del sistema linfático y de la sangre<sup>d</sup></b>						
Anemia	233 (43,8)	193 (35,7)	229 (42,3)	97 (18,2)	85 (15,7)	102 (18,9)
Neutropenia	186 (35,0)	178 (33,0)	328 (60,6)	148 (27,8)	143 (26,5)	243 (44,9)
Trombocitopenia	104 (19,5)	100 (18,5)	135 (25,0)	44 (8,3)	43 (8,0)	60 (11,1)
Neutropenia febril	7 (1,3)	17 (3,1)	15 (2,8)	6 (1,1)	16 (3,0)	14 (2,6)
Pancitopenia	5 (0,9)	6 (1,1)	7 (1,3)	1 (0,2)	3 (0,6)	5 (0,9)
<b>Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos</b>						
Tos <sup>f</sup>	121 (22,7)	94 (17,4)	68 (12,6)	< 1%	< 1%	< 1%
Disnea <sup>c,e</sup>	117 (22,0)	89 (16,5)	113 (20,9)	30 (5,6)	22 (4,1)	18 (3,3)
Epistaxis <sup>f</sup>	32 (6,0)	31 (5,7)	17 (3,1)	< 1%	< 1%	0 (0,0)
Dolor orofaríngeo <sup>f</sup>	30 (5,6)	22 (4,1)	14 (2,6)	0 (0,0)	0 (0,0)	0 (0,0)
Disnea por esfuerzo <sup>e</sup>	27 (5,1)	29 (5,4)	< 5%	6 (1,1)	2 (0,4)	0 (0,0)
<b>Trastornos del metabolismo y de la nutrición</b>						
Disminución del apetito	123 (23,1)	115 (21,3)	72 (13,3)	14 (2,6)	7 (1,3)	5 (0,9)
Hipocalcemia <sup>g</sup>	91 (17,1)	62 (11,5)	38 (7)	35 (6,6)	20 (3,7)	11 (2,0)
Hiper glucemia	62 (11,7)	52 (9,6)	19 (3,5)	28 (5,3)	23 (4,3)	9 (1,7)
Hipocalcemia	57 (10,7)	56 (10,4)	31 (5,7)	23 (4,3)	19 (3,5)	8 (1,5)
Deshidratación <sup>g</sup>	25 (4,7)	29 (5,4)	17 (3,1)	8 (1,5)	13 (2,4)	9 (1,7)
Gota <sup>e</sup>	< 5%	< 5%	< 5%	8 (1,5)	0 (0,0)	0 (0,0)
Diabetes mellitus <sup>g,c</sup>	< 5%	< 5%	< 5%	8 (1,5)	4 (0,7)	2 (0,4)
Hipofosfatemia <sup>e</sup>	< 5%	< 5%	< 5%	7 (1,3)	3 (0,6)	1 (0,2)

Refinado N° 8 (1,5) MESA DE ENTRADAS



Sistema corporal Reacción Adversa	Todas las reacciones adversas <sup>a</sup>			Reacciones adversas grado 3/4 <sup>b</sup>		
	Rd Continuous (N = 532)	Rd18 (N = 540)	MPT (N = 541)	Rd Continuous (N = 532)	Rd18 (N = 540)	MPT (N = 541)
Hiponatremia <sup>a,e</sup>	< 5%	< 5%	< 5%	7 (1,3)	13 (2,4)	6 (1,1)
<b>Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo</b>						
Erupción cutánea	139 (26,1)	151 (28,0)	105 (19,4)	39 (7,3)	38 (7,0)	33 (6,1)
Prurito <sup>f</sup>	47 (8,8)	49 (9,1)	24 (4,4)	< 1%	< 1%	< 1%
<b>Trastornos psiquiátricos</b>						
Insomnio	147 (27,6)	127 (23,5)	53 (9,8)	4 (0,8)	6 (1,1)	0 (0,0)
Depresión	58 (10,9)	46 (8,5)	30 (5,5)	10 (1,9)	4 (0,7)	1 (0,2)
<b>Trastornos vasculares</b>						
Trombosis venosa profunda <sup>a,g</sup>	55 (10,3)	39 (7,2)	22 (4,1)	30 (5,6)	20 (3,7)	15 (2,8)
Hipotensión <sup>g,h</sup>	51 (9,6)	35 (6,5)	36 (6,7)	11 (2,1)	8 (1,5)	6 (1,1)
<b>Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos</b>						
Caida <sup>f</sup>	43 (8,1)	25 (4,6)	25 (4,6)	< 1%	6 (1,1)	6 (1,1)
Contusión <sup>f</sup>	33 (6,2)	24 (4,4)	15 (2,8)	< 1%	< 1%	0 (0,0)
<b>Trastornos oculares</b>						
Cataratas	73 (13,7)	31 (5,7)	5 (0,9)	31 (5,8)	14 (2,6)	3 (0,6)
Cataratas subcapsulares <sup>e</sup>	< 5%	< 5%	< 5%	7 (1,3)	0 (0,0)	0 (0,0)
<b>Exploraciones complementarias</b>						
Disminución del peso	72 (13,5)	78 (14,4)	48 (8,9)	11 (2,1)	4 (0,7)	4 (0,7)
<b>Trastornos cardiacos</b>						
Fibrilación auricular <sup>e</sup>	37 (7,0)	25 (4,6)	25 (4,6)	13 (2,4)	9 (1,7)	6 (1,1)
Infarto de miocardio (incluido el agudo) <sup>e,g</sup>	< 5%	< 5%	< 5%	10 (1,9)	3 (0,6)	5 (0,9)
<b>Trastornos renales y urinarios</b>						
Insuficiencia renal (incluida la aguda) <sup>e,f,i</sup>	49 (9,2)	54 (10,0)	37 (6,8)	28 (5,3)	33 (6,1)	29 (5,4)
<b>Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incl. quistes y pólipos)</b>						
Carcinoma de células escamosas <sup>e,e</sup>	< 5%	< 5%	< 5%	8 (1,5)	4 (0,7)	0 (0,0)
Carcinoma de células basales <sup>e,e,i</sup>	< 5%	< 5%	< 5%	< 1%	< 1%	0 (0,0)

Nota: Un sujeto con múltiples ocurrencias de una reacción adversa es contabilizado una sola vez bajo el SOC/PT aplicable. Sistema Corporal / Reacción Adversa.

<sup>a</sup> Todas las reacciones adversas emergentes del tratamiento en por lo menos 5,0% de los sujetos en las ramas Rd Continuous o Rd18 y una frecuencia por lo menos 2,0% mayor (%) en las ramas Rd Continuous o Rd18 en comparación con la rama MPT.

<sup>b</sup> Todas las reacciones adversas emergentes del tratamiento de grado 3 o 4 en por lo menos 1,0% de los  
REV PI AR-005 (REV 22)\_Ene 2017 42  
CCAMQRA-011/17

FARM. KARINA A. FLORES  
IF-2018-12042984  
REGISTRO TECNICO  
ANMAT  
MN 11.562 - MP 14128  
MONTE VIDRE S.A.





después del trasplante (conclusión de altas dosis de melfalán / auto-HSCT) y el período de tratamiento de mantenimiento. En el Estudio de Mantenimiento 2, las reacciones adversas fueron sólo del período del tratamiento de mantenimiento. En general, las reacciones adversas más frecuentes (más del 20% en el grupo REVLIMID) en ambos estudios fueron neutropenia, trombocitopenia, leucopenia, anemia, infección del tracto respiratorio superior, bronquitis, nasofaringitis, tos, gastroenteritis, diarrea, rash, fatiga, astenia, espasmo muscular y pírexia. Las reacciones de grado 3 o 4 más frecuentes (más del 20% en el grupo REVLIMID) incluyeron neutropenia, trombocitopenia y leucopenia. Las reacciones adversas graves de infección pulmonar y neutropenia (más del 4,5%) se produjeron en el grupo de REVLIMID.

Para REVLIMID, las reacciones adversas más comunes que condujeron a la interrupción de la dosis fueron eventos hematológicos (29,7%, datos disponibles sólo en el Estudio de Mantenimiento 2). Las reacciones adversas más frecuente que condujeron a la reducción de la dosis de REVLIMID fueron eventos hematológicos (17,7%, datos disponibles sólo en el Estudio de Mantenimiento 2). Las reacciones adversas más frecuentes que condujeron a la discontinuación de REVLIMID fueron trombocitopenia (2,7%) en el Estudio de Mantenimiento 1 y neutropenia (2,4%) en el Estudio de Mantenimiento 2.

Las frecuencias de la aparición de reacciones adversas fueron generalmente más altas en los primeros 6 meses de tratamiento y luego las frecuencias disminuyeron con el tiempo o se mantuvieron estables durante el tratamiento.

La Tabla 13 resume las reacciones adversas notificadas para los grupos de tratamiento de REVLIMID y de mantenimiento con placebo.

**Tabla 13: Todas las reacciones adversas en el  $\geq 5.0\%$  y de Grado 3/4 en el  $\geq 1.0\%$  de los pacientes en los grupos de REVLIMID frente a Placebo \***

Reacción adversa Sistema corporal	Estudio de Mantenimiento 1				Estudio de Mantenimiento 2			
	Todas las reacciones adversas [a]		Reacciones adversas Grado 3/4 [b]		Todas las reacciones adversas [a]		Grade 3/4 Adverse Reactions [b]	
	REVLIMID (N=224) n (%)	Placebo (N=221) n (%)	REVLIMID (N=224) n (%)	Placebo (N=221) n (%)	REVLIMID (N=293) n (%)	Placebo (N=280) n (%)	REVLIMID (N=293) n (%)	Placebo (N=280) n (%)
<b>Trastornos sanguíneos y linfáticos</b>								
Neutropenia <sup>c, **</sup>	177 (79.0)	94 (42.5)	133 (59.4)	73 (33.0)	178 (60.8)	33 (11.8)	158 (53.9)	21 (7.5)
Trombocitopenia <sup>c, **</sup>	162 (72.3)	101 (45.7)	84 (37.5)	67 (30.3)	69 (23.5)	29 (10.4)	38 (13.0)	8 (2.9)
Leucopenia <sup>c</sup>	51 (22.8)	25 (11.3)	45 (20.1)	22 (10.0)	93 (31.7)	21 (7.5)	71 (24.2)	5 (1.8)
Anemia	47 (21.0)	27 (12.2)	23 (10.3)	18 (8.1)	26 (8.9)	15 (5.4)	11 (3.8)	3 (1.1)
Linfopenia	40 (17.9)	29 (13.1)	37 (16.5)	26 (11.8)	13 (4.4)	3 (1.1)	11 (3.8)	2 (0.7)
Pancitopenia <sup>c, d, **</sup>	1 (0.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (4.1)	1 (0.4)	7 (2.4)	1 (0.4)
Neutropenia febril <sup>c</sup>	39 (17.4)	34 (15.4)	39 (17.4)	34 (15.4)	7 (2.4)	1 (0.4)	5 (1.7)	1 (0.4)



Infecciones e Infestaciones*								
Infección del tracto respiratorio superior <sup>c</sup>	60 (26.8)	35 (15.8)	7 (3.1)	9 (4.1)	32 (10.9)	18 (6.4)	1 (0.3)	0 (0.0)
Infección neutropénica	40 (17.9)	19 (8.6)	27 (12.1)	14 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Neumonías* <sup>c, d, e</sup>	31 (13.8)	15 (6.8)	23 (10.3)	7 (3.2)	50 (17.1)	13 (4.6)	27 (9.2)	0 (0.0)
Bronquitis <sup>c</sup>	10 (4.5)	9 (4.1)	1 (0.4)	5 (2.3)	139 (47.4)	104 (37.1)	4 (1.4)	1 (0.4)
Nasofaringitis <sup>c</sup>	5 (2.2)	2 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	102 (34.8)	84 (30.0)	1 (0.3)	0 (0.0)
Gastroenteritis <sup>c</sup>	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	66 (22.5)	55 (19.6)	6 (2.0)	0 (0.0)
Rinitis <sup>c</sup>	2 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	44 (15.0)	19 (6.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
Sinusitis <sup>c</sup>	8 (3.6)	3 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	41 (14.0)	26 (9.3)	0 (0.0)	1 (0.4)
Gripe <sup>c</sup>	8 (3.6)	5 (2.3)	2 (0.9)	1 (0.5)	39 (13.3)	19 (6.8)	3 (1.0)	0 (0.0)
Infección pulmonar <sup>c</sup>	21 (9.4)	2 (0.9)	19 (8.5)	2 (0.9)	9 (3.1)	4 (1.4)	1 (0.3)	0 (0.0)
Infección del tracto respiratorio inferior <sup>c</sup>	13 (5.8)	5 (2.3)	6 (2.7)	4 (1.8)	4 (1.4)	4 (1.4)	0 (0.0)	2 (0.7)
Infección <sup>c</sup>	12 (5.4)	6 (2.7)	9 (4.0)	5 (2.3)	17 (5.8)	5 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
Infección del tracto urinario <sup>c, d, e</sup>	9 (4.0)	5 (2.3)	4 (1.8)	4 (1.8)	22 (7.5)	17 (6.1)	1 (0.3)	0 (0.0)
Infección bacteriana del tracto respiratorio inferior <sup>d</sup>	6 (2.7)	1 (0.5)	4 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Bacteriemia <sup>d</sup>	5 (2.2)	0 (0.0)	4 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Infección de herpes <sup>c, d</sup>	11 (4.9)	10 (4.5)	3 (1.3)	2 (0.9)	29 (9.9)	25 (8.9)	6 (2.0)	2 (0.7)
Sepsis* <sup>c, d, e</sup>	2 (0.9)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (2.0)	1 (0.4)	4 (1.4)	1 (0.4)
<b>Trastornos Gastrointestinales</b>								
Diarrea	122 (54.5)	83 (37.6)	22 (9.8)	17 (7.7)	114 (38.9)	34 (12.1)	7 (2.4)	0 (0.0)
Náuseas <sup>c</sup>	33 (14.7)	22 (10.0)	16 (7.1)	10 (4.5)	31 (10.6)	28 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Vómitos	17 (7.6)	12 (5.4)	8 (3.6)	5 (2.3)	16 (5.5)	15 (5.4)	1 (0.3)	0 (0.0)
Constipación <sup>c</sup>	12 (5.4)	8 (3.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	37 (12.6)	25 (8.9)	2 (0.7)	0 (0.0)
Dolor abdominal <sup>c</sup>	8 (3.6)	7 (3.2)	1 (0.4)	4 (1.8)	31 (10.6)	15 (5.4)	1 (0.3)	1 (0.4)

MESA DE ENTRADAS  
912



Dolor abdominal superior *	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	20 ( 6.8)	12 ( 4.3)	1 ( 0.3)	0 ( 0.0)
<b>Trastornos generales y alteraciones en el lugar de la administración</b>								
Astenia	0 ( 0.0)	1 ( 0.5)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	87 ( 29.7)	53 ( 18.9)	10 ( 3.4)	2 ( 0.7)
Fatiga	51 ( 22.8)	30 ( 13.6)	21 ( 9.4)	9 ( 4.1)	31 ( 10.6)	15 ( 5.4)	3 ( 1.0)	0 ( 0.0)
Pirexia *	17 ( 7.6)	10 ( 4.5)	2 ( 0.9)	2 ( 0.9)	60 ( 20.5)	26 ( 9.3)	1 ( 0.3)	0 ( 0.0)
<b>Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo</b>								
Piel seca *	9 ( 4.0)	4 ( 1.8)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	31 ( 10.6)	21 ( 7.5)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
Erupción cutánea	71 ( 31.7)	48 ( 21.7)	11 ( 4.9)	5 ( 2.3)	22 ( 7.5)	17 ( 6.1)	3 ( 1.0)	0 ( 0.0)
Prurito	9 ( 4.0)	4 ( 1.8)	3 ( 1.3)	0 ( 0.0)	21 ( 7.2)	25 ( 8.9)	2 ( 0.7)	0 ( 0.0)
<b>Trastornos del Sistema nervioso</b>								
Parestesia *	2 ( 0.9)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	39 ( 13.3)	30 ( 10.7)	1 ( 0.3)	0 ( 0.0)
Neuropatía Periférica**	34 ( 15.2)	30 ( 13.6)	8 ( 3.6)	8 ( 3.6)	29 ( 9.9)	15 ( 5.4)	4 ( 1.4)	2 ( 0.7)
Dolor de cabeza <sup>d</sup>	11 ( 4.9)	8 ( 3.6)	5 ( 2)	1 ( 0.5)	25 ( 8.5)	21 ( 7.5)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
<b>Investigaciones</b>								
Aumento de la alanina aminotransferasa	16 ( 7.1)	3 ( 1.4)	8 ( 3.6)	0 ( 0.0)	5 ( 1.7)	5 ( 1.8)	0 ( 0.0)	1 ( 0.4)
Aumento de la aspartato aminotransferasa <sup>d</sup>	13 ( 5.8)	5 ( 2.3)	6 ( 2.7)	0 ( 0.0)	2 ( 0.7)	5 ( 1.8)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
<b>Trastornos del metabolismo y la nutrición</b>								
Hipopotasemia	24 ( 10.7)	13 ( 5.9)	16 ( 7.1)	12 ( 5.4)	12 ( 4.1)	1 ( 0.4)	2 ( 0.7)	0 ( 0.0)
Deshidratación	9 ( 4.0)	5 ( 2.3)	7 ( 3.1)	3 ( 1.4)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
Hipofosfatemia <sup>d</sup>	16 ( 7.1)	15 ( 6.8)	13 ( 5.8)	14 ( 6.3)	0 ( 0.0)	1 ( 0.4)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)



Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo								
Espasmos musculares	0 ( 0.0)	1 ( 0.5)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	98 ( 33.4)	43 ( 15.4)	1 ( 0.3)	
Mialgia	7 ( 3.1)	8 ( 3.6)	3 ( 1.3)	5 ( 2.3)	19 ( 6.5)	12 ( 4.3)	2 ( 0.7)	1 ( 0.4)
Dolor musculoesquelético	1 ( 0.4)	1 ( 0.5)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	19 ( 6.5)	11 ( 3.9)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
Trastornos Hepatobiliares								
Hiperbilirubinemia	34 ( 15.2)	19 ( 8.6)	4 ( 1.8)	2 ( 0.9)	4 ( 1.4)	1 ( 0.4)	2 ( 0.7)	0 ( 0.0)
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos								
Tos	23 ( 10.3)	12 ( 5.4)	3 ( 1.3)	1 ( 0.5)	80 ( 27.3)	56 ( 20.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
Disnea	15 ( 6.7)	9 ( 4.1)	8 ( 3.6)	4 ( 1.8)	17 ( 5.8)	9 ( 3.2)	2 ( 0.7)	0 ( 0.0)
Rinorrea	0 ( 0.0)	3 ( 1.4)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	15 ( 5.1)	6 ( 2.1)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
Embolia pulmonar	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	3 ( 1.0)	0 ( 0.0)	2 ( 0.7)	0 ( 0.0)
Trastornos vasculares								
Trombosis venosa profunda	8 ( 3.6)	2 ( 0.9)	5 ( 2.2)	2 ( 0.9)	7 ( 2.4)	1 ( 0.4)	4 ( 1.4)	1 ( 0.4)
Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos quistes y pólipos)								
Síndrome mielodisplásico	5 ( 2.2)	0 ( 0.0)	2 ( 0.9)	0 ( 0.0)	3 ( 1.0)	0 ( 0.0)	1 ( 0.3)	0 ( 0.0)
Reacción adversa Sistema corporal	Estudio de Mantenimiento 1				Estudio de Mantenimiento 2			
	Todas las reacciones adversas [a]		Reacciones adversas Grado 3/4 [b]		Todas las reacciones adversas [a]		Grade 3/4 Adverse Reactions [b]	
	REVLIMID (N=224) n (%)	Placebo (N=221) n (%)	REVLIMID (N=224) n (%)	Placebo (N=221) n (%)	REVLIMID (N=293) n (%)	Placebo (N=280) n (%)	REVLIMID (N=293) n (%)	Placebo (N=280) n (%)
Trastornos sanguíneos y linfáticos								
Neutropenia	177 ( 79.0)	94 ( 42.5)	133 ( 59.4)	73 ( 33.0)	178 ( 60.8)	33 ( 11.8)	158 ( 53.9)	21 ( 7.5)
Trombocitopenia	162 ( 72.3)	101 ( 45.7)	84 ( 37.5)	67 ( 30.3)	69 ( 23.5)	29 ( 10.4)	38 ( 13.0)	8 ( 2.9)
Leucopenia	51 ( 22.8)	25 ( 11.3)	45 ( 20.1)	22 ( 10.0)	93 ( 31.7)	21 ( 7.5)	71 ( 24.2)	5 ( 1.8)
Anemia	47 ( 21.0)	27 ( 12.2)	23 ( 10.3)	18 ( 8.1)	26 ( 8.9)	15 ( 5.4)	11 ( 3.8)	3 ( 1.1)
Linfopenia	40 ( 17.9)	29 ( 13.1)	37 ( 16.5)	26 ( 11.8)	13 ( 4.4)	3 ( 1.1)	11 ( 3.8)	2 ( 0.7)
Pancitopenia	1 ( 0.4)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	12 ( 4.1)	1 ( 0.4)	7 ( 2.4)	1 ( 0.4)
Neutropenia febril	39 ( 17.4)	34 ( 15.4)	39 ( 17.4)	34 ( 15.4)	7 ( 2.4)	1 ( 0.4)	5 ( 1.7)	1 ( 0.4)

MESA DE ENTRADAS  
M.A.T. (OM) S.A. DE ENTRADAS  
473



<b>Infecciones e Infestaciones*</b>								
Infección del tracto respiratorio superior*	60 (26.8)	35 (15.8)	7 (3.1)	9 (4.1)	32 (10.9)	18 (6.4)	1 (0.3)	0 (0.0)
Infección neutropénica	40 (17.9)	19 (8.6)	27 (12.1)	14 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Neumonías**	31 (13.8)	15 (6.8)	23 (10.3)	7 (3.2)	50 (17.1)	13 (4.6)	27 (9.2)	5 (1.8)
Bronquitis*	10 (4.5)	9 (4.1)	1 (0.4)	5 (2.3)	139 (47.4)	104 (37.1)	4 (1.4)	1 (0.4)
Nasofaringitis*	5 (2.2)	2 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	102 (34.8)	84 (30.0)	1 (0.3)	0 (0.0)
Gastroenteritis*	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	66 (22.5)	55 (19.6)	6 (2.0)	0 (0.0)
Rinitis*	2 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	44 (15.0)	19 (6.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
Sinusitis*	8 (3.6)	3 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	41 (14.0)	26 (9.3)	0 (0.0)	1 (0.4)
Gripe*	8 (3.6)	5 (2.3)	2 (0.9)	1 (0.5)	39 (13.3)	19 (6.8)	3 (1.0)	0 (0.0)
Infección pulmonar*	21 (9.4)	2 (0.9)	19 (8.5)	2 (0.9)	9 (3.1)	4 (1.4)	1 (0.3)	0 (0.0)
Infección del tracto respiratorio inferior*	13 (5.8)	5 (2.3)	6 (2.7)	4 (1.8)	4 (1.4)	4 (1.4)	0 (0.0)	2 (0.7)
Infección*	12 (5.4)	6 (2.7)	9 (4.0)	5 (2.3)	17 (5.8)	5 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
Infección del tracto urinario**	9 (4.0)	5 (2.3)	4 (1.8)	4 (1.8)	22 (7.5)	17 (6.1)	1 (0.3)	0 (0.0)
Infección bacteriana del tracto respiratorio inferior*	6 (2.7)	1 (0.5)	4 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Bacteriemia*	5 (2.2)	0 (0.0)	4 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Infección de herpes*	11 (4.9)	10 (4.5)	3 (1.3)	2 (0.9)	29 (9.9)	25 (8.9)	6 (2.0)	2 (0.7)
Sepsis**	2 (0.9)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (2.0)	1 (0.4)	4 (1.4)	1 (0.4)
<b>Trastornos Gastrointestinales</b>								
Diarrea	122 (54.5)	83 (37.6)	22 (9.8)	17 (7.7)	114 (38.9)	34 (12.1)	7 (2.4)	0 (0.0)
Náuseas*	33 (14.7)	22 (10.0)	16 (7.1)	10 (4.5)	31 (10.6)	28 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Vómitos	17 (7.6)	12 (5.4)	8 (3.6)	5 (2.3)	16 (5.5)	15 (5.4)	1 (0.3)	0 (0.0)
Constipación*	12 (5.4)	8 (3.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	37 (12.6)	25 (8.9)	2 (0.7)	0 (0.0)
Dolor abdominal*	8 (3.6)	7 (3.2)	1 (0.4)	4 (1.8)	31 (10.6)	15 (5.4)	1 (0.3)	1 (0.4)
Dolor abdominal superior*	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	20 (6.8)	12 (4.3)	1 (0.3)	0 (0.0)
<b>Trastornos generales y alteraciones en el lugar de la administración</b>								
Astenia	0 (0.0)	1 (0.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	87 (29.7)	53 (18.9)	10 (3.4)	2 (0.7)
Fatiga	51 (22.8)	30 (13.6)	21 (9.4)	9 (4.1)	31 (10.6)	15 (5.4)	3 (1.0)	0 (0.0)
Pirexia*	17 (7.6)	10 (4.5)	2 (0.9)	2 (0.9)	60 (20.5)	26 (9.3)	1 (0.3)	0 (0.0)
<b>Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo</b>								
Piel seca*	9 (4.0)	4 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	31 (10.6)	21 (7.5)	0 (0.0)	0 (0.0)
Erupción cutánea	71 (31.7)	48 (21.7)	11 (4.9)	5 (2.3)	22 (7.5)	17 (6.1)	3 (1.0)	0 (0.0)
Prurito	9 (4.0)	4 (1.8)	3 (1.3)	0 (0.0)	21 (7.2)	25 (8.9)	2 (0.7)	0 (0.0)
<b>Trastornos del Sistema nervioso</b>								
Parestesia*	2 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	39 (13.3)	30 (10.7)	1 (0.3)	0 (0.0)
Neuropatía Periférica*	34 (15.2)	30 (13.6)	8 (3.6)	8 (3.6)	29 (9.9)	15 (5.4)	4 (1.4)	2 (0.7)
Dolor de cabeza*	11 (4.9)	8 (3.6)	5 (2.2)	1 (0.5)	25 (8.5)	21 (7.5)	0 (0.0)	0 (0.0)



Investigaciones								
Aumento de la alanina aminotransferasa	16 ( 7.1)	3 ( 1.4)	8 ( 3.6)	0 ( 0.0)	5 ( 1.7)	5 ( 1.8)	0 ( 0.0)	1 ( 0.4)
Aumento de la aspartato aminotransferasa <sup>d</sup>	13 ( 5.8)	5 ( 2.3)	6 ( 2.7)	0 ( 0.0)	2 ( 0.7)	5 ( 1.8)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
Trastornos del metabolismo y la nutrición								
Hipotasemia	24 ( 10.7)	13 ( 5.9)	16 ( 7.1)	12 ( 5.4)	12 ( 4.1)	1 ( 0.4)	2 ( 0.7)	0 ( 0.0)
Deshidratación	9 ( 4.0)	5 ( 2.3)	7 ( 3.1)	3 ( 1.4)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
Hipofosfatemia <sup>d</sup>	16 ( 7.1)	15 ( 6.8)	13 ( 5.8)	14 ( 6.3)	0 ( 0.0)	1 ( 0.4)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo								
Espasmos musculares <sup>e</sup>	0 ( 0.0)	1 ( 0.5)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	98 ( 33.4)	43 ( 15.4)	1 ( 0.3)	0 ( 0.0)
Mialgia <sup>e</sup>	7 ( 3.1)	8 ( 3.6)	3 ( 1.3)	5 ( 2.3)	19 ( 6.5)	12 ( 4.3)	2 ( 0.7)	1 ( 0.4)
Dolor musculoesquelético <sup>e</sup>	1 ( 0.4)	1 ( 0.5)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	19 ( 6.5)	11 ( 3.9)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
Trastornos Hepatobiliares								
Hiperbilirrubinemia <sup>e</sup>	34 ( 15.2)	19 ( 8.6)	4 ( 1.8)	2 ( 0.9)	4 ( 1.4)	1 ( 0.4)	2 ( 0.7)	0 ( 0.0)
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos								
Tos <sup>e</sup>	23 ( 10.3)	12 ( 5.4)	3 ( 1.3)	1 ( 0.5)	80 ( 27.3)	56 ( 20.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
Disnea <sup>e,e</sup>	15 ( 6.7)	9 ( 4.1)	8 ( 3.6)	4 ( 1.8)	17 ( 5.8)	9 ( 3.2)	2 ( 0.7)	0 ( 0.0)
Rinorrea <sup>e</sup>	0 ( 0.0)	3 ( 1.4)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	15 ( 5.1)	6 ( 2.1)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)
Embolia pulmonar <sup>e,d</sup>	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	0 ( 0.0)	3 ( 1.0)	0 ( 0.0)	2 ( 0.7)	0 ( 0.0)
Trastornos vasculares								
Trombosis venosa profunda <sup>e,d,%</sup>	8 ( 3.6)	2 ( 0.9)	5 ( 2.2)	2 ( 0.9)	7 ( 2.4)	1 ( 0.4)	4 ( 1.4)	1 ( 0.4)
Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos quistes y pólipos)								
Síndrome mielodisplásico <sup>e,d,e</sup>	5 ( 2.2)	0 ( 0.0)	2 ( 0.9)	0 ( 0.0)	3 ( 1.0)	0 ( 0.0)	1 ( 0.3)	0 ( 0.0)

Refrendado N° 179  
A.N.M.A.T. - MESA DE ENTRADAS

Nota: Los AE se codifican en el sistema corporal / reacción adversa usando MedDRA v15.1. Un sujeto con múltiples apariciones de un AE se cuenta sólo una vez en cada categoría de AE.

- <sup>a</sup> Todos los AEs emergentes del tratamiento en al menos el 5% de los pacientes del grupo de mantenimiento con Lenalidomida y al menos 2% más frecuentes (%) que el grupo de mantenimiento con placebo.
- <sup>b</sup> Todos los AEs de grado 3 o 4 emergentes en el tratamiento en al menos el 1% de los pacientes del grupo de mantenimiento con Lenalidomida y al menos el 1% más frecuentes (%) que el grupo de mantenimiento con placebo.
- <sup>c</sup> Todos los AEs graves emergentes del tratamiento en al menos el 1% de los pacientes del grupo de mantenimiento con Lenalidomida y al menos el 1% más frecuentes (%) que el grupo de mantenimiento con placebo.
- <sup>d</sup> Nota al pie de página "a" no aplicable para ninguno de los estudios.
- <sup>e</sup> Nota al pie de página "b" no aplicable para ningún estudio.
- <sup>@</sup> ADRs donde al menos uno tuvo resultado fatal.
- <sup>%</sup> ADRs donde por lo menos uno fue considerado como una amenaza para la vida (si el resultado del evento fue la muerte, se incluye con los casos de muerte).
- <sup>#</sup> Todas las reacciones adversas bajo el Sistema Corporal de Infecciones e Infestaciones excepto las infecciones raras de interés para la Salud Pública serán consideradas catalogadas.

\* Reacciones adversas para términos de ADR combinados (basados en TEAE PTs relevantes incluidos en los Estudios de Mantenimiento 1 y 2 [según MedDRA v 15.1]):

Neumonías: Bronconeumonía, Neumonía de Lobar, Neumonía por *Pneumocystis jirovecii*, *Pneumonia klebsiella*, *Pneumonia legionella*, Neumonía micoplasmal, Neumonía neumocócica, Neumonía estreptocócica, Neumonía viral, Trastorno pulmonar, Neumonitis  
Sepsis: sepsis bacteriana, sepsis neumocócica, sepsis, choque séptico, sepsis estafilocócica  
Neuropatía periférica: Neuropatía periférica, Neuropatía motora periférica, Neuropatía sensitiva periférica, Polineuropatía  
Trombosis venosa profunda: Trombosis venosa profunda, Trombosis, Trombosis venosa

**Después de por lo menos una terapia previa para MM**

En dos estudios, se evaluaron datos de 703 pacientes, quienes recibieron por lo menos una dosis de REVLIMID/dexametasona (353 pacientes) o placebo/dexametasona (350 pacientes).

REV PI AR-005 (REV 22)\_Ene 2017  
CCAMQRA-011/17

FARMACIA A FLORES  
IF-2018-120429  
APODERADA  
M.N. 11 200



En el grupo de tratamiento REVLIMID/dexametasona, 269 pacientes (76%) tuvieron por lo menos una interrupción de la dosis con o sin reducción de la dosis de REVLIMID en comparación con 199 pacientes (57%) en el grupo de tratamiento placebo/dexametasona. De estos pacientes que tuvieron una interrupción de la dosis con o sin reducción de la dosis, el 50% del grupo de tratamiento REVLIMID/dexametasona tuvo por lo menos una interrupción adicional de la dosis con o sin reducción de la dosis en comparación con el 21% en el grupo de tratamiento placebo/dexametasona. La mayoría de las reacciones adversas y las reacciones adversas grados 3/4 fueron más frecuentes en los pacientes que recibieron la combinación de REVLIMID/dexametasona en comparación con placebo/dexametasona.

Las tablas 14, 15 y 16 resumen las reacciones adversas informadas para los grupos REVLIMID/dexametasona y placebo/dexametasona.

<b>Tabla 14: Reacciones adversas informadas en <math>\geq 5\%</math> de los pacientes y con una diferencia <math>\geq 2\%</math> en el porcentaje de pacientes entre los grupos REVLIMID/dexametasona y placebo/dexametasona</b>		
<b>Sistema Corporal</b>	<b>REVLIMID/Dex*</b>	<b>Placebo/Dex*</b>
<b>Reacciones adversas</b>	<b>(N = 353)</b>	<b>(N = 350)</b>
	<b>n (%)</b>	<b>n (%)</b>
<b>Trastornos del sistema linfático y de la sangre</b>		
Neutropenia*	149 (42,2)	22 (6,3)
Anemia <sup>†</sup>	111 (31,4)	83 (23,7)
Trombocitopenia <sup>‡</sup>	76 (21,5)	37 (10,6)
Leucopenia	28 (7,94)	4 (1,1)
Linfopenia	19 (5,4)	5 (1,4)
<b>Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración</b>		
Fatiga	155 (43,9)	146 (41,7)
Pirexia	97 (27,5)	82 (23,4)
Edema periférico	93 (26,3)	74 (21,1)
Dolor en el pecho	29 (8,2)	20 (5,7)
Letargia	24 (6,8)	8 (2,3)
<b>Trastornos gastrointestinales</b>		
Constipación	143 (40,5)	74 (21,1)
Diarrea <sup>††</sup>	136 (38,5)	96 (27,4)
Náuseas <sup>‡‡</sup>	92 (26,1)	75 (21,4)
Vómitos <sup>‡‡</sup>	43 (12,2)	33 (9,4)
Dolor abdominal <sup>‡‡</sup>	35 (9,9)	22 (6,3)
Boca seca	25 (7,1)	13 (3,7)
<b>Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo</b>		
Calambre muscular	118 (33,4)	74 (21,1)
Dolor de espalda	91 (25,8)	65 (18,6)
Dolor en los huesos	48 (13,6)	39 (11,1)



Dolor en las extremidades	42 (11,9)	32 (9,1)	
<b>Trastornos del sistema nervioso</b>			
Mareos	82 (23,2)	59 (16,9)	
Tembler	75 (21,2)	26 (7,4)	A.N.M.A.T. - MESA DE ENTRADAS
Disgeusia	54 (15,3)	34 (9,7)	Refoliado N° 175
Hipoaestesia	36 (10,2)	25 (7,1)	
Neuropatía <sup>a</sup>	23 (6,5)	13 (3,7)	
<b>Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos</b>			
Disnea	83 (23,5)	60 (17,1)	
Nasofaringitis	62 (17,6)	31 (8,9)	
Faringitis	48 (13,6)	33 (9,4)	
Bronquitis	40 (11,3)	30 (8,6)	
<b>Infecciones<sup>b</sup> e infestaciones</b>			
Infección del tracto respiratorio superior	87 (24,6)	55 (15,7)	
Neumonía <sup>en</sup>	48 (13,6)	29 (8,3)	
Infección del tracto urinario	30 (8,5)	19 (5,4)	
Sinusitis	26 (7,4)	16 (4,6)	
<b>Trastornos cutáneos y del tejido subcutáneo</b>			
Erupción cutánea <sup>c</sup>	75 (21,2)	33 (9,4)	
Incremento de la transpiración	35 (9,9)	25 (7,1)	
Piel seca	33 (9,3)	14 (4,0)	
Prurito	27 (7,6)	18 (5,1)	
<b>Trastornos del metabolismo y nutrición</b>			
Anorexia	55 (15,6)	34 (9,7)	
Hipocalcemia	48 (13,6)	21 (6,0)	
Hipocalcemia	31 (8,8)	10 (2,9)	
Disminución del apetito	24 (6,8)	14 (4,0)	
Deshidratación	23 (6,5)	15 (4,3)	
Hipomagnesemia	24 (6,8)	10 (2,9)	
<b>Exploraciones complementarias</b>			
Disminución de peso	69 (19,5)	52 (14,9)	
<b>Trastornos oculares</b>			
Visión borrosa	61 (17,3)	40 (11,4)	
<b>Trastornos vasculares</b>			
Trombosis venosa profunda <sup>**</sup>	33 (9,3)	15 (4,3)	
Hipertensión	28 (7,9)	20 (5,7)	
Hipotensión	25 (7,1)	15 (4,3)	



**Tabla 15: Reacciones adversas grado 3/4 informadas en  $\geq 2\%$  de los pacientes y con una diferencia  $\geq 1\%$  en el porcentaje de pacientes entre los grupos REVLIMID/dexametasona y placebo/dexametasona**

<b>Sistema corporal</b>	<b>REVLIMID/Dex<sup>a</sup></b> (N = 353)	<b>Placebo/Dex<sup>a</sup></b> (N = 350)
<b>Reacción adversa</b>	<b>n (%)</b>	<b>n (%)</b>
<b>Trastornos del sistema linfático y de la sangre</b>		
Neutropenia <sup>a</sup>	118 (33,4)	12 (3,4)
Trombocitopenia <sup>a</sup>	43 (12,2)	22 (6,3)
Anemia <sup>a</sup>	35 (9,9)	20 (5,7)
Leucopenia	14 (4,0)	1 (0,3)
Linfopenia	10 (2,8)	4 (1,1)
Neutropenia febril <sup>a</sup>	8 (2,3)	0 (0,0)
<b>Trastornos generales y alteraciones del lugar de administración</b>		
Fatiga	23 (6,5)	17 (4,9)
<b>Trastornos vasculares</b>		
Trombosis venosa profunda <sup>a</sup>	29 (8,2)	12 (3,4)
<b>Infecciones<sup>b</sup> e infestaciones</b>		
Neumonía <sup>a</sup>	30 (8,5)	19 (5,4)
Infección del tracto urinario	5 (1,4)	1 (0,3)
<b>Trastornos del metabolismo y la nutrición</b>		
Hipocalcemia	17 (4,8)	5 (1,4)
Hipocalcemia	13 (3,7)	6 (1,7)
Hipofosfatemia	9 (2,5)	0 (0,0)
<b>Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos</b>		
Embolia pulmonar <sup>a</sup>	14 (4,0)	3 (0,9)
Distrés respiratorio <sup>a</sup>	4 (1,1)	0 (0,0)
<b>Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo</b>		
Debilidad muscular	20 (5,7)	10 (2,9)
<b>Trastornos gastrointestinales</b>		
Diarrea <sup>a</sup>	11 (3,1)	4 (1,1)
Constipación	7 (2,0)	1 (0,3)
Náuseas <sup>a</sup>	6 (1,7)	2 (0,6)
<b>Trastornos cardíacos</b>		
Fibrilación auricular <sup>a</sup>	13 (3,7)	4 (1,1)
Taquicardia	6 (1,7)	1 (0,3)
Insuficiencia cardíaca congestiva <sup>a</sup>	5 (1,4)	1 (0,3)



<b>Trastornos del sistema nervioso</b>		
Síncope	10 (2,8)	3 (0,9)
Mareos	7 (2,0)	3 (0,9)
<b>Trastornos oculares</b>		
Cataratas	6 (1,7)	1 (0,3)
Catarata unilateral	5 (1,4)	0 (0,0)
<b>Trastorno psiquiátrico</b>		
Depresión	10 (2,8)	6 (1,7)

A.N.M.A.T. - MESA DE ENTRADAS  
 Refolio N° 176

**Tabla 164: Reacciones adversas graves reportadas en  $\geq 1\%$  de los pacientes y con una diferencia  $\geq 1\%$  en el porcentaje de pacientes entre los grupos REVLIMID/dexametasona y placebo/dexametasona**

Sistema corporal	REVLIMID/Dex <sup>a</sup> (N = 353)	Placebo/Dex <sup>a</sup> (N = 350)
Reacción adversa	n (%)	n (%)
<b>Trastornos del sistema linfático y de la sangre</b>		
Neutropenia febril <sup>b*</sup>	6 (1,7)	0 (0,0)
<b>Trastornos vasculares</b>		
Trombosis venosa profunda <sup>b*</sup>	26 (7,4)	11 (3,1)
<b>Infecciones<sup>b</sup> e infestaciones</b>		
Neumonía	33 (9,3)	21 (6,0)
<b>Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos</b>		
Embolia pulmonar <sup>a†</sup>	13 (3,7)	3 (0,9)
<b>Trastornos cardíacos</b>		
Fibrilación auricular <sup>a†</sup>	11 (3,1)	2 (0,6)
Insuficiencia cardíaca congestiva <sup>a†</sup>	5 (1,4)	0 (0,0)
<b>Trastornos del sistema nervioso</b>		
Accidente cerebrovascular <sup>a†</sup>	7 (2,0)	3 (0,9)
<b>Trastornos gastrointestinales</b>		
Diarrea <sup>a†</sup>	6 (1,7)	2 (0,6)
<b>Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo</b>		
Dolor de hueso	4 (1,1)	0 (0,0)

Para las tablas 14, 15 y 16 de arriba:

<sup>a†</sup> reacciones adversas en las cuales por lo menos una resultó fatal.

<sup>b\*</sup> reacciones adversas en las cuales por lo menos una se consideró que puso en peligro la vida (si el resultado de la reacción fue muerte, se incluye en los casos de muerte).



La mediana de duración de exposición entre los pacientes tratados con REVLIMID/dexametasona fue 44 semanas, mientras que la mediana de duración de exposición entre los pacientes tratados con placebo/dexametasona fue 23 semanas. Esto debería considerarse cuando se compara la frecuencia de reacciones adversas entre los dos grupos de tratamiento REVLIMID/dexametasona vs. placebo/dexametasona.

### **Tromboembolia venosa y arterial**

#### **TEV y TEA están aumentados en pacientes tratados con REVLIMID**

La trombosis venosa profunda se informó como una reacción adversa grave (7,4%) o severa (8,2%) en una mayor proporción en el grupo REVLIMID/dexametasona en comparación con el 3,1% y el 3,4% en el grupo placebo/dexametasona, respectivamente en los 2 estudios en pacientes con por lo menos 1 terapia previa, con discontinuación debido a reacciones adversas relacionadas con la trombosis venosa profunda informadas en proporciones comparables entre los grupos. En el estudio NDMM, se informó trombosis venosa profunda como una reacción adversa (todos los grados: 10,3%, 7,2%, 4,1%), como una reacción adversa seria (3,6%, 2,0%, 1,7%), y como una reacción adversa de grado 3/4 (5,6%, 3,7%, 2,8%) en las ramas Rd Continuous, Rd18 y MPT, respectivamente. Las discontinuaciones y las reducciones de la dosis debido a reacciones adversas de trombosis venosa profunda se informaron a tasas comparables entre las ramas Rd Continuous y Rd18 (ambas < 1%). La interrupción del tratamiento de REVLIMID por reacciones adversas de trombosis venosa profunda se informó a tasas comparables entre las ramas Rd Continuous (2,3%) y Rd18 (1,5%).


La embolia pulmonar (EP) se informó como una reacción adversa seria (3,7%) o de grados 3/4 (4,0%) en una proporción mayor en el grupo REVLIMID/dexametasona en comparación con el 0,9% en el grupo placebo/dexametasona en los 2 estudios en pacientes con por lo menos 1 terapia previa, con discontinuación debido a reacciones adversas relacionadas con la trombosis venosa profunda informadas en proporciones comparables entre los grupos. En el estudio NDMM, se informó trombosis venosa profunda como una reacción adversa (todos los grados: 10,3%, 7,2%, 4,1%), como una reacción adversa seria (3,6%, 2,0%, 1,7%), y como una reacción adversa de grado 3/4 (5,6%, 3,7%, 2,8%) en las ramas Rd Continuous, Rd18 y MPT, respectivamente. Las discontinuaciones y las reducciones de la dosis debido a reacciones adversas de trombosis venosa profunda se informaron a tasas comparables entre las ramas Rd Continuous y Rd18 (ambas < 1%). La interrupción del tratamiento de REVLIMID por reacciones adversas de trombosis venosa profunda se informó a tasas comparables entre las ramas Rd Continuous (2,3%) y Rd18 (1,5%).

La embolia pulmonar se informó como una reacción adversa seria (3,7%) o de grados 3/4 (4,0%) en una proporción mayor en el grupo REVLIMID/dexametasona en comparación con el 0,9% (seria o de grado 3/4) en el grupo placebo/dexametasona en los 2 estudios en pacientes con por lo menos 1 terapia previa, con discontinuaciones debido a reacciones adversas vinculadas con la embolia pulmonar informadas en proporciones comparables entre los grupos. En el estudio NDMM, la frecuencia de reacciones adversas de embolia pulmonar fue similar entre las ramas Rd Continuous, Rd18 y MPT para las reacciones adversas (todos los grados: 3,9%, 3,3% y 4,3%, respectivamente), reacciones adversas serias (3,8%, 2,8% y 3,7%, respectivamente), y reacciones adversas grado 3/4 (3,8%, 3,0% y 3,7%, respectivamente).

El infarto de miocardio se informó como una reacción adversa seria (1,7%) o severa (1,7%) en una tasa más



alta en el grupo de REVLIMID/dexametasona en comparación con 0,6% y 0,6% respectivamente, en el grupo placebo/dexametasona. La discontinuación debido a reacciones adversas de infarto de miocardio (incluido el agudo) fue de 0,8% en el grupo de REVLIMID/dexametasona y ninguna en el grupo placebo/dexametasona. En el estudio NDMM, se informó infarto de miocardio (incluido el agudo) como una reacción adversa (todos los grados: 2,4%, 0,6% y 1,1%), como una reacción adversa seria (2,3%, 0,6% y 1,1%), o como una reacción adversa severa (1,9%, 0,6% y 0,9%) en las ramas Rd Continuoous, Rd18 y MRT. respectivamente



Se informó ACV como una reacción adversa seria (2,3%) o severa (2,0%) en el grupo REVLIMID/dexametasona en comparación con 0,9% y 0,9% respectivamente en el grupo placebo/dexametasona. La discontinuación por ACV fue del 1,4% en el grupo REVLIMID/ dexametasona y del 0,3% en el grupo placebo/dexametasona. En el estudio NDMM, se informó ACV como una reacción adversa (todos los grados: 0,8%, 0,6% y 0,6%), como una reacción adversa seria (0,8%, 0,6 % y 0,6%) o como una reacción adversa severa (0,6%, 0,6%, 0,2%) en las ramas Rd Continuoous, Rd18 y MPT, respectivamente.

**Otras reacciones adversas después de por lo menos una terapia previa para MM :**

En estos dos estudios, se informaron las siguientes reacciones adversas no descritas más arriba que se produjeron en una proporción del  $\geq 1\%$  y de por lo menos dos veces el porcentaje de placebo.

**Trastornos del sistema linfático y de la sangre:** pancitopenia, anemia hemolítica autoinmune; hemolitia adquirida.

**Trastornos cardíacos:** bradicardia, infarto de miocardio, angina de pecho.

**Trastornos endocrinos:** hirsutismo.

**Trastornos oculares:** ceguera, hipertensión ocular.

**Trastornos gastrointestinales:** hemorragia gastrointestinal, glosodinia.

**Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:** malestar.

**Investigaciones:** pruebas de la función hepática con resultados anormales, incremento de la alanina aminotransferasa.

**Trastornos del sistema nervioso:** isquemia cerebral.

**Trastornos psiquiátricos:** cambios del estado de ánimo, alucinaciones, pérdida de la libido.

**Trastorno del aparato reproductor y de la mama:** disfunción eréctil.

**Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos:** tos, ronquera.

**Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:** exantema, hiperpigmentación de la piel.

**Infecciones e infestaciones :** Reactivación viral por Hepatitis B y Herpes Zoster

**Síndromes mielodisplásicos**

Un total de 148 pacientes recibieron por lo menos 1 dosis de 10 mg de REVLIMID en el estudio clínico de SMD relacionado con delección del 5q. Por lo menos un evento adverso se informó en todos los 148 pacientes que fueron tratados con la dosis inicial de 10 mg de REVLIMID. Los eventos adversos informados con mayor frecuencia estuvieron relacionados con trastornos del sistema linfático y de la sangre, trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, trastornos gastrointestinales, y trastornos generales y alteraciones en el




lugar de administración.

Los eventos adversos observados informados con mayor frecuencia fueron trombocitopenia (61,5%; 91/148) y neutropenia (58,8%; 87/148). Le siguieron diarrea (48,6%; 72/148), prurito (41,9%; 62/148), erupción cutánea (35,8%; 53/148) y fatiga (31,1%; 46/148). La tabla 17 resume los eventos adversos que fueron informados en  $\geq 5\%$  de los pacientes tratados con REVLIMID en el estudio clínico de SMD relacionado con delección del 5q. La tabla 18 resume las reacciones adversas grado 3 y grado 4 observadas con mayor frecuencia independientemente de la relación con el tratamiento con REVLIMID. En los estudios de rama única realizados, a menudo no es posible distinguir eventos adversos que están relacionados con el fármaco y aquellos que reflejan la enfermedad subyacente del paciente.

**Tabla 17: Resumen de eventos adversos informados en  $\geq 5\%$  de los pacientes tratados con REVLIMID® en el estudio clínico de SMD relacionado con delección del 5q**

Sistema corporal/Evento Adverso [a]	10 mg general (N=148)	
Pacientes con por lo menos un evento adverso	148	(100,0)
<b>Trastornos del sistema linfático y de la sangre</b>		
Trombocitopenia	91	(61,5)
Neutropenia	87	(58,8)
Anemia	17	(11,5)
Leucopenia	12	(8,1)
Neutropenia febril	8	(5,4)
<b>Trastornos del tejido cutáneo y subcutáneo</b>		
Prurito	62	(41,9)
Erupción cutánea	53	(35,8)
Piel seca	21	(14,2)
Contusión	12	(8,1)
Sudor nocturno	12	(8,1)
Mayor transpiración	10	(6,8)
Equimosis	8	(5,4)
Eritema	8	(5,4)
<b>Trastornos gastrointestinales</b>		
Diarrea	72	(48,6)
Constipación	35	(23,6)
Náuseas	35	(23,6)
Dolor abdominal	18	(12,2)
Vómitos	15	(10,1)
Dolor abdominal superior	12	(8,1)
Boca seca	10	(6,8)
Hecec blandas	9	(6,1)
<b>Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos</b>		
Nasofaringitis	34	(23,0)



Tos	29	(19,6)
Disnea	25	(16,9)
Faringitis	23	(15,5)
Epistaxis	22	(14,9)
Disnea por esfuerzo	10	(6,8)
Rinitis	10	(6,8)
Bronquitis	9	(6,1)
<b>Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración</b>		
Fatiga	46	(31,1)
Pirexia	31	(20,9)
Edema periférico	30	(20,3)
Astenia	22	(14,9)
Edema	15	(10,1)
Dolor	10	(6,8)
Escalofríos	9	(6,1)
Dolor de tórax	8	(5,4)
<b>Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo</b>		
Artralgia	32	(21,6)
Dolor de espalda	31	(20,9)
Calambre muscular	27	(18,2)
Dolor en las extremidades	16	(10,8)
Mialgia	13	(8,8)
Hinchazón periférica	12	(8,1)
<b>Trastornos del sistema nervioso</b>		
Mareos	29	(19,6)
Dolor de cabeza	29	(19,6)
Hipocrestesia	10	(6,8)
Disgeusia	9	(6,1)
Neuropatía periférica	8	(5,4)
<b>Infecciones e infestaciones</b>		
Infección del tracto respiratorio superior	22	(14,9)
Neumonía	17	(11,5)
Infección del tracto urinario	16	(10,8)
Sinusitis	12	(8,1)
Celulitis	8	(5,4)
<b>Trastornos del metabolismo y la nutrición</b>		
Hipocalcemia	16	(10,8)
Anorexia	15	(10,1)
Hipomagnesemia	9	(6,1)



<b>Investigaciones</b>		
Aumento de alanina aminotransferasa	12	(8,1)
<b>Trastornos psiquiátricos</b>		
Insomnio	15	(10,1)
Depresión	8	(5,4)
<b>Trastornos renales y urinarios</b>		
Disuria	10	(6,8)
<b>Trastornos vasculares</b>		
Hipertensión	9	(6,1)
<b>Trastornos endocrinos</b>		
Hipotiroidismo adquirido	10	(6,8)
<b>Trastornos cardíacos</b>		
Palpitaciones	8	(5,4)

[a] El sistema corporal y los eventos adversos están codificados usando el diccionario MedDRA. El sistema corporal y los eventos adversos se enumeran en orden descendente de frecuencia para la columna General. Un paciente con manifestaciones múltiples de un EA se cuenta sólo una vez en la categoría de EA.

**Tabla 18: Eventos adversos grado 3 y 4 observados con mayor frecuencia<sup>[1]</sup> independientemente de la relación con el tratamiento del estudio**

Eventos adversos <sup>[2]</sup>	10 mg (N=148)	
Pacientes con por lo menos un EA grados 3/4	131	(88,5)
Neutropenia	79	(53,4)
Trombocitopenia	74	(50,0)
Neumonía	11	(7,4)
Erupción cutánea	10	(6,8)
Anemia	9	(6,1)
Leucopenia	8	(5,4)
Fatiga	7	(4,7)
Disnea	7	(4,7)
Dolor de espalda	7	(4,7)
Neutropenia febril	6	(4,1)
Náuseas	6	(4,1)
Diarrea	5	(3,4)
Pirexia	5	(3,4)
Sepsis	4	(2,7)
Mareos	4	(2,7)
Granulocitopenia	3	(2,0)
Dolor de tórax	3	(2,0)



Embolia pulmonar	3	(2,0)
Dificultad respiratoria	3	(2,0)
Prurito	3	(2,0)
Pancitopenia	3	(2,0)
Calambre muscular	3	(2,0)
Infección del tracto respiratorio	2	(1,4)
Infección del tracto respiratorio superior	2	(1,4)
Astenia	2	(1,4)
Insuficiencia multiorgánica	2	(1,4)
Epistaxis	2	(1,4)
Hipoxia	2	(1,4)
Efusión pleural	2	(1,4)
Neumonitis	2	(1,4)
Hipertensión pulmonar	2	(1,4)
Vómitos	2	(1,4)
Aumento de la transpiración	2	(1,4)
Artralgia	2	(1,4)
Dolor en las extremidades	2	(1,4)
Dolor de cabeza	2	(1,4)
Síncope	2	(1,4)

A.N.M.A.T.  
 FOLIO 281  
 MESA DE ENTRADAS  
 Refoliado N 179

<sup>[1]</sup> Eventos adversos con frecuencia  $\geq 1\%$  en el grupo general de 10 mg. Los grados 3 y 4 se basan en los Criterios de Toxicidad Común del Instituto Nacional del Cáncer (NCI) CTC, *National Cancer Institute Common Toxicity Criteria*) versión 2.

<sup>[2]</sup> Los eventos adversos están codificados usando el diccionario MedDRA. Un paciente con manifestaciones múltiples de un EA se cuenta sólo una vez en la categoría del evento adverso.

En otros estudios clínicos de REVLIMID en pacientes con SMD, se informaron los siguientes eventos adversos graves (independientemente de la relación con el tratamiento con el fármaco experimental) no descriptos en las tablas 17 ó 18:

**Trastornos del sistema linfático y de la sangre:** anemia hemolítica tipo cálida, infarto esplénico, depresión de la médula ósea, coagulopatía, hemólisis, anemia hemolítica, anemia refractaria.

**Trastornos cardíacos:** insuficiencia cardíaca congestiva, fibrilación auricular, angina de pecho, paro cardíaco, insuficiencia cardíaca, paro cardiorrespiratorio, cardiomiopatía, infarto de miocardio, isquemia miocárdica, fibrilación auricular agravada, bradicardia, shock cardiogénico, edema pulmonar, arritmia supraventricular, taquiarritmia, disfunción ventricular.

**Trastornos del oído y del laberinto:** vértigo.

**Trastornos endocrinos:** enfermedad de Basedow.

**Trastornos gastrointestinales:** hemorragia gastrointestinal, colitis isquémica, perforación intestinal, hemorragia rectal, pólipos del colon, diverticulitis, disfagia, gastritis, gastroenteritis, enfermedad de reflujo.



gastroesofágico, hernia inguinal obstructiva, síndrome de intestino irritable, melena, pancreatitis por obstrucción biliar, pancreatitis, absceso perirrectal, obstrucción del intestino delgado, hemorragia gastrointestinal superior.

**Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración:** progresión de la enfermedad, caída, marcha anormal, pirexia intermitente, nódulo, escalofríos, muerte súbita.

**Trastornos hepatobiliares:** hiperbilirrubinemia, colecistitis aguda, colecistitis, insuficiencia hepática.

**Trastornos del sistema inmune:** hipersensibilidad.

**Infecciones e infestaciones:** infección, bacteremia, infección de línea central, infección por *Clostridium*, infección de oído, sepsis por *Enterobacter*, infección por hongos, infección viral por herpes, gripe, infección del riñón, sepsis por *Klebsiella*, neumonía lobar, infección localizada, infección oral, infección por *Pseudomonas*, shock séptico, sinusitis aguda, sinusitis, infección estafilocócica, urosepsis.

**Lesión, envenenamiento y complicaciones de procedimiento:** fractura de fémur, reacción a la transfusión, fractura de vértebra cervical, fractura de cuello femoral, fractura de pelvis, fractura de cadera, sobredosis, hemorragia post-procedimiento, fractura de costilla, accidente de tránsito, fractura con compresión de médula espinal.

**Investigaciones:** aumento de creatinina en sangre, cultivo negativo, disminución de hemoglobina, pruebas de función hepática con resultados anormales, aumento de troponina I.

**Trastornos del metabolismo y de la nutrición:** deshidratación, gota, hipernatremia, hipoglucemia.

**Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo:** artritis, artritis agravada, artritis gotosa, dolor de cuello, pirofosfato condrocalcinosis.

**Neoplasias benignas, malignas y no especificadas:** leucemia aguda, leucemia mielóide aguda, carcinoma bronquioloalveolar, cáncer de pulmón con metástasis, linfoma, cáncer de próstata con metástasis.

**Trastornos del sistema nervioso:** accidente cerebrovascular, afasia, infarto cerebeloso, infarto cerebral, disminución del nivel de conciencia, disartría, migraña, compresión de médula espinal, hemorragia subaracnoidea, accidente isquémico transitorio.

**Trastornos psiquiátricos:** estado de confusión.

**Trastornos renales y urinarios:** insuficiencia renal, hematuria, insuficiencia renal aguda, azotemia, cálculos uretrales, masa renal.

**Trastornos del sistema reproductivo y de la mama:** dolor pélvico.

**Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos:** bronquitis, enfermedad obstructiva crónica de las vías respiratorias exacerbada, insuficiencia respiratoria, disnea exacerbada, enfermedad pulmonar intersticial, infiltración pulmonar, sibilancia.

**Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:** dermatosis neutrofilica febril aguda.

**Trastornos del sistema vascular:** trombosis venosa profunda, hipotensión, trastorno de la arteria aorta, isquemia, tromboflebitis superficial, trombosis.

#### ***Linfoma de células del manto (LCM)***

En el ensayo de LCM, un total de 134 pacientes recibieron al menos 1 dosis de REVLIMID. La mediana de edad fue de 67 años (rango 43-83 años), 128/134 (96 %) eran caucásicos, 108/134 (81 %) eran hombres y 82/134 (61 %) tenía una duración de LCM de al menos 3 años.



La Tabla 19 resumen las reacciones adversas más frecuentemente observadas independientemente de la relación con el tratamiento con REVLIMID. En los 134 pacientes tratados en este estudio, la mediana de duración del tratamiento fue de 95 días (1-1002 días). Setenta y ocho pacientes (58 %) recibieron 12 o más ciclos de terapia, 53 pacientes (40 %) recibieron 6 o más ciclos y 26 pacientes (19 %) recibieron 12 o más ciclos. Setenta y seis pacientes (57 %) experimentó al menos una interrupción de dosis debido a eventos adversos, y 51 pacientes (38 %) experimentaron al menos una reducción de dosis debido a eventos adversos. Veintiséis pacientes (19 %) discontinuaron el tratamiento debido a eventos adversos.

MESA DE ENTRADAS  
Refolado N° 160

**Tabla 19: Incidencia de reacciones adversas (≥10%) o eventos adversos (EA) grados 3/4 (en al menos 2 pacientes) con linfoma de células de manto**

Sistema Corporal/Evento adverso	Todos los EAs <sup>1</sup> (N=134) n (%)	EAs <sup>2</sup> grados 3/4 (N=134) n (%)
<b>Trastornos generales y condiciones del lugar de administración de la inyección</b>		
Fatiga	45 (34)	9 (7)
Pirexia <sup>5</sup>	31 (23)	3 (2)
Edema periférico	21 (16)	0
Astenia <sup>5</sup>	19 (14)	4 (3)
Deterioro general de la salud física	3 (2)	2 (1)
<b>Trastornos gastrointestinales</b>		
Diarrea <sup>5</sup>	42 (31)	8 (6)
Náuseas	40 (30)	1 (<1)
Constipación	21 (16)	1 (<1)
Vómitos <sup>5</sup>	16 (12)	1 (<1)
Dolor abdominal <sup>5</sup>	13 (10)	5 (4)
<b>Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo</b>		
Dolor de espalda	18 (13)	2 (1)
Espasmos musculares	17 (13)	1 (<1)
Artralgia	11 (8)	2 (1)
Debilidad muscular <sup>5</sup>	8 (6)	2 (1)
<b>Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos</b>		
Tos	38 (28)	1 (<1)
Disnea <sup>5</sup>	24 (18)	8 (6)
Efusión pleural	10 (7)	2 (1)
Hipoxia	3 (2)	2 (1)
Embolia pulmonar	3 (2)	2 (1)
Insuficiencia respiratoria <sup>5</sup>	2 (1)	2 (1)
Dolor orofaríngeo	13 (10)	0
<b>Infecciones e infestaciones</b>		





Sistema Corporal/Evento adverso	Todos los EAs <sup>1</sup> (N=134) n (%)	EAs <sup>2</sup> grados 3/4 (N=134) n (%)
Neumonía <sup>3</sup>	19 (14)	12 (9)
Infección respiratoria superior	17 (13)	0
Celulitis <sup>5</sup>	3 (2)	2 (1)
Bacteriemia <sup>5</sup>	2 (1)	2 (1)
Sepsis estafilocócica <sup>5</sup>	2 (1)	2 (1)
Infección del tracto urinario <sup>5</sup>	5 (4)	2 (1)
<b>Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo</b>		
Rash <sup>4</sup>	30 (22)	2 (1)
Prurito	23 (17)	1 (<1)
<b>Trastornos del sistema linfático y de la sangre</b>		
Neutropenia	65 (49)	58 (43)
Thrombocitopenia <sup>5</sup>	48 (36)	37 (28)
Anemia <sup>5</sup>	41 (31)	15 (11)
Leucopenia <sup>5</sup>	20 (15)	9 (7)
Linfopenia	10 (7)	5 (4)
Neutropenia febril <sup>5</sup>	8 (6)	8 (6)
<b>Trastornos del metabolismo y de la nutrición</b>		
Disminución del apetito	19 (14)	1 (<1)
Hipocalcemia	17 (13)	3 (2)
Deshidratación <sup>5</sup>	10 (7)	4 (3)
Hipocalcemia	4 (3)	2 (1)
Hiponatremia	3 (2)	3 (2)
<b>Trastornos renales y urinarios</b>		
Insuficiencia Renal <sup>5</sup>	5 (4)	2 (1)
<b>Trastornos vasculares</b>		
Hipotensión <sup>3</sup>	9 (7)	4 (3)
Trombosis venosa profunda <sup>5</sup>	5 (4)	5 (4)
<b>Neoplasias benignas, malignas o no especificadas (incluidos quistes y pólipos)</b>		
Exacerbación tumoral	13 (10)	0
Cáncer de células escamosas de la piel <sup>5</sup>	4 (3)	4 (3)
<b>Exploraciones complementarias</b>		
Disminución de peso	17 (13)	0

1-Eventos adversos del ensayo de LCM – Todos los eventos adversos emergentes del tratamiento con  $\geq 10\%$  de pacientes

2-Eventos adversos grado 3/4 del ensayo de LCM – Todos los eventos adversos emergente de grado 3/4 emergentes del tratamiento en 2 o más pacientes



S-Eventos adversos serios del ensayo de LCM – Todos los eventos adversos serios emergentes del tratamiento en 2 más pacientes

@ - Eventos adversos en los que al menos uno provocó un resultado fatal

% - Eventos adversos en los que al menos uno se consideró con riesgo de muerte (si el resultado fue la muerte, se incluyó con casos de muerte)

# - Todos los eventos adversos bajo el Sistema Corporal de Infecciones a excepción de infecciones raras de interés para la Salud Pública se considerará enumerado

+ - Todos los eventos adversos bajo términos del nivel alto (HLT) de erupción cutánea se considerarán enumerados

A.N.M.A.T. - MESA DE ENTRADAS
Referencia para 981

Las siguientes reacciones adversas que se manifestaron en otras indicaciones, que incluyen otro estudio sobre MCL y no se describen anteriormente han sido reportados (5%-10%) en pacientes tratados con monoterapia de REVLIMID para linfoma de células de manto.

**Trastorno cardíaco: insuficiencia cardíaca**

**Trastornos del oído y del laberinto: vértigo**

**Trastornos generales y alteraciones en la zona de la administración: escalofríos**

**Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo: Dolor en las extremidades**

**Infecciones e infestaciones: Infección del tracto respiratorio, sinusitis, nasofaringitis, herpes oral**

**Trastornos del sistema nervioso: disgeusia, dolor de cabeza, neuropatía periférica, Ictargo**

**Trastornos psiquiátricos: insomnio**

**Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Piel seca, sudoración nocturna**

Los siguientes eventos adversos serios no descritos anteriormente y reportados en 2 o más pacientes tratados con monoterapia de REVLIMID para linfoma de células de manto.

**Trastornos sanguíneos y linfáticos: Neutropenia**

**Trastornos cardíacos: infarto de miocardio (incluido infarto agudo de miocardio -MI-), taquicardia supraventricular**

**Infecciones e infestaciones: Colitis por clostridium difficile, sepsis**

**Neoplasias benignas, malignas o no especificadas (incluidos quistes y pólipos): Carcinoma de células basales**

**Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, embolia pulmonar**

**Experiencia poscomercialización**

Las siguientes reacciones adversas han sido identificadas a partir de experiencia poscomercialización a escala mundial con REVLIMID. Debido a que una población de tamaño incierto reporta voluntariamente estas reacciones, no siempre es posible calcular la frecuencia de manera confiable o establecer una relación causal con la exposición al fármaco.

**Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo: Síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, reacción farmacológica con eosinofilia y síntomas sistémicos (DRESS)**

**Trastornos del sistema inmunológico: Angioedema, enfermedad aguda de injerto contra el huésped (tras trasplante hematopoyético alogénico)**

**Neoplasias benignas, malignas y no especificadas (incluidos los quistes y los pólipos): Síndrome de lisis tumoral, reacción de exacerbación tumoral**

REV PI AR-005 (REV 22) Ene 2017

CCAMQRA-011/17

FALIV. KARINA A. FLORES  
CO-DIRECTORA TÉCNICA  
F-2018-1004980-ERABN-DERM#ANMAT  
MN 11.562 - MP 14128  
MONTE VERDE S.A.



**Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos:** neumonitis

**Trastornos hepatobiliares:** Insuficiencia hepática (incluyendo fatalidad), hepatitis tóxica, hepatitis citolítica, hepatitis colestásica, hepatitis citolítica / colestática mixta, pruebas de laboratorio hepáticas, transitorias anormales.

**Infecciones e infestaciones:** Reactivación viral (como el virus de la hepatitis B y el herpes zóster [culebrilla])

**Trastornos endocrinos:** Hipotiroidismo, hipertiroidismo

**Para más información, llame al Departamento Científico: Tel. (011) 4509-7100**

### **SOBREDOSIS**

No hay experiencia específica en el manejo de sobredosis de lenalidomida en pacientes con MM, SMD o LCM. En estudios de búsqueda de dosis en sujetos sanos, algunos sujetos fueron expuestos hasta 200 mg (administrados como 100 mg dos veces al día) y, en estudios de dosis únicas, algunos sujetos fueron expuestos hasta 400 mg.

Los principales efectos adversos informados fueron prurito, urticaria, erupción cutánea, y transaminasas hepáticas elevadas. En ensayos clínicos, la toxicidad limitante de la dosis fue la neutropenia y la trombocitopenia.

**ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:**

**HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIERREZ**

TELÉFONO: (011) 4962-6666/2247

**HOSPITAL A. POSADAS**

TELÉFONO: (011) 4654-6648/4658-7777

**CENTRO DE ASISTENCIA TOXICOLÓGICA DE LA PLATA**

TELÉFONO: (0221) 451-5555

### **CONSERVACION**

Almacenar a temperatura inferior a 25°C

### **Manejo y eliminación**

Se debe tener cuidado con el manejo de REVLIMID. Las cápsulas de REVLIMID no deben abrirse ni romperse. Si el polvo de la cápsula de REVLIMID toma contacto con la piel, lávela inmediata y cuidadosamente con agua y jabón. Si REVLIMID toma contacto con las membranas mucosas, límpic bien con agua.

Se deben considerar procedimientos para el manejo y el desecho adecuados de fármacos anticancerígenos. Se han publicado diversas pautas sobre el tema.


Recetar no más de un suministro para 28 días.

REV PI AR-005 (REV 22)\_Ene 2017  
CCAMQRA-011/17

64

FARM. KARINA A. FLORES  
COORDINADORA TÉCNICA  
ABODERADA  
M.N. 11.562 - MP 14128  
MONTE VERDE S.A.

IF-2018-12042984-APN-DERM#ANMAT



## PRESENTACIÓN

**Cápsulas REVLIMID 5 mg:**

Cápsulas opacas blancas que tienen impreso en tinta negra "REV" en una mitad y "5 mg" en la otra mitad

**Cápsulas REVLIMID 10 mg:**

Cápsulas opacas azul/verde y amarillo pálido que tienen impreso en tinta negra "REV" en una mitad y "10 mg" en la otra mitad

**Cápsulas REVLIMID 15 mg:**

Cápsulas opacas azul y blanco que tienen impreso en tinta negra "REV" en una mitad y "15 mg" en la otra mitad

**Cápsulas REVLIMID 25 mg:**

Cápsulas opacas blancas que tienen impreso en tinta negra "REV" en una mitad y "25 mg" en la otra mitad

**Fecha de última revisión: Sep 2017**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ESTE MEDICAMENTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN DE FARMACOVIGILANCIA ACTIVA, Y PRESENTA PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO.**

**ESTE MEDICAMENTO SOLO DEBE UTILIZARSE BAJO ESTRICTO CONTROL Y VIGILANCIA MEDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA**

**ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD**

**CERTIFICADO NR. 54360**

**LABORATORIO: MONTE VERDE S.A**

**DOMICILIO:** Ruta Nacional N° 40, Km 155 s/n° esq. Calle 8, Departamento de Pocito, Provincia de San Juan

**DIRECTORA TÉCNICA:** Dra. Marina Lorena Manzur, Farmacéutica

REV-PI AR-005 (REV 22) Ene 2017  
CCAMQRA-011/17

65

FARMACIA KARINA A. FLORES  
CD. DIRECTORA TÉCNICA  
MODERADA  
N° 11-562 MR 14128  
IF-2018-1204207-ANMAT  
MONTE VERDE S.A.



**ELABORADO POR:**

CELGENE INTERNATIONAL SARL (Route de Perreux I, 2017, Boudry, Suiza)

o

PENN PHARMACEUTICALS LIMITED (23 – 24 Tafarnaubach Industrial Estate Tredegar, Gwent, NP23 5

AA, Reino Unido

FARM. KARINA A. FLORES  
COORDINADORA TÉCNICA  
APC DERADA

IF-2018-1204008#E-ARDE-S.E.R.M#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2018-12042984-APN-DERM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Martes 20 de Marzo de 2018

**Referencia:** 1527-18-5 PROSPECTO REVLIMID

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 66 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2018.03.20 18:46:09 -0300

Analia Claudia Sabattini  
Técnico Profesional  
Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica


Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2018.03.20 18:46:11 -0300

## INFORMACION PARA EL PACIENTE

**REVLIMID®**  
**LENALIDOMIDA**  
Cápsulas de 5 mg, 10 mg, 15 mg y 25 mg.



Venta bajo receta archi



**Código ATC: L04AX04**

### LEA TODO EL PROSPECTO DETENIDAMENTE ANTES DE EMPEZAR A TOMAR EL MEDICAMENTO

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Los medicamentos a veces son prescritos para patologías que no se mencionan en las Guías sobre los Medicamentos. No tome REVLIMID para patologías para las cuales no fue prescrito. No comparta REVLIMID con otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted. Puede hacerles daño y causar defectos congénitos.
- Si considera que alguno de los eventos adversos que sufre es grave, o si aprecia cualquier evento adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

#### CONTENIDO DEL PROSPECTO:

1. ¿QUÉ ES REVLIMID® Y PARA QUE SE UTILIZA?
2. ANTES DE USAR REVLIMID®
3. ¿CÓMO USAR REVLIMID®?
4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS
5. CONSERVACIÓN DE REVLIMID®
6. INFORMACIÓN ADICIONAL

#### 1. ¿QUÉ ES LENALIDOMIDA Y PARA QUE SE UTILIZA?

REVLIMID® (lenalidomida) es un medicamento de venta bajo receta utilizado para tratar lo siguiente:

- o Pacientes con mieloma múltiple (MM) en combinación con dexametasona. Está indicado como terapia de mantenimiento en

REV PIL AR-005 (REV 22)\_Ene 2017  
CCAMQRA-011/17

IF-2018-12043104-AP-  
FARM. YARINA A. FLORES  
APODERADA  
MN 11.562 - MP 14128



pacientes con MM luego del trasplante autólogo de células madre hematopoyéticas (auto-HSCT).

- Pacientes que tienen síndromes mielodisplásicos (SMD). REVLIMID es para el tipo de SMD con un problema cromosómico en donde falta parte del cromosoma 5. Este tipo de SMD es conocido como SMD con delección del 5q. Los pacientes con este tipo de SMD pueden tener recuentos bajos de glóbulos rojos que requieren tratamiento con transfusiones de sangre.
- Pacientes con linfoma de células de manto (LCM) cuando la enfermedad no responde o reaparece luego del tratamiento con dos medicamentos previos (y uno de ellos era bortezomib). El linfoma de células de manto es un cáncer de un tipo de glóbulo blanco (linfocitos) que están en los ganglios linfáticos.

REVLIMID no debe utilizarse para tratar pacientes con leucemia linfocítica crónica (LLC) a menos que estén participando de un ensayo clínico controlado.

Se desconoce si REVLIMID es seguro y efectivo en personas menores de 18 años de edad.

## 2. ANTES DE USAR REVLIMID

### NO TOME REVLIMID SI:

- Está embarazada, planea quedar embarazada o queda embarazada durante el tratamiento con REVLIMID.
- Si es alérgico a lenalidomida o a alguno de los componentes de REVLIMID. Consulte la lista completa de los ingredientes al final de este Prospecto de Información para el Paciente.

### ANTES DE TOMAR REVLIMID, COMÉNTALE A SU MÉDICO SI ESTÁ AFECTADO POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

- problemas hepáticos
- problemas renales o ha recibido tratamiento de diálisis renal
- problemas de la glándula tiroides
- intolerancia a la lactosa. REVLIMID contiene lactosa.
- cualquier otra condición médica.
- está amamantando. REVLIMID no debe ser utilizado por mujeres que están amamantando. Se desconoce si REVLIMID pasa a la leche materna





sexuales sin protección con una mujer que está o podría quedar embarazada.

- No done esperma mientras toma REVLIMID, durante cualquier interrupción de su tratamiento, y durante 4 semanas después de dejar de tomar REVLIMID. Si una mujer queda embarazada con su esperma, el bebé puede estar expuesto a REVLIMID y nacer con defectos congénito  
**Si su pareja queda embarazada, llame de inmediato a su profesional de la salud.**

- **Bajo recuento de glóbulos blancos (neutropenia) y de plaquetas (trombocitopenia).**

REVLIMID causa un bajo recuento de glóbulos blancos y de plaquetas en la mayoría de los pacientes. Puede necesitar una transfusión de sangre o determinados medicamentos si su recuento sanguíneo baja mucho.

Su médico debe controlar su recuento sanguíneo a menudo particularmente durante los primeros meses del tratamiento con REVLIMID, y por lo menos en forma mensual de ahí en adelante.

Informe a su médico si manifiesta algún sangrado o hematomas durante el tratamiento con REVLIMID.

- **Coágulos de sangre.** Los coágulos de sangre en arterias, venas y pulmones aparecen de forma más frecuente en quienes toman REVLIMID. Este riesgo es aún mayor en personas con mieloma múltiple que toman dexametasona con REVLIMID. Los ataques cardíacos y los ACV también ocurren con más frecuencia en personas que toman REVLIMID con dexametasona. Para reducir este riesgo aumentado, la mayoría de las personas que toma REVLIMID también se les administrará un medicamento anticoagulante. Antes de tomar REVLIMID, dígame a su médico lo siguiente:

- si ha tenido un coágulo de sangre
- si tiene presión alta
- si fuma
- si sabe que tiene un nivel alto de grasas en la sangre (hiperlipidemia)
- Infórmele acerca de todos los medicamentos que toma. Algunos medicamentos también pueden aumentar su riesgo de tener coágulos de sangre.

Hable con su médico o busque asistencia médica de inmediato si llega a tener cualquiera de los siguientes signos o síntomas durante el tratamiento con REVLIMID:

- **coágulo de sangre en el pulmón, brazo o pierna que podría incluir:** falta de aire, dolor de pecho, o inflamación de brazos o piernas



- o **ataque cardiaco que podría incluir:** dolor de pecho que podría extenderse a los brazos, cuello, mandíbula, espalda o zona del estómago (abdomen), sensación de sudoración, falta de aire, náuseas o vómitos
- o **ACV que podría incluir:** entumecimiento o debilidad repentina, especialmente en un lado del cuerpo, dolor de cabeza o confusión severos, problemas en la visión, el habla o el equilibrio.

MESA DE ENTRADAS	
Refollado N°	268

**Infórmele al profesional de la salud acerca de todos los medicamentos que toma, incluso medicamentos con y sin prescripción, vitaminas y suplementos a base de hierbas.** Es posible que REVLIMID y otros medicamentos se afecten unos a otros provocando serios efectos colaterales.

Conozca los medicamentos que toma. Conserve una lista de los mismos para mostrarles al profesional de la salud y a su farmacéutico

### 3. ¿CÓMO USAR REVLIMID?

Tome REVLIMID exactamente como se le recetó y siga las instrucciones del Programa de Minimización de Riesgo.

Antes de prescribir REVLIMID, el profesional de la salud hará lo siguiente:

- le explicará el Programa de Minimización de Riesgo
- le hará firmar el formulario de consentimiento informado entre el médico y el paciente.
- **Ingiera las cápsulas de REVLIMID enteras con agua una vez por día. No abra, rompa o mastique las cápsulas.**
- **No comparta REVLIMID con otras personas.** Puede provocar defectos congénitos y otros problemas graves.
- **Tome REVLIMID a aproximadamente la misma hora cada día.**
- No abra las cápsulas de REVLIMID ni las manipule más de lo necesario. Si toma contacto con una cápsula de REVLIMID rota o el fármaco contenido en la cápsula, lave la zona del cuerpo con agua y jabón.
- Si se olvida de tomar una dosis de REVLIMID, y han pasado menos de 12 horas de su horario regular, tómela lo antes posible. Si se olvida de tomarla durante todo un día, retome su esquema de dosificación habitual el próximo día. **No tome 2 dosis al mismo tiempo.**
- Si toma demasiado REVLIMID o tiene una sobredosis, llame a su profesional de la salud o al centro de control de intoxicaciones de inmediato.

**Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben:**

- Deben hacerse una prueba de embarazo antes de iniciar el



tratamiento, luego cada 4 semanas si su ciclo menstrual es regular o cada 2 semanas si su ciclo menstrual es irregular.

- Si no menstrúa o tiene sangrado inusual, debe hacerse una prueba de embarazo y recibir asesoramiento.
- Deben usar simultáneamente 2 métodos anticonceptivos diferentes y efectivos 4 semanas antes de empezar a tomar el medicamento, mientras lo está tomando y durante 4 semanas después de dejar de tomar REVLIMID.

**Los pacientes masculinos que toman REVLIMID**, incluso aquellos que se han realizado una vasectomía, deben usar un condón de látex durante el contacto sexual con una mujer embarazada o con una mujer que puede quedar embarazada.

#### ¿Qué debo evitar mientras tomo REVLIMID®?

- Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre REVLIMID?”
- **Mujeres: No deben quedar embarazadas ni tampoco deben amamantar mientras estén tomando REVLIMID**
- **Hombres: no deben donar esperma.**
- **No comparta REVLIMID con otras personas.** Puede provocar defectos congénitos y otros problemas graves.
- **No debe donar sangre** mientras esté tomando REVLIMID, ni durante cualquier interrupción de su tratamiento, ni 4 semanas después de dejar REVLIMID. Si una mujer embarazada recibe la sangre que usted donó, el bebé puede estar expuesto a REVLIMID y puede nacer con defectos congénitos.

#### 4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

- Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre REVLIMID?”.


**REVLIMID puede causar efectos adversos graves, que pueden incluir lo siguiente:**

- **Aumento del riesgo de muerte en personas que tienen leucemia linfocítica crónica (LLC).** Los pacientes con LLC que toman REVLIMID tienen un riesgo aumentado de muerte en comparación con personas que toman clorambucilo. REVLIMID puede causar problemas cardíacos serios que pueden provocar la muerte, por ejemplo fibrilación auricular, ataque cardíaco o insuficiencia



cardíaca. No debe tomar REVLIMID si tiene LLC salvo que este participando en un ensayo clínico controlado.

- **Riesgo de aparición de nuevos cánceres (neoplasias).** Los pacientes con mieloma múltiple que reciben Revlimid y Melfalan y con trasplante de células madre de la sangre tienen un riesgo mayor de desarrollar nuevos cánceres, incluidos ciertos tipos de cáncer en la sangre (leucemia mieloide aguda o LMA, y síndrome mielodisplásico o SMD) y un tipo de linfoma llamado linfoma de Hodgkin. Hable con el profesional de la salud acerca del riesgo de desarrollar nuevos focos de cáncer si toma REVLIMID. Su médico controlará la posible aparición de nuevos focos de cáncer durante su tratamiento con REVLIMID.



- **Problemas hepáticos severos, incluida la insuficiencia hepática y la muerte.** Hable de inmediato con su médico si desarrolla alguno de los siguientes síntomas de problemas hepáticos:
  - Si su piel o la parte blanca de sus ojos se torna amarillenta (ictericia)
  - Orina oscura o marrón (de color té)
  - Dolor en la parte superior derecha de su estómago (abdomen)
  - Sangrado o formación de hematomas con más facilidad de lo normal
  - Se siente muy cansado
- **Problemas en la glándula tiroides (hipo o hipertiroidismo)**

**Su médico le realizará análisis de sangre para controlar la función hepática durante el tratamiento con REVLIMID.**

- **Reacciones dermatológicas serias que incluyen reacciones alérgicas graves.** Pueden producirse con REVLIMID y pueden provocar la muerte. Llame a su profesional de la salud de inmediato si manifiesta cualquiera de estos signos o síntomas de una reacción alérgica seria o de una reacción seria de la piel durante el tratamiento con REVLIMID:
  - Hinchazón de la cara, ojos, labios, lengua y garganta.
  - Problemas al tragar.
  - Dificultad para respirar.
  - Erupción cutánea, urticaria o exfoliación de la piel.
  - Ampollas.
  - Erupción con fiebre y /o glándulas inflamadas





- **Síndrome de lisis tumoral.** El síndrome de lisis tumoral es provocado por la rápida descomposición de las células cancerosas. El síndrome puede generar insuficiencia renal y la necesidad de tratamiento de diálisis, ritmo cardíaco anormal, convulsiones y, a veces, la muerte. Su médico podría realizarle análisis de sangre para controlar el síndrome de lisis tumoral
- **Empeoramiento del tumor (reacción de llamarada en el tumor).** Hable con su médico si llega a tener alguno de estos síntomas de reacción de llamarada en el tumor mientras toma REVLIMID: ganglios linfáticos inflamados y sensibles, febrícula, dolor o erupción cutánea
- **Riesgo de muerte prematura en MCL.** En personas que tienen Linfoma de células del manto (MCL), puede haber riesgo de morir antes (muerte prematura) al tomar REVLIMID. Hable con su proveedor de atención médica sobre cualquier inquietud y posible factor de riesgo
- **Reactivación viral por Hepatitis B y Herpes Zoster**

Los efectos adversos frecuentes de REVLIMID son los siguientes:

- Diarrea
- constipación
- prurito
- erupción cutánea
- cansancio
- hinchazón de extremidades y de la piel
- náuseas
- fiebre
- tos

Éstos no son todos los efectos adversos posibles de REVLIMID.

Llame a su profesional de la salud a fin de solicitarle asesoramiento médico sobre efectos adversos. Puede informar efectos adversos a la Autoridad Sanitaria .


Llame a su profesional de la salud a fin de recibir asesoramiento médico respecto de los efectos colaterales. Informar los efectos colaterales a Laboratorios Raffo al teléfono 4509-7100.

## 5. CONSERVACIÓN DE REVLIMID

- Conserve REVLIMID a temperatura ambiente, inferior a 25°C
- Devuelva cualquier REVLIMID que no haya usado a su médico.



Conserve REVLIMID y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.



## 6. INFORMACIÓN ADICIONAL

### Información general sobre REVLIMID

Los medicamentos a veces son prescritos para patologías que no se mencionan en las Guías sobre los Medicamentos. **No** tome REVLIMID para patologías para las cuales no fue prescripto. **No** comparta REVLIMID con otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted. Puede hacerles daño o causar defectos congénitos.

Este prospecto de Información para el Paciente provee un resumen de la información más importante acerca de REVLIMID. Si desea obtener más información, hable con el profesional de la salud. Puede solicitar a su médico o farmacéutico información sobre REVLIMID escrita para los profesionales de la salud. También puede llamar al Laboratorio Raffo al teléfono 4509-7100.

### ¿Qué contiene Revlimid?


El principio activo es Lenalidomida

Cada cápsula de 5 mg contiene: 5 mg de lenalidomida. Los demás componentes son: lactosa anhidra, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica y estearato de magnesio.

Cada cápsula de 10 mg contiene: 10 mg de lenalidomida. Los demás componentes son: lactosa anhidra, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica y estearato de magnesio.

Cada cápsula de 15 mg contiene: 15 mg de lenalidomida. Los demás componentes son: lactosa anhidra, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica y estearato de magnesio.

Cada cápsula de 25 mg contiene: 25 mg de lenalidomida. Los demás componentes son: lactosa anhidra, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica y estearato de magnesio.



Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

**ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:**

**HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIERREZ**  
TELÉFONO: (011) 4962-6666/2247

**HOSPITAL A. POSADAS**  
TELÉFONO: (011) 4654-6648/4658-7777

**CENTRO DE ASISTENCIA TOXICOLÓGICA DE LA PLATA**  
TELÉFONO: (0221) 451-5555

**PRESENTACIÓN:**

REVLIMID 5 mg  
Cápsulas opacas blancas que tienen impreso en tinta negra "REV" en una mitad y "5 mg" en la otra mitad:

Caja de 21 capsulas de 5 mg  
Caja de 28 capsulas de 25 mg

REVLIMID 10 mg  
Cápsulas opacas azul/verde y amarillo pálido que tienen impreso en tinta negra "REV" en una mitad y "10 mg" en la otra mitad:

Caja de 21 capsulas de 10 mg  
Caja de 28 capsulas de 25 mg

REVLIMID 15 mg  
Cápsulas opacas azul pálido y blanco que tienen impreso en tinta negra "REV" en una mitad y "15 mg" en la otra mitad:

Caja de 21 capsulas de 15 mg  
Caja de 28 capsulas de 25 mg

REVLIMID 25 mg


REV PIL AR-005 (REV 22)\_Ene 2017  
CCAMQRA-011/17

10



Cápsulas opacas blancas que tienen impreso en tinta negra "REV" en una mitad y "25 mg" en la otra mitad:

Caja de 21 capsulas de 25 mg  
Caja de 28 capsulas de 25 mg



Fecha de última revisión: Sep 2017

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**ESTE MEDICAMENTO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN DE FÁRMACOVIGILANCIA ACTIVA, Y PRESENTA PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO.**

**ESTE MEDICAMENTO SOLO DEBE UTILIZARSE BAJO ESTRICTO CONTROL Y VIGILANCIA MEDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA**

**ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD**

**CERTIFICADO N° 54360**

**LABORATORIO: MONTE VERDE S.A**

**DOMICILIO:** Ruta Nacional N° 40, s/n esq. Calle 8 Departamento de Pocito, Provincia de San Juan

**DIRECTORA TÉCNICA:** Dra. Marina Lorena Manzur, Farmacéutica

**ELABORADO POR:**

CELGENE INTERNATIONAL SARL (Route de Perreux I, 2017, Boudry, Suiza)

o

PENN PHARMACEUTICALS LIMITED (23 - 24 Tafarnaubach Industrial Estate Tredegar, Gwen, NP2 3 AA, Reino Unido)





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2018-12043104-APN-DERM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Martes 20 de Marzo de 2018

**Referencia:** 1527-18-5 INF PACIENTE REVLIMID

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2018.03.20 18:47:13 -03'00'

Analia Claudia Sabattini  
Técnico Profesional  
Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2018.03.20 18:47:13 -03'00'