



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-14839667-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el Expediente EX-2020-14839667-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma MSD ARGENTINA S.R.L. solicita la aprobación de nuevos proyectos de rótulos, prospectos e información para el paciente para la Especialidad Medicinal denominada ZEMURON / BROMURO DE ROCURONIO, Forma farmacéutica y concentración: SOLUCIÓN INYECTABLE / BROMURO DE ROCURONIO 10 mg / ml; aprobada por Certificado N° 45.532.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición N°: 5904/96 y Circular N° 4/13.

Que la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorias.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. – Autorízase a la firma MSD ARGENTINA S.R.L. propietaria de la Especialidad Medicinal denominada ZEMURON / BROMURO DE ROCURONIO, Forma farmacéutica y concentración: SOLUCIÓN

INYECTABLE / BROMURO DE ROCURONIO 10 mg / ml; el nuevo proyecto de rótulos obrante en los documentos IF-2020-19654407-APN-DERM#ANMAT, IF-2020-19654472-APN-DERM#ANMAT, IF-2020-19654371-APN-DERM#ANMAT, IF-2020-19654324-APN-DERM#ANMAT, IF-2020-19654215-APN-DERM#ANMAT y IF-2020-19654262-APN-DERM#ANMAT; el nuevo proyecto de prospecto obrante en el documento IF-2020-19654542-APN-DERM#ANMAT; e información para el paciente obrante en el documento IF-2020-19654602-APN-DERM#ANMAT.

ARTICULO 2º. – Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 45.532, cuando el mismo se presente acompañado de la presente Disposición.

ARTICULO 3º. - Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición y rótulos, prospectos e información para el paciente. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

Expediente EX-2020-14839667-APN-DGA#ANMAT

Js

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa  
Date: 2020.04.07 09:57:14 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRÓNICA - GDE  
Date: 2020.04.07 09:57:17 -03:00

**PROYECTO DE ROTULO SECUNDARIO**



**ZEMURON®**

**Bromuro de rocuronio 10 mg/ml**

Solución inyectable para administración intravenosa

VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA

**FORMULA**

Cada vial/ampolla de 5 ml contiene: **Bromuro de rocuronio 50 mg**. Excipientes: Acetato de sodio; Cloruro de sodio; Ácido acético hasta pH=4, Agua para inyección hasta 5 ml.

Agente paralizante

**POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:** Ver prospecto adjunto.

**PRESENTACIONES**

Contiene 10 y 12 viales de 5 ml con 50 mg de bromuro de rocuronio.

Contiene 10 y 12 ampollas de 5 ml con 50 mg de bromuro de rocuronio.

**CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO**

Zemuron debe conservarse en la heladera entre 2°C y 8°C. Zemuron puede conservarse fuera de la heladera a una temperatura de hasta 30°C durante 12 semanas como máximo. Una vez fuera de la heladera no debe volverse a conservar en frío.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ESTE MEDICAMENTO DEBE SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA.**

Fabricado por: **Siegfried Hameln GmbH**, Langes Feld 13, 31789, Hameln - Alemania.

INDUSTRIA ALEMANA

Importado y comercializado en Argentina por: **MSD Argentina S.R.L.** Cazadores de Coquimbo 2841/57 piso 4, Munro (B1605AZE), Vicente López, Prov. de Buenos Aires. Tel.: 6090-7200. [www.msd.com.ar](http://www.msd.com.ar)

Directora Técnica: Cristina B. Wiege, Farmacéutica.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 45.532

EXP.:

LOT.:

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico  
MSD Argentina S.R.L.  
IF-2020-15348129-APN-DGA#ANMAT  
MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TÉCNICO  
Página 149 de 173



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-14839667 ROT SEC 50mg

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.03.30 19:10:59 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.03.30 19:11:00 -03:00



**PROYECTO DE ROTULO SECUNDARIO**



**ZEMURON®**

**Bromuro de rocuronio 10 mg/ml**

Solución inyectable para administración intravenosa

VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA

**FORMULA**

Cada vial/ampolla de 10 ml contiene: **Bromuro de rocuronio 100 mg**. Excipientes: Acetato de sodio; Cloruro de sodio; Ácido acético hasta pH=4, Agua para inyección hasta 10 ml.

Agente paralizante

**POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:** Ver prospecto adjunto.

**PRESENTACIONES**

Contiene 10 viales de 10 ml con 100 mg de bromuro de rocuronio.

Contiene 10 ampollas de 10 ml con 100 mg de bromuro de rocuronio.

**CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO**

Zemuron debe conservarse en la heladera entre 2°C y 8°C. Zemuron puede conservarse fuera de la heladera a una temperatura de hasta 30°C durante 12 semanas como máximo. Una vez fuera de la heladera no debe volverse a conservar en frío.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ESTE MEDICAMENTO DEBE SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA.**

Fabricado por: **Siegfried Hameln GmbH**, Langes Feld 13, 31789, Hameln - Alemania.

INDUSTRIA ALEMANA

Importado y comercializado en Argentina por: **MSD Argentina S.R.L.** Cazadores de Coquimbo 2841/57 piso 4, Munro (B1605AZE), Vicente López, Prov. de Buenos Aires. Tel.: 6090-7200. [www.msd.com.ar](http://www.msd.com.ar)

Directora Técnica: Cristina B. Wiege, Farmacéutica.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 45.532

EXP.:

LOT.:


Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico  
MSD Argentina S.R.L.

IF-2020-15348129-APN-DGA#ANMAT

Página 152 de 173





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-14839667 ROT SEC 100mg

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.03.30 19:11:25 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.03.30 19:11:26 -03:00

**PROYECTO DE ROTULO SECUNDARIO**



**ZEMURON®**

**Bromuro de rocuronio 10 mg/ml**

Solución inyectable para administración intravenosa

VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA

**FORMULA**

Cada vial de 2,5 ml contiene: **Bromuro de rocuronio 25 mg**. Excipientes: Acetato de sodio; Cloruro de sodio; Ácido acético hasta pH=4, Agua para inyección hasta 2,5 ml.

Agente paralizante

**POSOLÓGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:** Ver prospecto adjunto.

**PRESENTACIONES**

Contiene 10 viales de 2,5 ml con 25 mg de bromuro de rocuronio.

**CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENAMIENTO**

Zemuron debe conservarse en la heladera entre 2°C y 8°C. Zemuron puede conservarse fuera de la heladera a una temperatura de hasta 30°C durante 12 semanas como máximo. Una vez fuera de la heladera no debe volverse a conservar en frío.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ESTE MEDICAMENTO DEBE SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA.**

Fabricado por: **Siegfried Hameln GmbH**, Langes Feld 13, 31789, Hameln - Alemania.

INDUSTRIA ALEMANA

Importado y comercializado en Argentina por: **MSD Argentina S.R.L.** Cazadores de Coquimbo 2841/57 piso 4, Munro (B1605AZE), Vicente López, Prov. de Buenos Aires. Tel.: 6090-7200. [www.msd.com.ar](http://www.msd.com.ar)

Directora Técnica: Cristina B. Wiede, Farmacéutica.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 45.532

EXP.:

LOT.:

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas

Co-Director Técnico  
MSD Argentina S.R.L.

IF-2020-15348129-APN-DGA#ANMAT

MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TÉCNICO  
APODERADO



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-14839667 ROT SEC 25mg

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.03.30 19:10:34 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.03.30 19:10:35 -03:00

**PROYECTO DE ROTULO PRIMARIO**



**ZEMURON®**

**Bromuro de rocuronio 10 mg/ml**  
Solución inyectable – Vía intravenosa

Vial/ampolla de 10 ml con 100 mg de bromuro de rocuronio.

INDUSTRIA ALEMANA

Agente paralizante

EXP.:

LOT.:

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico

IF-2020-15348129-APN-DGA#ANMAT

MSD ARGENTINA SRL  
Fam. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TECNICO  
APODERADO



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-14839667 ROT PRIM 100mg

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.03.30 19:10:51 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.03.30 19:10:51 -03:00

**PROYECTO DE ROTULO PRIMARIO**



**ZEMURON®**

**Bromuro de rocuronio 10 mg/ml**  
Solución inyectable – Vía intravenosa

Vial de 2,5 ml con 25 mg de bromuro de rocuronio.

INDUSTRIA ALEMANA

Agente paralizante

EXP.:

LOT.:

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas

Co-Director Técnico

MSD Argentina S.R.L.

IF-2020-15348129-APN-DGA#ANMAT

MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TECNICO  
APODERADO



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-14839667 ROT PRIM 25mg

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.03.30 19:08:58 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.03.30 19:08:58 -03:00



**PROYECTO DE ROTULO PRIMARIO**



**ZEMURON®**

**Bromuro de rocuronio 10 mg/ml**

Solución inyectable – Vía intravenosa

Vial/ampolla de 5 ml con 50 mg de bromuro de rocuronio.

INDUSTRIA ALEMANA

Agente paralizante

EXP.:

LOT.:

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas

Co-Director Técnico

MSD Argentina S.R.L.

IF-2020-15348129-APN-DGA#ANMAT

MSD ARGENTINA SRL  
Fam. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TECNICO  
APODERADO



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-14839667 ROT PRIM 50mg

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.03.30 19:09:33 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.03.30 19:09:34 -03:00

INFORMACIÓN PARA EL PRESCRIPTOR

ZEMURON

Bromuro de rocuronio – 10 mg/ml

Solución inyectable para administración intravenosa

VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA

COMPOSICIÓN

Cada vial de 2,5 ml contiene: **Bromuro de rocuronio 25 mg**. Excipientes: Acetato de sodio 5 mg; Cloruro de sodio 8,25 mg; Ácido acético hasta pH 4 15-25 mg; Agua para inyección hasta 2,5 ml

Cada vial/ampolla de 5 ml contiene: **Bromuro de rocuronio 50 mg**. Excipientes: Acetato de sodio 10 mg; Cloruro de sodio 16,5 mg; Ácido acético hasta pH 4 30-50 mg; Agua para inyección hasta 5 ml

Cada vial/ampolla de 10 ml contiene: **Bromuro de rocuronio 100 mg**. Excipientes: Acetato de sodio 20 mg; Cloruro de sodio 33 mg; Ácido acético hasta pH 4 60-100 mg; Agua para inyección hasta 10 ml.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

ZEMURON (bromuro de rocuronio) es un agente bloqueante neuromuscular no despolarizante. Miorrelajantes, agentes de acción periférica. Código ATC: M03AC09.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

ZEMURON está indicado en adultos y pacientes pediátricos (desde recién nacidos a término hasta adolescentes [de 0 hasta 18 años]) como coadyuvante de la anestesia general para facilitar la intubación traqueal durante la inducción rutinaria, y para conseguir la relajación de la musculatura esquelética en cirugía. En adultos, ZEMURON también está indicado para facilitar la intubación traqueal durante la inducción de secuencia rápida y como coadyuvante en la unidad de cuidados intensivos (UCI) para facilitar la intubación y la ventilación mecánica.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Propiedades farmacodinámicas

Mecanismo de acción

ZEMURON (bromuro de rocuronio) es un agente bloqueante neuromuscular no despolarizante de acción intermedia y con un comienzo de acción rápido, que presenta todas las acciones farmacológicas características de esta clase de fármacos (curariforme). Actúa compitiendo por los receptores colinérgicos nicotínicos de la placa motora terminal. Esta acción se antagoniza por los inhibidores de la acetilcolinesterasa como la neostigmina, edrofonio y piridostigmina.

Efectos farmacodinámicos

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico

IF-2020-15348129-APN-DGA#ANMAT

MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TÉCNICO  
APODERADO

La ED<sub>90</sub> (dosis requerida para producir una depresión del 90% de la transmisión neuromuscular del pulgar a la estimulación del nervio cubital) en anestesia intravenosa es aproximadamente de 0,3 mg.kg<sup>-1</sup> de bromuro de rocuronio. La ED<sub>95</sub> en lactantes es más baja que en adultos y niños (0,25; 0,35 y 0,40 mg/kg, respectivamente).

La duración clínica (duración hasta la recuperación espontánea del 25% de la transmisión neuromuscular) con 0,6 mg/kg de bromuro de rocuronio es de 30-40 minutos. La duración total (tiempo hasta la recuperación espontánea del 90% de la transmisión neuromuscular) es de 50 minutos. El tiempo medio de la recuperación espontánea del 25% al 75% de la transmisión neuromuscular (índice de recuperación) después de una dosis en bolo de 0,6 mg/kg de bromuro de rocuronio es de 14 minutos. Con dosis más bajas de 0,3-0,45 mg/kg de bromuro de rocuronio (1-1 ½ x ED<sub>90</sub>), el inicio de la acción es más lento y la duración de la acción es más corta. Con dosis altas de 2 mg.kg<sup>-1</sup>, la duración clínica es de 110 minutos.

#### Intubación durante la anestesia de rutina

Durante los 60 segundos tras la administración intravenosa de una dosis de 0,6 mg/kg de bromuro de rocuronio (2 x ED<sub>90</sub> bajo anestesia intravenosa), se pueden obtener condiciones de intubación adecuadas en casi todos los pacientes, de los que en el 80% las condiciones de intubación se aprecian como excelentes. La parálisis muscular generalizada adecuada para cualquier tipo de procedimiento se establece en 2 minutos. Tras la administración de 0,45 mg/kg de bromuro de rocuronio, se obtienen condiciones de intubación aceptables a los 90 segundos.

#### Inducción de secuencia rápida

Durante la inducción de secuencia rápida de la anestesia con propofol o con fentanilo/tiopental, se alcanzan unas condiciones adecuadas para la intubación en 60 segundos en el 93% y el 96% de los pacientes, respectivamente, tras una dosis de 1,0 mg/kg de bromuro de rocuronio. En el 70% de los casos, las condiciones de intubación fueron excelentes. La duración clínica de esta dosis se aproxima a 1 hora, momento en el cual el bloqueo neuromuscular puede ser revertido con toda seguridad. Tras una dosis de 0,6 mg/kg de bromuro de rocuronio, se alcanzan unas condiciones de intubación adecuadas en 60 segundos en el 81% y 75% de los pacientes durante la inducción de secuencia rápida con propofol o fentanilo/tiopental, respectivamente.

#### Población pediátrica

El tiempo de inicio promedio en lactantes y niños a la dosis de intubación de 0,6 mg/kg es ligeramente más corto que en adultos. La comparación entre los diferentes grupos de edad pediátrica muestra que el tiempo de inicio promedio en recién nacidos y adolescentes (1 minuto) es ligeramente más largo que en lactantes de entre 28 días y 2 meses, ambos inclusive, lactantes de entre 3 meses y 23 meses, ambos inclusive, y niños (de 2 a 11 años) (0,4, 0,6 y 0,8 minutos, respectivamente). La duración de la relajación y el tiempo de recuperación tienden a ser más cortos en niños, en comparación con lactantes y adultos. La comparación entre los grupos de edad pediátrica demostró que el tiempo medio de reaparición de T3 se prolongaba en recién nacidos y lactantes de entre 28 días y 2 meses, ambos inclusive (56,7 y 60,7 minutos, respectivamente) en relación a lactantes de entre 3 meses y 23 meses, ambos inclusive, niños y adolescentes (45,4; 37,6 y 42,9 minutos, respectivamente).

Tiempo de inicio promedio (DS) y duración clínica después de una dosis de intubación inicial\* de 0,6 mg/kg de rocuronio durante la anestesia de mantenimiento con sevoflurano/óxido nitroso e isoflurano/óxido nitroso en pacientes pediátricos (grupo PP).

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.

 **Confidencial**

Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico  
MSD Argentina S.R.L.  
IF-2020-15348129-ARN-DGA#ANMAT  
MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TÉCNICO  
APODERADO

	Tiempo hasta el bloqueo máximo** (min)	Tiempo hasta la reaparición del T3** (min)
Recién nacidos (0-27 días) n=10	0,98 (0,62)	56,69 (37,04) n=9
Lactantes de entre 28 días y 2 meses, ambos inclusive n=11	0,44 (0,19) n=10	60,71 (16,52)
Lactantes de entre 3 meses y 23 meses, ambos inclusive n=28	0,59 (0,27)	45,46 (12,94) n=27
Niños (2-11 años) n=34	0,84 (0,29)	37,58 (11,82)
Adolescentes (12-17 años) n=31	0,98 (0,38)	42,90 (15,83) n=30

\* Dosis de rocuronio administrada en 5 segundos.

\*\* Calculado desde el final de la administración de la dosis de intubación de rocuronio.

Poblaciones especiales

La duración de acción de las dosis de mantenimiento de 0,15 mg/kg de bromuro de rocuronio puede ser algo más larga bajo anestesia con enflurano e isoflurano en pacientes geriátricos y en pacientes con insuficiencia hepática y/o renal (aproximadamente 20 minutos), que frente a pacientes sin deterioro de las funciones del órgano excretor bajo anestesia intravenosa (aproximadamente 13 minutos) (ver Posología y forma de administración). No se han observado efectos acumulativos (aumento progresivo de la duración de la acción) con dosis de mantenimiento repetitivas en el nivel recomendado.

Unidad de cuidados intensivos

Tras la infusión continua en la Unidad de Cuidados Intensivos, el tiempo de recuperación de la relación del tren de cuatro a 0,7 depende de la profundidad de bloqueo al final de la infusión. Tras una infusión continua de 20 horas o más, el tiempo medio (intervalo) entre la aparición de la segunda respuesta al tren de cuatro y la recuperación de la relación del tren de cuatro a 0,7 es aproximadamente de 1,5 (1-5) horas en pacientes que no presentan fallo multiorgánico y de 4 (1-25) horas en pacientes que presentan fallo multiorgánica.

Cirugía cardiovascular

En pacientes que deben someterse a cirugía cardiovascular, las alteraciones cardiovasculares más comunes durante el comienzo del bloqueo máximo, tras una dosis de ZEMURON 0,6-0,9 mg/kg, son un aumento ligero y clínicamente insignificante de la frecuencia cardíaca de hasta el 9% y un incremento de la presión arterial media de hasta el 16% respecto a los valores de control.

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico  
MSD Argentina S.R.L.  
IF-2020-15348120-ARN-DGA#ANMAT  
MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TÉCNICO  
APODERADO

Reversión de la relajación muscular

La acción del rocuronio puede ser antagonizada con sugammadex o con inhibidores de la acetilcolinesterasa, tales como neostigmina, piridostigmina o edrofonio. El sugammadex puede administrarse para la reversión de rutina o para la reversión inmediata. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa se administran en la reaparición de la segunda respuesta (T<sub>2</sub>) o a los primeros signos de recuperación clínica.

**Propiedades farmacocinéticas**

Tras la administración intravenosa de una dosis en bolo de bromuro de rocuronio, la concentración plasmática sigue tres fases exponenciales. En adultos normales, el promedio (intervalo de confianza del 95%) de la vida media de eliminación es de 73 (66-80) minutos, el volumen aparente de distribución en el equilibrio es 203 (193-214) ml/kg y el clearance plasmático es 3,7 (3,5-3,9) ml/kg/min.

El rocuronio se excreta en orina y bilis. La excreción urinaria se aproxima al 40% a las 12-24 horas. Tras la inyección de una dosis de bromuro de rocuronio marcado con radioisótopo, la excreción media es del 47% en orina y del 43% en heces después de 9 días. Aproximadamente el 50% se recupera en su forma inalterada.

Población pediátrica

La farmacocinética del bromuro de rocuronio en pacientes pediátricos (n=146) con edades comprendidas entre los 0 y los 17 años fue evaluada mediante un análisis poblacional de los datos farmacocinéticos combinados procedentes de dos ensayos clínicos en los que la anestesia era inducida por sevoflurano y mantenida con isoflurano/óxido nítrico. Todos los parámetros farmacocinéticos demostraron ser linealmente proporcionales al peso de los niños, ilustrado por un similar aclaramiento (l.h<sup>-1</sup>.kg<sup>-1</sup>). El volumen de distribución (l.kg<sup>-1</sup>) y la semivida de eliminación (h) disminuyen con la edad (años). Los parámetros farmacocinéticos según los grupos de edad se resumen a continuación:

Parámetros farmacocinéticos estimados (promedio [DS]) de bromuro de rocuronio en pacientes pediátricos durante la inducción de la anestesia con óxido nítrico y sevoflurano y mantenimiento de la anestesia con isoflurano/óxido nítrico.

Parámetros farmacocinéticos	Rango de edad de los pacientes				
	Recién nacidos a término (0-27 días)	Lactantes de entre 28 días y 2 meses, ambos inclusive	Lactantes de entre 3 y 23 meses, ambos inclusive	Niños (2-11 años)	Adolescentes (12-17 años)
CL (l.hr <sup>-1</sup> .kg <sup>-1</sup> )	0,31 (0,07)	0,30 (0,08)	0,33 (0,10)	0,35 (0,09)	0,29 (0,14)
Volumen de Distribución(l/kg)	0,42 (0,06)	0,31 (0,03)	0,23 (0,03)	0,18 (0,02)	0,18 (0,01)
t <sub>1/2</sub> β (hr)	1,1 (0,2)	0,9 (0,3)	0,8 (0,2)	0,7 (0,2)	0,8 (0,3)

Poblaciones especiales

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico

IF-2020-15348120-ARN-DGA#ANMAT

MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TÉCNICO  
APODERADO

En estudios controlados, el clearance plasmático en pacientes geriátricos y en pacientes con insuficiencia renal se redujo, sin que alcanzase no obstante en la mayoría de los estudios, niveles estadísticos significativos. En pacientes con insuficiencia hepática, la semivida de eliminación media se prolonga 30 minutos y el clearance plasmático medio se reduce 1 ml/kg/min (ver Posología y forma de administración).

#### Unidad de cuidados intensivos

Cuando se administra en infusión continua para facilitar la ventilación mecánica durante 20 horas o más, el promedio de la vida media de eliminación y el volumen aparente de distribución en estado de equilibrio (promedio) aumenta. En los estudios clínicos controlados, se observa una gran variabilidad entre pacientes, según la naturaleza e importancia del fallo multiorgánico y las características de los pacientes. En pacientes con fallo multiorgánico se observó una vida media de eliminación promedio ( $\pm$ SD) de 21,5 ( $\pm$ 3,3) horas, un volumen aparente de distribución en estado de equilibrio de 1,5 ( $\pm$ 0,8) l/kg y un clearance plasmático de 2,1 ( $\pm$ 0,8) ml/kg/min.

#### **Datos de seguridad preclínica**

Solamente se observaron efectos en estudios no clínicos bajo exposiciones que superan suficientemente la exposición máxima en humanos, lo que indica que la relevancia en la práctica clínica es limitada.

No existe un modelo animal adecuado que mimetice la situación clínica de un paciente en UCI, que normalmente suele ser extremadamente compleja. Por lo tanto, la seguridad de ZEMURON utilizado para facilitar la ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos se basa principalmente en los resultados obtenidos en estudios clínicos.

#### **POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN**

##### Posología

Al igual que otros agentes bloqueantes neuromusculares, ZEMURON sólo debe ser administrado por o bajo la supervisión de médicos expertos, familiarizados con la acción y el uso de estos medicamentos.

Al igual que con los demás agentes bloqueantes neuromusculares, las dosis de ZEMURON deben individualizarse para cada paciente. Para definir la dosificación deben tenerse en cuenta: método de anestésico a utilizar, duración prevista de la intervención quirúrgica, método de sedación a utilizar y duración prevista de la ventilación mecánica, la posible interacción con otros medicamentos administrados concomitantemente, así como el estado del paciente. Se recomienda el empleo de una técnica de monitorización neuromuscular adecuada para evaluar el bloqueo neuromuscular y su recuperación.

Los anestésicos de inhalación potencian los efectos de bloqueo neuromuscular de ZEMURON. Sin embargo, esta potenciación resulta clínicamente relevante en el transcurso de la anestesia, cuando los fármacos volátiles alcanzan las concentraciones tisulares requeridas para dicha interacción. En consecuencia deben realizarse los ajustes con ZEMURON, administrando dosis de mantenimiento inferiores en intervalos menos frecuentes o utilizando índices de infusión inferiores de ZEMURON durante las intervenciones de larga duración (superiores a 1 hora) bajo anestesia por inhalación (ver Interacción con otros productos medicinales y otras formas de interacción).

En pacientes adultos las siguientes recomendaciones de dosificación pueden servir como pauta general para la intubación traqueal y la relajación muscular en procedimientos quirúrgicos de corta a larga duración, así como para su uso en la unidad de cuidados intensivos.

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.

 **Confidencial**

Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico

IF-2020-15348129-ARN-DGA#ANMAT

MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TÉCNICO  
APODERADO



**Intervenciones quirúrgicas***Intubación traqueal*

La dosis de intubación estándar en anestesia es de 0,6 mg/kg de bromuro de rocuronio, la cual proporciona condiciones de intubación adecuadas en casi todos los pacientes en 60 segundos. Se recomienda una dosis de 1,0 mg/kg de bromuro de rocuronio para facilitar las condiciones de intubación traqueal en inducción de secuencia rápida, la cual proporciona condiciones de intubación adecuadas en casi todos los pacientes en 60 segundos. Si se administra una dosis de 0,6 mg/kg de bromuro de rocuronio en inducción de secuencia rápida se recomienda intubar al paciente 90 segundos después de la administración de bromuro de rocuronio.

Para el uso del bromuro de rocuronio en inducción de secuencia rápida en pacientes sometidas a cesárea, ver Embarazo y Lactancia.

*Dosis altas*

En caso de haber alguna razón para elegir dosis altas en determinados pacientes, se indica que se han utilizado dosis iniciales de hasta 2 mg/kg de bromuro de rocuronio en intervenciones quirúrgicas, sin que se hayan observado efectos cardiovasculares adversos.

El uso de estas dosis altas de bromuro de rocuronio disminuye el tiempo de inicio de acción y aumenta la duración de acción (ver Propiedades Farmacodinámicas).

*Dosis de mantenimiento*

La dosis de mantenimiento recomendada de ZEMURON es de 0,15 mg/kg de bromuro de rocuronio; en el caso de utilización prolongada de anestésicos volátiles la dosis debe reducirse a 0,075-0,1 mg/kg de bromuro de rocuronio. Las dosis de mantenimiento deben administrarse preferentemente cuando la transmisión neuromuscular alcance el 25% de recuperación, o cuando aparezcan 2 a 3 respuestas a la estimulación en tren de cuatro.

*Infusión continua*

Si se administra ZEMURON por infusión continua, se recomienda administrar una dosis de carga de 0,6 mg/kg de bromuro de rocuronio y cuando el bloqueo neuromuscular comience a recuperarse, iniciar la administración por infusión. La velocidad de infusión deberá ajustarse para mantener la respuesta de la transmisión neuromuscular al 10% de la altura de la respuesta control o para mantener 1 a 2 respuestas a la estimulación en tren de cuatro. En adultos, el índice de infusión requerido para mantener el bloqueo neuromuscular a este nivel se sitúa entre 0,3-0,6 mg/kg/h bajo anestesia intravenosa y entre 0,3-0,4 mg/kg/h bajo anestesia inhalatoria. Se recomienda la monitorización continua del bloqueo neuromuscular, dado que las velocidades de perfusión requeridas varían de un paciente a otro y con el método anestésico utilizado.

*Población pediátrica*

La dosis recomendada para intubación en la anestesia de rutina y la dosis de mantenimiento en recién nacidos a término (0-27 días), lactantes (28 días-23 meses, ambos inclusive), niños (2-11 años, ambos inclusive) y adolescentes (12-17 años, ambos inclusive) es similar a la de los adultos.

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.

**C** Confidencial

Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico

IF-2020-15348129-APN-DGA#ANMAT

MSD ARGENTINA SRL  
Firm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TECNICO  
APODERADO



Sin embargo, la duración de la acción de la dosis única de intubación será más larga en recién nacidos y lactantes que en niños (ver Propiedades farmacodinámicas).

En infusión continua en pediatría, las velocidades de infusión son similares a las de los adultos, excepto en los niños (2-11 años). En niños de entre 2 y 11 años, ambos inclusive, podrían ser necesarias velocidades de infusión más altas.

De este modo, en niños (2-11 años), se recomiendan las mismas velocidades iniciales de infusión i que para los adultos, y luego deben ajustarse para mantener la respuesta de la transmisión neuromuscular al 10% de la altura de la respuesta control o para mantener 1 ó 2 respuestas a la estimulación en tren de cuatro durante la intervención.

La experiencia con bromuro de rocuronio en la inducción de secuencia rápida en pacientes pediátricos es limitada. Por ello, no se recomienda el uso de bromuro de rocuronio para facilitar las condiciones de intubación durante la inducción de secuencia rápida en pacientes pediátricos.

#### *Dosificación en geriatría y en pacientes con enfermedades hepáticas y/o del tracto biliar y/o insuficiencia renal*

La dosis de intubación estándar en pacientes geriátricos y en pacientes con enfermedades hepáticas y/o del tracto biliar y/o insuficiencia renal durante la anestesia de rutina es de 0,6 mg/kg de bromuro de rocuronio. Debe considerarse la utilización de una dosis de 0,6 mg/kg en la técnica de inducción de secuencia rápida de la anestesia en pacientes en los cuales se prevea una prolongación de la duración de acción.

Independiente de la técnica anestésica utilizada, la dosis de mantenimiento recomendada para estos pacientes es de 0,075-0,1 mg/kg de bromuro de rocuronio, y la velocidad de infusión recomendada es de 0,3-0,4 mg/kg/h (ver Infusión continua; Advertencias y precauciones especiales de uso).

#### *Dosificación en pacientes obesos y con sobrepeso*

Al utilizar ZEMURON en pacientes con sobrepeso u obesos (definidos como pacientes cuyo peso corporal excede un 30% o más en relación a su peso corporal ideal), las dosis deben calcularse en función del peso corporal ideal.

### **Utilización en cuidados intensivos**

#### *Intubación traqueal*

Para la intubación traqueal, deben utilizarse las mismas dosis que las descritas para las intervenciones quirúrgicas.

#### *Dosis de mantenimiento*

Se recomienda la administración de una dosis de carga inicial de 0,6 mg/kg de bromuro de rocuronio, seguido de una infusión continua en el momento en el que el nivel de respuesta de la transmisión neuromuscular alcance el 10% de la altura de la respuesta de control o hasta que aparezcan 1 a 2 respuestas a la estimulación en tren de cuatro. Las dosis siempre deberán ajustarse en función del efecto observado en cada paciente. La velocidad de infusión inicial recomendada para el mantenimiento de un bloqueo neuromuscular del 80-90% (1 a 2 respuestas a la estimulación en tren de cuatro) en pacientes adultos es de 0,3-0,6 mg/kg/h durante la primera hora de administración.

Según la respuesta del paciente, la dosis se reducirá en las 6-12 horas siguientes. Después, la dosis requerida se mantiene relativamente constante.

Se ha observado una gran variabilidad entre pacientes en cuanto a la velocidad de infusión por hora en los estudios clínicos controlados, con un resultado medio que oscila entre 0,2–0,5 mg/kg/h dependiendo de la naturaleza y el grado de insuficiencia orgánica, medicación concomitante y características individuales de los pacientes. Para conseguir el control óptimo en cada paciente se recomienda la monitorización de la transmisión neuromuscular. Se ha estudiado su administración hasta un total de 7 días.

#### *Poblaciones especiales*

No disponemos de datos sobre la seguridad y eficacia del uso de ZEMURON para facilitar las condiciones de ventilación mecánica en cuidados intensivos en pacientes pediátricos ni geriátricos. Por ello, no se recomienda su uso en estos pacientes.

#### Forma de administración

ZEMURON se administra por vía intravenosa, tanto mediante inyección en bolo como mediante infusión continua (ver Instrucciones de Uso/Manipulación).

#### **CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad al principio activo (rocuronio o al ión bromuro), o a algunos de los excipientes.

#### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO**

No se recomienda mezclar ZEMURON con fármacos cuya compatibilidad no esté demostrada. Sin embargo, si se comparte la misma vía de administración, deberá tenerse precaución y deberán seguirse algunas recomendaciones (es importante consultar la sección Incompatibilidades).

Debido a que ZEMURON provoca la parálisis de la musculatura respiratoria, la ventilación mecánica es necesaria en pacientes tratados con este fármaco hasta que se restaure la respiración espontánea adecuada. Al igual que ocurre con los demás agentes bloqueantes neuromusculares, es importante prever las dificultades de la intubación, en particular cuando se utiliza en la inducción de secuencia rápida. En caso de que las dificultades de la intubación requieran la reversión inmediata del bloqueo neuromuscular inducido por rocuronio, debe considerarse la administración de sugammadex.

Al igual que con otros agentes bloqueantes neuromusculares, se ha observado curarización residual con ZEMURON. Para evitar complicaciones debidas a la curarización residual, se recomienda extubar sólo después de que el paciente se haya recuperado suficientemente del bloqueo neuromuscular. Los pacientes geriátricos (65 años o mayores) pueden tener un riesgo mayor de bloqueo neuromuscular residual. Deben considerarse también otros factores que podrían causar curarización residual tras la extubación en la fase postoperatoria (como por ejemplo interacciones farmacológicas o el estado del paciente). Si no se incluye en el protocolo clínico estándar, debe considerarse el uso de un agente reversor, tal como sugammadex o inhibidores de la acetilcolinesterasa, especialmente en aquellos casos en los que es más probable que ocurra la curarización residual.

Pueden aparecer reacciones anafilácticas tras la administración de agentes bloqueantes neuromusculares. Deben tomarse siempre las precauciones apropiadas para tratar dichas reacciones. Particularmente en el caso de anteriores reacciones anafilácticas a agentes bloqueantes musculares, deben tomarse precauciones especiales ya que se ha informado de reacciones alérgicas cruzadas a bloqueantes musculares.

En general se ha observado bloqueo muscular prolongado y/o debilidad muscular tras el uso prolongado de bloqueantes neuromusculares en la Unidad de Cuidados Intensivos. Para prevenir una posible prolongación del bloqueo neuromuscular y/o una sobredosificación es esencial que se monitorice la transmisión neuromuscular. Además, los pacientes deberán recibir analgesia y sedación adecuadas. Asimismo los bloqueantes neuromusculares deben administrarse en dosis cuidadosamente ajustadas a cada paciente por o bajo la supervisión de médicos experimentados familiarizados con sus acciones y con técnicas de monitoreo neuromuscular apropiadas.

Se ha observado frecuentemente miopatía tras la administración prolongada de agentes bloqueantes neuromusculares no despolarizantes en la Unidad de Cuidados Intensivos, en combinación con la terapia con corticoesteroides. Por lo tanto, en el caso de pacientes que estén recibiendo agentes bloqueantes neuromusculares y corticoesteroides, debe limitarse el tiempo de uso del agente bloqueante neuromuscular tanto como sea posible.

Si se utiliza suxametonio (succinilcolina) para la intubación, debe retrasarse la administración de ZEMURON hasta que el paciente se haya recuperado clínicamente del bloqueo neuromuscular inducido por el suxametonio.

#### Hipertermia maligna

Dado que bromuro de rocuronio siempre se utiliza con otros medicamentos y debido al riesgo de hipertermia maligna durante la anestesia, incluso en ausencia de factores desencadenantes conocidos, los médicos deben ser conscientes de los primeros síntomas, del diagnóstico de confirmación y del tratamiento de la hipertermia maligna antes del inicio de la anestesia. Los estudios en animales manifiestan que el bromuro de rocuronio no es un factor desencadenante de la hipertermia maligna. Se han observado casos raros de hipertermia maligna con ZEMURON durante la farmacovigilancia; sin embargo, la asociación causal no ha sido probada.

#### **Los siguientes estados pueden influir en la farmacocinética y/o la farmacodinamia de ZEMURON:**

##### Enfermedades hepáticas y/o del tracto biliar e insuficiencia renal:

Dado que el rocuronio se excreta en la orina y la bilis, ZEMURON debe administrarse con precaución en pacientes con enfermedades hepáticas y/o del tracto biliar y/o con insuficiencia renal clínicamente significativa. En estos grupos de pacientes se ha observado una acción prolongada con dosis de 0,6 mg/kg de bromuro de rocuronio.

##### Tiempo de circulación prolongado:

Los estados asociados a un tiempo de circulación prolongado, tales como enfermedad cardiovascular, edad avanzada y estado edematoso que producen un aumento del volumen de distribución, pueden contribuir a retrasar el comienzo de acción del fármaco. La duración de acción puede también prolongarse debido a una reducción del clearance plasmático.

##### Enfermedad neuromuscular:

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico  
IF-2020-15348129-ARN-DGA#ANMAT

MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TÉCNICO  
APODERADO

Al igual que otros agentes bloqueantes neuromusculares, ZEMURON debe ser utilizado con extrema precaución en pacientes con una enfermedad neuromuscular o después de poliomielitis, ya que la respuesta a los agentes bloqueantes neuromusculares puede estar considerablemente alterada en estos casos. La magnitud y dirección de esta alteración pueden variar ampliamente. En pacientes con miastenia gravis o síndrome miasténico (Eaton-Lambert), pequeñas dosis de ZEMURON pueden tener efectos intensos, por lo cual ZEMURON debe ser dosificado de acuerdo a la respuesta.

Hipotermia:

En operaciones bajo condiciones hipotérmicas, el efecto bloqueante neuromuscular de ZEMURON aumenta y la duración se prolonga.

Obesidad:

Como ocurre con otros agentes bloqueantes neuromusculares, ZEMURON puede presentar una duración prolongada y una recuperación espontánea prolongada en pacientes obesos, si las dosis administradas se calculan en función del peso corporal real.

Quemados:

Los pacientes quemados desarrollan por lo general una resistencia a los agentes bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Por tanto se recomienda ajustar la dosis en función de la respuesta.

Estados que pueden aumentar los efectos de ZEMURON:

Hipotasemia (por ej., después de vómitos intensos, diarrea y tratamiento con diuréticos), hipermagnesemia, hipocalcemia (después de transfusiones masivas), hipoproteïnemia, deshidratación, acidosis, hipercapnia, caquexia.

Los trastornos electrolíticos graves, las alteraciones del pH sanguíneo o la deshidratación deberán ser corregidos cuando sea posible.

Información importante sobre algunos de los componentes de ZEMURON:

Este medicamento contiene menos de 1 mmol (23 mg) de sodio por vial, por lo que se considera esencialmente "exento de sodio".

**INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN**

Se ha demostrado que los siguientes fármacos influyen en la magnitud y/o la duración de acción de los agentes bloqueantes neuromusculares no despolarizantes:

Efecto de otros fármacos sobre ZEMURON:

**Efecto aumentado:**

- Los anestésicos volátiles halogenados potencian el bloqueo neuromuscular de ZEMURON. El efecto sólo es aparente con las dosis de mantenimiento (ver Posología y forma de administración). La reversión del bloqueo con inhibidores acetilcolinesterasa también puede ser inhibida.
- Tras intubación con suxametonio (succinilcolina, ver Advertencias y precauciones especiales de uso).
- El uso concomitante prolongado de corticoesteroides y ZEMURON en la Unidad de Cuidados Intensivos puede dar lugar a la duración prolongada del bloqueo neuromuscular o miopatía (ver Advertencias y precauciones especiales de uso; Reacciones adversas).

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico  
MSD Argentina S.R.L.  
IF-2020-15348129-APN-DGA#ANMAT

MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TÉCNICO  
APODERADO

**Otros fármacos:**

- Antibióticos: aminoglucósidos, lincosamidas y antibióticos polipéptidos, antibióticos acilaminopenicilinas.
- Diuréticos, quinidina, y su isómero quinina, sales de magnesio, bloqueadores de los canales de calcio, sales de litio, anestésicos locales (lidocaína intravenosa., bupivacaína epidural) y administración aguda de fenitoína o fármacos  $\beta$ -bloqueantes.

Se ha observado recurarización tras la administración postoperatoria de antibióticos aminoglucósidos, lincosamida, polipéptidos y acilaminopenicilinas, quinidina, quinina y sales de magnesio (ver Advertencias y precauciones especiales de uso).

**Efecto disminuido:**

- Administración crónica previa de fenitoína o carbamazepina.
- Inhibidores de la proteasa (gabexato, ulinastatina).

**Efecto variable:**

- La administración de otros agentes bloqueantes neuromusculares no despolarizantes en combinación con ZEMURON puede atenuar o potenciar el bloqueo neuromuscular, dependiendo del orden de administración y del bloqueante neuromuscular utilizado.
- El suxametonio (succinilcolina) administrado después de ZEMURON puede potenciar o atenuar el efecto bloqueante neuromuscular de ZEMURON.

Efecto de ZEMURON sobre otros fármacos

La combinación de ZEMURON con lidocaína puede inducir un inicio más rápido de la acción de la lidocaína.

Población pediátrica

No se han realizado estudios de interacciones. Las interacciones anteriormente mencionadas para adultos y las advertencias y precauciones especiales de empleo (ver Advertencias y precauciones especiales de uso) también deben tenerse en cuenta en los pacientes pediátricos.

**FERTILIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA**Embarazo

No se dispone de datos clínicos sobre embarazos de riesgo para bromuro de rocuronio. Los estudios con animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de embarazo, desarrollo embrio/fetal, parto o desarrollo posnatal. Debería prestarse atención en la prescripción a mujeres embarazadas.

Cesárea

ZEMURON puede utilizarse en la técnica de inducción de secuencia rápida en pacientes intervenidas por cesárea siempre y cuando no se prevean dificultades en la intubación y se haya administrado una dosis suficiente de anestésico o tras la intubación con suxametonio (succinilcolina). ZEMURON ha demostrado ser un fármaco en mujeres embarazadas intervenidas por cesárea a la dosis de 0,6 mg/kg. ZEMURON no modifica la valoración de índice de Apgar, ni el tono muscular fetal o la adaptación cardiorrespiratoria. Las muestras de sangre

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico  
IF-2020-15648129-APN-DGA#ANMAT  
MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TÉCNICO  
APODERADO





umbilical han puesto de manifiesto una transferencia placentaria limitada de bromuro de rocuronio, con ausencia de efectos adversos sobre el recién nacido.

Nota 1: Se han estudiado dosis de 1,0 mg/kg en la inducción de secuencia rápida de la anestesia, pero no en pacientes de cesárea. Por ello, sólo se recomienda una dosis de 0,6 mg/kg en este grupo de pacientes.

Nota 2: La recuperación del bloqueo neuromuscular inducido tras la administración de agentes bloqueantes neuromusculares puede estar inhibida o ser incompleta en pacientes tratadas con sulfato de magnesio por toxemia del embarazo, debido a que las sales de magnesio intensifican el bloqueo neuromuscular. Por ello, en estos pacientes, la dosis de ZEMURON debe reducirse y ajustarse cuidadosamente a la respuesta neuromuscular.

Lactancia

Se desconoce si ZEMURON se excreta en la leche materna humana. Los estudios en animales manifiestan niveles insignificantes de ZEMURON en la leche de animales. ZEMURON sólo debe administrarse a mujeres en lactancia, cuando su médico decida que los beneficios superan los riesgos. Después de la administración de una dosis única, se recomienda abstenerse de la siguiente lactancia durante cinco semividas de eliminación de rocuronio; es decir, durante aproximadamente 6 horas.

**EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR Y UTILIZAR MAQUINARIAS**

Dado que ZEMURON se utiliza como coadyuvante de la anestesia general, deben tomarse las medidas de precaución usuales tras la anestesia general en pacientes ambulatorios.

**REACCIONES ADVERSAS**

Las reacciones adversas más frecuentes son dolor/reacción en el sitio de inyección, cambios en los signos vitales y bloqueo neuromuscular prolongado. Las reacciones adversas graves que se comunican más frecuentemente en la farmacovigilancia son "reacciones anafilácticas y anafilactoides" y los síntomas asociados. Ver también las explicaciones a continuación de la tabla.

Clasificación órgano-sistema (MedDRA)	Término preferido <sup>a</sup>	
	Poco frecuente/raro <sup>b</sup> (<1/100, >1/10000)	Muy raro (<1/10000)
Trastornos del sistema inmune		Hipersensibilidad Reacción anafiláctica Reacción anafilactoide Shock anafiláctico Shock anafilactoide
Trastornos del sistema nervioso		Parálisis flácida
Trastornos cardíacos	Taquicardia	

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico  
IF-2020-15648129-ARN-DGA#ANMAT  
MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TÉCNICO  
APODERADO  
Página 80 de 173

**PROYECTO DE PROSPECTO**



Trastornos vasculares	Hipotensión	Colapso circulatorio y shock Enrojecimiento
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos		Broncoespasmo
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo		Edema angioneurótico Urticaria Erupción Erupción eritematosa
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo		Pérdida de fuerza muscular <sup>c</sup> Miopatía esteroide <sup>c</sup>
Trastornos generales y condiciones en el sitio de administración	Fármaco ineficaz Efecto/Respuesta terapéutica del fármaco disminuida Efecto/Respuesta del fármaco aumentada Dolor en el sitio de inyección Reacción en el sitio de inyección	Edema facial
Lesiones traumáticas, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos terapéuticos	Bloqueo neuromuscular prolongado Recuperación retardada de la anestesia	Complicaciones respiratorias por anestesia

MedDRA versión 8.1

<sup>a</sup> Las frecuencias son estimaciones derivadas de los informes de farmacovigilancia y de la literatura general.

<sup>b</sup> Los datos de farmacovigilancia no pueden proporcionar cifras precisas de incidencia. Por esa razón, la frecuencia comunicada se ha dividido en dos categorías en vez de cinco.

<sup>c</sup> Tras el uso prolongado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Reacciones anafilácticas

Aunque muy raramente, se han descrito reacciones anafilácticas graves a agentes bloqueantes neuromusculares, incluyendo ZEMURON. Las reacciones anafilácticas/anafilactoides son: broncoespasmo, trastornos cardiovasculares (por ejemplo hipotensión, taquicardia, colapso circulatorio-shock) y trastornos cutáneos (por ej., angioedema, urticaria). Estas reacciones han sido mortales en algunos casos. Debido a la posible gravedad de estas reacciones, debe asumirse siempre que estas reacciones pueden presentarse y tomar las precauciones necesarias.

Dado que se sabe que los agentes bloqueantes neuromusculares son capaces de inducir liberación de histamina tanto a nivel local como sistémico, siempre deberá tenerse en cuenta la posibilidad de que aparezcan reacciones pruriginosas y eritematosas en el sitio de la inyección y/o reacciones histaminoides (anafilactoides) generalizadas (ver también Reacciones Anafilácticas) cuando se administran estos fármacos.

En los estudios clínicos sólo se han observado ligeros aumentos de los niveles plasmáticos medios de histamina tras la administración rápida en bolo de 0,3-0,9 mg/kg de bromuro de rocuronio.

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico  
IF-2020-15348129-APN-DGA#ANMAT  
MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TÉCNICO  
APODERADO

Bloqueo neuromuscular prolongado

La reacción adversa más frecuente al grupo de agentes bloqueantes no despolarizantes consiste en un aumento de la acción farmacológica del fármaco más allá del tiempo necesario, que puede abarcar desde la pérdida de fuerza del músculo esquelético a parálisis del músculo esquelético profunda y prolongada que provocaría una insuficiencia respiratoria o apnea.

Miopatía

Se han comunicado casos de miopatía tras la utilización de varios agentes bloqueantes neuromusculares en la Unidad de Cuidados Intensivos en combinación con corticoesteroides (ver Advertencias y precauciones especiales de uso).

Reacciones locales en el sitio de inyección

Durante la inducción de secuencia rápida, se ha descrito dolor en el sitio de inyección, especialmente en aquellos pacientes que no han perdido completamente la conciencia y en particular, cuando se utiliza propofol como agente inductor. En los estudios clínicos se ha observado dolor a la inyección en el 16% de los pacientes sometidos a inducción de secuencia rápida de la anestesia con propofol y en menos del 0,5% de los pacientes sometidos a inducción de secuencia rápida de la anestesia con fentanilo y tiopental.

Población pediátrica

En un meta-análisis de 11 estudios clínicos en pacientes pediátricos (n=704) tratados con bromuro de rocuronio (hasta 1 mg/kg) se observó la aparición de taquicardia como evento adverso con una frecuencia del 1,4%.

**SOBREDOSIS**

En caso de sobredosis y bloqueo neuromuscular prolongado, el paciente debe permanecer bajo ventilación mecánica y sedación. En esta situación hay dos opciones para revertir el bloqueo neuromuscular: (1) En adultos, puede administrarse sugammadex para la reversión de un bloqueo intenso y profundo. La dosis de sugammadex a administrar dependerá del grado de bloqueo neuromuscular. (2) Puede administrarse un inhibidor de la acetilcolinesterasa (por ej. neostigmina, edrofonio, piridostigmina) o sugammadex, a dosis adecuadas, una vez que se ha iniciado la recuperación espontánea. Cuando la administración de un fármaco inhibidor de la acetilcolinesterasa deja de revertir los efectos neuromusculares de ZEMURON, debe continuarse la ventilación hasta que se restaure la respiración espontánea. La dosificación repetida de un inhibidor de la acetilcolinesterasa puede ser peligrosa.

En estudios con animales, la depresión severa de la función cardiovascular, que finalmente deriva en un colapso cardíaco, no se produjo hasta que la administración de una dosis acumulativa de 750 x ED<sub>90</sub> (135 mg/kg de bromuro de rocuronio).

**Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los siguientes centros de toxicología:**

**Hospital de pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247, 0800-444-8694**

**Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777**

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico

IF-2020-15648120-APN-DGA#ANMAT

MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TECNICO  
APODERADO



**INCOMPATIBILIDADES**

Se ha documentado la incompatibilidad física de ZEMURON cuando se adiciona a soluciones que contienen los siguientes fármacos: anfotericina, amoxicilina, azatioprina, cefazolina, cloxacilina, dexametasona, diazepam, enoximona, eritromicina, famotidina, furosemida, succinato sódico de hidrocortisona, insulina, intralípido, metohexital, metilprednisolona, succinato sódico de prednisolona, tiopental, trimetoprima y vancomicina.

No se recomienda mezclar ZEMURON con otros fármacos exceptuando los mencionados en la sección Instrucciones de uso/manipulación. Si ZEMURON se administra a través de la misma vía de infusión previamente utilizada con otros fármacos, es importante que ésta se lave adecuadamente (por ejemplo con NaCl al 0,9%) entre la administración de ZEMURON y fármacos con incompatibilidad demostrada o no establecida con ZEMURON.

**CONDICIONES ESPECIALES DE ALMACENAMIENTO**

ZEMURON debe conservarse en la heladera entre 2 y 8°C. ZEMURON puede conservarse fuera de la heladera a una temperatura de hasta 30°C durante 12 semanas como máximo. Una vez fuera de la heladera no debe volverse a conservar en frío. El período de conservación no debe exceder la fecha de vencimiento del producto.

**PRECAUCIONES ESPECIALES DE ELIMINACION Y OTRAS MANIPULACIONES**

Dado que ZEMURON no contiene conservantes, se recomienda desechar toda solución no utilizada. Se han realizado estudios de compatibilidad con las siguientes soluciones de infusión. A las concentraciones de 0,5 mg/ml y 2,0 mg/ml, ZEMURON ha demostrado ser compatible con: NaCl al 0,9%, dextrosa al 5%, dextrosa al 5% en solución salina, agua estéril para inyección, solución Ringer lactato y Haemacel 35. Las soluciones deben utilizarse durante las 24 horas siguientes a su mezcla. Las soluciones no utilizadas deberán desecharse. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo con la normativa local.

**PRESENTACIONES**

- ZEMURON 25 mg = 2,5 ml  
Caja con 10 viales, conteniendo 25 mg de bromuro de rocuronio.
  
- ZEMURON 50 mg = 5 ml  
Caja con 10 y 12 viales, conteniendo 50 mg de bromuro de rocuronio.  
Caja con 10 y 12 ampollas, conteniendo 50 mg de bromuro de rocuronio.
  
- ZEMURON 100 mg = 10 ml  
Caja con 10 viales, conteniendo 100 mg de bromuro de rocuronio.  
Caja con 10 ampollas, conteniendo 100 mg de bromuro de rocuronio.

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico  
IF-2020-15348129-APN-DGA#ANMAT  
MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TÉCNICO  
APODERADO

**PROYECTO DE PROSPECTO**



**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ESTE MEDICAMENTO DEBE SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA.**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 45.532

Fabricado por: **Siegfried Hameln GmbH**, Langes Feld 13, 31789, Hameln, Alemania.

INDUSTRIA ALEMANA

Importado y comercializado en Argentina por: **MSD Argentina S.R.L.** Cazadores de Coquimbo 2841/57 piso 4, Munro (B1605AZE), Vicente López, Prov. de Buenos Aires. Tel.: 6090-7200. [www.msd.com.ar](http://www.msd.com.ar)

Directora Técnica: Cristina B. Wiede, Farmacéutica.

Representante en Uruguay: **Cía. Cibeles S.A.** 12 de diciembre 767, Montevideo. D.T.Q.F. Carolina Harley. Reg MSP N° 33.735.

Venta bajo receta profesional.

En caso de sobredosificación consulte a su médico o llame al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), Tel. 1722.

Última revisión ANMAT: .....

MK8085-ARG-2018-018976

MK8085-URY-2018-018982

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico  
IF-2020-15348129-APN-DGA#ANMAT  
MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TÉCNICO  
APODERADO  
Página 84 de 173



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-14839667 PROSP

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.03.30 19:12:38 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.03.30 19:11:56 -03:00



INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

ZEMURON

Bromuro de rocuronio – 10 mg/ml

Solución inyectable para administración intravenosa

VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o anestesista.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o anestesista o, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4. Posibles efectos adversos

Contenido del prospecto

1. Qué es ZEMURON y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar ZEMURON
3. Cómo usar ZEMURON
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de ZEMURON
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es ZEMURON y para qué se utiliza

ZEMURON pertenece al grupo de los relajantes musculares. Los relajantes musculares se utilizan en la anestesia general para operaciones quirúrgicas, para que los músculos se relajen completamente. Esto facilita la operación al cirujano. Normalmente los nervios envían mensajes a los músculos mediante impulsos. ZEMURON actúa bloqueando estos impulsos de forma que los músculos se relajan. Como los músculos necesarios para la respiración también se relajan, necesitará ayuda para respirar (respiración artificial) durante y después de la operación hasta que pueda respirar por sí mismo. El efecto del relajante muscular se controla regularmente durante la operación y si fuera necesario, se administraría más medicamento. Los efectos desaparecen al final de la operación y entonces usted puede empezar a respirar por sí mismo. A veces, se administra otro fármaco para acelerar este proceso. ZEMURON también se puede utilizar en la Unidad de Cuidados Intensivos para mantener los músculos relajados.

*Este medicamento es únicamente para uso hospitalario.*

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar ZEMURON

No use ZEMURON:

- si es alérgico al rocuronio, a los iones del bromuro o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6. Contenido del envase e información adicional).

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico

IF-2020-45348129-APN-DGA#ANMAT

MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TÉCNICO  
APODERADO

### Advertencias y precauciones

Sus antecedentes médicos pueden influir en la forma en que se le administre ZEMURON.

Informe a su anestésista si ha tenido o tiene ahora alguna de las siguientes enfermedades:

- alergia a los relajantes musculares
- enfermedades de los riñones
- enfermedades del corazón
- edema (retención de líquidos por ejemplo en las pantorrillas)
- enfermedad del hígado o de la vesícula biliar, o alteraciones del funcionamiento del hígado
- enfermedades que afecten a los nervios y los músculos.

Informe también a su anestésista si usted ha tenido:

- antecedentes de hipertermia maligna (fiebre repentina con palpitaciones, respiración rápida y rigidez, dolor y/o debilidad muscular).

Algunas situaciones médicas pueden influir en la forma de actuación del ZEMURON. Por ejemplo, si padece alguna de estas situaciones su anestésista lo tendrá en cuenta al decidir la dosis correcta de ZEMURON:

- niveles bajos de potasio en la sangre
- niveles elevados de magnesio en la sangre
- niveles bajos de calcio en la sangre
- niveles bajos de proteínas en la sangre
- deshidratación
- demasiados ácidos en la sangre
- demasiado dióxido de carbono en la sangre
- estado de salud general frágil
- sobrepeso
- quemaduras.

### Niños/pacientes de edad avanzada

ZEMURON puede utilizarse en niños y adolescentes (recién nacidos a término hasta los 17 años) y pacientes de edad avanzada, pero su anestésista evaluará primero su historia clínica.

### Uso de ZEMURON con otros medicamentos

Informe a su médico o anestésista si está utilizando, ha utilizado recientemente o pudiera tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Otros medicamentos pueden influir sobre los efectos de ZEMURON o viceversa. Si toma (o piensa tomar) uno de los siguientes medicamentos, debe comunicárselo a su médico.

Los siguientes medicamentos pueden **aumentar** el efecto de ZEMURON:

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico

IF-2020-15348120-ARN-DGA#ANMAT

MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TÉCNICO  
APODERADO



- algunos anestésicos
- uso conjunto y prolongado de corticosteroides con ZEMURON a largo plazo en la Unidad de Cuidados Intensivos (antiinflamatorios)
- algunos medicamentos para tratar las infecciones bacterianas (antibióticos)
- algunos medicamentos contra el trastorno bipolar (por ejemplo el litio)
- algunos medicamentos para las enfermedades del corazón o para la hipertensión (quinidina, antagonistas del calcio, agentes betabloqueantes)
- algunos medicamentos para tratar la malaria (quinina)
- medicamentos que aumentan el volumen de orina, como los diuréticos
- sales de magnesio
- anestésicos locales (lidocaína, bupivacaína)
- uso de medicamentos para la epilepsia durante una operación (fenitoína).

Los siguientes medicamentos pueden **disminuir** el efecto de ZEMURON:

- uso prolongado de medicamentos para el tratamiento de la epilepsia: fenitoína y carbamazepina
- medicamentos para la inflamación del páncreas, trastorno de la coagulación de la sangre o pérdida aguda de sangre (inhibidores de la proteasa: gabexato, ulinastatina).

Los siguientes medicamentos tienen un **efecto variable** sobre ZEMURON:

- otros relajantes musculares.

ZEMURON puede influir en los efectos de los siguientes medicamentos:

- puede incrementar el efecto de anestésicos locales (como la lidocaína).

### Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de que le administren ZEMURON.

La lactancia debe suspenderse 6 horas después del uso de este medicamento.

### Conducción y uso de máquinas

Su médico le informará sobre cuándo puede conducir y utilizar máquinas potencialmente peligrosas con seguridad después de la administración de ZEMURON.

### ZEMURON contiene sodio

Este medicamento contiene menos de 23 mg (1 mmol) de sodio por vial, por lo que se considera esencialmente "exento de sodio".

### 3. Cómo usar ZEMURON

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico

IF-2020-15348129-ARN-DGA#ANMAT

MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TECNICO  
APODERADO



Su anestesista ajustará la dosis a sus necesidades. Le administrarán ZEMURON antes o durante la operación. La dosis recomendada es de 0,6 mg por kilo de peso corporal y el efecto dura de 30 a 40 minutos. Durante la operación se comprobará la actividad de ZEMURON. Si es necesario, se le administrará más dosis que dependerá de varios factores, por ejemplo las posibles interacciones con otros medicamentos, la duración esperada de la operación, su edad o su estado de salud.

Su anestesista se encargará de administrarle ZEMURON, por vía intravenosa, mediante una simple inyección o por infusión continua.

**Si usa más ZEMURON del que debe**

El personal médico estará controlando la operación y no es probable que le administren un exceso de ZEMURON. Sin embargo, si esto ocurriera, se mantendrá la respiración artificial hasta que sea capaz de respirar por sí mismo.

Su médico puede acelerar la recuperación administrándole un medicamento que contrarreste los efectos del relajante muscular.

**4. Posibles efectos adversos**

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Raros o poco frecuentes (al menos 1 de cada 10.000 pacientes)

- aumento de la velocidad del latido del corazón (taquicardia)
- disminución de la presión arterial (hipotensión)
- aumento o disminución del efecto de ZEMURON
- dolor en el lugar de la inyección
- prolongación del efecto relajante muscular de ZEMURON.

Muy raros (menos de 1 de cada 10.000 pacientes)

- reacciones alérgicas tales como cambios en la presión arterial y en el ritmo cardíaco y shock debido a la baja circulación sanguínea
- presión en el pecho por espasmos musculares de las vías aéreas (broncoespasmo)
- alteraciones en la piel (por ejemplo edema, enrojecimiento, erupción o ronchas)
- debilidad del músculo o parálisis
- alteración crónica de los músculos, observada normalmente tras la administración concomitante de ZEMURON y corticosteroides (medicamentos antiinflamatorios) en pacientes críticos en la Unidad de Cuidados Intensivos (miopatía esteroidea).

**5. Conservación de ZEMURON**

ZEMURON debe conservarse en la heladera entre 2 y 8°C. ZEMURON puede conservarse fuera de la heladera a una temperatura de hasta 30°C durante 12 semanas como máximo. Una vez fuera de la heladera no debe volverse a conservar en frío. El periodo de conservación no debe exceder la fecha de vencimiento del producto.

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico

IF-2020-15348129-ARN-DGA#ANMAT

MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TÉCNICO  
APODERADO





La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local.

**6. Contenido del envase e información adicional**

Composición de ZEMURON

- El principio activo es bromuro de rocuronio. Cada ml de solución contiene 10 mg de bromuro de rocuronio.
- Los demás componentes son: Acetato de sodio; Cloruro de sodio; Ácido acético hasta pH 4; Agua para inyección c.s.

**PRESENTACIONES**

ZEMURON 25 mg = 2,5 ml

Caja con 10 viales, conteniendo 25 mg de bromuro de rocuronio.

ZEMURON 50 mg = 5 ml

Caja con 10 y 12 viales, conteniendo 50 mg de bromuro de rocuronio.

Caja con 10 y 12 ampollas, conteniendo 50 mg de bromuro de rocuronio.

ZEMURON 100 mg = 10 ml

Caja con 10 viales, conteniendo 100 mg de bromuro de rocuronio.

Caja con 10 ampollas, conteniendo 100 mg de bromuro de rocuronio.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ESTE MEDICAMENTO DEBE SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA.**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 45.532

Fabricado por: **Siegfried Hameln GmbH**, Langes Feld 13, 31789, Hameln, Alemania.

INDUSTRIA ALEMANA

Importado y comercializado en Argentina por: **MSD Argentina S.R.L.** Cazadores de Coquimbo 2841/57 piso 4, Munro (B1605AZE), Vicente López, Prov. de Buenos Aires. Tel.: 6090-7200. [www.msd.com.ar](http://www.msd.com.ar)

Directora Técnica: Cristina B. Wiege, Farmacéutica.

Representante en Uruguay: **Cía. Cibeles S.A.** 12 de diciembre 767, Montevideo. D.T.Q.F. Carolina Harley. Reg MSP N° 33.735.

Venta bajo receta profesional.

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico  
IF-2020-15348129-APN-DGA#ANMAT  
MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TÉCNICO  
APODERADO

**PROYECTO DE PROSPECTO**



En caso de sobredosificación consulte a su médico o llame al Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT), Tel. 1722.

**¿Cuándo se revisó este prospecto por última vez?**

Este prospecto se revisó por última vez:.....

MK8085-ARG-2018-018976

MK8085-URY-2018-018982

Jose Nerone  
Apoderado  
MSD Argentina S.R.L.



  
Alejandro Balonas  
Co-Director Técnico  
IF-2020-15648120-ARN-DGA#ANMAT  
MSD ARGENTINA SRL  
Farm. Alejandro H. Balonas  
CO-DIRECTOR TECNICO  
APODERADO



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-14839667 INF PAC

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.03.30 19:12:26 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2020.03.30 19:12:27 -03:00