



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Disposición

Número:

Referencia: EX-2019-69969053-APN-DGA#ANMAT

VISTO el EX-2019-69969053-APN-DGA#ANMAT del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma SANOFI-AVENTIS ARGENTINA S.A. solicita la autorización de nuevos rótulo, prospectos e información para el paciente para la especialidad medicinal denominada PRALUENT / ALIROCUMAB, forma farmacéutica: SOLUCION INYECTABLE, autorizada por el certificado N° 58.400.

Que la documentación presentada se encuadra dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos N° 16.463, Decreto N° 150/92.

Que en IF-2020-18367493-APN-DECBR#ANMAT obra el Informe Técnico de evaluación favorable de la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nro. 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º. - Autorízase a la firma SANOFI-AVENTIS ARGENTINA S.A. los nuevos rótulo, prospectos e información para el paciente presentados para la especialidad medicinal denominada PRALUENT /

ALIROCUMAB, forma farmacéutica: SOLUCION INYECTABLE, autorizada por el certificado N° 58.400.

ARTÍCULO 2°.- Acéptase el texto de rótulo que consta en el Anexo IF-2020-22500188-APN-DECBR#ANMAT.

ARTÍCULO 3°.- Acéptase el texto de prospectos que consta en el Anexo IF-2020-22499872-APN-DECBR#ANMAT.

ARTÍCULO 4°.- Acéptase el texto de información para el paciente que consta en el Anexo IF-2020-22499609-APN-DECBR#ANMAT.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese; por la Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente disposición y Anexos; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2019-69969053-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by GARAY Valeria Teresa
Date: 2020.05.22 18:14:40 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRÓNICA - GDE
Date: 2020.05.22 18:14:43 -03:00



Proyecto de RÓTULO SECUNDARIO PRALUENT® 75 mg – jeringa prellenada

**PRALUENT® 75 mg
ALIROCUMAB 75 mg/1ml
Solución inyectable en jeringa prellenada**

Vía de administración subcutánea
VENTA BAJO RECETA

INDUSTRIA FRANCESA

Contenido: 1 jeringa prellenada con 1 ml (unidosis)

Fórmula:

Cada jeringa prellenada de un solo uso contiene 75 mg de alirocumab en 1 ml de solución.
Excipientes: histidina; sacarosa; polisorbato 20; agua para inyectables

Conservar en heladera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar.

Si fuera necesario, por ejemplo, cuando viaja, la lapicera prellenada se puede mantener a temperatura ambiente hasta 25 ° C durante un máximo de 30 días.

Después de retirarlo de la heladera, PRALUENT debe usarse dentro de los 30 días o desecharse.
Mantener la jeringa dentro del estuche para protegerla de la luz.

Mantener en su envase original, no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Lote:
Vence:

MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Elaborado por: Sanofi Winthrop Industrie, 1051 Boulevard Industriel, 76580 Le Trait, Francia

sanofi-aventis Argentina S.A.

Polonia 50, La Tablada, Provincia de Buenos Aires; Argentina.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 58.400

Dirección Técnica: Javier Cirrincione, Farmacéutico.

Importado por:

sanofi-aventis Chile S.A.

Av. Presidente Riesco 5435, Of. 1802, Las Condes, Santiago – Chile.

Distribuido por Kuehne+Nagel Ltda., Carlos Fernández 290, San Joaquín, Santiago, Reg. I.S.P. N° F-20424

Acondicionado por: Kuehne+Nagel Ltda., Carlos Fernández 260, San Joaquín o Pharmalsa Ltda, Colo Colo N° 261, Quilicura, o Novo Farma Service S.A., Víctor Uribe N° 2300, Quilicura.

Licenciante: REGENERON Pharmaceuticals Inc., 81 Columbia Turnpike Rensselaer, NY 12144, Connecticut, USA.

Venta bajo receta simple. Mayor información en www.ispch.cl

sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Aletia Weiberg
MN 15.552 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada

Representante e Importador en Uruguay



sanofi-aventis Uruguay S.A.

Edificio Corporate El Plata – F. García Cortinas 2357, Piso 7 – 11300 -Montevideo.

Reg. M.S.P. N° _____ - Ley 15.443.

VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL

Dirección Técnica Q.F. M.J. Bocage

Información sobre el producto: ver prospecto.

Representante exclusivo en Paraguay:


sanofi-aventis Paraguay S.A. Av. Costanera y Calle 3 – Parque Industrial Barrail.

Asunción del Paraguay. Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Registro Sanitario M.S.P. y B.S. N° _____.

Director Técnico: QF Jefferson L. Garbin, registro profesional N° 4372

VENTA BAJO RECETA. Importado de sanofi-aventis Argentina S.A.

Distribuido en Paraguay por: Distribuidora la Policlínica S.A.



sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria Wilberger
MN 15.552 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada



Proyecto de RÓTULO SECUNDARIO PRALUENT® 150 mg – jeringa prellenada

**PRALUENT® 150 mg
ALIROCUMAB 150 mg/1 ml
Solución inyectable en jeringa prellenada**

Vía de administración subcutánea

VENTA BAJO RECETA

INDUSTRIA FRANCESA

Contenido: 1 jeringa prellenada con 1 ml (unidosis)

Fórmula:

Cada jeringa prellenada de un solo uso contiene 150 mg de alirocumab en 1 ml de solución.
Excipientes: histidina; sacarosa; polisorbato 20; agua para inyectables

Conservar en heladera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar.
Si fuera necesario, por ejemplo, cuando viaja, la lapicera prellenada se puede mantener a temperatura ambiente hasta 25 ° C durante un máximo de 30 días.
Después de retirarlo de la heladera, PRALUENT debe usarse dentro de los 30 días o desecharse.
Mantener la jeringa dentro del estuche para protegerla de la luz.

Mantener en su envase original, no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase..

Lote:
Vence:

MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Elaborado por: Sanofi Winthrop Industrie, 1051 Boulevard Industriel, 76580 Le Trait, Francia

sanofi-aventis Argentina S.A.

Polonia 50, La Tablada, Provincia de Buenos Aires; Argentina
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado N° 58.400
Dirección Técnica: Javier Cirrincione, Farmacéutico

Importado por:

sanofi-aventis Chile S.A.

Av. Presidente Riesco 5435, Of. 1802, Las Condes, Santiago – Chile.
Distribuido por Kuehne+Nagel Ltda., Carlos Fernández 290, San Joaquín, Santiago, Reg. I.S.P. N° F-20424

Acondicionado por: Kuehne+Nagel Ltda., Carlos Fernández 260, San Joaquín o Pharmalsa Ltda, Colo Colo N° 261, Quilicura, o Novo Farma Service S.A., Victor Uribe N° 2300, Quilicura.
Licenciante: REGENERON Pharmaceuticals Inc., 81 Columbia Turnpike Rensselaer, NY 12144, Connecticut, USA.

Venta bajo receta simple. Mayor información en www.ispch.cl

Representante e Importador en Uruguay

sanofi-aventis Uruguay S.A.


sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria Wilberger
MN 15.552 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada



Edificio Corporate El Plata – F. García Cortinas 2357, Piso 7 – 11300 -Montevideo.
Reg. M.S.P. N° _____ - Ley 15.443.
VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL
Dirección Técnica: Q.F. M.J. Bocage
Información sobre el producto: ver prospecto.

Representante exclusivo en Paraguay:

sanofi-aventis Paraguay S.A. Av. Costanera y Calle 3 – Parque Industrial Barrail.
Asunción del Paraguay. Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del
M.S.P. y B.S. Registro Sanitario M.S.P. y B.S. N° _____.
Director Técnico: QF Jefferson L. Garbin, registro profesional N° 4372
VENTA BAJO RECETA. Importado de sanofi-aventis Argentina S.A.
Distribuido en Paraguay por: Distribuidora la Policlínica S.A.



sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria Wilberger
MIN 15.552 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada



Proyecto de RÓTULO SECUNDARIO PRALUENT® 75 mg – lapicera prellenada

**PRALUENT® 75 mg
ALIROCUMAB 75 mg/1ml
Solución inyectable en lapicera prellenada**

Vía de administración subcutánea
VENTA BAJO RECETA

INDUSTRIA FRANCESA

Contenido: 1 lapicera prellenada con 1 ml (unidadosis)

Fórmula:

Cada lapicera prellenada de un solo uso contiene 75 mg de alirocumab en 1 ml de solución.
Excipientes: histidina; sacarosa; polisorbato 20; agua para inyectables

Conservar en heladera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar.
Si fuera necesario, por ejemplo, cuando viaja, la lapicera prellenada se puede mantener a temperatura ambiente hasta 25 ° C durante un máximo de 30 días.
Después de retirarlo de la heladera, PRALUENT debe usarse dentro de los 30 días o desecharse.
Mantener la lapicera dentro del estuche para protegerla de la luz.

Mantener en su envase original, no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Lote:
Vence:

MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Elaborado por: Sanofi Winthrop Industrie, 1051 Boulevard Industriel, 76580 Le Trait, Francia
Acondicionado en Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, Brüningstraße 50, 65926 Frankfurt am Main, Alemania.

sanofi-aventis Argentina S.A.

Polonia 50, La Tablada, Provincia de Buenos Aires; Argentina.
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° 58.400
Dirección Técnica: Javier Cirrincione, Farmacéutico.

Importado por:

sanofi-aventis Chile S.A.

Av. Presidente Riesco 5435, Of. 1802, Las Condes, Santiago – Chile.
Distribuido por Kuehne+Nagel Ltda., Carlos Fernández 290, San Joaquín, Santiago, Reg. I.S.P. N° F-20424

Acondicionado por: Kuehne+Nagel Ltda., Carlos Fernández 260, San Joaquín o Pharmalsa Ltda, Colo Colo N° 261, Quilicura, o Novo Farma Service S.A., Victor Uribe N° 2300, Quilicura.
Licenciante: REGENERON Pharmaceuticals Inc., 81 Columbia Turnpike Rensselaer, NY 12144, Connecticut, USA.

Venta bajo receta simple. Mayor información en www.ispch.cl

sanofi-aventis Argentina S.A.
Farma. Valeria Wilberger
MN 15.552 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada



Representante e Importador en Uruguay

sanofi-aventis Uruguay S.A.

Edificio Corporate El Plata – F. García Cortinas 2357, Piso 7 – 11300 -Montevideo.

Reg. M.S.P. N° _____ - Ley 15.443.

VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL

Dirección Técnica: Q.F. M.J. Bocage

Información sobre el producto: ver prospecto.

Representante exclusivo en Paraguay:


sanofi-aventis Paraguay S.A. Av. Costanera y Calle 3 – Parque Industrial Barrail.

Asunción del Paraguay. Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Registro Sanitario M.S.P. y B.S. N° _____.

Director Técnico: QF Jefferson L. Garbin, registro profesional N° 4372

VENTA BAJO RECETA. Importado de sanofi-aventis Argentina S.A.

Distribuido en Paraguay por: Distribuidora la Policlínica S.A.


sanofi-aventis Argentina S.A.
Fanni Valenzuela Wilberger
MN 15.552 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada



Proyecto de RÓTULO SECUNDARIO PRALUENT® 150 mg – lapicera prellenada

**PRALUENT® 150 mg
ALIROCUMAB 150 mg/1 ml
Solución inyectable en lapicera prellenada**

Vía de administración subcutánea

VENTA BAJO RECETA

INDUSTRIA FRANCESA

Contenido: 1 lapicera prellenada con 1 ml (unidadosis)

Fórmula:

Cada lapicera prellenada de un solo uso contiene 150 mg de alirocumab en 1 ml de solución.
Excipientes: histidina; sacarosa; polisorbato 20; agua para inyectables

Conservar en heladera (entre 2 °C y 8 °C). No congelar.

Si fuera necesario, por ejemplo, cuando viaja, la lapicera prellenada se puede mantener a temperatura ambiente hasta 25 °C durante un máximo de 30 días.

Después de retirarlo de la heladera, PRALUENT debe usarse dentro de los 30 días o desecharse.
Mantener la lapicera dentro del estuche para protegerla de la luz.

Mantener en su envase original, no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase..

Lote:

Vence:

MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Elaborado por: Sanofi Winthrop Industrie, 1051 Boulevard Industriel, 76580 Le Trait, Francia
Acondicionado en Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, Brüningstraße 50,
65926 Frankfurt am Main, Alemania.

sanofi-aventis Argentina S.A.

Polonia 50, La Tablada, Provincia de Buenos Aires; Argentina
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado N° 58.400
Dirección Técnica: Javier Cirrincione, Farmacéutico

Importado por:

sanofi-aventis Chile S.A.

Av. Presidente Riesco 5435, Of. 1802, Las Condes, Santiago – Chile.

Distribuido por Kuehne+Nagel Ltda., Carlos Fernández 290, San Joaquín, Santiago, Reg. I.S.P. N°
F-20424

Acondicionado por: Kuehne+Nagel Ltda., Carlos Fernández 260, San Joaquín o Pharmsalsa Ltda,
Colo Colo N° 261, Quilicura, o Novo Farma Service S.A., Víctor Uribe N° 2300, Quilicura.

Licenciante: REGENERON Pharmaceuticals Inc., 81 Columbia Turnpike Rensselaer, NY 12144,
Connecticut, USA.

Venta bajo receta simple. Mayor información en www.ispch.cl

sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria Wilberger
MN 15.652 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada



Representante e Importador en Uruguay

sanofi-aventis Uruguay S.A.

Edificio Corporate El Plata – F. García Cortinas 2357, Piso 7 – 11300 -Montevideo.

Reg. M.S.P. N° _____ - Ley 15.443.

VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL

Dirección Técnica: Q.F. M.J. Bocage

Información sobre el producto: ver prospecto.

Representante exclusivo en Paraguay:


sanofi-aventis Paraguay S.A. Av. Costanera y Calle 3 – Parque Industrial Barrail.

Asunción del Paraguay. Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Registro Sanitario M.S.P. y B.S. N° _____.

Director Técnico: QF Jefferson L. Garbin, registro profesional N° 4372

VENTA BAJO RECETA. Importado de sanofi-aventis Argentina S.A.

Distribuido en Paraguay por: Distribuidora la Policlínica S.A.



sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria Wilberger
MN 15.552 / MP 20.623
Co-Directora Técnica / Apoderada



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULO PRALUENT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.04.02 14:23:30 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.04.02 14:22:47 -03:00

Proyecto de PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR

**PRALUENT®
ALIROCUMAB 75 mg y 150 mg
Solución inyectable
Vía subcutánea**

**VENTA BAJO RECETA
INDUSTRIA FRANCESA**

**Jeringa prellenada con 75 mg / 1 ml - Industria francesa
Jeringa prellenada con 150 mg / 1 ml - Industria francesa
Lapicera prellenada con 75 mg / 1 ml - Industria francesa
Lapicera prellenada con 150 mg / 1 ml - Industria francesa**

FÓRMULA

Praluent® 75 mg

- Cada jeringa prellenada de un solo uso contiene 75 mg de alirocumab en 1 ml de solución. Excipientes: histidina; sacarosa; polisorbato 20; agua para inyectables
- Cada lapicera prellenada de un solo uso contiene 75 mg de alirocumab en 1 ml de solución. Excipientes: histidina; sacarosa; polisorbato 20; agua para inyectables

Praluent® 150 mg

- Cada jeringa prellenada de un solo uso contiene 150 mg de alirocumab en 1 ml de solución. Excipientes: histidina; sacarosa; polisorbato 20; agua para inyectables
- Cada lapicera prellenada de un solo uso contiene 150 mg de alirocumab en 1 ml de solución. Excipientes: histidina; sacarosa; polisorbato 20; agua para inyectables

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Grupo farmacoterapéutico: Otros agentes modificadores de lípidos.
Código ATC: C10AX14

INDICACIONES

Hiperlipidemia primaria y dislipemia mixta

Praluent® está indicado en adultos con hipercolesterolemia primaria (familiar heterocigota y no familiar) o dislipidemia mixta, como tratamiento complementario a la dieta:

- en combinación con una estatina o una estatina con otros tratamientos hipolipemiantes en pacientes que no consiguen alcanzar sus objetivos de C-LDL con la dosis máxima tolerada de una estatina, o
- en monoterapia o en combinación con otros tratamientos hipolipemiantes en pacientes con intolerancia a las estatinas, o en los que se contraindique el uso de una estatina.

Enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida

Praluent está indicado en adultos con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida para reducir el riesgo cardiovascular, disminuyendo los niveles de C-LDL, como tratamiento adyuvante a la corrección de otros factores de riesgo:

- en combinación con la dosis máxima tolerada de una estatina con o sin otros tratamientos lipolipemiantes o
- solo o en combinación con otros tratamientos lipolipemiantes en pacientes que son intolerantes a estatinas o a los que se les ha contraindicado una estatina.

POSOLOGÍA/DOSIFICACIÓN - MODO DE ADMINISTRACIÓN

Posología

Antes de iniciar el tratamiento con Praluent® se deben excluir otras causas secundarias de hiperlipidemia o de dislipidemia mixta (p. ej., síndrome nefrótico, hipotiroidismo).

La dosis inicial habitual de Praluent® es de 75 mg administrada por vía subcutánea una vez cada 2 semanas. Los pacientes que requieran una mayor reducción del C-LDL (>60 %) pueden empezar con 150 mg administrados por vía subcutánea una vez cada 2 semanas o 300 mg una vez cada 4 semanas (mensualmente).

La dosis de Praluent® se puede individualizar en función de las características del paciente, tales como el nivel basal de C-LDL, el objetivo del tratamiento y la respuesta. Los niveles de lípidos se pueden evaluar 4 a 8 semanas después del inicio del tratamiento o de su ajuste, cuando normalmente se alcanza el estado estacionario del C-LDL, y en consecuencia la dosis se puede ajustar (aumentando o disminuyendo la dosis). Los pacientes se deben tratar con las dosis más bajas necesarias para alcanzar la reducción deseada de C-LDL.

Si se necesita una reducción adicional de LDL-C en pacientes tratados con 75 mg una vez cada 2 semanas o 300 mg una vez cada 4 semanas (mensual), la dosis se puede ajustar a la dosis máxima de 150 mg una vez cada 2 semanas.

Si se omite una dosis, el paciente se debe administrar la inyección lo antes posible, y a continuación, debe reanudar el tratamiento de acuerdo al esquema original.

Poblaciones especiales

Pediatría

No se ha establecido la seguridad y eficacia de Praluent® en niños y adolescentes menores de 18 años. No se dispone de datos.

Personas de edad avanzada

No es necesario ajustar la dosis en personas de edad avanzada.

Insuficiencia hepática

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada. No se dispone de datos en pacientes con insuficiencia hepática grave.

Insuficiencia renal

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. Los datos en pacientes con insuficiencia renal grave son limitados.

Peso corporal

No es necesario ajustar la dosis en pacientes en función del peso.

Modo de administración

Vía subcutánea.

Praluent® se administra como inyección subcutánea en el muslo, el abdomen o en la parte superior del brazo. Para administrar la dosis de 300 mg, administrar dos inyecciones de 150 mg consecutivamente en dos sitios de inyección diferentes.

Se recomienda alternar el lugar de la inyección en cada inyección.

Praluent® no se debe inyectar en zonas que presenten enfermedades cutáneas activas o lesiones tales como eritemas solares, exantemas, inflamación o infecciones cutáneas.

Praluent® no se debe administrar de forma conjunta con otros medicamentos inyectables en el mismo lugar de inyección.

El paciente se puede autoinyectar Praluent® o puede administrarlo otra persona, después de que un profesional sanitario le instruya sobre cómo hacerlo siguiendo la técnica de inyección subcutánea adecuada.

Se debe dejar que Praluent® se atempere a temperatura ambiente antes de su uso. Praluent® se debe utilizar lo antes posible una vez que esté a temperatura ambiente (ver sección Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones).

Cada jeringa o lapicera prellenada es para un solo uso.

CONTRAINDICACIONES

Pacientes con hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera de los excipientes listados bajo el título "Fórmula".

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Advertencias especiales y precauciones de uso

sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria Wilberger
MN 15.552 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada

Reacciones alérgicas

En estudios clínicos se han notificado reacciones alérgicas generales, incluyendo prurito, además de reacciones alérgicas raras, y en ocasiones graves, tales como hipersensibilidad, eccema numular, urticaria y vasculitis por hipersensibilidad. En caso de que aparezcan signos o síntomas de reacciones alérgicas graves se debe interrumpir el tratamiento con Praluent® y se debe iniciar un tratamiento sintomático adecuado (ver sección Contraindicaciones).

Insuficiencia renal

En estudios clínicos, hubo una representación limitada de pacientes con insuficiencia renal grave (definida como IFG <30 ml/min/1,73 m²) (Ver sección Farmacocinética). Praluent® se debe utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia renal grave.

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. Los datos en pacientes con insuficiencia renal grave son limitados.

Insuficiencia hepática

No se han estudiado los pacientes con alteración hepática grave (Child-Pugh C) (ver sección Farmacocinética).

Praluent® se debe utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia hepática grave

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada. No se dispone de datos en pacientes con insuficiencia hepática grave.

Población pediátrica

No se ha establecido la seguridad y eficacia de Praluent® en niños y adolescentes menores de 18 años. No se dispone de datos.

Personas de edad avanzada

No es necesario ajustar la dosis en personas de edad avanzada.

Peso corporal

No es necesario ajustar la dosis en pacientes en función del peso.

Precauciones que se deben tomar antes de manipular el medicamento

Se debe dejar que Praluent® se atempere a temperatura ambiente antes de su uso. Praluent® se debe utilizar lo antes posible una vez que esté a temperatura ambiente.

Cada jeringa o lapicera prellenada es para un solo uso.

La solución debe ser transparente, de incolora a amarillo pálido. No se debe utilizar si la solución presenta cambios de color o contiene partículas visibles.

Después de su uso, deseche la jeringa o lapicera prellenada en un contenedor para objetos punzantes de acuerdo con la normativa local. No reciclar el contenedor.

Mantener siempre el contenedor fuera de la vista y del alcance de los niños. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

Efectos de alirocumab sobre otros medicamentos

Dado que alirocumab es un medicamento biológico, no se prevén efectos farmacocinéticos de alirocumab sobre otros medicamentos ni ningún efecto sobre las enzimas del citocromo P450.

En estudios clínicos, cuando alirocumab fue administrado en combinación con atorvastatina o rosuvastatina, no se observaron cambios relevantes en las concentraciones de estatinas en presencia de la administración repetida de alirocumab, lo que indica que las enzimas del citocromo P450 (principalmente CYP3A4 y CYP2C9) y las proteínas transportadoras como P-gp y OATP no se vieron afectadas por alirocumab.

Efectos de otros medicamentos sobre alirocumab

Se sabe que las estatinas y otros tratamientos hipolipemiantes aumentan la producción de PCSK9, la proteína diana de alirocumab. Esto provoca el aumento del aclaramiento mediado por la proteína diana y una reducción de la exposición sistémica al alirocumab. En comparación con alirocumab en

monoterapia, la exposición a alirocumab es aproximadamente un 40%, 15% y 35% inferior cuando se utiliza de manera concomitante con estatinas, ezetimiba y fenofibrato, respectivamente. Sin embargo, la reducción del C-LDL se mantiene durante el intervalo de administración cuando alirocumab se administra cada dos semanas.

Embarazo

No se recomienda utilizar Praluent® durante el embarazo, a no ser que la situación clínica de la mujer requiera el tratamiento con alirocumab.

No hay datos relativos al uso de Praluent® en mujeres embarazadas. Alirocumab es un anticuerpo IgG1 recombinante, por tanto, se espera que atraviese la barrera placentaria (ver sección Datos preclínicos de seguridad). Los estudios en animales no sugieren efectos perjudiciales directos ni indirectos en términos de mantenimiento del embarazo o desarrollo embrionario; se detectó toxicidad materna en ratas, pero no en monos con dosis superiores a las administradas a humanos, y se observó una menor respuesta inmunitaria secundaria a la exposición al antígeno en crías de monos (ver sección Datos preclínicos de seguridad).

Lactancia

Se desconoce si alirocumab se excreta en la leche materna. La inmunoglobulina G (IgG) humana se excreta en la leche materna, en particular en el calostro. No se recomienda el uso de Praluent® en mujeres lactantes durante este período. Para la duración de la lactancia restante, se espera que la exposición sea baja. Debido a que se desconocen los efectos de alirocumab en el lactante, se debe decidir si es necesario interrumpir la lactancia o interrumpir el tratamiento con Praluent® durante este período.

Fertilidad

No se produjeron reacciones adversas sobre los marcadores indirectos de la fertilidad en estudios en animales (ver sección Datos preclínicos sobre seguridad). No hay datos relativos a reacciones adversas sobre la fertilidad en humanos.

Conducción de vehículos o realización de tareas riesgosas

La influencia de Praluent® sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

REACCIONES ADVERSAS:

Los datos de seguridad descritos a continuación reflejan la exposición a alirocumab en 3340 pacientes (3451 pacientes-año de exposición), la mayoría con riesgo cardiovascular alto o muy alto, tratados con alirocumab en una dosis de 75 y / o 150 mg, administrados por vía subcutánea una vez cada 2 semanas (Q2W), para una duración del tratamiento de hasta 18 meses (incluidos 2408 pacientes expuestos a alirocumab durante al menos 52 semanas, y 639 pacientes expuestos a alirocumab durante al menos 76 semanas). Los datos de seguridad se basan en los resultados combinados de nueve estudios controlados con placebo (cuatro estudios de fase 2 y cinco de fase 3, todos en pacientes con estatina de fondo) y cinco estudios de fase 3 controlados con ezetimiba (con tres estudios en pacientes de estatina de fondo).

Resumen del perfil de seguridad

En diez ensayos controlados de fase 3, con pacientes con hipercolesterolemia primaria y dislipidemia mixta, las reacciones adversas más frecuentes fueron reacciones locales en la zona de inyección, signos y síntomas del tracto respiratorio superior, y prurito. Las reacciones adversas más frecuentes que llevaron a la interrupción del tratamiento en pacientes tratados con Praluent® fueron reacciones en la zona de inyección.

El perfil de seguridad en ODYSSEY OUTCOMES (un ensayo de resultados cardiovasculares a largo plazo) fue consistente con el perfil de seguridad general descrito en los ensayos controlados de fase 3.

No se observaron diferencias en el perfil de seguridad entre las dos dosis (75 mg y 150 mg) utilizadas en el programa de fase III.

En estudios de fase 3 controlados en pacientes con hipercolesterolemia primaria y dislipidemia mixta, 1158 (34.7%) de los tratados con Praluent tenían ≥ 65 años de edad y 241 pacientes (7.2%) tenían ≥ 75 años de edad. En el estudio de resultados cardiovasculares d, 2505 pacientes tratados con PRALUENT eran ≥ 65 años de edad y 493 pacientes tratados con PRALUENT eran ≥ 75 años de edad.

edad. No se observaron diferencias significativas en la seguridad y eficacia con el aumento de la edad.

Las reacciones adversas se presentan de acuerdo con el Sistema de Clasificación de Órganos. Las categorías de frecuencia se definen de acuerdo al siguiente criterio: Muy frecuentes ($\geq 1/10$); frecuentes (de $\geq 1/100$ a $< 1/10$); poco frecuentes (de $\geq 1/1000$ a $< 1/100$); raras (de $\geq 1/10\ 000$ a $< 1/1000$); muy raras ($< 1/10\ 000$) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).

Se notificaron las siguientes reacciones adversas en pacientes tratados con alirocumab en estudios controlados agrupados:

Tabla 1: Reacciones adversas informadas con Praluent en estudios controlados de fase 3 combinados y ODYSSEY OUTCOMES.

Sistemas de clasificación de órganos	Frecuentes	Raras
Desórdenes del sistema inmunológico		Hipersensibilidad, vasculitis por hipersensibilidad
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos	Signos y síntomas del tracto respiratorio superior*	
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	Prurito	Urticaria, eccema numular.
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración	Reacciones en la zona de inyección**	

* incluyendo principalmente dolor orofaríngeo, rinorrea, estornudos

** incluyendo eritema/enrojecimiento, prurito, edema, dolor/sensibilidad

Descripción de reacciones adversas seleccionadas

Reacciones locales en la zona de inyección

Se notificaron reacciones locales en la zona de inyección, incluidos eritema/enrojecimiento, prurito, edema, y dolor/sensibilidad, en el 6,1 % de los pacientes tratados con alirocumab comparado con el 4,1 % de los pacientes del grupo de control (que recibían inyecciones de placebo). La mayoría de éstas fueron transitorias y de intensidad leve. La tasa de interrupción debida a reacciones locales en la zona de inyección fue comparable entre los dos grupos (del 0,2 % en el grupo de alirocumab comparado con el 0,3 % en el grupo de control). En el estudio de resultados cardiovasculares (ODYSSEY OUTCOMES), las reacciones en el lugar de inyección también se produjeron con mayor frecuencia en pacientes tratados con alirocumab que en pacientes tratados con placebo (3,8% alirocumab, 2,1% placebo).

Reacciones alérgicas generales

Se notificaron reacciones alérgicas generales con más frecuencia en el grupo de alirocumab (8,1 % de los pacientes) que en el grupo de control (7,0 % de los pacientes), debido principalmente, a una diferencia en la incidencia del prurito. Los casos de prurito observados fueron, por lo general, leves y transitorios. Además, en estudios clínicos controlados se notificaron reacciones alérgicas raras y que en alguna ocasión fueron graves, como hipersensibilidad, eccema numular, urticaria y vasculitis por hipersensibilidad. (Ver sección Advertencias y Precauciones). En el estudio de resultados cardiovasculares (ODYSSEY OUTCOMES), las reacciones alérgicas generales fueron similares en pacientes tratados con alirocumab y en pacientes tratados con placebo (7,9% alirocumab 7,8% placebo). No se observaron diferencias en la incidencia de prurito.

Estudio de dosificación cada 4 semanas

El perfil de seguridad en pacientes tratados con un esquema de dosificación de 300 mg una vez cada 4 semanas (mensual), fue similar al perfil de seguridad descrito en el programa de estudios clínicos utilizando un régimen de dosificación cada 2 semanas, excepto por una mayor tasa de reacciones en el sitio de inyección. Las reacciones en el lugar de la inyección se notificaron con una frecuencia de 16.6% en el grupo de 300 mg una vez cada 4 semanas de tratamiento y 7.9% en el

grupo de placebo. Los pacientes en el grupo de tratamiento con alirocumab 300 mg cada 4 semanas recibieron inyecciones de placebo alternas para mantener el ciego con respecto a la frecuencia de inyección. Excluyendo las reacciones en el lugar de la inyección que ocurrieron después de estas inyecciones de placebo, la frecuencia de éstas fue 11.8%. La tasa de interrupción debido a las reacciones en el lugar de inyección fue del 0,7% en el tratamiento de 300 mg una vez cada 4 semanas y del 0% en el grupo de placebo.

Poblaciones especiales

Personas de edad avanzada

Aunque no se observaron problemas de seguridad en pacientes de más de 75 años, los datos sobre este grupo de edad son escasos. En estudios controlados, 1.158 pacientes (34,7%) tratados con Praluent® tenían 65 años o más y 241 pacientes (7,2%) tratados con Praluent® tenían 75 años o más. No se observaron diferencias significativas en la seguridad y la eficacia con el aumento de la edad.

Valores bajos de C-LDL

Aunque no se identificaron consecuencias adversas de LDL-C muy bajo en los ensayos de alirocumab, se desconocen los efectos a largo plazo de niveles muy bajos de LDL-C. En estudios genéticos publicados, así como en ensayos clínicos y observacionales con terapias de reducción de lípidos, un mayor riesgo de aparición de diabetes se ha asociado con niveles más bajos de LDL-C.

Eventos cardiovasculares (CV)

Se está realizando un ensayo de resultados cardiovasculares cuyo criterio de valoración principal es la adjudicación de eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE, es decir, muerte por ECC, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular isquémico y angina inestable que requiere hospitalización).

En los análisis preespecíficos de los estudios combinados de fase 3, los eventos CV emergentes del tratamiento se confirmaron mediante adjudicación, que consistió en muerte por cardiopatía coronaria (CHD), infarto de miocardio, ictus isquémico, angina inestable que requiere hospitalización, hospitalización por insuficiencia cardíaca congestiva y revascularización. Fueron informados 110 (3,5%) pacientes en el grupo de alirocumab y 53 (3,0%) pacientes en el grupo control (placebo o control activo) con HR = 1,08 (IC del 95%, 0,78 a 1,50). Se informaron 114 MACE confirmados por adjudicación en 52 de 3182 (1,6%) pacientes en el grupo de alirocumab y 33 de 1792 (1,8%) pacientes en el grupo control (placebo o control activo); HR = 0,81 (IC del 95%, 0,52 a 1,25).

En los análisis finales preespecificados del estudio LONG TERM, los eventos CV emergentes del tratamiento confirmados por la adjudicación se produjeron en 72 de 1550 (4,6%) pacientes en el grupo de alirocumab y en 40 de 788 (5,1%) pacientes en el grupo de placebo; La MACE confirmada por adjudicación se informó en 27 de 1550 (1,7%) pacientes en el grupo de alirocumab y 26 de 788 (3,3%) pacientes en el grupo de placebo. Las razones de riesgo se calcularon post-hoc; para todos los eventos CV, HR = 0,91 (IC 95%, 0,62 a 1,34); para MACE, HR = 0,52 (IC del 95%, 0,31 a 0,90).

Mortalidad por cualquier causa

La mortalidad por todas las causas en los estudios de fase 3 fue del 0,6% (20 de 3182 pacientes) en el grupo alirocumab y del 0,9% (17 de 1792 pacientes) en el grupo control. La causa principal de muerte en la mayoría de estos pacientes fue eventos CV.

Inmunogenicidad/anticuerpos antifármaco (AAF)

Al igual que con todas las proteínas terapéuticas, existe un potencial de inmunogenicidad. En el ensayo ODYSSEY OUTCOMES, el 5.5% de los pacientes tratados con alirocumab 75 mg y / o 150 mg cada 2 semanas (Q2W) tuvieron anticuerpos antidrogas (ADA) detectados después de iniciar el tratamiento en comparación con el 1.6% de los pacientes tratados con placebo, la mayoría de éstas fueron respuestas transitorias. Se observaron respuestas persistentes de ADA en el 0,7% de los pacientes tratados con alirocumab y el 0,4% de los pacientes tratados con placebo.

Se observaron respuestas de anticuerpos neutralizantes (NAb) en el 0,5% de los pacientes tratados con alirocumab y en <0,1% de los pacientes tratados con placebo.

Las respuestas de anticuerpos antidrogas, incluido NAb, fueron de bajo título y no parecieron tener un impacto clínicamente significativo en la eficacia o seguridad de alirocumab, excepto por una mayor tasa de reacciones en el lugar de la inyección en pacientes con ADA emergente del tratamiento en comparación con los pacientes ADA negativo (7.5% vs 3.6%). Se desconocen las consecuencias a largo plazo de continuar el tratamiento con alirocumab en presencia de ADA.

En un grupo de diez ensayos controlados con placebo y con control activo de pacientes tratados con alirocumab 75 mg y / o 150 mg Q2W, así como en un estudio clínico separado de pacientes tratados con alirocumab 75 mg Q2W o 300 mg cada 4 semanas (incluido algunos pacientes con ajuste de dosis a 150 mg Q2W), la incidencia de detección de ADA y NAb fue similar a los resultados del ensayo ODYSSEY OUTCOMES descrito anteriormente.

Los datos de inmunogenicidad dependen en gran medida de la sensibilidad y especificidad del ensayo, así como de otros factores. Además, la incidencia observada de la positividad de anticuerpos en un ensayo puede verse influida por varios factores, entre ellos el manejo de la muestra, el momento de la recolección de la muestra, los medicamentos concomitantes y la enfermedad subyacente. Por estas razones, la comparación de la incidencia de anticuerpos contra alirocumab con la incidencia de anticuerpos contra otros productos puede ser engañosa.

Experiencia Postcomercialización

Se han notificado las siguientes reacciones adversas durante el uso posterior a la aprobación de Praluent. Las reacciones adversas se derivan de informes espontáneos y, por lo tanto, la frecuencia es "desconocida" (no se puede estimar a partir de los datos disponibles).

- Desórdenes generales y condiciones del sitio de administración
 - Enfermedad similar a la gripe.

Notificación de sospecha de reacciones adversas

El reporte de sospecha de reacciones adversas luego de la autorización del medicamento es importante. Permite un continuo monitoreo del balance beneficio/riesgo del producto medicinal. Los profesionales de la salud deben reportar cualquier sospecha de reacciones adversas (Ver datos correspondientes a su país, al final de este prospecto)

SOBREDOSIFICACIÓN

En estudios clínicos controlados, no se identificaron problemas de seguridad con una dosis más frecuente que la pauta posológica recomendada de cada 2 semanas. No existe ningún tratamiento específico para la sobredosis con Praluent®. En caso de sobredosis, el paciente debe recibir tratamiento sintomático y recibir las medidas de apoyo que sean necesarias.

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA (LEASE AL FINAL DEL PROSPECTO).

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS/PROPIEDADES

Alirocumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 humano producido en células de ovario de hámster chino mediante tecnología de ADN recombinante.

Acción Farmacológica

Alirocumab es un anticuerpo monoclonal IgG1 completamente humano que se une con alta afinidad y especificidad a la proproteína convertasa subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9). La PCSK9 se une a los receptores de lipoproteínas de baja densidad (R-LDL) en la superficie de los hepatocitos para estimular la degradación de los R-LDL en el hígado. El R-LDL es el principal receptor que elimina la LDL circulante; por tanto, la disminución en los niveles de R-LDL por medio de la PCSK9 tiene como resultado mayores niveles sanguíneos de C-LDL. Al inhibir la unión de la PCSK9 al R-LDL, alirocumab aumenta el número de receptores LDL disponibles para eliminar la LDL, reduciendo así los niveles de C-LDL.

El R-LDL también se une a las lipoproteínas VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad) residuales ricas en triglicéridos y a la lipoproteína de densidad intermedia (IDL). Por consiguiente, el tratamiento con alirocumab, puede reducir los niveles de estas lipoproteínas residuales, como lo demuestra al reducir los niveles de apolipoproteína B (Apo B), de lipoproteínas de colesterol distintas de las de alta densidad (C-no-HDL) y de triglicéridos (TG). Alirocumab también reduce los

niveles de lipoproteína (a) [Lp(a)], una forma de LDL que está unida a la apolipoproteína (a). No obstante, el R-LDL ha evidenciado tener una baja afinidad por la Lp(a); por ello, el mecanismo exacto de alirocumab para reducir los niveles de Lp(a) no se comprende totalmente.

En estudios genéticos en humanos, se han identificado variantes de la PCSK9 tanto con mutaciones de pérdida de función como con mutaciones de ganancia de función. Las personas con mutación de pérdida de función en un único alelo de la PCSK9 presentan menores niveles de C-LDL, lo cual está relacionado con una incidencia significativamente menor de cardiopatía coronaria. Se ha notificado un número reducido de personas que portan mutaciones de pérdida de función en PCSK9 en dos alelos y niveles notablemente bajos de C-LDL, con niveles de C-HDL y TG en el intervalo normal. En cambio, se han identificado mutaciones de ganancia de función en el gen PCSK9 en pacientes con niveles más altos de C-LDL y un diagnóstico clínico de hipercolesterolemia familiar.

En un estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de 14 semanas de duración, se aleatorizó a 13 pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota (HFhe) causada por mutaciones de ganancia de función en el gen PCSK9 para recibir alirocumab 150 mg cada dos semanas o placebo. Los niveles iniciales medios de C-LDL fueron de 151,5 mg/dl (3,90 mmol/l). En la semana 2, la reducción media de C-LDL con respecto al valor inicial fue del 62,5% en los pacientes tratados con alirocumab comparada con el 8,8% en los pacientes que recibieron placebo. En la semana 8, la reducción media de C-LDL con respecto al valor inicial en todos los pacientes tratados con alirocumab fue del 72,4%.

Farmacodinamia

En ensayos in vitro, alirocumab no provocó actividad de la función efectora mediada por Fc (toxicidad celular dependiente de anticuerpos y citotoxicidad dependiente del complemento) ni en presencia ni en ausencia de la PCSK9, y no se observaron complejos inmunes insolubles capaces de unir proteínas del complemento con alirocumab cuando se unió a la PCSK9.

Eficacia clínica y seguridad

Resumen del programa de ensayos clínicos de fase III – esquema posológico de 75 mg y 150 mg cada 2 semanas

La eficacia de alirocumab se investigó en diez ensayos de fase III (cinco estudios controlados con placebo y cinco controlados con ezetimiba), en los que participaron 5296 pacientes aleatorizados con hipercolesterolemia (familiar heterocigota y no familiar) o dislipidemia mixta, de los cuales 3188 se aleatorizaron para recibir alirocumab. En los estudios de fase III, el 31% de los pacientes padecía diabetes mellitus de tipo 2 y el 64% de los pacientes tenía antecedentes de enfermedad coronaria. Tres de los diez estudios se llevaron a cabo exclusivamente en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigótica (HFhe). La mayoría de los pacientes del programa de fase III estaban recibiendo un tratamiento hipolipemiente de base consistente en la administración de la dosis máxima tolerada de estatina, con o sin otros tratamientos hipolipemiantes, y que tenían un riesgo cardiovascular (CV) alto o muy alto. Se realizaron dos estudios en pacientes no tratados de manera concomitante con una estatina, incluido un estudio en pacientes con intolerancia documentada a las estatinas.

Se realizaron dos estudios (LONG TERM y HIGH FH), en los que participaron un total de 2416 pacientes, con una única dosis de 150 mg cada dos semanas. Se realizaron ocho estudios con una dosis de 75 mg cada dos semanas, y un aumento de dosis, en función de determinados criterios, a 150 mg cada dos semanas en la semana 12 en pacientes que no habían alcanzado el nivel predefinido de C-LDL objetivo, basándose en su nivel de riesgo CV en la semana 8.

El criterio de valoración principal de la eficacia en todos los estudios de fase III fue el porcentaje medio de reducción con respecto al valor inicial en el C-LDL en la semana 24 en comparación con placebo o ezetimiba. Todos los estudios cumplieron su criterio de valoración principal. En general, la administración de alirocumab también produjo un mayor porcentaje de reducción estadísticamente significativo en colesterol total (C-total), colesterol no asociado a lipoproteínas de alta densidad (C-no-HDL), apolipoproteína B (Apo B) y lipoproteína (a) [Lp(a)] en comparación con placebo/ezetimiba, tanto si los pacientes recibían tratamiento concomitante con una estatina, como si no. Alirocumab también redujo el nivel de triglicéridos (TG), y aumentó el de colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad (C-HDL) y apolipoproteína A-1 (Apo A-1) en comparación con placebo. Se observó una reducción de C-LDL en todos los grupos de edad, sexo, índice de masa corporal (IMC), raza, y en todos los niveles iniciales de C-LDL, en los pacientes con HFhe y sin HFhe, en los pacientes con dislipidemia mixta y en los pacientes diabéticos.

Aunque se observó una eficacia similar en pacientes de más de 75 años, los datos sobre este grupo de edad son escasos. La reducción de C-LDL fue uniforme, independientemente del uso concomitante de estatinas y de las dosis. Una proporción significativamente mayor de pacientes logró un C-LDL de <70 mg/dl (<1,81 mmol/l) en el grupo de alirocumab en comparación con el de placebo o ezetimiba en la semana 12 y la semana 24. En estudios que utilizaron la pauta de aumento de dosis en función de determinados criterios, una mayoría de los pacientes alcanzaron el nivel predefinido de C-LDL objetivo (basándose en su nivel de riesgo CV) a la dosis de 75 mg cada dos semanas, y la mayoría de los pacientes mantuvieron el tratamiento a la dosis de 75 mg cada dos semanas. Se observó el efecto hipolipemiente de alirocumab en los 15 días posteriores a la primera dosis y se alcanzó el efecto máximo a las 4 semanas, aproximadamente. Con el tratamiento a largo plazo, se mantuvo la eficacia durante la duración de todos los estudios (2 años). Tras la interrupción del tratamiento con alirocumab, no se observó efecto rebote en el C-LDL y sus niveles recuperaron gradualmente los niveles iniciales.

En análisis predefinidos antes del posible aumento de dosis en la semana 12 en los 8 estudios en los que los pacientes empezaron con la pauta posológica de 75 mg cada 2 semanas, se obtuvo una reducción media de C-LDL que varió del 44,5% al 49,2%. En los dos estudios en los que los pacientes empezaron y se mantuvieron con 150 mg cada 2 semanas, la reducción media alcanzada de C-LDL en la semana 12 fue de 62,6%. En los análisis realizados en los estudios agrupados de fase III cuyo diseño permitía el aumento de dosis, entre el subgrupo de pacientes que aumentaron la dosis, que se aumentase de 75 mg cada dos semanas a 150 mg cada dos semanas de alirocumab en la semana 12 tuvo como resultado una reducción media adicional de los niveles de C-LDL del 14% en pacientes tratados con estatina de base. En pacientes no tratados con estatina de base, el aumento de la dosis de alirocumab tuvo como resultado una reducción media adicional de los niveles de C-LDL del 3%, observándose su efecto con más intensidad en aproximadamente el 25% de los pacientes que obtuvieron al menos una disminución adicional de los niveles de C-LDL del 10% tras el aumento de dosis. Los pacientes que aumentaron la dosis a 150 mg cada dos semanas presentaron niveles iniciales medios de C-LDL más altos.

Evaluación de los acontecimientos cardiovasculares (CV)

Se está llevando a cabo actualmente un ensayo de resultados cardiovasculares cuyo criterio de valoración principal son los acontecimientos adversos cardiovasculares graves adjudicados (AACG, es decir, muerte por cardiopatía isquémica (CI), infarto de miocardio, accidente cerebrovascular isquémico y angina inestable que requiera hospitalización).

En los análisis predefinidos de los estudios agrupados de fase III, los acontecimientos CV aparecidos durante el tratamiento confirmados mediante adjudicación, consistentes en muerte por cardiopatía coronaria, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular isquémico, angina inestable que requiera hospitalización, hospitalización por insuficiencia cardíaca congestiva y revascularización, se notificaron en 110 pacientes (el 3,5%) del grupo de alirocumab y en 53 pacientes (el 3,0%) del grupo de control (placebo o control activo) con un cociente de riesgo (hazard ratio, HR) igual a 1,08 (IC 95%: de 0,78 a 1,50). Los AACG confirmados mediante adjudicación se notificaron en 52 de los 3182 pacientes (el 1,6%) del grupo de alirocumab y en 33 de los 1792 pacientes (el 1,8%) del grupo de control (placebo o control activo); HR=0,81 (IC 95%: de 0,52 a 1,25).

En los análisis finales predefinidos del estudio LONG TERM, los acontecimientos CV aparecidos durante el tratamiento confirmados mediante adjudicación se produjeron en 72 de los 1550 pacientes (el 4,6%) del grupo de alirocumab y en 40 de los 788 pacientes (el 5,1%) del grupo de placebo; Los AACG confirmados por adjudicación se notificaron en 27 de los 1550 pacientes (el 1,7%) del grupo de alirocumab y en 26 de los 788 pacientes (el 3,3%) del grupo de placebo. Los cocientes de riesgo se calcularon a posteriori; para todos los acontecimientos CV, HR=0,91 (IC 95 %: de 0,62 a 1,34); para AACG, HR=0,52 (IC 95%: de 0,31 a 0,90).

Mortalidad por cualquier causa

La mortalidad por cualquier causa en los estudios de fase III fue del 0,6% (20 de 3182 pacientes) en el grupo de alirocumab y del 0,9% (17 de 1792 pacientes) en el grupo de control. La causa principal de muerte en la mayoría de estos pacientes fueron los acontecimientos CV.

Tratamiento combinado con una estatina

Estudios de fase III controlados con placebo (con estatina de base) en pacientes con hipercolesterolemia primaria o dislipidemia mixta

Estudio LONG TERM:

Este estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de 18 meses de duración incluyó a 2310 pacientes con hipercolesterolemia primaria y riesgo CV alto o muy alto que recibían la dosis máxima tolerada de estatina, con o sin otro tratamiento hipolipemiante. Los pacientes recibieron alirocumab a una dosis de 150 mg cada dos semanas o placebo además del tratamiento hipolipemiante que ya estuviesen recibiendo. El 17,7% de los pacientes incluidos en el estudio LONG TERM tenían HFhe, el 34,6 % de ellos con diabetes mellitus de tipo 2 y el 68,6 % con antecedentes de cardiopatía coronaria. En la semana 24, la diferencia media del tratamiento con respecto al placebo en cuanto al cambio porcentual en el nivel de C-LDL con respecto al valor inicial fue de -61,9% (IC 95%: -64,3%, -59,4%; valor p: <0,0001). En la semana 12, el 82,1% de los pacientes en el grupo de alirocumab alcanzó un C-LDL <70 mg/dl (<1,81 mmol/l) frente al 7,2% de los pacientes en el grupo de placebo. La diferencia en comparación con el placebo fue estadísticamente significativa en la semana 24 en todos los lípidos/lipoproteínas.

Estudio COMBO I

Un estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de 52 semanas de duración que incluyó a 311 pacientes clasificados como de muy alto riesgo CV y que no habían alcanzado los niveles predefinidos de C-LDL objetivo con la dosis máxima tolerada de estatina, con o sin otro tratamiento hipolipemiante. Los pacientes recibieron alirocumab a una dosis de 75 mg cada dos semanas o placebo además del tratamiento hipolipemiante que ya estuviesen recibiendo. El aumento de la dosis de alirocumab a 150 mg cada dos semanas se llevó a cabo en la semana 12 en pacientes con niveles de C-LDL ≥ 70 mg/dl ($\geq 1,81$ mmol/l). En la semana 24, la diferencia media del tratamiento con respecto al placebo en cuanto al cambio porcentual en el nivel de C-LDL con respecto al valor inicial fue de -45,9% (IC 95%: -52,5%, -39,3%; valor p: <0,0001). En la semana 12 (antes del aumento de dosis), el 76,0% de los pacientes en el grupo de alirocumab alcanzó un nivel de C-LDL <70 mg/dl (<1,81 mmol/l) frente al 11,3% en el grupo de placebo. Se aumentó la dosis a 150 mg cada dos semanas en 32 pacientes (16,8%) tratados durante más de 12 semanas. Entre el subgrupo de pacientes que aumentaron la dosis en la semana 12, se alcanzó una reducción media adicional del 22,8% en los niveles de C-LDL en la semana 24. La diferencia en comparación con placebo fue estadísticamente significativa en la semana 24 en todos los lípidos/lipoproteínas, excepto en TG y Apo A-1.

Estudios de fase III controlados con placebo (con estatina de base) en pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota (HFhe)

Estudios FH I y FH II

Dos estudios multicéntricos, doble ciego, controlados con placebo, de 18 meses de duración que incluyeron a 732 pacientes con HFhe que recibían la dosis máxima tolerada de estatina, con o sin otro tratamiento hipolipemiante. Los pacientes recibieron alirocumab a una dosis de 75 mg cada dos semanas o placebo además del tratamiento hipolipemiante que ya estuviesen recibiendo. El aumento de la dosis de alirocumab a 150 mg cada dos semanas se llevó a cabo en la semana 12 en pacientes con niveles de C-LDL ≥ 70 mg/dl ($\geq 1,81$ mmol/l). En la semana 24, la diferencia media del tratamiento con respecto al placebo en cuanto al cambio porcentual en el nivel de C-LDL con respecto al valor inicial fue de -55,8% (IC 95%: -60,0%, -51,6%; valor p: <0,0001).

En la semana 12 (antes del aumento de dosis), el 50,2% de los pacientes alcanzó un C-LDL de <70 mg/dl (<1,81 mmol/l) frente al 0,6 % en el grupo de placebo. Entre el subgrupo de pacientes que aumentaron la dosis en la semana 12, se alcanzó una reducción media adicional del 15,7% en los niveles de C-LDL en la semana 24. La diferencia en comparación con el placebo fue estadísticamente significativa en la semana 24 en todos los lípidos/lipoproteínas.

Estudio HIGH FH

Un tercer estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de 18 meses de duración que incluyó a 106 pacientes con HFhe tratados con la dosis máxima tolerada de estatina, con o sin otro tratamiento hipolipemiante y con niveles iniciales de C-LDL ≥ 160 mg/dl ($\geq 4,14$ mmol/l). Los pacientes recibieron alirocumab a una dosis de 150 mg cada dos semanas o placebo además del tratamiento hipolipemiante que ya estuviesen recibiendo. En la semana 24, la diferencia media del tratamiento con respecto al placebo en cuanto al cambio porcentual en el nivel de C-LDL con

respecto al valor inicial fue de -39,1% (IC 95%: -51,1%, -27,1%; valor p: <0,0001). La media del cambio en todos los demás lípidos/lipoproteínas fue similar a la de los estudios FH I y FH II, aunque sin alcanzar significación estadística en TG, C-HDL y Apo A-1.

Estudio de fase III controlado con ezetimiba (con estatina de base) en pacientes con hipercolesterolemia primaria o dislipidemia mixta

Estudio COMBO II

Un estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con ezetimiba, de 2 años de duración que incluyó a 707 pacientes clasificados como de muy alto riesgo CV y que no habían alcanzado los niveles predefinidos de C-LDL objetivo con la dosis máxima tolerada de estatina. Los pacientes recibieron alirocumab 75 mg cada dos semanas o ezetimiba 10 mg una vez al día además del tratamiento de estatinas que ya recibiesen. El aumento de la dosis de alirocumab a 150 mg cada dos semanas se llevó a cabo en la semana 12 en pacientes con niveles de C-LDL ≥ 70 mg/dl ($\geq 1,81$ mmol/l). En la semana 24, la diferencia media del tratamiento con respecto a ezetimiba en cuanto al cambio porcentual en el nivel de C-LDL con respecto al valor inicial fue de -29,8% (IC 95%: -34,4%, -25,3%; valor p: <0,0001). En la semana 12 (antes del aumento de dosis), el 77,2% de los pacientes alcanzó un C-LDL de <70 mg/dl (<1,81 mmol/l) frente al 46,2% en el grupo de ezetimiba. Entre el subgrupo de pacientes que aumentaron la dosis en la semana 12, se alcanzó una reducción media adicional del 10,5% en los niveles de C-LDL en la semana 24. La diferencia en comparación con ezetimiba fue estadísticamente significativa en la semana 24 en todos los lípidos/lipoproteínas, excepto en TG y Apo A-1.

En monoterapia o como complemento al tratamiento hipolipemiante

Ensayos de fase III controlados con ezetimiba en pacientes con hipercolesterolemia primaria (sin una estatina de base)

Estudio ALTERNATIVE

Un estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con ezetimiba, de 24 semanas de duración que incluyó a 248 pacientes con intolerancia documentada a las estatinas debido a síntomas relacionados con el músculo esquelético. Los pacientes recibieron alirocumab 75 mg cada dos semanas, o ezetimiba 10 mg una vez al día, o atorvastatina 20 mg una vez al día (como grupo de reexposición). El aumento de la dosis de alirocumab a 150 mg cada dos semanas se llevó a cabo en la semana 12 en pacientes con niveles de C-LDL ≥ 70 mg/dl ($\geq 1,81$ mmol/l) o ≥ 100 mg/dl ($\geq 2,59$ mmol/l), en función de su nivel de riesgo CV. En la semana 24, la diferencia media del tratamiento con respecto a ezetimiba en cuanto al cambio porcentual en el nivel de C-LDL con respecto al valor inicial fue de -30,4% (IC 95%: -36,6%, -24,2%; valor p: <0,0001). En la semana 12 (antes del aumento de dosis), el 34,9% de los pacientes alcanzó un C-LDL de <70 mg/dl (<1,81 mmol/l) frente al 0% en el grupo de ezetimiba. Entre el subgrupo de pacientes que aumentaron la dosis en la semana 12, se alcanzó una reducción media adicional del 3,6 % en los niveles de C-LDL en la semana 24. La diferencia en comparación con ezetimiba fue estadísticamente significativa en la semana 24 en C-LDL, C-total, C-no-HDL, Apo B y Lp(a).

Este ensayo evaluó a pacientes que no toleraban al menos dos estatinas (una como mínimo a la dosis más baja aprobada). En estos pacientes, se produjeron acontecimientos adversos musculoesqueléticos en una tasa inferior en el grupo de alirocumab (el 32,5%) en comparación con el grupo de atorvastatina (el 46,0%) (HR=0,61 [IC 95%: de 0,38 a 0,99]), y un menor porcentaje de pacientes en el grupo de alirocumab (el 15,9%) interrumpieron el tratamiento del estudio debido a acontecimientos adversos musculoesqueléticos en comparación con el grupo de atorvastatina (22,2%). En los cinco ensayos controlados con placebo en pacientes que recibían la dosis máxima tolerada de estatina (n=3752), la tasa de interrupción debida a acontecimientos adversos musculoesqueléticos fue del 0,4% en el grupo de alirocumab y del 0,5% en el grupo de placebo.

Estudio MONO

Un estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con ezetimiba, de 24 semanas de duración que incluyó a 103 pacientes con un riesgo CV moderado, que no estaban recibiendo estatinas ni otros tratamientos hipolipemiantes y que presentaban unos niveles iniciales de C-LDL de entre 100 mg/dl (2,59 mmol/l) y 190 mg/dl (4,91 mmol/l). Los pacientes recibieron alirocumab 75 mg cada dos

semanas o ezetimiba 10 mg una vez al día. El aumento de la dosis de alirocumab a 150 mg cada dos semanas se llevó a cabo en la semana 12 en pacientes con niveles de C-LDL ≥ 70 mg/dl ($\geq 1,81$ mmol/l). En la semana 24, la diferencia media del tratamiento con respecto a ezetimiba en cuanto al cambio porcentual en el nivel de C-LDL con respecto al valor inicial fue de -31,6% (IC 95%: -40,2%, -23,0%; valor p: $< 0,0001$). En la semana 12 (antes del aumento de dosis), el 57,7% de los pacientes alcanzó un C-LDL de < 70 mg/dl ($< 1,81$ mmol/l) frente al 0 % en el grupo de ezetimiba. Se aumentó la dosis a 150 mg cada dos semanas en 14 pacientes (30,4%) tratados durante más de 12 semanas. Entre el subgrupo de pacientes que aumentaron la dosis en la semana 12, se alcanzó una reducción media adicional del 1,4% en los niveles de C-LDL en la semana 24. La diferencia en comparación con ezetimiba fue estadísticamente significativa en la semana 24 en C-LDL, C-total, C-no-HDL y Apo B.

Régimen de dosificación cada 4 semanas (Q4W)

Estudio CHOICE I

Un estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de 48 semanas incluyó a 540 pacientes con una dosis máxima de estatina, con o sin otra terapia modificadora de lípidos (308 en el grupo de alirocumab 300 mg Q4W, 76 en el alirocumab 75 mg grupo Q2W y 156 en el grupo placebo), y 252 pacientes no tratados con estatina (144 en el grupo alirocumab 300 mg Q4W, 37 en el grupo alirocumab 75 mg Q2W y 71 en el grupo placebo). Los pacientes recibieron alirocumab 300 mg Q4W, alirocumab 75 mg Q2W o placebo además de su terapia de modificación de lípidos existente (estatinas, terapia sin estatinas o dieta sola). En general, el 71,6% de los pacientes se clasificaron con un riesgo CV alto o muy alto y no en su objetivo de LDL-C. El ajuste de la dosis en los brazos de alirocumab a 150 mg Q2W ocurrió en la semana 12 en pacientes con LDL-C ≥ 70 mg / dL o ≥ 100 mg / dL, dependiendo de su nivel de riesgo CV, o en pacientes que no tenían al menos una reducción del 30% de LDL-C desde el inicio. En la cohorte de pacientes con estatinas de base, el LDL-C basal promedio fue de 112,7 mg / dL. En la semana 12, el cambio porcentual medio desde el inicio con 300 mg de alirocumab Q4W en LDL-C (análisis ITT) fue de -55.3% comparado con + 1.1% para el placebo. En la semana 12 (antes del ajuste de la dosis), el 77,3% de los pacientes tratados con alirocumab 300 mg Q4W alcanzaron un LDL-C de < 70 mg / dL en comparación con el 9,3% en el grupo de placebo. En la semana 24, el cambio porcentual medio desde el inicio con 300 mg de alirocumab Q4W / 150 mg Q2W en LDL-C (análisis ITT) fue del -58.8% comparado con el - 0.1% para el placebo. En la semana 24, la diferencia de tratamiento promedio para alirocumab 300 mg Q4W / 150 mg Q2W de placebo en el porcentaje de cambio de LDL-C desde el inicio fue de - 58.7% (97.5% CI: -65.0%, -52.4%; valor p: 0.0001). En pacientes tratados más de 12 semanas, la dosis se ajustó a 150 mg Q2W en 56 (19.3%) de 290 pacientes en el brazo de alirocumab 300 mg Q4W. Entre el subgrupo de pacientes con dosis ajustadas a 150 mg Q2W en la semana 12, se logró una reducción adicional del 25,4% en LDL-C en la semana 24.

En la cohorte de pacientes no tratados con una estatina concomitante, el LDL-C basal promedio fue de 142,1 mg / dL. En la semana 12, el cambio porcentual medio desde el inicio con 300 mg de alirocumab Q4W en LDL-C (análisis ITT) fue de -58.4% comparado con + 0.3% para el placebo. En la semana 12 (antes del ajuste de la dosis), el 65,2% de los pacientes tratados con alirocumab 300 mg Q4W alcanzaron un LDL-C de < 70 mg / dL en comparación con el 2,8% en el grupo de placebo. En la semana 24, el cambio porcentual medio desde el inicio con 300 mg de alirocumab Q4W / 150 mg Q2W en LDL-C (análisis ITT) fue de -52.7% comparado con -0.3% para el placebo. En la semana 24, la diferencia de tratamiento promedio para alirocumab 300 mg Q4W / 150 mg Q2W de placebo en el porcentaje de cambio de LDL-C desde el inicio fue de -52.4% (97.5% CI: -59.8%, - 45.0%; valor de p: < 0.0001). En pacientes tratados más de 12 semanas, la dosis se ajustó a 150 mg Q2W en 19 (14.7%) de 129 pacientes en el brazo de alirocumab 300 mg Q4W. Entre el subgrupo de pacientes con dosis ajustadas a 150 mg Q2W en la semana 12, se logró una reducción media adicional del 7,3% en LDL-C en la semana 24.

En ambas cohortes, la diferencia frente a placebo fue estadísticamente significativa en la semana 24 para todos los parámetros lipídicos, excepto para Apo A-1 en el subgrupo de pacientes con estatinas de base.

Estudio ODYSSEY OUTCOMES

sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria Wilberger
MN 15.552 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada

Un ensayo multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo en 18,924 pacientes adultos (9462 alirocumab; 9462 placebo) seguido por hasta 5 años. Los pacientes habían experimentado un evento de síndrome coronario agudo (SCA) de 4 a 52 semanas antes de la aleatorización y se trataron con un régimen de terapia modificadora de lípidos (LMT, por sus siglas en inglés) que fue intensivo en estatinas (definido como atorvastatina 40 u 80 mg, o rosuvastatina 20 o 40 mg) o en dosis máximas toleradas de esas estatinas, con o sin otro LMT. Todos los pacientes fueron aleatorizados 1: 1 para recibir alirocumab 75 mg una vez cada dos semanas (Q2W) o placebo Q2W. En el mes 2, si se requería una reducción adicional de LDL-C basada en criterios de LDL-C pre especificados (LDL-C ≥ 50 mg / dL o 1.29 mmol / L), el alirocumab se ajustó a 150 mg Q2W. Para los pacientes que tenían su dosis ajustada a 150 mg Q2W y que tenían dos valores de LDL-C consecutivos por debajo de 25 mg / dL (0,65 mmol / L), se realizó una titulación descendente de 150 mg Q2W a 75 mg Q2W. Los pacientes con 75 mg Q2W que tenían dos valores de LDL-C consecutivos por debajo de 15 mg / dL (0,39 mmol / L) se cambiaron a placebo de forma ciega. Aproximadamente 2615 (27.7%) de 9451 pacientes tratados con alirocumab requirieron un ajuste de dosis de 150 mg Q2W. De estos 2615 pacientes, 805 (30.8%) obtuvieron una titulación inferior a 75 mg Q2W. En total, 730 (7.7%) de 9451 pacientes cambiaron a placebo. Un total de 99.5% de los pacientes fueron seguidos para determinar supervivencia hasta el final de la prueba. La mediana de seguimiento fue de 33 meses.

El índice de evento SCA fue un infarto de miocardio en el 83,2% de los pacientes (34,6% STEMI, 48,6% NSTEMI) y un episodio de angina inestable en el 16,8% de los pacientes. Antes del evento del índice SCA, el 19,2% tenía un infarto de miocardio y el 22,7% tenía procedimientos de revascularización coronaria (CABG / PCI). La mayoría de los pacientes (88,8%) estaban recibiendo tratamiento con estatinas de alta intensidad con o sin otro LMT en la asignación al azar. El valor medio de LDL-C al inicio del estudio fue de 92.4 mg / dL (2.39 mmol / L).

Alirocumab redujo significativamente el riesgo de punto final compuesto primario para tiempo hasta la primera aparición de eventos cardiovasculares adversos mayores (MACE) que consisten en muerte por enfermedad coronaria (cardiopatía coronaria), infarto de miocardio no fatal (IM), accidente cerebrovascular (ACV) isquémico fatal y no fatal o angina inestable (AI) que requiere hospitalización (HR 0,85; IC del 95%: 0,78; 0,93; valor de p = 0,0003). Alirocumab también redujo significativamente los siguientes puntos finales compuestos: riesgo de evento de cardiopatía coronaria; evento mayor de CHD; evento cardiovascular y el compuesto de mortalidad por todas las causas, infarto de miocardio no fatal y ACV isquémico no fatal. También se observó una reducción de la mortalidad por todas las causas. En el subgrupo de pacientes de alto riesgo con LDL-C basal ≥ 100 mg / dL (≥ 2.59 mmol / L), los puntos finales primarios y todos los secundarios mejoraron con el tratamiento con alirocumab, incluida la muerte por enfermedad coronaria la muerte cardiovascular y la mortalidad por todas las causas.

Farmacocinética

Absorción

Tras la administración subcutánea de 50 mg a 300 mg de alirocumab, las medianas de los tiempos hasta la concentración sérica máxima (tm_{ax}) fueron de 3 a 7 días.

La farmacocinética de alirocumab después de una única administración subcutánea de 75 mg en el abdomen, en la parte superior del brazo o en el muslo, fue similar.

La biodisponibilidad absoluta de alirocumab después de la administración subcutánea fue de alrededor del 85% según se determinó mediante el análisis farmacocinético de la población.

La exposición mensual con 300 mg cada 4 semanas de tratamiento fue similar a la de 150 mg cada 2 semanas.

Se alcanzó el estado de equilibrio tras 2 o 3 dosis, con una tasa de acumulación de un máximo del doble.

Distribución

Tras la administración intravenosa, el volumen de distribución fue de unos 0,04 o 0,05 l/kg, lo que indica que alirocumab se distribuye sobre todo en el sistema circulatorio.

Biotransformación

No se realizaron estudios específicos de metabolismo con alirocumab ya que es una proteína. Es de esperar que alirocumab se degrade a péptidos pequeños y aminoácidos individuales.

Eliminación

Se observaron dos fases de eliminación de alirocumab. A concentraciones bajas, la eliminación se produce predominantemente a través la unión saturable a la proteína objetivo (PCSK9), mientras que, a concentraciones altas, la eliminación de alirocumab se produce en gran parte a través de una vía proteolítica insaturable.

Basándose en un análisis farmacocinético de la población, la mediana de la semivida aparente de alirocumab en estado de equilibrio fue de 17 a 20 días en pacientes que recibieron alirocumab en monoterapia a dosis subcutáneas de 75 mg cada dos semanas o de 150 mg cada dos semanas. Cuando se coadministró con una estatina, la mediana de la semivida aparente de alirocumab fue de 12 días.

Linealidad/No linealidad

Se observó un aumento ligeramente mayor al que sería proporcional a la dosis, con un aumento de entre 2,1 y 2,7 veces en las concentraciones totales de alirocumab con un aumento del doble de la dosis, de 75 mg a 150 mg cada dos semanas.

Poblaciones especiales

Personas de edad avanzada

Basándose en un análisis farmacocinético de la población, se observó que la edad estaba asociada a una pequeña diferencia en los niveles plasmáticos de alirocumab en estado estacionario, sin que esta influyese en la eficacia o la seguridad.

Sexo

Basándose en un análisis farmacocinético de la población, el sexo no influye en la farmacocinética de alirocumab.

Raza

Basándose en un análisis farmacocinético de la población, la raza no influye en la farmacocinética de alirocumab.

Tras la administración subcutánea de una dosis única de entre 100 mg y 300 mg de alirocumab, no se observaron diferencias significativas en los niveles plasmáticos entre sujetos sanos japoneses y caucásicos.

Peso corporal

El peso corporal se identificó como una covariable significativa en el modelo farmacocinético (FC) de la población final que afectaba a la farmacocinética de alirocumab. Los niveles de alirocumab (ABC_{0-14d}) en estado de equilibrio con ambas pautas posológicas, 75 y 150 mg cada dos semanas, disminuyeron en un 29% y 36% en pacientes que pesaban más de 100 kg en comparación con los pacientes que pesaban entre 50 y 100 kg. Lo cual no se tradujo en una diferencia clínicamente significativa en la disminución del C-LDL.

Insuficiencia hepática

En un estudio de fase I, tras la administración de una única dosis subcutánea de 75 mg, los perfiles farmacocinéticos de alirocumab en pacientes con insuficiencia hepática leve y moderada fueron similares en comparación con los de los pacientes con función hepática normal. No se dispone de datos en pacientes con insuficiencia hepática grave.

Insuficiencia renal

Al no conocerse que los anticuerpos monoclonales se eliminen por vías renales, no es de esperar que la función renal afecte a la farmacocinética de alirocumab. Los análisis farmacocinéticos de la población mostraron que los niveles de alirocumab (ABC_{0-14d}) en estado estacionario con ambas pautas posológicas, 75 y 150 mg cada dos semanas, se incrementaron en un 22%-35% y en un 49%-50% en pacientes con alteración renal leve y moderada, respectivamente, en comparación con pacientes con función renal normal. La distribución del peso corporal y la edad, dos covariables que afectan a los niveles la exposición de alirocumab, fue diferente entre las distintas categorías de función renal, lo que explica con más probabilidad las diferencias farmacocinéticas observadas. Se dispone de datos limitados en pacientes con alteración renal grave; en estos pacientes los niveles de alirocumab fueron aproximadamente 2 veces mayores comparados con sujetos con función renal normal.

Relación(es) farmacocinéticas/farmacodinámica(s)

El efecto farmacodinámico de alirocumab en la disminución del C-LDL es indirecto y mediado a través de la unión a PCSK9. Se observa una reducción en función de la concentración en el nivel de PCSK9 libre y de C-LDL hasta que se logra la saturación objetivo. Tras la saturación de la unión de la PCSK9, mayores aumentos en las concentraciones de alirocumab no provocan una mayor

reducción del C-LDL, aunque sí se observa una duración ampliada del efecto hipolipemiante sobre la C-LDL.

Datos preclínicos sobre seguridad

Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según las evaluaciones de farmacología de seguridad y toxicidad a dosis repetidas.

Los estudios de toxicología reproductiva en ratas y macacos indicaron que alirocumab, como otros anticuerpos IgG, atraviesa la barrera placentaria.

No se produjeron reacciones adversas sobre los marcadores indirectos de la fertilidad (p. ej. ciclicidad estrol, volumen testicular, volumen eyaculatorio, motilidad del esperma o recuento total de espermatozoides por eyaculación) en macacos, ni tampoco se produjeron hallazgos anatomopatológicos o histopatológicos relacionados con alirocumab en los tejidos reproductivos en ningún estudio de toxicología en ratas o monos.

No se produjeron reacciones adversas sobre el crecimiento o el desarrollo fetal en ratas y monos. No fue evidente la toxicidad materna en monas preñadas a exposiciones sistémicas que fueron 81 veces superiores a los niveles en humanos con la dosis de 150 mg cada dos semanas. Sin embargo, se observó toxicidad materna en ratas preñadas a exposiciones sistémicas que se calculó que eran aproximadamente 5,3 veces superiores a los niveles en humanos con la dosis de 150 mg cada dos semanas (basándose en la exposición medida en ratas no preñadas durante un estudio de toxicología de 5 semanas).

Las crías de los macacos que recibieron dosis altas de alirocumab una vez a la semana durante toda la gestación presentaron una respuesta inmunitaria secundaria más débil a la exposición al antígeno que las crías de los animales del grupo control. En las crías no hubo otras evidencias de disfunción inmunitaria relacionada con Alirocumab.

PRESENTACIONES

Praluent® 75 mg

- Estuches con 1, 2 o 6 jeringas prellenadas con 1 ml. La jeringa está equipada con un émbolo de polipropileno de color verde claro.
- Estuches con 1, 2 o 6 lapiceras prellenadas con 1 ml. La lapicera está equipada con capuchón azul y botón pulsador de activación color verde claro.

Praluent® 150 mg

- Estuches con 1, 2 o 6 jeringas prellenadas con 1 ml. La jeringa está equipada con un émbolo de polipropileno de color gris oscuro.
- Estuches con 1, 2 o 6 lapiceras prellenadas con 1 ml. La lapicera está equipada con capuchón azul y botón pulsador de activación color gris oscuro.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Conservar en heladera/refrigerador (entre 2 °C y 8 °C). No congelar.

Si fuera necesario, por ejemplo, cuando viaja, las lapiceras prellenadas o las jeringas prellenadas se pueden mantener a temperatura ambiente hasta 25 °C durante un máximo de 30 días.

Después de retirarlo de la heladera, PRALUENT debe usarse dentro de los 30 días o ser desechado. Mantener la jeringa o la lapicera dentro del estuche para protegerla de la luz.

Después de su uso, deseche la jeringa o lapicera prellenada en un contenedor para objetos punzantes de acuerdo con la normativa local. No reciclar el contenedor.

Mantener siempre el contenedor fuera de la vista y del alcance de los niños. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local.

Mantener en su envase original, no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Jeringas prellenadas

Elaboradas por: Sanofi Winthrop Industrie, 1051 Boulevard Industriel, 76580 Le Trait, Francia

Lapiceras prellenadas

sanofi-aventis Argentina S.A.
Fam. Valeria W. Berger
MN 15.552 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada



Elaboradas por: Sanofi Winthrop Industrie, 1051 Boulevard Industriel, 76580 Le Trait, Francia.
Acondicionadas en Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, Brüningstraße 50,
65926 Frankfurt am Main, Alemania.

sanofi-aventis Argentina S.A.

Polonia 50, La Tablada, Provincia de Buenos Aires
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado N° 58400
Dirección Técnica: Javier Cirrincione, Farmacéutico
Tel: 011 - 4732 5000
www.sanofi.com.ar

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA.

HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ 0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247

HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 / 4658-7777

HOSPITAL FERNÁNDEZ: (011) 4808-2655 / 4801-7767

OPTATIVAMENTE OTROS CENTROS DE INTOXICACIONES.

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

sanofi-aventis de Chile S.A.

Mayor información disponible en el Departamento Médico de Sanofi-Aventis, teléfono 2366 7014.

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON EL CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA (CITUC) AL 2 635 3800.

Licenciante: REGENERON Pharmaceuticals Inc., 81 Columbia Turnpike Rensselaer, NY 12144, Connecticut, USA.

Representante exclusivo en Paraguay:

sanofi-aventis Paraguay S.A.

Avenida Costanera y Calle 3, Parque Industrial Barrail, Asunción, Paraguay.
Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S.
Registro Sanitario M.S.P. y B.S. N°: _____
Director Técnico: Q.F. Jefferson L. Garbin. Registro Profesional N°: 4372.

VENTA BAJO RECETA.

EN CASO DE SOBREDOSIS, FAVOR CONCURRIR AL CENTRO DE TOXICOLOGÍA EMERGENCIAS MÉDICAS. GRAL SANTOS Y TEODORO S. MONGELÓS. TEL. 204 800.

Importado de: sanofi-aventis Argentina S.A.

Representante e Importador en Uruguay

sanofi-aventis Uruguay S.A.

Edificio Corporate El Plata – F. García Cortinas 2357, Piso 7 - Montevideo.

Reg. M.S.P. N° _____ - Ley 15.443.

VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL

Dirección Técnica: Q.F. M. José Bocage

EN CASO DE INGESTA ACCIDENTAL O SOBREDOSIS COMUNICARSE CON EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLÓGICO (CIAT): HOSPITAL DE CLÍNICAS AVENIDA ITALIA S/N PISO 7 TEL: 1722.

Última Revisión: CCDS V7_Praluent®_PI_sav002/Feb20 - Aprobado por Disposición ANMAT N°

sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria M. Zilberberg
MN 15.552 / IJP 20.528
Co-Directora Técnica / Apoderada

Última revisión: CCDS V7_Praluent® pen+jeringa_PI_sav002/Feb20 – Aprobado por Disposición ANMAT N°



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: PROSPECTO PRALUENT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 17 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.04.02 14:23:07 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.04.02 14:22:25 -03:00



PROSPECTO PARA INFORMACIÓN DEL PACIENTE

PRALUENT® **ALIROCUMAB 75 mg y 150 mg** Solución para inyección – vía subcutánea

Jeringa prellenada con 75 mg/1ml
Jeringa prellenada con 150 mg/1ml

VENTA BAJO RECETA
INDUSTRIA FRANCESA

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Si tiene alguna pregunta o duda, consulte a su médico.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que podría ser perjudicial.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico.

Utilice siempre PRALUENT® como su médico le ha indicado.

Salvo precisa indicación del médico, no debe utilizarse ningún medicamento durante el embarazo.

CONSULTE CON SU MÉDICO ANTES DE UTILIZAR CUALQUIER MEDICAMENTO

Contenido del prospecto

1. Qué es PRALUENT® y para qué se utiliza
2. Antes de usar PRALUENT®
3. Cómo debo utilizar PRALUENT®
4. Posibles efectos adversos
5. Cómo debo conservar y mantener PRALUENT®
6. Información adicional

1. ¿Qué es PRALUENT® y para qué se utiliza?

Qué es Praluent®

El principio activo de Praluent® es alirocumab.

Praluent® es un anticuerpo monoclonal (un tipo de proteína especializada diseñada para fijarse a una sustancia diana en el cuerpo). Los anticuerpos monoclonales son proteínas que reconocen y se unen a otras proteínas únicas. Alirocumab se une a la PCSK9.

Cómo funciona Praluent®

Praluent® ayuda a reducir sus niveles de colesterol "malo" (también llamado "colesterol LDL").

Praluent® bloquea una proteína llamada PCSK9.

La PCSK9 es una proteína secretada por las células hepáticas.

Normalmente, el colesterol "malo" se elimina de la sangre al fijarse a "receptores" específicos (estaciones de acoplamiento) en el hígado.

La PCSK9 reduce el número de estos receptores en el hígado, lo que provoca que los niveles de colesterol "malo" sean más altos de lo que deberían.

Al bloquear la PCSK9, Praluent aumenta el número de receptores disponibles para ayudar a eliminar el colesterol "malo" y así reduce los niveles de colesterol "malo".

Para qué se utiliza Praluent®

- En adultos con niveles altos de colesterol en su sangre (hipercolesterolemia, familiar heterocigota y no familiar, o dislipemia mixta).
- Para reducir el riesgo cardiovascular en adultos con niveles altos de colesterol en sangre y con enfermedad cardiovascular.

Se administra:

sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria Wilberger
MN 15.552 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada



- junto con una estatina (medicamento utilizado frecuentemente para tratar el colesterol alto) o con otros medicamentos para reducir el colesterol, si la dosis máxima de una estatina no reduce suficientemente los niveles de colesterol o,
- sola o con otro medicamento para reducir el colesterol cuando no se toleran o no pueden usarse las estatinas.

Continúe con su dieta para reducir el colesterol mientras tome este medicamento.

2. Antes de usar PRALUENT®

No use PRALUENT® si:

- usted es alérgico (hipersensible) a alirocumab o a algunos de sus componentes (léase "Información Adicional / Composición de PRALUENT®")

Advertencias y precauciones

Hable con su médico acerca de sus enfermedades, incluidas alergias antes de usar Praluent®.

Si presenta una reacción alérgica grave, interrumpa el tratamiento con Praluent® y acuda a su médico inmediatamente. Algunas veces en estudios clínicos han aparecido reacciones alérgicas graves como hipersensibilidad (dificultad para respirar), eccema numular (manchas rojizas en la piel, a veces con ampollas), y vasculitis por hipersensibilidad (que es una forma específica de reacción de hipersensibilidad con síntomas como diarrea, con una erupción cutánea, o manchas en la piel de color púrpura). Para conocer las reacciones alérgicas que se pueden presentar mientras está tomando Praluent®, ver sección 4 "Posibles efectos adversos".

Informe a su médico antes de utilizar este medicamento si padece alguna enfermedad del riñón o del hígado, debido a que Praluent® se ha estudiado en pocos pacientes con enfermedad grave de riñón y en ningún paciente con enfermedad grave de hígado.

Niños y adolescentes

No se recomienda el uso de Praluent® en niños y adolescentes menores de 18 años. No se dispone de datos sobre el uso del medicamento en estos grupos de edad.

Uso de Praluent con otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Embarazo y lactancia

No se recomienda utilizar Praluent® durante el embarazo o la lactancia.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

No se espera que este medicamento afecte a su capacidad para conducir o utilizar máquinas.

3. ¿Cómo debo utilizar PRALUENT®?

Siga exactamente las instrucciones indicadas por su médico para la administración de este medicamento. En caso de duda, consulte nuevamente a su médico.

Qué cantidad se debe inyectar

Su médico le dirá qué dosis es la apropiada para usted y con qué frecuencia se debe inyectar (75 mg o 150 mg una vez cada 2 semanas o 300 mg una vez cada 4 semanas/mensualmente). Su médico comprobará sus niveles de colesterol y podrá ajustar la dosis (aumentándola o disminuyéndola) durante el tratamiento.

Compruebe siempre el nombre y la concentración del medicamento en la etiqueta de la jeringa.

Cuándo se debe inyectar

Inyéctese Praluent una vez cada 2 semanas (para las dosis de 75 mg o 150 mg) o una vez cada 4 semanas/mensualmente (para la dosis de 300 mg). Para administrar la dosis de 300 mg, poner dos inyecciones de 150 mg consecutivas en dos lugares diferentes de inyección.

Antes de inyectarse

Lea las instrucciones de uso detalladas en este prospecto antes de inyectarse Praluent®.

sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria Weinberger
MN 15.552 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada



Dónde se debe inyectar

Lea las instrucciones de uso detalladas de este prospecto sobre dónde inyectar.

Cómo usar la jeringa prellenada

Antes de usar la jeringa por primera vez, su médico le mostrará cómo se debe inyectar Praluent®.

Lea siempre las “**Instrucciones de uso**” que se incluyen en la caja.

Utilice siempre la jeringa según se describe en las “**Instrucciones de uso**”.

Si usa más Praluent® del que debe

Si usa más Praluent® del que debe, consulte a su médico.

Si olvidó usar Praluent®

Si se saltó una dosis de Praluent®, inyéctese lo antes posible la dosis que se saltó. A continuación, inyéctese la siguiente dosis dos semanas después del día en que se saltó la dosis.

Por ejemplo, si normalmente se inyectaba cada martes alterno, siga inyectándose cada martes alterno. De ese modo, mantendrá la pauta de administración original. Si no está seguro acerca de cuándo inyectarse Praluent®, consulte a su médico.

Si interrumpe el tratamiento con Praluent®

No interrumpa el tratamiento con Praluent® sin antes hablar con su médico. Si interrumpe el tratamiento con Praluent®, pueden aumentar sus niveles de colesterol.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Si presenta una reacción alérgica grave, interrumpa el tratamiento con Praluent® y acuda a su médico inmediatamente. Algunas veces han aparecido reacciones alérgicas graves como hipersensibilidad (dificultad para respirar), eccema numular (manchas rojizas en la piel, a veces con ampollas), y vasculitis por hipersensibilidad (que es una forma específica de reacción de hipersensibilidad con síntomas como diarrea, erupción cutánea, o manchas en la piel de color púrpura) (pueden afectar a 1 de cada 1000 personas).

Otros efectos adversos son:

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- enrojecimiento, picazón, hinchazón, dolor/sensibilidad donde se inyectó el medicamento (reacciones locales en la zona de inyección);
- signos o síntomas del tracto respiratorio superior como dolor de garganta, secreción nasal, estornudos
- picazón (prurito).

Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas)

- ronchas sobreelevadas rojizas que provocan picazón (urticaria).

▪ **Frecuencia no conocida**

Desde la comercialización de Praluent se han notificado los siguientes efectos adversos, con una frecuencia no conocida:

- enfermedad de tipo gripal.

Reporte de efectos adversos

Si presenta algún efecto adverso, consulte con su médico. Esto incluye también cualquier posible efecto adverso no mencionado en el prospecto.

5. ¿Cómo debo conservar y mantener PRALUENT®?

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

Conservar en la heladera/refrigerador (entre 2 °C y 8 °C). No congelar.

No mantener Praluent® fuera de la heladera/refrigerador más de 24 horas a temperaturas por debajo de 25 °C (no conservar por encima de 25 °C).

Mantener la jeringa en el envase exterior para protegerla de la luz.



Si es necesario, las jeringas prellenadas individuales se pueden mantener fuera de heladera por debajo de 25°C, durante un máximo de 30 días. Protegidas de la luz. Después de sacarlo de la heladera, Praluent se debe utilizar en 30 días o desecharse.

No utilice este medicamento si presenta cambios de color, está turbio o contiene partículas visibles. Después de su uso, introduzca la jeringa en un contenedor para objetos punzantes. Mantener siempre el contenedor fuera de la vista y del alcance de los niños. Pregunte a su médico, cómo deshacerse del contenedor. No reciclar el contenedor.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Mantener en su envase original, no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

El medicamento vence el último día del mes que se indica en el envase.

6. Información adicional

Composición de PRALUENT® 75 mg ó 150 mg

El **principio activo** es alirocumab.

Cada jeringa de un solo uso, contiene **75 miligramos** (75 miligramos por ml) de alirocumab

Los demás componentes son: histidina, sacarosa, polisorbato 20 y agua para inyectables.

Cada jeringa prellenada con émbolo verde contiene 1 ml de solución que libera una dosis única de 75 miligramos.

Cada jeringa de un solo uso, contiene **150 miligramos** (150 miligramos por ml) de alirocumab

Los demás componentes son: histidina, sacarosa, polisorbato 20 y agua para inyectables.

Cada jeringa prellenada con émbolo gris contiene 1 ml de solución que libera una dosis única de 150 miligramos.

Aspecto de PRALUENT® y contenido del envase

Praluent® es una solución inyectable transparente, de incolora a amarillo pálido, que se presenta en una jeringa prellenada.


Está disponible en envases de 1, 2 o 6 jeringas prellenadas.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

sanofi-aventis Argentina S.A.
Fam. Valeria Wilberger
MNI 15.552 - MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada

**INSTRUCCIONES DE USO DE LA JERINGA PRELLENADA
PRALUENT® 75 mg**

En la siguiente imagen se muestran las partes de la jeringa de Praluent®



Información importante

Se trata de una jeringa prellenada de un solo uso. Contiene 75 mg de Praluent (alirocumab) en 1 ml. El medicamento se inyecta bajo la piel y puede administrárselo usted mismo u otra persona. Esta jeringa se debe usar solamente para una inyección y luego se debe desechar.

Qué debe hacer

- ✓ Mantener la jeringa de Praluent fuera de la vista y del alcance de los niños.
- ✓ Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar la jeringa de Praluent®.
- ✓ Siga estas instrucciones cada vez que use una jeringa de Praluent.
- ✓ Conserve las jeringas sin usar en la heladera/refrigerador entre 2 °C y 8 °C. Para más información sobre condiciones de conservación ver la sección 5 "¿Cómo debo conservar y mantener Praluent®?"

Qué no debe hacer

- ✗ No toque la aguja.
- ✗ No utilice la jeringa si se ha caído al suelo o está dañada.
- ✗ No utilice la jeringa si falta el capuchón gris de la aguja o no está firmemente sujeto.
- ✗ No reutilice la jeringa.
- ✗ No agite la jeringa.
- ✗ No congele la jeringa.
- ✗ No exponga la jeringa a la luz solar directa.

Conserve este prospecto. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o llame al número de sanofi que se detalla al final de este prospecto.

PASO A: Preparación de la inyección

Antes de empezar necesitará:


- la jeringa de Praluent®
- toallitas humedecidas en alcohol
- bolita de algodón o gasa

sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria Wilberge
MN 15.552 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada

- un contenedor para objetos punzantes (ver paso B, 6).

1. Antes de empezar.

Extraiga la jeringa del envoltorio tomándola del cuerpo.



2. Mirar la etiqueta de la jeringa

Compruebe que tiene el medicamento correcto y la dosis correcta (émbolo verde para 75 mg/ml).

Compruebe la fecha de vencimiento de la jeringa y no la utilice si está vencida.

Compruebe que el líquido es transparente, entre incoloro y amarillo pálido y que no contiene partículas; en caso contrario, no utilizar la jeringa.

Compruebe que la jeringa no está abierta ni dañada.

3. Deje que la jeringa se adecúe a la temperatura ambiente de 30 a 40 minutos.

Deje que la jeringa se atempere por sí sola, no intente calentarla.

Utilice la jeringa lo antes posible una vez que esté a temperatura ambiente.

No vuelva a meter la jeringa en la heladera/refrigerador.

4. Preparar el lugar de la inyección.

Lávese las manos con agua y jabón y séqueselas con una toalla.

Puede inyectárselo en:

- el muslo
- el vientre (salvo en la zona de 5 cm alrededor del ombligo)
- la parte superior externa de su brazo

(Ver imagen).

Para inyectarse puede estar de pie o sentado.


Limpie la piel en la zona de la inyección con una toallita humedecida en alcohol.

No elija una zona de la piel que esté dolorida, endurecida, enrojecida o caliente.

No elija una zona cercana a una vena visible.

Inyéctese cada vez en una zona diferente.

No se inyecte Praluent® conjuntamente con otros medicamentos inyectables en la misma zona.



PASO B: Cómo inyectarse

1. Después de completar todos los pasos del “PASO A: Preparación de la inyección”, retire el capuchón de la aguja.


NO retire el capuchón hasta que esté preparado para inyectarse.

sanofi-aventis Argentina
 Farm. Valeria Walberger
 MN 15.552 / MP 20.628
 Co-Directora Técnica / Apoderada

Sujete de la mitad del cuerpo de la jeringa con la aguja en dirección opuesta a usted.
No toque el émbolo.


Podría observarse una burbuja de aire. Esto es normal. No intente eliminar ninguna burbuja de aire que pueda haber en la jeringa antes de la inyección.

No vuelva a colocar el capuchón gris.



2. En caso necesario, pellizcar la piel.


Tome un pliegue de piel en la zona de inyección entre los dedos pulgar e índice.
No suelte el pliegue de piel durante toda la inyección.



3. Mediante un movimiento rápido insertar la aguja en el pliegue de piel.


Si puede pellizcar 5 cm de piel utilice un ángulo de 90°.

Si sólo puede pellizcar 2 cm de piel utilice un ángulo de 45°.



4. Empujar el émbolo

Inyecte toda la solución empujando el émbolo lenta y constantemente.




5. Antes de retirar la aguja compruebe que la jeringa esté vacía.

No retire la jeringa hasta que esté completamente vacía.

Extraiga la aguja de la piel en el mismo ángulo que la insertó.

No frote la superficie de la piel después de la inyección.

Si se produce algún sangrado, presione el lugar de la inyección con una bolita de algodón o gasa hasta que deje de sangrar.



6. Deseche la jeringa y el capuchón



No vuelva a colocar el capuchón gris de la aguja.

No reutilice la jeringa.

Deseche la jeringa y el capuchón en un contenedor para objetos punzantes inmediatamente después de su uso.

Pregunte a su médico cómo deshacerse del contenedor.


Mantener siempre el contenedor fuera de la vista y del alcance de los niños.



sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria Wilberger
MN 15.552 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada

**INSTRUCCIONES DE USO DE LA JERINGA PRELLENADA
PRALUENT® 150 mg**

En la siguiente imagen se muestran las partes de la jeringa de Praluent®



Información importante

Se trata de una jeringa prellenada de un solo uso. Contiene 150 mg de Praluent (alirocumab) en 1 ml.

El medicamento se inyecta bajo la piel y puede administrárselo usted mismo u otra persona. Esta jeringa se debe usar solamente para una inyección y luego se debe desechar.

Qué debe hacer

- ✓ Mantener la jeringa de Praluent fuera de la vista y del alcance de los niños.
- ✓ Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar la jeringa de Praluent®.
- ✓ Siga estas instrucciones cada vez que use una jeringa de Praluent.
- ✓ Conserve las jeringas sin usar en la heladera/refrigerador entre 2 °C y 8 °C. Para más información sobre condiciones de conservación ver la sección 5 “¿Cómo debo conservar y mantener Praluent®?”

Qué no debe hacer

- ✗ No toque la aguja.
- ✗ No utilice la jeringa si se ha caído al suelo o está dañada.
- ✗ No utilice la jeringa si falta el capuchón gris de la aguja o no está firmemente sujeto.
- ✗ No reutilice la jeringa.
- ✗ No agite la jeringa.
- ✗ No congele la jeringa.
- ✗ No exponga la jeringa a la luz solar directa.

Conserve este prospecto. Si tiene alguna duda, consulte a su médico o llame al número de sanofi que se detalla al final de este prospecto.

PASO A: Preparación de la inyección

Antes de empezar necesitará:

- la jeringa de Praluent®
- toallitas humedecidas en alcohol
- bolita de algodón o gasa

sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria Valdesperger
MN 15.852 / LIP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada

- un contenedor para objetos punzantes (ver paso B, 6).

1. Antes de empezar.

Extraiga la jeringa del envoltorio tomándola del cuerpo.



2. Mirar la etiqueta de la jeringa

Compruebe que tiene el medicamento correcto y la dosis correcta (émbolo gris para 150 mg/ml). Compruebe la fecha de vencimiento de la jeringa y no la utilice si está vencida. Compruebe que el líquido es transparente, entre incoloro y amarillo pálido y que no contiene partículas; en caso contrario, no utilizar la jeringa. Compruebe que la jeringa no está abierta ni dañada.

3. Deje que la jeringa se adecúe a la temperatura ambiente de 30 a 40 minutos.

Deje que la jeringa se atempere por sí sola, no intente calentarla. Utilice la jeringa lo antes posible una vez que esté a temperatura ambiente. No vuelva a meter la jeringa en la heladera/refrigerador.

4. Preparar el lugar de la inyección.

Lávese las manos con agua y jabón y séqueselas con una toalla.

Puede inyectárselo en:

- el muslo
- el vientre (salvo en la zona de 5 cm alrededor del ombligo)
- la parte superior externa de su brazo

(Ver imagen).

Para inyectarse puede estar de pie o sentado.


Limpie la piel en la zona de la inyección con una toallita humedecida en alcohol.

No elija una zona de la piel que esté dolorida, endurecida, enrojecida o caliente.

No elija una zona cercana a una vena visible.

Inyéctese cada vez en una zona diferente.

No se inyecte Praluent® conjuntamente con otros medicamentos inyectables en la misma zona.




PASO B: Cómo inyectarse

1. Después de completar todos los pasos del “PASO A: Preparación de la inyección”, retire el capuchón de la aguja.


sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria Alberber
MN 15.562 / NIP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada

No retire el capuchón hasta que esté preparado para inyectarse.
Sujete de la mitad del cuerpo de la jeringa con la aguja en dirección opuesta a usted.
No toque el émbolo.
Podría observarse una burbuja de aire. Esto es normal. No intente eliminar ninguna burbuja de aire que pueda haber en la jeringa antes de la inyección.
No vuelva a colocar el capuchón gris.




2. En caso necesario, pellizcar la piel.

Tome un pliegue de piel en la zona de inyección entre los dedos pulgar e índice.
No suelte el pliegue de piel durante toda la inyección.




3. Mediante un movimiento rápido insertar la aguja en el pliegue de piel.

Si puede pellizcar 5 cm de piel utilice un ángulo de 90°.
Si sólo puede pellizcar 2 cm de piel utilice un ángulo de 45°.



4. Empujar el émbolo

Inyecte toda la solución empujando el émbolo lenta y constantemente.




5. Antes de retirar la aguja compruebe que la jeringa esté vacía.

No retire la jeringa hasta que esté completamente vacía.

Extraiga la aguja de la piel en el mismo ángulo que la insertó.

No frote la superficie de la piel después de la inyección.

Si se produce algún sangrado, presione el lugar de la inyección con una bolita de algodón o gasa hasta que deje de sangrar.



6. Deseche la jeringa y el capuchón


No vuelva a colocar el capuchón gris de la aguja.

No reutilice la jeringa.

Deseche la jeringa y el capuchón en un contenedor para objetos punzantes inmediatamente después de su uso.

Pregunte a su médico cómo deshacerse del contenedor.

Mantener siempre el contenedor fuera de la vista y del alcance de los niños.



MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Elaborado por: Sanofi Winthrop Industrie, 1051 Boulevard Industriel, 76580 Le Trait, Francia.

sanofi-aventis Argentina S.A.

Polonia 50, La Tablada, Provincia de Buenos Aires

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud

Certificado N° 58400

Dirección Técnica: Javier Cirrincione, Farmacéutico

Tel: 011 - 4732 5000

www.sanofi.com.ar

sanofi-aventis Argentina S.A.

Farm. Valeria Wilton

MN 15.552 / I.P. 20.628

Co-Directora Técnica / Apoderada



ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA.
HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ 0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247
HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 / 4658-7777
HOSPITAL FERNÁNDEZ: (011) 4808-2655 / 4801-7767
OPTATIVAMENTE OTROS CENTROS DE INTOXICACIONES.

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

sanofi-aventis de Chile S.A.

Mayor información disponible en el Departamento Médico de Sanofi-Aventis, teléfono 2366 7014.

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON EL CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA (CITUC) AL 2 635 3800.

Licenciante: REGENERON Pharmaceuticals Inc., 81 Columbia Turnpike Rensselaer, NY 12144, Connecticut, USA.

Representante exclusivo en Paraguay:

sanofi-aventis Paraguay S.A.

Avenida Costanera y Calle 3, Parque Industrial Barrail, Asunción, Paraguay.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S.

Registro Sanitario M.S.P. y B.S. N°: _____

Director Técnico: Q.F. Jefferson L. Garbin. Registro Profesional N°: 4372.

VENTA BAJO RECETA.

EN CASO DE SOBREDOSIS, FAVOR CONCURRIR AL CENTRO DE TOXICOLOGÍA EMERGENCIAS MÉDICAS. GRAL SANTOS Y TEODORO S. MONGELÓS. TEL. 204 800.

Importado de: sanofi-aventis Argentina S.A.

Distribuido en Paraguay por: Distribuidora la Policlínica S.A.

Representante e Importador en Uruguay

sanofi-aventis Uruguay S.A.

Edificio Corporate El Plata – F. García Cortinas 2357, Piso 7 - Montevideo.

Reg. M.S.P. N° _____ - Ley 15.443.

VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL

Dirección Técnica: Q.F. M. José Bocage

EN CASO DE INGESTA ACCIDENTAL O SOBREDOSIS COMUNICARSE CON EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLÓGICO (CIAT): HOSPITAL DE CLÍNICAS AVENIDA ITALIA S/N PISO 7 TEL: 1722.

Bolivia: Distribuido por Quimiza Ltda. – Q.F. Dra Jenny Flores. Venta Bajo Receta Médica.

Última Revisión: CCDS V7_Praluent®_PIP_sav002/Feb20 - Aprobado por Disposición ANMAT N°

sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria Wabender
MN 15.652 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada



PROSPECTO PARA INFORMACIÓN DEL PACIENTE

PRALUENT®
ALIROCUMAB 75 mg y 150 mg
Solución para inyección – vía subcutánea

Lapicera prellenada con 75 mg/1ml
Lapicera prellenada con 150 mg/1ml

VENTA BAJO RECETA
INDUSTRIA FRANCESA

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento.

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Si tiene alguna pregunta o duda, consulte a su médico.

Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que podría ser perjudicial.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico.

Utilice siempre PRALUENT® como su médico le ha indicado.

Salvo precisa indicación del médico, no debe utilizarse ningún medicamento durante el embarazo.

CONSULTE CON SU MÉDICO ANTES DE UTILIZAR CUALQUIER MEDICAMENTO

Contenido del prospecto

1. Qué es PRALUENT® y para qué se utiliza
2. Antes de usar PRALUENT®
3. Cómo debo utilizar PRALUENT®
4. Posibles efectos adversos
5. Cómo debo conservar y mantener PRALUENT®
6. Información adicional

1. ¿Qué es PRALUENT® y para qué se utiliza?

Qué es Praluent®

El principio activo de Praluent® es alirocumab.

Praluent® es un anticuerpo monoclonal (un tipo de proteína especializada diseñada para fijarse a una sustancia diana en el cuerpo). Los anticuerpos monoclonales son proteínas que reconocen y se unen a otras proteínas únicas. Alirocumab se une a una proteína llamada PCSK9.

Cómo funciona Praluent®

Praluent® ayuda a reducir sus niveles de colesterol "malo" (también llamado "colesterol LDL").

Praluent® bloquea una proteína llamada PCSK9.

La PCSK9 es una proteína secretada por las células hepáticas.

Normalmente, el colesterol "malo" se elimina de la sangre al fijarse a "receptores" específicos (estaciones de acoplamiento) en el hígado.

La PCSK9 reduce el número de estos receptores en el hígado, lo que provoca que los niveles de colesterol "malo" sean más altos de lo que deberían.

Al bloquear la PCSK9, Praluent® aumenta el número de receptores disponibles para ayudar a eliminar el colesterol "malo" y así reduce los niveles de colesterol "malo".

Para qué se utiliza Praluent®

- En adultos con niveles altos de colesterol en su sangre (hipercolesterolemia, familiar heterocigota y no familiar, o dislipemia mixta).
- Para reducir el riesgo cardiovascular en adultos con niveles altos de colesterol en sangre y con enfermedad cardiovascular.

Se administra:

sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria Walberger
MN 15.552 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada



- junto con una estatina (medicamento utilizado frecuentemente para tratar el colesterol alto) o con otros medicamentos para reducir el colesterol, si la dosis máxima de una estatina no reduce suficientemente los niveles de colesterol o,
- sola o con otro medicamento para reducir el colesterol cuando no se toleran o no pueden usarse las estatinas.

Continúe con su dieta para reducir el colesterol mientras tome este medicamento.

2. Antes de usar PRALUENT®

No use PRALUENT® si:

- usted es alérgico (hipersensible) a alirocumab o a algunos de sus componentes (léase "Información Adicional / Composición de PRALUENT®")

Advertencias y precauciones

Hable con su médico acerca de sus enfermedades, incluidas alergias antes de usar Praluent®.

Si presenta una reacción alérgica grave, interrumpa el tratamiento con Praluent® y acuda a su médico inmediatamente. Algunas veces en estudios clínicos han aparecido reacciones alérgicas graves como hipersensibilidad (dificultad para respirar), eccema numular (manchas rojizas en la piel, a veces con ampollas), y vasculitis por hipersensibilidad (que es una forma específica de reacción de hipersensibilidad con síntomas como diarrea, con una erupción cutánea, o manchas en la piel de color púrpura). Para conocer las reacciones alérgicas que se pueden presentar mientras está tomando Praluent®, ver sección 4 "Posibles efectos adversos".

Informe a su médico antes de utilizar este medicamento si padece alguna enfermedad del riñón o del hígado, debido a que Praluent® se ha estudiado en pocos pacientes con enfermedad grave de riñón y en ningún paciente con enfermedad grave de hígado.

Niños y adolescentes

No se recomienda el uso de Praluent® en niños y adolescentes menores de 18 años. No se dispone de datos sobre el uso del medicamento en estos grupos de edad.

Uso de Praluent con otros medicamentos

Informe a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

Embarazo y lactancia

No se recomienda utilizar Praluent® durante el embarazo o la lactancia.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

No se espera que este medicamento afecte a su capacidad para conducir o utilizar máquinas.

3. ¿Cómo debo usar PRALUENT®?

Siga exactamente las instrucciones indicadas por su médico para la administración de este medicamento. En caso de duda, consulte nuevamente a su médico.

Qué cantidad se debe inyectar

Su médico le dirá qué dosis es la apropiada para usted y con qué frecuencia se debe inyectar (75 mg o 150 mg una vez cada 2 semanas o 300 mg una vez cada 4 semanas/mensualmente). Su médico comprobará sus niveles de colesterol y podrá ajustar la dosis (aumentándola o disminuyéndola) durante el tratamiento.

Compruebe siempre el nombre y la concentración del medicamento en la etiqueta de la lapicera.

Cuándo se debe inyectar

Inyéctese Praluent una vez cada 2 semanas (para las dosis de 75 mg o 150 mg) o una vez cada 4 semanas/mensualmente (para la dosis de 300 mg). Para administrar la dosis de 300 mg, poner dos inyecciones de 150 mg consecutivas en dos lugares diferentes de inyección.

Antes de inyectarse

Lea las instrucciones de uso detalladas de este prospecto antes de inyectarse Praluent®.



Dónde se debe inyectar

Lea las instrucciones de uso detalladas en este prospecto sobre dónde inyectar.

Cómo usar la lapicera prellenada

Antes de usar la lapicera por primera vez, su médico le mostrará cómo se debe inyectar Praluent®. Lea siempre las “**Instrucciones de uso**” que se incluyen en la caja. Utilice siempre la lapicera según se describe en las “**Instrucciones de uso**”.

Si usa más Praluent® del que debe

Si usa más Praluent® del que debe, consulte a su médico.

Si olvidó usar Praluent®

Si se saltó una dosis de Praluent®, inyéctese lo antes posible la dosis que se saltó. A continuación, inyéctese la siguiente dosis dos semanas después del día en que se saltó la dosis. Por ejemplo, si normalmente se inyectaba cada martes alterno, siga inyectándose cada martes alterno. De ese modo, mantendrá la pauta de administración original. Si no está seguro acerca de cuándo inyectarse Praluent®, consulte a su médico.

Si interrumpe el tratamiento con Praluent®

No interrumpa el tratamiento con Praluent® sin antes hablar con su médico. Si interrumpe el tratamiento con Praluent®, pueden aumentar sus niveles de colesterol. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Si presenta una reacción alérgica grave, interrumpa el tratamiento con Praluent® y acuda a su médico inmediatamente. Algunas veces han aparecido reacciones alérgicas graves como hipersensibilidad (dificultad para respirar), eccema numular (manchas rojizas en la piel, a veces con ampollas), y vasculitis por hipersensibilidad (que es una forma específica de reacción de hipersensibilidad con síntomas como diarrea, erupción cutánea, o manchas en la piel de color púrpura) (pueden afectar a 1 de cada 1000 personas).

Otros efectos adversos son:

Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- enrojecimiento, picazón, hinchazón, dolor/sensibilidad donde se inyectó el medicamento (reacciones locales en la zona de inyección);
- signos o síntomas del tracto respiratorio superior como dolor de garganta, secreción nasal, estornudos
- picazón (prurito).

Raros (pueden afectar hasta 1 de cada 1000 personas)

- ronchas sobreelevadas rojizas que provocan picazón (urticaria).

Frecuencia no conocida

Desde la comercialización de Praluent se han notificado los siguientes efectos adversos, con una frecuencia no conocida:

- enfermedad de tipo gripal.

Reporte de efectos adversos

Si presenta algún efecto adverso, consulte con su médico. Esto incluye también cualquier posible efecto adverso no mencionado en el prospecto.

5. ¿Cómo debo conservar y mantener PRALUENT®?

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

Conservar en la heladera/refrigerador (entre 2 °C y 8 °C). No congelar.

No mantener Praluent® fuera de la heladera/refrigerador más de 24 horas a temperaturas por debajo de 25 °C (no conservar por encima de 25 °C).

Mantener la lapicera en el envase exterior para protegerla de la luz.



Si es necesario, las lapiceras prellenadas individuales se pueden mantener fuera de heladera por debajo de 25°C, durante un máximo de 30 días. Protegidas de la luz. Después de sacarlo de la heladera, Praluent se debe utilizar en 30 días o desecharse.

No utilice este medicamento si presenta cambios de color, está turbio o contiene partículas visibles. Después de su uso, introduzca la lapicera en un contenedor para objetos punzantes. Mantener siempre el contenedor fuera de la vista y del alcance de los niños. Pregunte a su médico, cómo deshacerse del contenedor. No reciclar el contenedor.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Mantener en su envase original, no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

El medicamento vence el último día del mes que se indica en el envase.

6. Información adicional

Composición de PRALUENT® 75 mg ó 150 mg

El **principio activo** es alirocumab.

Cada lapicera de un solo uso, contiene **75 miligramos** (75 miligramos por ml) de alirocumab

Los demás componentes son: histidina, sacarosa, polisorbato 20 y agua para inyectables.

Cada lapicera prellenada con botón pulsador verde contiene 1 ml de solución que libera una dosis única de 75 miligramos.

Cada lapicera de un solo uso, contiene **150 miligramos** (150 miligramos por ml) de alirocumab

Los demás componentes son: histidina, sacarosa, polisorbato 20 y agua para inyectables.

Cada lapicera prellenada con botón pulsador gris contiene 1 ml de solución que libera una dosis única de 150 miligramos.

Aspecto de PRALUENT® y contenido del envase

Praluent® es una solución inyectable transparente, de incolora a amarillo pálido, que se presenta en una lapicera prellenada.

Está disponible en envases de 1, 2 o 6 lapiceras prellenadas.

Puede que solamente estén comercializados algunos tamaños de envases.

sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Willem Wilberger
MN 15.552 - MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada

**INSTRUCCIONES DE USO DE LA LAPICERA PRELLENADA
PRALUENT® 75 mg**

En la siguiente imagen se muestran las partes de la lapicera de Praluent®



Información importante

Se trata de una lapicera prellenada de un solo uso. Contiene 75 mg de Praluent (alirocumab) en 1 ml.

El medicamento se inyecta bajo la piel y puede administrárselo usted mismo u otra persona. Esta lapicera se debe usar solamente para una inyección y luego se debe desechar.

Qué debe hacer

- ✓ Mantener la lapicera de Praluent® fuera de la vista y del alcance de los niños.
- ✓ Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar la lapicera de Praluent®.
- ✓ Siga estas instrucciones cada vez que use una lapicera de Praluent®.
- ✓ Conserve las lapiceras sin usar en la heladera/refrigerador entre 2 °C y 8 °C. Para más información sobre condiciones de conservación ver la sección 5 "¿Cómo debo conservar y mantener Praluent®?"

Qué no debe hacer

- ✗ No toque el protector amarillo de seguridad.
- ✗ No utilice la lapicera si se ha caído al suelo o está dañada.
- ✗ No utilice la lapicera si falta el capuchón azul de la aguja o no está firmemente sujeto.
- ✗ No reutilice la lapicera.
- ✗ No agite la lapicera.
- ✗ No congele la lapicera.
- ✗ No exponga la lapicera a la luz solar directa.

Conserve este prospecto. Si tiene alguna duda, consulte a su médico

PASO A: Preparación de la inyección

Antes de empezar necesitará:

- la lapicera de Praluent®
- toallitas humedecidas en alcohol
- bolita de algodón o gasa
- un contenedor para objetos punzantes (ver paso B, 8).


1. Mirar la etiqueta de la lapicera.

- Compruebe que contiene el medicamento correcto y la dosis correcta.
- Compruebe la fecha de vencimiento de la lapicera; no la utilice si está vencida.



2. Mirar la ventana para inspección.

- Compruebe que el líquido es transparente, entre incoloro y amarillo pálido y que no contiene partículas; en caso contrario, no utilizar la lapicera (ver imagen A).
- Es posible que vea una burbuja de aire. Eso es algo normal.
- No utilice la lapicera si la ventana para inspección tiene un color amarillo sólido (ver imagen B).



3. Deje que la lapicera se adecúe a la temperatura ambiente de 30 a 40 minutos.


- Deje que la lapicera se adecúe a temperatura ambiente por sí sola, no intente calentarla.
- Utilice la lapicera lo antes posible una vez que esté a temperatura ambiente.
- No vuelva a colocar la lapicera en la heladera/refrigerador.

4. Preparar el lugar de la inyección.

- Lávese las manos con agua y jabón y séquelas con una toalla.
- Puede inyectárselo en:


- el muslo
- el vientre (salvo en la zona de 5 cm alrededor del ombligo)
- la parte superior externa de su brazo
(Ver imagen).

- Para inyectarse puede estar de pie o sentado.
- Limpie la piel en la zona de la inyección con una toallita humedecida en alcohol.
- No elija una zona de la piel que esté dolorida, endurecida, enrojecida o caliente.
- No elija una zona cercana a una vena visible.
- Inyéctese en una zona diferente cada vez.
- No se inyecte Praluent® conjuntamente con otros medicamentos inyectables en la misma zona.




PASO B: cómo inyectarse

- 1- Después de completar todos los pasos del “Paso A: Preparación de la inyección”, retire el capuchón azul
 - No retire el capuchón hasta que esté listo para inyectarse.
 - No vuelva a colocar el capuchón azul.




- 2- Sostener la lapicera de Praluent® de la siguiente manera.
 - No toque el protector amarillo de seguridad.
 - Asegúrese de que se vea la ventana para inspección.



- 3- Presionar el protector amarillo de seguridad sobre la piel formando un ángulo aproximado de 90 °.
 - Presione y agarre con firmeza la lapicera contra el cuerpo hasta que el protector amarillo de seguridad ya no quede a la vista. La lapicera no funcionará si el protector amarillo de seguridad no está pulsado totalmente.
 - Si es necesario, pellizque la piel para asegurarse de que el lugar de la inyección es firme.

sanofiaventis Argentina S.A.
Farm. Valeria W. Berger
MN 15.552 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada



4- Presionar y soltar inmediatamente el botón pulsador verde con el pulgar.

- Escuchará un click. En ese momento habrá empezado la inyección.
- La ventana para inspección comenzará a ponerse de color amarillo.



5- Mantener la lapicera contra la piel después de soltar el botón pulsador

- La inyección puede durar hasta 20 segundos.



6- Comprobar si la ventana para inspección está de color amarillo antes de retirar la lapicera.


- No retire la lapicera hasta que toda la ventana para inspección esté amarilla.
- La inyección se habrá completado cuando la ventana para inspección se haya vuelto completamente amarilla y puede que escuche un segundo click.
- Si la ventana para inspección no se vuelve completamente amarilla, llame a sanofi-aventis para solicitar ayuda. No se administre una segunda dosis sin hablar antes con su médico.

sanofi-aventis Argentina S.A.
 Farm. Valeria Weberger
 MN 15.552 / MP 20.628
 Co-Directora Técnica / Apoderada



7- Retirar la lapicera de la piel.

- No frote la superficie de la piel después de la inyección.
- Si se produce algún sangrado, presione el lugar de la inyección con una bolita de algodón o gasa hasta que deje de sangrar.



8- Desechar la lapicera y el capuchón

- No vuelva a colocar el capuchón azul.
- Deseche la lapicera y el capuchón en un contenedor para objetos punzantes inmediatamente después de su uso.
- Pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero cómo deshacerse del contenedor.
- Mantener siempre el contenedor fuera de la vista y del alcance de los niños.



sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria Wilberger
MN 15.652 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada

**INSTRUCCIONES DE USO DE LA LAPICERA PRELLENADA
PRALUENT® 150 mg**

En la siguiente imagen se muestran las partes de la lapicera de Praluent®



Información importante

Se trata de una lapicera prellenada de un solo uso. Contiene 150 mg de Praluent (alirocumab) en 1 ml.

El medicamento se inyecta bajo la piel y puede administrárselo usted mismo u otra persona. Esta lapicera se debe usar solamente para una inyección y luego se debe desechar.

Qué debe hacer

- ✓ Mantener la lapicera de Praluent® fuera de la vista y del alcance de los niños.
- ✓ Lea todas las instrucciones detenidamente antes de usar la lapicera de Praluent®.
- ✓ Siga estas instrucciones cada vez que use una lapicera de Praluent®.
- ✓ Conserve las lapiceras sin usar en la heladera/refrigerador entre 2 °C y 8 °C. Para más información sobre condiciones de conservación ver la sección 5 "¿Cómo debo conservar y mantener Praluent®?"

Qué no debe hacer

- ✗ No toque el protector amarillo de seguridad.
- ✗ No utilice la lapicera si se ha caído al suelo o está dañada.
- ✗ No utilice la lapicera si falta el capuchón azul de la aguja o no está firmemente sujeto.
- ✗ No reutilice la lapicera.
- ✗ No agite la lapicera.
- ✗ No congele la lapicera.
- ✗ No exponga la lapicera a la luz solar directa.

Conserve este prospecto. Si tiene alguna duda, consulte a su médico

PASO A: Preparación de la inyección

Antes de empezar necesitará:

- la lapicera de Praluent®
- toallitas humedecidas en alcohol
- bolita de algodón o gasa
- un contenedor para objetos punzantes (ver paso B, 8).

1- Mirar la etiqueta de la lapicera.


Compruebe que contiene el medicamento correcto y la dosis correcta.

- Compruebe la fecha de vencimiento de la lapicera; no la utilice si está vencida.



2- Mirar la ventana para inspección.

- Compruebe que el líquido es transparente, entre incoloro y amarillo pálido y que no contiene partículas; en caso contrario, no utilizar la lapicera (ver imagen A).
- Es posible que vea una burbuja de aire. Eso es algo normal.
- No utilice la lapicera si la ventana para inspección tiene un color amarillo sólido (ver imagen B).



3- Deje que la lapicera se adecúe a la temperatura ambiente de 30 a 40 minutos.

- Deje que la lapicera se adecúe a la temperatura ambiente por sí sola, no intente calentarla.
- Utilice la lapicera lo antes posible una vez que esté a temperatura ambiente.
- No vuelva a colocar la lapicera en la heladera/refrigerador.


4- Preparar el lugar de la inyección.

- Lávese las manos con agua y jabón y séqueselas con una toalla.
- Puede inyectárselo en:

- el muslo
 - el vientre (salvo en la zona de 5 cm alrededor del ombligo)
 - la parte superior externa de su brazo
- (Ver imagen).


- Para inyectarse puede estar de pie o sentado.
- Limpie la piel en la zona de la inyección con una toallita humedecida en alcohol.
- No elija una zona de la piel que esté dolorida, endurecida, enrojecida o caliente.
- No elija una zona cercana a una vena visible.
- Inyéctese en una zona diferente cada vez.
- No se inyecte Praluent® conjuntamente con otros medicamentos inyectables en la misma zona.

sanofi-aventis Argentina S.A.
Fatm. Valeria Wilberger
MN 15.552 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada




PASO B: cómo inyectarse


- 1- **Después de completar todos los pasos del “Paso A: Preparación de la inyección”, retire el capuchón azul**
 - No retire el capuchón hasta que esté listo para inyectarse.
 - No vuelva a colocar el capuchón azul




- 2- **Sostener la lapicera de Praluent® de la siguiente manera.**
 - No toque el protector amarillo de seguridad.
 - Asegúrese de que se vea la ventana para inspección.



- 3- **Presionar el protector amarillo de seguridad sobre la piel formando un ángulo aproximado de 90 °.**
 - Presione y agarre con firmeza la lapicera contra el cuerpo hasta que el protector amarillo de seguridad ya no quede a la vista. La lapicera no funcionará si el protector amarillo de seguridad no está pulsado totalmente.
 - Si es necesario, pellizque la piel para asegurarse de que el lugar de la inyección es firme.


sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria V. Bortolotto
MN 15.552 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada




4- Presionar y soltar inmediatamente el botón pulsador gris con el pulgar.

- Escuchará un click. En ese momento habrá empezado la inyección.
- La ventana para inspección comenzará a ponerse de color amarillo.



5- Mantener la lapicera contra la piel después de soltar el botón pulsador

- La inyección puede durar hasta 20 segundos.



6- Comprobar si la ventana para inspección está de color amarillo antes de retirar la lapicera.


- No retire la lapicera hasta que toda la ventana para inspección esté amarilla.
- La inyección se habrá completado cuando la ventana para inspección se haya vuelto completamente amarilla y puede que escuche un segundo clic.

Si la ventana para inspección no se vuelve completamente amarilla, llame a sanofi-aventis para solicitar ayuda. No se administre una segunda dosis sin hablar antes con su médico.



7- Retirar la lapicera de la piel.

- No frote la superficie de la piel después de la inyección.
- Si se produce algún sangrado, presione el lugar de la inyección con una bolita de algodón o gasa hasta que deje de sangrar.



8- Desechar la lapicera y el capuchón

- No vuelva a colocar el capuchón azul.
- Deseche la lapicera y el capuchón en un contenedor para objetos punzantes inmediatamente después de su uso.
- Pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero cómo deshacerse del contenedor.
- Mantener siempre el contenedor fuera de la vista y del alcance de los niños.



MANTENER TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Elaborado por: Sanofi Winthrop Industrie, 1051 Boulevard Industriel, 76580 Le Trait, Francia.
Acondicionado en Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Industriepark Hoechst, Brüningstraße 50,
65926 Frankfurt am Main, Alemania.

sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria V. Abaigar
MN 15.552 / MP 22.628
Co-Directora Técnica / Apoderada



sanofi-aventis Argentina S.A.

Polonia 50, La Tablada, Provincia de Buenos Aires
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado N° 58400
Dirección Técnica: Javier Cirrincione, Farmacéutico
Tel: 011 - 4732 5000
www.sanofi.com.ar

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA.

HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ 0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247

HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648 / 4658-7777

HOSPITAL FERNÁNDEZ: (011) 4808-2655 / 4801-7767

OPTATIVAMENTE OTROS CENTROS DE INTOXICACIONES.

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

sanofi-aventis de Chile S.A.

Mayor información disponible en el Departamento Médico de Sanofi-Aventis, teléfono 2366 7014.

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON EL CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA (CITUC) AL 22 635 3800.

Licenciante: REGENERON Pharmaceuticals Inc., 81 Columbia Turnpike Rensselaer, NY 12144, Connecticut, USA.

Representante exclusivo en Paraguay:

sanofi-aventis Paraguay S.A.

Avenida Costanera y Calle 3, Parque Barrail, Asunción, Paraguay.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S.

Registro Sanitario M.S.P. y B.S. N°: _____.

Director Técnico: Q.F. Jefferson L. Garbin. Registro Profesional N°: 4372.

VENTA BAJO RECETA.

EN CASO DE SOBREDOSIS, FAVOR CONCURRIR AL CENTRO DE TOXICOLOGÍA EMERGENCIAS MÉDICAS. GRAL SANTOS Y TEODORO S. MONGELÓS. TEL. 204 800.

Importado de: sanofi-aventis Argentina S.A.

Distribuido en Paraguay por: Distribuidora la Policlínica S.A.

Representante e Importador en Uruguay

sanofi-aventis Uruguay S.A.

Edificio Corporate El Plata – F. García Cortinas 2357, Piso 7 - Montevideo.

Reg. M.S.P. N° _____ - Ley 15.443.

VENTA BAJO RECETA PROFESIONAL

Dirección Técnica: Q.F. M. José Bocage

EN CASO DE INGESTA ACCIDENTAL O SOBREDOSIS COMUNICARSE CON EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO TOXICOLÓGICO (CIAT): HOSPITAL DE CLÍNICAS AVENIDA ITALIA S/N PISO 7 TEL: 1722.

Última Revisión: CCDS V7_Praluent® pen_PIP_sav002/JFeb20 - Aprobado por Disposición ANMAT N°

sanofi-aventis Argentina S.A.
Farm. Valeria Wilberger
MN 15.552 / MP 20.628
Co-Directora Técnica / Apoderada



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: INFO PACIENTE PRALUENT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 28 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.04.02 14:22:45 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.04.02 14:22:04 -03:00