



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Disposición**

**Número:** DI-2022-3379-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Miércoles 4 de Mayo de 2022

**Referencia:** 1-0047-2001-000710-21-2

---

VISTO el Expediente N° 1-0047-2001-000710-21-2 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones JANSSEN CILAG FARMACEUTICA SA solicita se autorice la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (en adelante REM) de esta Administración Nacional, de una nueva especialidad medicinal, la que será importada a la República Argentina.

Que el producto a registrar se encuentra autorizado para su consumo público en el mercado interno de por lo menos uno de los países que integran el ANEXO I del Decreto 150/92 (Corresponde al Art. 4° de dicho Decreto).

Que las actividades de importación y comercialización de especialidades medicinales se encuentran contempladas por la Ley 16463 y los Decretos 9763/64, 1890/92, y 150/92 (T.O. Decreto 177/93), y normas complementarias.

Que la solicitud presentada encuadra en el Art. 4° del Decreto 150/92 (T.O. Decreto 177/93).

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), a través de sus áreas técnicas competentes, el que considera que el solicitante ha reunido las condiciones exigidas por la normativa vigente, contando con laboratorio propio de control de calidad y depósito, y que la indicación, posología, vía de administración, condición de venta, y los proyectos de rótulos, de prospectos y de información para el paciente se consideran aceptables.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcriptos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas competentes del INAME.

Que el Plan de Gestión de Riesgo, de acuerdo al documento PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO\_VERSION01.PDF / 0 - 11/03/2022 11:15:14 agregado por el recurrente, se encuentra aprobado por la

Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos del Instituto Nacional de Medicamentos mediante el expediente nro. EX 2021-108004490-APN-DGA#ANMAT.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos de esta Administración Nacional, dictamina que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el REM de la especialidad medicinal objeto de la solicitud.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nro. 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º: Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Especialidades Medicinales (REM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de la especialidad medicinal de nombre comercial REKAMBYS y nombre/s genérico/s RILPIVIRINA, la que será importada a la República Argentina, de acuerdo con los datos identificatorios característicos incluidos en el certificado de inscripción, según lo solicitado por la firma JANSSEN CILAG FARMACEUTICA SA.

ARTICULO 2º: Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s, de prospecto/s y de información para el paciente que obran en los documentos denominados INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE\_VERSION03.PDF / 0 - 26/01/2022 11:49:15, PROYECTO DE PROSPECTO\_VERSION03.PDF / 0 - 26/01/2022 11:49:15, PROYECTO DE RÓTULO DE ENVASE PRIMARIO\_VERSION02.PDF / 0 - 26/01/2022 11:49:15, PROYECTO DE RÓTULO DE ENVASE SECUNDARIO\_VERSION01.PDF - 26/10/2021 14:07:15 .

ARTICULO 3º: En los rótulos y prospectos autorizados deberá figurar la leyenda: “ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD, CERTIFICADO N°...”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la norma legal vigente.

ARTICULO 4º: Con carácter previo a la comercialización del producto cuya inscripción se autoriza por la presente disposición, el titular del mismo deberá notificar a esta Administración Nacional la fecha de inicio de la elaboración o importación del primer lote a comercializar a los fines de realizar la verificación técnica consistente en la constatación de la capacidad de producción.

ARTICULO 5º: Establécese que la firma JANSSEN CILAG FARMACEUTICA SA deberá cumplir con el informe periódico del Plan de Gestión de Riesgo aprobado por la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos del Instituto Nacional de Medicamentos.

ARTICULO 6º: En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo precedente, esta Administración Nacional podrá suspender la comercialización del producto aprobado por la presente disposición, cuando consideraciones de salud pública así lo ameriten.

ARTICULO 7º: La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 1º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 8º: Regístrese. Inscríbase el nuevo producto en el Registro Nacional de Especialidades Medicinales. Notifíquese electrónicamente al interesado la presente disposición y los rótulos y prospectos aprobados. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N°: 1-0047-2001-000710-21-2

rl

Digitally signed by LIMERES Manuel Rodolfo  
Date: 2022.05.04 14:06:00 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Manuel Limeres  
Administrador Nacional  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

### **REKAMBYS® RILPIVIRINA 900 mg/3 ml Suspensión inyectable de liberación prolongada**

Únicamente para administración intramuscular en el glúteo  
Industria suiza

Venta bajo receta archivada

**Lea atentamente todo el folleto antes de comenzar a tomar este medicamento, debido a que contiene información importante para usted.**

- Conserve este folleto, es probable que necesite volver a leerlo.
- Si tiene alguna otra duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le prescribió solamente a usted. No debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarlos.
- Si experimenta algún efecto secundario, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este folleto. Ver la sección “Posibles efectos secundarios”.

#### **Contenido del folleto**

1. ¿Qué es REKAMBYS® y para qué se utiliza?
2. ¿Qué necesita saber antes de tomar REKAMBYS®?
3. ¿Cómo se administra REKAMBYS®?
4. Posibles efectos secundarios
5. ¿Cómo almacenar REKAMBYS®?
6. Contenido del envase e información adicional

#### **1. ¿Qué es REKAMBYS® y para qué se utiliza?**

REKAMBYS® contiene el principio activo rilpivirina. Pertenece a un grupo de medicamentos denominados inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa (INNTI) que se utilizan para el tratamiento de la infección por el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1).

REKAMBYS® trabaja en conjunto con otros medicamentos para el VIH para bloquear la capacidad del virus para hacer más copias de sí mismo. Las inyecciones de REKAMBYS® no curan la infección por VIH, pero ayudan a reducir la cantidad de VIH en el organismo y la mantienen en niveles bajos. Esto retrasa el daño al sistema inmunitario y el desarrollo de infecciones y enfermedades asociadas con el SIDA.

REKAMBYS® siempre se administra en combinación con otro medicamento para el VIH denominado cabotegravir inyectable. Se utilizan juntos en adultos de 18 años o más cuya infección por VIH-1 ya está bajo control.

#### **2. ¿Qué necesita saber antes de tomar REKAMBYS®?**

**No utilice REKAMBYS®** si es alérgico a rilpivirina, o a alguno de los otros ingredientes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PIL-IFU\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

**No utilice REKAMBYS® si está tomando alguno de los siguientes medicamentos, ya que podrían afectar el funcionamiento de REKAMBYS® o el otro medicamento:**

- Carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína (medicamentos para tratar la epilepsia y prevenir convulsiones)
- Rifabutina, rifampicina, rifapentina (medicamentos para tratar algunas infecciones bacterianas tales como tuberculosis)
- Dexametasona (un corticosteroide utilizado para diferentes afecciones, tales como inflamación y reacciones alérgicas) como tratamiento oral o inyectable
- Productos que contienen la hierba de san juan (*Hypericum perforatum*, un agente herbal para la depresión)

Si usted está tomando cualquiera de los medicamentos anteriores, consulte a su médico sobre cuáles son las alternativas.

### **Advertencias y precauciones**

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar REKAMBYS®.

REKAMBYS® no es una cura para la infección por VIH. Es parte de un tratamiento para disminuir la cantidad de virus en la sangre. Usted puede transmitir el VIH aun si toma este medicamento, aunque el riesgo disminuye por el tratamiento antirretroviral efectivo. Consulte a su médico sobre las precauciones necesarias para evitar infectar a otras personas.

### **Informe a su médico sobre su situación**

Verifique los siguientes puntos e informe a su médico si cualquiera de ellos aplica a usted.

- Para que el tratamiento tenga éxito, es muy importante que usted asista a todas las visitas programadas para las inyecciones, sin faltar a ninguna visita. Si no puede asistir a una visita planificada, informe a su médico lo antes posible.
- Informe a su médico si tiene o ha tenido **problemas en el hígado**, tales como hepatitis B o C, o **problemas en los riñones**. Su médico puede evaluar el funcionamiento de su hígado o sus riñones antes de decidir si usted puede tomar REKAMBYS®. Ver “Efectos secundarios poco frecuentes” en la sección 4 de este folleto para conocer los signos de daño hepático.
- Informe a su médico de inmediato si nota cualquier síntoma de infecciones (por ejemplo, fiebre, escalofríos, sudoración). En algunos pacientes con VIH, puede aparecer inflamación de infecciones previas poco después de que se inicia el tratamiento para el VIH. Se cree que estos síntomas se deben a una mejoría en la respuesta inmunológica del cuerpo, lo que le permite combatir infecciones que pueden haber estado presentes antes, pero sin otros síntomas obvios.
- Avise a su médico de inmediato si observa síntomas tales como debilidad muscular, debilidad que comienza en manos y pies y asciende hacia el torso, palpitaciones, temblores o hiperactividad. Esto se debe a que también pueden producirse trastornos autoinmunes (afecciones en las que el sistema inmunitario ataca por error el tejido corporal sano) después de que comience a tomar medicamentos para el tratamiento de la infección por VIH. Los trastornos autoinmunes pueden producirse muchos meses después del inicio del tratamiento.
- Informe a su médico si está tomando cualquier medicamento que sepa que puede causar un ritmo cardiaco irregular potencialmente mortal (Torsade de Pointes).

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PIL-IFU\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

### Reacciones a las inyecciones

En algunas personas, los síntomas de reacción posteriores a la inyección han ocurrido minutos después de recibir la inyección de rilpivirina. La mayoría de los síntomas desaparecieron unos minutos después de la inyección. Los síntomas de las reacciones posteriores a la inyección pueden incluir: dificultad para respirar, calambres estomacales, erupción, sudoración, entumecimiento de la boca, sensación de ansiedad, sensación de calor, sensación de mareo o sensación de que se va a desmayar, cambios en la presión arterial, y dolor (por ejemplo, espalda y pecho). Informe a su médico si experimenta estos síntomas después de recibir las inyecciones.

### Las citas regulares son importantes

Es importante que **asista a las citas programadas** para recibir REKAMBYS®, para controlar su infección por el VIH y evitar que su enfermedad empeore. No omita ninguna cita, es muy importante para el éxito de su tratamiento. Si no puede asistir a una cita planificada, informe a su médico lo antes posible. Hable con su médico si está pensando en interrumpir el tratamiento. Si se retrasa en recibir su inyección de REKAMBYS®, o si deja de recibir REKAMBYS®, deberá tomar otros medicamentos para tratar la infección por VIH y para reducir el riesgo de que el virus se vuelva resistente, ya que los niveles del medicamento en su cuerpo serán demasiado bajos para tratar la infección por VIH.

### Niños

REKAMBYS® no debe utilizarse en niños y adolescentes menores de 18 años, debido a que no se ha estudiado en estos pacientes.

### Otros medicamentos y REKAMBYS®

Informe a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o va a tomar cualquier otro medicamento. Algunos medicamentos pueden afectar los niveles de REKAMBYS® en la sangre cuando se toman al mismo tiempo que REKAMBYS®, o REKAMBYS® puede afectar el funcionamiento del otro medicamento.

**No use REKAMBYS® si usted está tomando alguno de los siguientes medicamentos**, ya que podrían afectar como REKAMBYS® o el otro medicamento funciona:

- Carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína (medicamentos para tratar la epilepsia y prevenir las convulsiones)
- Rifabutina, rifampicina, rifapentina (medicamentos para tratar algunas infecciones bacterianas, tales como tuberculosis)
- Dexametasona (un corticoesteroide usado en variadas condiciones, tales como inflamación y reacciones alérgicas), oral o inyección como vía de tratamiento.
- Productos que contienen la hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*, un remedio herbal usado para la depresión)

Si está tomando alguno de dichos medicamentos, consulte a su médico por otras alternativas.

**Los efectos de REKAMBYS® o de otros medicamentos pueden cambiar** si usted toma REKAMBYS® junto con cualquiera de los siguientes medicamentos:

- Claritromicina, eritromicina (antibióticos)
- Metadona (para el tratamiento de la abstinencia y dependencia de narcóticos)

### Embarazo y lactancia

Informe a su médico de inmediato si usted está embarazada o planea quedar embarazada. Su médico considerará el beneficio y el riesgo para usted y su bebé de utilizar REKAMBYS®

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PIL-IFU\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

mientras está embarazada. Si usted planea quedar embarazada, consulte a su médico previamente, ya que la rilpivirina puede permanecer en el cuerpo por hasta 4 años o más después de la última inyección de REKAMBYS®.

Las madres con VIH no deben amamantar, ya que existe la posibilidad de infectar al bebé con VIH a través de la leche materna.

Consulte a su médico antes de tomar cualquier medicamento.

### Conducir y utilizar máquinas

Algunos pacientes pueden experimentar cansancio, mareos o somnolencia durante el tratamiento con REKAMBYS®. No conduzca ni opere maquinaria si presenta cualquiera de estos efectos secundarios.

### Información importante sobre alguno de los ingredientes de REKAMBYS®

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) cada 3 ml de inyección, esto es decir que es esencialmente “libre de sodio”.

### 3. ¿Cómo se administra REKAMBYS®?

Un enfermero o médico le dará REKAMBYS® por medio de una inyección en el glúteo (inyección intramuscular, o IM).

Usted recibirá su inyección de REKAMBYS® **una vez cada 2 meses**, junto con otro medicamento inyectable denominado cabotegravir. Su médico le explicará con qué frecuencia se le administrará el medicamento.

**Cuando comience el tratamiento con REKAMBYS®**, usted y su médico pueden decidir comenzar con un tratamiento diario de un comprimido de 25 mg de rilpivirina con una comida y un comprimido de 30 mg de cabotegravir durante un mes antes de su primera inyección de REKAMBYS®. Esto se denomina *período de inicio*. Al tomar los comprimidos antes de recibir las inyecciones de REKAMBYS® y cabotegravir, su médico podrá saber cuán bien usted tolera estos medicamentos.

La otra opción es que usted y su médico pueden decidir comenzar directamente con las inyecciones de REKAMBYS®.

Si usted recibirá REKAMBYS® cada 2 meses, su tratamiento será el siguiente:

	Cuando	
Medicamento	Primera y segunda inyección con un mes de diferencia	A partir de la tercera inyección, cada dos meses
Rilpivirina	Inyección única de 900 mg	Inyección de 900 mg cada 2 meses
Cabotegravir	Inyección única de 600 mg	Inyección de 600 mg cada 2 meses

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PIL-IFU\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

### Si usted omite una inyección de REKAMBYS®

Es importante que cumpla con sus citas planificadas regulares para recibir su inyección. Si usted omite una cita, comuníquese con su médico de inmediato para programar una nueva cita.

**Avise a su médico** si piensa que no podrá recibir su inyección de REKAMBYS® en el momento habitual. Su médico le recomendará que tome comprimidos en su lugar, hasta que esté en condiciones de volver a recibir una inyección de REKAMBYS®.

### Si recibiera demasiado REKAMBYS®

Un médico o enfermero le dará este medicamento a usted, por lo que es improbable que reciba demasiado. Si esto le preocupa, consulte a su médico o enfermero.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología de:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez – Tel: (011) 4962-6666 / 2247

Hospital A. Posadas – Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777

### No deje de tomar REKAMBYS® sin consultar a su médico.

Tome REKAMBYS® durante el tiempo que su médico lo recomiende. No deje de tomarlo, a menos que su médico le aconseje hacerlo.

Rilpivirina (el principio activo de REKAMBYS®) puede permanecer en niveles bajos en su organismo por hasta 4 años después de suspender el tratamiento. Sin embargo, una vez que haya recibido la última dosis de REKAMBYS®, los niveles bajos de rilpivirina que permanezcan no funcionarán lo suficientemente bien contra el virus y este puede volverse resistente. Para mantener su infección por VIH-1 bajo control y evitar que el virus se vuelva resistente, debe comenzar un tratamiento diferente contra el VIH en el momento de su próxima inyección planificada de REKAMBYS®.

## 4. Posibles efectos secundarios

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede causar efectos secundarios, aunque no todas las personas los experimentan.

A continuación, se presenta una lista de efectos secundarios que se informaron cuando se utilizó REKAMBYS® en combinación con inyección de cabotegravir.

Efectos secundarios muy frecuentes (afectan al menos a 1 de cada 10 personas)

- Dolor de cabeza
- Reacciones en el sitio de inyección (generalmente son leves o moderadas y se vuelven menos frecuentes con el tiempo). Los síntomas pueden incluir:
  - Muy frecuentes: dolor y malestar, una masa o bulto endurecidos
  - Frecuentes: enrojecimiento, picazón, hinchazón, calor o moretones (que puede incluir decoloración o un acúmulo de sangre debajo de la piel)
  - Poco frecuentes: entumecimiento, sangrado leve, absceso (acumulación de pus) o celulitis (calor, hinchazón o enrojecimiento)
- Sensación de calor/fiebre (*pirexia*)

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PIL-IFU\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

## Efectos secundarios frecuentes (afectan a menos de 1 de cada 10 personas)

- Depresión
- Ansiedad
- Sueños anormales
- Dificultad para dormir (*insomnio*)
- Mareos
- Náuseas
- Vómitos
- Dolor de panza (*dolor abdominal*)
- Gases (*flatulencia*)
- Diarrea
- Erupción cutánea
- Dolor muscular (*mialgia*)
- Cansancio (*fatiga*)
- Sensación de debilidad (*astenia*)
- Malestar general
- Aumento de peso

## Efectos secundarios poco frecuentes (afectan a menos de 1 de cada 100 personas)

- Somnolencia
- Sensación de mareo, durante o después de una inyección. Esto puede provocar desmayos.
- Daño hepático (los signos pueden incluir coloración amarillenta de la piel y el blanco de los ojos, pérdida del apetito, picazón, sensibilidad en el abdomen, heces de color claro u orina inusualmente oscura).
- Cambios en los análisis de sangre hepáticos (aumento de *transaminasas*)
- Aumento de *bilirrubina* (una sustancia producida por el hígado) en la sangre.

## Otros efectos secundarios

- Dolor abdominal grave causado por inflamación del páncreas (*pancreatitis*)

Los siguientes efectos secundarios que pueden ocurrir con los comprimidos de rilpivirina también pueden ocurrir con la inyección de REKAMBYS®:

## Efectos secundarios muy frecuentes

- Aumento del colesterol y/o amilasa pancreática en la sangre

## Efectos secundarios frecuentes (afectan a menos de 1 de cada 10 personas)

- Disminución del apetito
- Trastornos del sueño
- Estado de ánimo depresivo
- Malestar estomacal
- Boca seca
- Bajo recuento de células sanguíneas blancas y/o plaquetas, disminución de la hemoglobina en sangre, aumento de los triglicéridos y/o lipasa en la sangre

## Efectos secundarios poco frecuentes (afectan a menos de 1 de cada 100 personas)

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PIL-IFU\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

- Signos o síntomas de inflamación o infección, por ejemplo, fiebre, escalofríos, sudoración (*síndrome de reactivación inmune; consultar sección 2 para ver más detalles*)

### **Notificación de efectos secundarios**

Si experimenta algún efecto secundario consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este folleto. También puede notificarlos directamente a través del sistema nacional de notificación. Mediante la notificación de efectos secundarios, usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

### **5. Cómo almacenar REKAMBYS®**

Conservar en la heladera entre 2°C y 8°C. No congelar.

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en la caja. La fecha de vencimiento corresponde al último día del mes que se indica.

No debe tirar ningún medicamento por los desagües ni a la basura. Pregunte a su médico cómo deshacerse de los medicamentos que ya no utiliza. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

### **6. Contenido del envase e información adicional**

#### **Qué contiene REKAMBYS®**

El principio activo es rilpivirina.

Cada vial de 3 ml contiene: Rilpivirina 900 mg de rilpivirina (como rilpivirina base).

Excipientes: Poloxámero 338, ácido cítrico monohidratado, glucosa monohidratada, fosfato diácido de sodio monohidratado, hidróxido de sodio, agua para inyectables.

Cada inyección contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg), y es esencialmente “libre de sodio”.

#### **Aspecto de REKAMBYS® y contenido del envase**

REKAMBYS® se presenta en envases conteniendo 1 vial de 3 ml, 1 adaptador de vial, 1 jeringa y 1 aguja para inyección.

*Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la  
Página Web de la ANMAT:*

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>

o

*llamar a ANMAT responde 0800-333-1234*

### **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PIL-IFU\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

Producto: REKAMBYS®

Nro de registro:



Elaborado y acondicionamiento primario por: Cilag AG, Hochstrasse 201, Schaffhausen, Suiza.

Acondicionamiento secundario por: Stiftung Altra Schaffhausen, Mühlenstrasse 56, Schaffhausen, Suiza.

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A.

Mendoza 1259, C1428DJG, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°:

Directora Técnica: Farm. Georgina Rodriguez

**Centro de Atención al Cliente**

**Por correo electrónico:** [infojanssen@janar.jnj.com](mailto:infojanssen@janar.jnj.com)

**Por teléfono:** 0800 122 0238

® Marca Registrada

**Fecha de última revisión:**

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PIL-IFU\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

## INSTRUCCIONES DE USO

**REKAMBYS®**  
**RILPIVIRINA 900 mg/3 ml**  
**Suspensión inyectable de liberación prolongada**

Únicamente para administración intramuscular en el glúteo  
Industria suiza

Venta bajo receta archivada

### **Resumen**

Una dosis completa requiere dos inyecciones:  
3 ml de cabotegravir y 3 ml de rilpivirina.  
Cabotegravir y rilpivirina son suspensiones que no necesitan más dilución o reconstitución. Los pasos de preparación para ambos medicamentos son los mismos.  
Cabotegravir y rilpivirina son para uso intramuscular solamente. Ambas inyecciones deben ser administradas en las regiones glúteas. El orden de la administración no es importante.

 **Nota: Se recomienda la región ventroglútea.**

### **Información de almacenamiento**

Almacenar en la heladera a una temperatura de 2°C a 8°C.

 **No congelar.**


Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PIL-IFU\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

<p><b>Vial de rilpivirina</b></p>  <p><b>Tapa del vial</b> (Con tapón de goma bajo la tapa)</p>	<p><b>Adaptador del vial</b></p> 
<p><b>Jeringa</b></p>  <p><b>Émbolo</b></p>	<p><b>Aguja de inyección</b></p>  <p><b>Protector de la aguja</b></p> <p><b>Capuchón de la aguja</b></p>
<p><b>El envase contiene</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 vial de rilpivirina</li> <li>• 1 adaptador para vial</li> <li>• 1 jeringa</li> <li>• 1 aguja de inyección (calibre 23, 1½ pulgada)</li> </ul> <p>Considere la constitución del paciente y use su criterio médico para seleccionar una longitud adecuada de la aguja de inyección.</p>	
<p><b>También necesitará</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guantes no estériles</li> <li>• 2 toallitas humedecidas con alcohol</li> <li>• 2 gasas</li> <li>• Un envase para elementos punzocortantes</li> <li>• 1 envase de cabotegravir de 3 ml</li> <li>• Asegúrese de tener el envase de cabotegravir cerca antes de comenzar</li> </ul>	
<p><b>Preparación</b></p>	
<p><b>1. Inspeccione el vial</b></p>	

Specialist: NP


MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PIL-IFU\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

Verifique la fecha de vencimiento y el medicamento



- Verifique que no haya pasado la fecha de vencimiento.
- Inspeccione los viales inmediatamente. Si usted puede ver material extraño, no use el producto.

**No** use el producto si ya ha pasado la fecha de vencimiento.

## 2. Espere 15 minutos



Espera 15 minutos



- Espere al menos 15 minutos antes de que esté listo para dar la inyección para permitir que el medicamento alcance la temperatura ambiente.

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:


AR\_RILP\_suspINJ\_PIL-IFU\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

### 3. Agite vigorosamente




- Sostenga el vial con firmeza y agítelo vigorosamente durante 10 segundos completos, como se muestra.
- Invierta el vial y compruebe la resuspensión. Debe tener un aspecto uniforme. Si la suspensión no es uniforme, vuelva a agitar el vial.
- También es normal ver pequeñas burbujas de aire.

### 4. Retire la tapa del vial



- Retire la tapa del vial.
  - Limpie el tapón de goma con una toallita humedecida con alcohol.
- ⚠ No permita que nada toque el tapón de goma después de limpiarlo.**

### 5. Abra el adaptador del vial



- Retire la cubierta de papel del envase del adaptador del vial.
- ⚠ Nota:** Mantenga el adaptador en su lugar en el envase para el siguiente paso.

Specialist: NP


MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:


AR\_RILP\_suspINJ\_PIL-IFU\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

## 6. Coloque el adaptador del vial




- Presione el adaptador del vial directamente hacia abajo dentro del vial utilizando el envase como se muestra.  
El adaptador del vial debe ajustarse de manera segura en su lugar.
- Cuando esté listo, levante hacia arriba el envase del adaptador del vial como se muestra.

## 7. Prepare la jeringa



- Retire la jeringa del envase.
- Introduzca 1 ml de aire dentro de la jeringa. Esto hará más fácil extraer el líquido después.

## 8. Coloque la jeringa



- Sostenga firmemente el adaptador del vial y el vial, como se muestra.
- Enrosque la jeringa firmemente dentro del adaptador del vial.
- Presione completamente el émbolo hacia abajo para empujar el aire dentro del vial.

Specialist: NP


MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:


AR\_RILP\_suspINJ\_PIL-IFU\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

### 9. Extraiga lentamente la dosis




- Invierta la jeringa y el vial y extraiga lentamente tanto líquido como sea posible dentro de la jeringa. Puede haber más líquido que la cantidad necesaria para la dosis.

### 10. Desenrosque la jeringa



- Desenrosque la jeringa del adaptador del vial, sosteniendo el adaptador para vial como se muestra.
- Nota:** Mantenga la jeringa en posición vertical para evitar filtraciones. Verifique que la suspensión tenga un aspecto uniforme y un color blanco lechoso.

### 11. Coloque la aguja



- Descubra el envase de la aguja lo suficiente para exponer la base de la aguja.
- Manteniendo la jeringa en posición vertical, gírela firmemente sobre la aguja.
- Retire el envase de la aguja.

Specialist: NP

MAF: LGS


QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PIL-IFU\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

## Inyección

### 12. Prepare el lugar de la inyección




Las inyecciones deben administrarse en las regiones glúteas. Seleccione una de las siguientes áreas para la inyección:

- Ventroglútea (recomendada)
- Dorsoglútea (cuadrante superior externo)

**Nota:** Para uso intramuscular glúteo únicamente.


**No inyectar por vía intravenosa.**

### 13. Retire la cubierta



- Doble el protector de la aguja a medida que lo separa de la aguja.
- Retire la cubierta de la aguja de inyección.


### 14. Retire el líquido adicional



- Sostenga la jeringa con la aguja apuntando hacia arriba.
- Presione el émbolo a la dosis de 3 ml para retirar el líquido adicional y cualquier burbuja de aire.

**Nota:** Limpie el lugar de la inyección con una toallita humedecida con alcohol. Deje secar la piel al aire antes de continuar.


### 15. Estire la piel



Use la técnica de inyección en Z para minimizar la filtración del medicamento del lugar de la inyección.


- Con firmeza, arrastre la piel que recubre el lugar de la inyección, desplazándola aproximadamente 2,5 cm.
- Sosténgala en esta posición para la inyección.

### 16. Inserte la aguja



- Inserte la aguja todo lo que se pueda, o lo suficientemente profunda para alcanzar al músculo.

### 17. Inyecte la dosis



- Aun sosteniendo la piel estirada, lentamente presione el émbolo completamente hacia abajo.
- Asegúrese que la jeringa esté vacía.
- Retire la aguja y suelte la piel estirada inmediatamente.

Specialist: NP


MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PIL-IFU\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es


### 18. Evalúe el lugar de la inyección



- Aplique presión en el lugar de la inyección con una gasa.
- Se puede utilizar un pequeño vendaje si hay sangrado.

**No** masajee el área.


### 19. Haga que la aguja sea segura



- Doble el protector de la aguja sobre la aguja.
- Aplique presión suave usando una superficie dura para bloquear el protector de la aguja.
- El protector de la aguja hará un clic cuando se bloquee.

### Después de la inyección

### 20. Elimine de manera segura



- Elimine las agujas, jeringas, viales y adaptadores para viales usados de acuerdo con las leyes de salud y seguridad locales.

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PIL-IFU\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

## Repita para el 2<sup>do</sup> medicamento



**Repita todos los pasos  
para el 2<sup>do</sup> medicamento**

Si aún no ha inyectado ambos medicamentos, siga los pasos para preparación e inyección de cabotegravir, que tiene sus propias instrucciones de uso específicas.

## Preguntas y respuestas

### 1. ¿Durante cuánto tiempo puede dejarse el medicamento fuera de la heladera?

Conviene inyectar el medicamento tan pronto como alcance la temperatura ambiente. Sin embargo, el vial puede guardarse en la caja a temperatura ambiente (temperatura máxima de 25°C) por hasta 6 horas. Si no se usa después de las 6 horas, debe ser descartado.

### 2. ¿Durante cuánto tiempo puede dejarse el medicamento en la jeringa?

Conviene inyectar el medicamento (a temperatura ambiente) tan pronto como sea posible después de extraerlo. Sin embargo, el medicamento puede permanecer en la jeringa por hasta 2 horas antes de inyectarlo.

Si pasan más de 2 horas, el medicamento, la jeringa y la aguja deben descartarse.

### 3. ¿Por qué necesito inyectar aire dentro del vial?

La inyección de 1 ml de aire dentro del vial facilita extraer la dosis dentro de la jeringa. Sin el aire, parte del líquido puede retroceder hacia el vial accidentalmente, dejando una cantidad menor a la deseada en la jeringa.

### 4. ¿Importa el orden en el que administre los medicamentos?

No, el orden no es importante.

### 5. ¿Es seguro calentar el vial hasta temperatura ambiente más rápidamente?

Conviene dejar que el vial alcance la temperatura ambiente de forma natural. Sin embargo, puede usar el calor de sus manos para acelerar el tiempo de calentamiento, pero asegure que el vial no supere los 25°C.

No use ningún otro método de calentamiento.

### 6. ¿Por qué se recomienda la administración por vía ventroglútea?

Se recomienda el acceso ventroglútea, hacia el músculo glúteo medio, porque se localiza lejos de nervios y vasos sanguíneos importantes. El acceso dorsoglúteo, hacia el músculo glúteo mayor, es aceptable, si así lo prefiere el profesional sanitario. La inyección no debe administrarse en ninguna otra región.

*Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la  
Página Web de la ANMAT:*

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PIL-IFU\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

Producto: REKAMBYS®

Nro de registro:



o

llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

## MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado y acondicionamiento primario por: Cilag AG, Hochstrasse 201, Schaffhausen, Suiza.

Acondicionamiento secundario por: Stiftung Altra Schaffhausen, Mühlenstrasse 56, Schaffhausen, Suiza.

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A.  
Mendoza 1259, C1428DJG, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina  
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado N°:  
Directora Técnica: Farm. Georgina Rodriguez

### Centro de Atención al Cliente

Por correo electrónico: [infojanssen@janar.jnj.com](mailto:infojanssen@janar.jnj.com)

Por teléfono: 0800 122 0238

® Marca Registrada

Fecha de última revisión:



BRUNO MAGNASCO Claudia Andrea  
CUIL 27180692407



LIMERES Manuel Rodolfo  
CUIL 20047031932

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PIL-IFU\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

## **FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**

### **REKAMBYS® RILPIVIRINA 900 mg/3 ml Suspensión inyectable de liberación prolongada**

Únicamente para administración intramuscular en el glúteo  
Industria suiza

Venta bajo receta archivada

#### **COMPOSICIÓN**

Cada vial de 3 ml contiene: Rilpivirina 900 mg (como rilpivirina base).  
Excipientes: Poloxámero 338 150 mg, ácido cítrico monohidratado 3 mg, glucosa monohidratada 57.75 mg, fosfato diácido de sodio monohidratado 6 mg, hidróxido de sodio 2.598 mg, agua para inyectables c.s.p. 3 ml.

Cada inyección contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg), y es esencialmente “libre de sodio”.

#### **ACCIÓN TERAPÉUTICA**

Grupo farmacoterapéutico: Antiviral para uso sistémico, inhibidores no nucleosídicos de la transcriptasa inversa, código ATC: J05AG05

#### **INDICACIONES**

REKAMBYS® está indicado, en combinación con la inyección de cabotegravir, para el tratamiento de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana tipo 1 (VIH-1) en adultos virológicamente suprimidos (ARN del VIH-1 <50 copias/ml) bajo un régimen antirretroviral estable, sin evidencia actual o pasada de resistencia viral y sin fracaso virológico previo a agentes de las clases Inhibidores No Nucleosídicos de la Transcriptasa Reversa (INNTR) e Inhibidores de la Integrasa (INI).

#### **PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS**

##### **Propiedades farmacodinámicas**

###### Mecanismo de acción

Rilpivirina es una diarilpirimidina inhibidora no nucleosídica de la transcriptasa inversa (INNTR) del VIH-1. La actividad de rilpivirina está mediada por inhibición no competitiva de la transcriptasa inversa (RT) del VIH-1. Rilpivirina no inhibe las ADN polimerasas celulares humanas,  $\alpha$ ,  $\beta$  y  $\gamma$ .

###### Actividad antiviral *in vitro*

Rilpivirina exhibió actividad contra cepas de laboratorio de VIH-1 de tipo silvestre en una línea de células T infectadas agudamente con un valor de la mediana de EC<sub>50</sub> para VIH-1/IIIB de

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

0,73 nM (0,27 ng/ml). Aunque rilpivirina demostró una actividad limitada *in vitro* contra el VIH-2, con valores de EC<sub>50</sub> de entre 2510 y 10830 nM (920 a 3970 ng/ml), el tratamiento de la infección por VIH-2 con rilpivirina no está recomendado en ausencia de datos clínicos.

Rilpivirina también demostró actividad antiviral contra un panel amplio de aislados primarios del grupo M del VIH-1 (subtipos A, B, C, D, F, G, H) con valores de EC<sub>50</sub> de entre 0,07 a 1,01 nM (0,03 a 0,37 ng/ml) y aislados primarios del grupo O con valores de EC<sub>50</sub> de entre 2,88 y 8,45 nM (1,06 a 3,10 ng/ml).

### Resistencia

Considerando todos los datos *in vitro* e *in vivo* disponibles generados con rilpivirina oral en pacientes no tratados previamente, las siguientes mutaciones asociadas a resistencia pueden afectar la actividad de rilpivirina cuando están presentes al inicio del estudio: K101E, K101P, E138A, E138G, E138K, E138R, E138Q, V179L, Y181C, Y181I, Y181V, Y188L, H221Y, F227C, M230I, M230L, y la combinación de L100I y K103N.

### *En cultivo celular*

Las cepas resistentes a rilpivirina se seleccionaron en cultivo celular, comenzando por VIH-1 de tipo silvestre de diferentes orígenes y subtipos, así como VIH-1 resistente a INNTR. Las mutaciones asociadas a resistencia observadas con mayor frecuencia incluyeron L100I, K101E, V108I, E138K, V179F, Y181C, H221Y, F227C y M230I.

### *Pacientes con supresión virológica*

La cantidad individuos que cumplieron con los criterios de fracaso virológico confirmado (FVC) fue bajo entre los estudios agrupados de Fase 3, ATLAS y FLAIR. Hubo 7 FVC con rilpivirina más cabotegravir (7/591; 1,2%) y 7 FVC con el régimen antirretroviral actual (7/591; 1,2%) hasta la semana 48. En el grupo de rilpivirina más cabotegravir en el análisis agrupado, 5/591 (0,8%) individuos desarrollaron resistencia: 5/591 (0,8%) y 4/591 (0,7%) con mutaciones asociadas a la resistencia a rilpivirina (K101E [n=1], E138A/E/K/T [n=1], E138A [n=1] o E138K [n=2]) y/o cabotegravir (G140R [n=1], Q148R [n=2] o N155H [n=1]), respectivamente. Las 4 FVC con cabotegravir más rilpivirina en FLAIR tenían el subtipo VIH-1 A1 (n=3) o AG (n=1). Una FVC en FLAIR nunca recibió una inyección. Las 3 FVC con cabotegravir más rilpivirina en ATLAS tenían el subtipo VIH-1 A, A1 o AG. En 2 de estas 3 FVC, las mutaciones asociadas a la resistencia a rilpivirina observadas en el momento de fracaso virológico también se observaron al inicio del estudio en el ADN del VIH-1 de PBMC.

En el estudio ATLAS-2M, 10 individuos cumplieron los criterios de FVC hasta la semana 48: 8/522 (1,5%) en el grupo de c8s y 2/523 (0,4%) en el grupo de c4s. En el grupo de c8s, 5/522 (1,0%) desarrollaron resistencia: 4/522 (0,8%) y 5/522 (1,0%) con mutaciones asociadas a la resistencia a rilpivirina (E138A [n=1], E138K [n=1], K101E [n=2], o Y188L [n=1]) y/o cabotegravir (Q148R [n=3] o N155H [n=4]), respectivamente. En el grupo de c4s, 2/523 (0,4%) desarrollaron resistencia: 1/523 (0,2%) y 2/523 (0,4%) tuvieron mutaciones asociadas a la resistencia a rilpivirina (K101E [n=1], M230L [n=1]) y/o cabotegravir (E138K [n=1], Q148R [n=1] o N155H [n=1]), respectivamente. Al inicio del estudio en el grupo de c8s, 5 individuos tenían mutaciones asociadas a la resistencia a rilpivirina y 1 de ellos portaba una mutación asociada a la resistencia a cabotegravir. Ninguno de los individuos del grupo de c4s tenía ninguna mutación asociada a la resistencia a rilpivirina o cabotegravir al inicio del estudio. Las 10 FVC con cabotegravir más rilpivirina en ATLAS-2M tenían el subtipo A (n=1), A1 (n=2), B (n=4), C (n=2) del VIH-1 o el Complejo (n=1).

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

### Resistencia cruzada

#### *Virus mutante INNTR dirigido*

En un panel de 67 cepas de laboratorio recombinantes de VIH-1 con una mutación en posiciones de RT asociada con resistencia a INNTR, incluidas las más comúnmente encontradas, K103N y Y181C, rilpivirina mostró actividad antiviral contra 64 (96%) de estas cepas. Las mutaciones únicas asociadas a resistencia relacionadas con pérdida de susceptibilidad a rilpivirina fueron: K101P, Y181I y Y181V. La mutación K103N no produjo una menor susceptibilidad a rilpivirina por sí misma, pero la combinación de K103N y L100I produjo una susceptibilidad 7 veces menor a rilpivirina.

#### *Aislados clínicos recombinantes*

Rilpivirina retuvo sensibilidad (Factor de Cambio  $\leq$  Punto de Corte Biológico) contra el 62% de 4786 aislados clínicos recombinantes del VIH-1 resistentes a efavirenz y/o a nevirapina.

#### *Pacientes suprimidos virológicamente*

En el análisis de la Semana 48 de los estudios de Fase 3 ATLAS y FLAIR, 5/7 FVC tuvieron resistencia fenotípica contra rilpivirina en el fracaso virológico. Ente estos 5 pacientes, se observó resistencia cruzada fenotípica contra efavirenz (n=4), etravirina (n=3) y nevirapina (n=4).

### Efectos sobre el electrocardiograma

No se mostró ningún efecto sobre el intervalo QTcF para rilpivirina oral a la dosis recomendada de 25 mg una vez al día en un estudio aleatorizado, cruzado, controlado con placebo y principio activo (moxifloxacina 400 mg una vez al día) en 60 adultos sanos, con 13 mediciones durante 24 horas en estado estacionario. Las concentraciones plasmáticas de rilpivirina después de las inyecciones de REKAMBYS® son comparables a aquellas logradas con rilpivirina oral a una dosis de 25 mg diaria. REKAMBYS® a la dosis recomendada de 600 mg mensualmente o 900 mg cada 2 meses no se asocia con un efecto clínicamente relevante sobre el QTc.

Cuando se estudiaron las dosis supraterapéuticas de 75 mg una vez al día y 300 mg una vez al día de rilpivirina oral en adultos sanos, las diferencias medias máximas emparejadas por tiempo (límite de confianza superior del 95%) en el intervalo QTcF con respecto al placebo después de la corrección inicial fueron de 10,7 (15,3) y 23,3 (28,4) ms, respectivamente. La administración en estado estacionario de rilpivirina oral 75 mg una vez al día y 300 mg una vez al día produjo una media de  $C_{m\acute{a}x}$  de aproximadamente 4,4 veces y 11,6 veces, respectivamente, más altas que la media de  $C_{m\acute{a}x}$  en el estado estacionario observada con la dosis recomendada de 600 mg una vez al mes de REKAMBYS®. La administración en estado estacionario de rilpivirina oral 75 mg una vez al día y 300 mg una vez al día produjo una media de  $C_{m\acute{a}x}$  de aproximadamente 4,1 veces y 10,7 veces, respectivamente, más altas que la media de  $C_{m\acute{a}x}$  en el estado estacionario observada con la dosis recomendada de 900 mg cada 2 meses de REKAMBYS®.

### Eficacia clínica y seguridad

#### Administración cada 1 mes

La eficacia de la inyección de REKAMBYS® más cabotegravir se evaluó en dos estudios de no inferioridad de Fase 3 aleatorizados, multicéntricos, controlados con activo, de grupos paralelos, abiertos, FLAIR (201584) y ATLAS (201585). El análisis primario se realizó después de que todos los individuos finalizaron su visita de la Semana 48 o interrumpieron la

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

participación en el estudio prematuramente.

*Pacientes con supresión virológica (en régimen previo a base de dolutegravir durante 20 semanas)*

En FLAIR, 629 individuos infectados por VIH-1 sin tratamiento antirretroviral previo (ART), recibieron un régimen que contenía un inhibidor de transferencia de la cadena de integrasa de dolutegravir (INI) durante 20 semanas (ya fuera dolutegravir/abacavir/lamivudina o dolutegravir + otros 2 inhibidores nucleosídicos de la transcriptasa inversa si los individuos eran positivos para HLA-B\*5701). Los individuos con supresión virológica (ARN de VIH-1 <50 copias por ml, n=566) fueron aleatorizados (1:1) para recibir un régimen de rilpivirina más cabotegravir o para permanecer en el TAR. Los individuos aleatorizados para recibir el régimen de rilpivirina más cabotegravir iniciaron tratamiento con una administración de inicio por vía oral con un comprimido de cabotegravir (30 mg) más un comprimido de rilpivirina (25 mg) durante al menos 4 semanas, seguido de tratamiento con la inyección de cabotegravir (mes 1: 600 mg, del mes 2 en adelante: inyección de 400 mg) más inyección de rilpivirina (mes 1: inyección de 900 mg, del mes 2 en adelante: inyección de 600 mg), mensualmente, por hasta 96 semanas.

*Pacientes con supresión virológica (estables con ART previo durante al menos 6 meses)*

En ATLAS, 616 individuos infectados por VIH-1, tratados previamente con ART, con supresión virológica (durante al menos 6 meses) (ARN de VIH-1 <50 copias por ml) fueron aleatorizados (1:1) y recibieron un régimen de rilpivirina más cabotegravir o permanecieron en el TAR. Los individuos aleatorizados para recibir el régimen de rilpivirina más cabotegravir iniciaron tratamiento con una administración de inicio por vía oral con un comprimido de cabotegravir (30 mg) más un comprimido de rilpivirina (25 mg) durante al menos 4 semanas, seguido de tratamiento con la inyección de cabotegravir (mes 1: 600 mg, del mes 2 en adelante: inyección de 400 mg) más inyección de rilpivirina (mes 1: inyección de 900 mg, del mes 2 en adelante: inyección de 600 mg), mensualmente, durante 44 semanas adicionales. En ATLAS, el 50%, 17%, y 33% de los individuos recibieron un INNTR, un PI, o un INI (respectivamente) como tercer clase de agente de tratamiento basal antes de la aleatorización y esto fue similar entre los grupos de tratamiento.

*Estudios Fase 3 agrupados*

Al inicio, en el análisis agrupado, en el grupo de rilpivirina más cabotegravir, la mediana de edad de los individuos fue de 38 años, el 27% eran mujeres, el 27% eran no blancos, el 1% tenían  $\geq 65$  años de edad y el 7% tenían recuentos de células CD4+ menores a 350 células por  $\text{mm}^3$ ; estas características fueron similares entre los grupos de tratamiento.

El principal criterio de valoración de ambos estudios fue la proporción de individuos con ARN de VIH-1 plasmático  $\geq 50$  copias/ml en la semana 48 (algoritmo instantáneo para la población por ITT-E).

En un análisis agrupado de los dos estudios Fase 3, rilpivirina más cabotegravir no fue inferior al TAR en la proporción de individuos que tenían ARN de VIH-1 plasmático  $\geq 50$  copias/ml (1,9% y 1,7% respectivamente) en la semana 48. La diferencia de tratamiento ajustada entre rilpivirina más cabotegravir y TAR (0,2; IC del 95%: -1,4, 1,7) alcanzó el criterio de no inferioridad (límite superior del IC del 95% por debajo del 4%) [Ver Tabla 6].

El principal criterio de valoración y otros resultados de la Semana 48, incluidos los resultados

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

para factores basales clave de FLAIR, ATLAS, y los datos agrupados, se muestran en la Tabla 6 y la Tabla 7.

**Tabla 6: Resultados virológicos del tratamiento aleatorizado en FLAIR y ATLAS en la Semana 48 (Análisis por Snapshot).**

	FLAIR		ATLAS		Datos agrupados	
	RPV+ CAB N=283	TAR N=283	RPV+ CAB N=308	TAR N=308	RPV+CAB N=591	TAR N=591
<b>ARN de VIH-1 <math>\geq 50</math> copias/ml<sup>†</sup></b>	6 (2,1)	7 (2,5)	5 (1,6)	3 (1,0)	11 (1,9)	10 (1,7)
% de diferencia de tratamiento (IC del 95%)*	-0,4 (-2,8; 2,1)		0,7 (-1,2; 2,5)		0,2 (-1,4; 1,7)	
<b>ARN de VIH-1 &lt; 50 copias/ml</b>	265 (93,6)	264 (93,3)	285 (92,5)	294 (95,5)	550 (93,1)	558 (94,4)
% de diferencia de tratamiento (IC del 95%)*	0,4 (-3,7; 4,5)		-3,0 (-6,7; 0,7)		-1,4 (-4,1; 1,4)	
<b>Sin datos virológicos en la ventana de la Semana 48</b>	12 (4,2)	12 (4,2)	18 (5,8)	11 (3,6)	30 (5,1)	23 (3,9)
<b>Razones</b>						
Interrumpió la participación en el estudio/el medicamento del estudio por evento adverso o muerte	8 (2,8)	2 (0,7)	11 (3,6)	5 (1,6)	19 (3,2)	7 (1,2)
Interrumpió la participación en el estudio/el medicamento del estudio por otras razones	4 (1,4)	10 (3,5)	7 (2,3)	6 (1,9)	11 (1,9)	16 (2,7)
Datos faltantes durante la ventana, pero durante el estudio	0	0	0	0	0	0

\* Ajustado para los factores de estratificación basales.

<sup>†</sup> Incluye individuos con interrupción por falta de eficacia o con interrupción mientras no estaban suprimidos.

N = Número de individuos en cada grupo de tratamiento, IC = Intervalo de confianza, TAR = Tratamiento antiretroviral actual, RPV = rilpivirina, CAB = cabotegravir.

**Tabla 7: Proporción de individuos con ARN de VIH-1 plasmático  $\geq 50$  copias/ml en la Semana 48 para factores basales clave (Resultados por Snapshot)**

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

Factores basales		Datos agrupados de FLAIR y ATLAS	
		RPV+CAB N=591 n/N (%)	TAR N=591 n/N (%)
<b>CD4+ basales</b> (células/ mm <sup>3</sup> )	<350	0/42	2/54 (3,7)
	≥ 350 a < 500	5/120 (4,2)	0/117
	≥500	6/429 (1,4)	8/420 (1,9)
<b>Sexo</b>	Masculino	6/429 (1,4)	9/423 (2,1)
	Femenino	5/162 (3,1)	1/168 (0,6)
<b>Raza</b>	Blanca	9/430 (2,1)	7/408 (1,7)
	Negros/afroamericanos	2/109 (1,8)	3/133 (2,3)
	Asiáticos/otra	0/52	0/48
<b>IMC</b>	<30 kg/m <sup>2</sup>	6/491 (1,2)	8/488 (1,6)
	≥30 kg/m <sup>2</sup>	5/100 (5,0)	2/103 (1,9)
<b>Edad (años)</b>	<50	9/492 (1,8)	8/466 (1,7)
	≥50	2/99 (2,0)	2/125 (1,6)
<b>Tratamiento antiviral basal en la aleatorización</b>	PI	1/51 (2,0)	0/54
	INI	6/385 (1,6)	9/382 (2,4)
	INNTR	4/155 (2,6)	1/155 (0,6)

IMC= Índice de masa corporal, PI= Inhibidor de proteasas, INI= Inhibidor de integrasas, INNTR = Inhibidor no nucleosídico de transcriptasa reversa, RPV = rilpivirina, CAB = cabotegravir, TAR = tratamiento antirretroviral actual

En los estudios FLAIR y ATLAS, las diferencias de tratamiento entre características basales (recuento de CD4+, sexo, edad, raza, IMC, clase de tratamiento de tercer agente basal) fueron comparables.

#### Semana 96 del estudio FLAIR

En el estudio FLAIR a las 96 semanas, los resultados fueron consistentes con los resultados a las 48 semanas. La proporción de individuos con ARN del VIH-1 plasmático ≥50 copias/ml en rilpivirina más cabotegravir (n=283) y TAR (n=283) fue del 3,2% y 3,2%, respectivamente (diferencia de tratamiento ajustada entre REKAMBYS® más cabotegravir y TAR [0,0; IC del 95%: -2,9, 2,9]). La proporción de individuos con ARN del VIH-1 plasmático <50 copias/ml en REKAMBYS® más cabotegravir y TAR fue del 87% y 89%, respectivamente (diferencia de tratamiento ajustada entre REKAMBYS® más cabotegravir y TAR [-2,8; IC del 95%: -8,2, 2,5]).

#### Semana 124 del estudio FLAIR: inyección directa frente a dosificación inicial oral

En el estudio FLAIR, se hizo una evaluación de la seguridad y la eficacia en la semana 124 en aquellos pacientes que decidieron cambiar en la semana 100 de abacavir/dolutegravir/lamivudina a rilpivirina más cabotegravir en la fase de extensión. Los pacientes tuvieron la opción de cambiar a una fase con o sin dosificación inicial oral, creando así un grupo de dosificación inicial oral y un grupo de inyección directa.

En la semana 124, la proporción de sujetos con ARN del VIH-1 en plasma ≥ 50 copias/ml fue de 1/121 (0,8%) y 1/111 (0,9%) para los grupos de inicio por vía oral y de inyección directa, respectivamente. Las tasas de supresión viral (ARN del VIH-1 < 50 copias/ml) fueron similares tanto en el grupo de inicio por vía oral (113/121 [93,4%]) como en el grupo de inyección directa (110/111 [99,1%]).

#### Administración cada 2 meses

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

*Pacientes con supresión virológica (estables con ART previo durante al menos 6 meses)*

La eficacia y seguridad de la inyección de rilpivirina administrada cada 2 meses se ha evaluado en un estudio de no inferioridad de Fase 3b, aleatorizado, multicéntrico, de grupos paralelos, abierto, ATLAS-2M (207966). El análisis primario se realizó después de que todos los individuos finalizaron su visita de la Semana 48 o interrumpieron la participación en el estudio prematuramente.

En ATLAS-2M, 1045 individuos infectados por VIH-1, tratados previamente con ART y con supresión virológica, fueron aleatorizados (1:1) y recibieron un régimen de inyección de rilpivirina más cabotegravir administrado cada 2 meses o mensualmente. Los individuos que recibieron inicialmente tratamiento sin cabotegravir/rilpivirina recibieron un tratamiento de inicio por vía oral que comprendía un comprimido de rilpivirina (25 mg) más un comprimido de cabotegravir (30 mg) diario durante al menos 4 semanas. Los individuos aleatorizados para recibir inyecciones mensuales de rilpivirina (mes 1: inyección de 900 mg, del mes 2 en adelante: inyección de 600 mg) e inyecciones de cabotegravir (mes 1: inyección de 600 mg, del mes 2 en adelante: inyección de 400 mg) recibieron tratamiento durante 44 semanas más. Los individuos aleatorizados para recibir inyecciones de rilpivirina cada 2 meses (inyección de 900 mg en los meses 1, 2, 4 y cada 2 meses en adelante) e inyecciones de cabotegravir (inyección de 600 mg en los meses 1, 2, 4 y cada 2 meses en adelante) recibieron tratamiento durante 44 semanas más. Antes de la aleatorización, el 63%, 13% y 24% de los individuos recibieron rilpivirina más cabotegravir durante 0 semanas, 1 a 24 semanas y >24 semanas, respectivamente.

Al inicio, la mediana de edad de los individuos fue de 42 años, el 27% eran mujeres, el 27% eran no blancos, el 4% tenían  $\geq 65$  años de edad, y el 6% tenían recuentos de células CD4+ menores a 350 células por  $\text{mm}^3$ ; estas características fueron similares entre los grupos de tratamiento.

El principal criterio de valoración en ATLAS-2M fue la proporción de individuos con ARN de VIH-1 plasmático  $\geq 50$  copias/ml en la semana 48 (algoritmo instantáneo para la población por ITT-E).

En ATLAS-2M, el tratamiento con rilpivirina más cabotegravir administrado cada 2 meses fue no inferior a cabotegravir y rilpivirina administrados cada mes en la proporción de individuos que tenían ARN del VIH-1 plasmático  $\geq 50$  copias/ml (1,7% y 1,0%, respectivamente) en la semana 48. La diferencia de tratamiento ajustada entre cabotegravir + rilpivirina administrada cada 2 meses y cada mes (0,8; IC del 95%: -0,6, 2,2) alcanzó el criterio de no inferioridad (límite superior del IC del 95% por debajo del 4%).

**Tabla 8: Resultados virológicos del tratamiento aleatorizado de ATLAS-2M a las 48 semanas (Análisis por Snapshot)**

	<b>Administración cada 2 meses (c8s) N=522 (%)</b>	<b>Administración mensual (c4s) N=523 (%)</b>
<b>ARN de VIH-1 <math>\geq 50</math> copias/ml<sup>†</sup></b>	9 (1,7)	5 (1,0)
% de diferencia de tratamiento (IC del 95%)*	0,8 (-0,6; 2,2)	
<b>ARN de VIH-1 &lt; 50 copias/ml</b>	492 (94,3)	489 (93,5)

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

% de diferencia de tratamiento (IC del 95%)*	0,8 (-2,1; 3,7)	
<b>Sin datos virológicos en la ventana de la Semana 48</b>	21 (4,0)	29 (5,5)
<b>Razones:</b>		
Suspendió la participación en el estudio debido a EA o muerte	9 (1,7)	13 (2,5)
Suspendió la participación en el estudio por otras razones <sup>a</sup>	12 (2,3)	16 (3,1)
Datos durante el estudio, pero faltantes en la ventana	0	0

\* Ajustado para los factores de estratificación basales.

† Incluye individuos con interrupción por falta de eficacia o con interrupción mientras no estaban suprimidos.

N = Número de individuos en cada grupo de tratamiento, IC = Intervalo de confianza, TAR = Tratamiento antirretroviral actual.

**Tabla 9: Proporción de individuos con ARN de VIH-1 plasmático  $\geq 50$  copias/ml en ATLAS-2M en la Semana 48 para factores basales clave (Resultados por Snapshot)**

		Número de ARN del VIH-1 $\geq 50$ copias/ml/ Total evaluado (%)	
		Administración cada 2 meses (C8S)	Administración mensual (C4S)
<b>Recuento basal de células CD4+ (células/mm<sup>3</sup>)</b>	<350	1/-35 (2,9)	1/-27 (3,7)
	350 a <500	1/-96 (1,0)	0/-89
	$\geq 500$	7/391 (1,8)	4/407 (1,0)
<b>Sexo</b>	Masculino	4/385 (1,0)	5/380 (1,3)
	Femenino	5/137 (3,5)	0/143
<b>Raza</b>	Blanca	5/370 (1,4)	5/393 (1,3)
	No blancos	4/152 (2,6)	0/130
	Negros o afroamericanos	4/101 (4,0)	0/90
	No Negros o afroamericanos	5/421 (1,2)	5/421 (1,2)
<b>IMC</b>	<30 kg/m <sup>2</sup>	3/409 (0,7)	3/425 (0,7)
	$\geq 30$ kg/m <sup>2</sup>	6/113 (5,3)	2/98 (2,0)
<b>Edad (años)</b>	<35	4/137 (2,9)	1/145 (0,7)
	35 a < 50	3/242 (1,2)	2/239 (0,8)
	$\geq 50$	2/143 (1,4)	2/139 (1,4)
<b>Exposición previa a CAB/RPV</b>	Ninguna	5/327 (1,5)	5/327 (1,5)
	1-24 semanas	3/69 (4,3)	0/68
	> 24 semanas	1/126 (0,8)	0/128

IMC = índice de masa corporal, CAB = cabotegravir, RPV = rilpivirina

En el estudio ATLAS-2M, las diferencias de tratamiento en el principal criterio de valoración entre características basales (recuento de linfocitos CD4+, sexo, edad, raza, IMC y exposición previa a cabotegravir/rilpivirina) no fueron clínicamente significativas.

#### Análisis Post-hoc

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

Los análisis multivariantes de los estudios agrupados de Fase 3 (ATLAS, FLAIR, ATLAS-2M), incluidos los datos de 1039 adultos infectados por el VIH sin exposición previa a rilpivirina más cabotegravir, examinaron la influencia de las siguientes covariables: características basales virales y de los participantes, régimen posológico (C4S o C8S) y concentraciones plasmáticas post-basales del medicamento en FVC utilizando modelos de regresión con un procedimiento de selección de covariables. Hasta la Semana 48 en estos estudios 13/1039 (1,25%) participantes tenían FVC mientras recibían rilpivirina más cabotegravir.

Cuatro covariables se asociaron significativamente ( $P < 0,05$  para cada cociente de riesgo ajustado) con un mayor riesgo de FVC: resistencia a rilpivirina asociada a mutaciones (RAMs) al inicio del estudio identificadas mediante el ensayo genotípico de ADN proviral, subtipo A6/A1 del VIH-1 (asociado con el polimorfismo de la integrasa L74I), concentración valle de rilpivirina 4 semanas después de la dosis de inyección inicial, IMC de al menos 30 kg/m<sup>2</sup> (asociado con la farmacocinética de cabotegravir). Otras covariables, incluida la administración C4S o C8S, el sexo femenino u otros subtipos virales (no A6/A1), no tuvieron una asociación significativa con la FVC. Ningún factor basal, cuando estaba presente de forma aislada, fue predictivo de fracaso virológico. Sin embargo, una combinación de al menos 2 de los siguientes factores basales se asoció con un mayor riesgo de FVC: resistencia a rilpivirina asociada a mutaciones, subtipo A6/A1 del VIH-1 o IMC  $\geq 30$  kg/m<sup>2</sup> (Tabla 10).

**Tabla 10: Resultados de la Semana 48 por presencia de factores basales clave de RAM de RPV, subtipo A6/A1<sup>1</sup> del VIH-1, IMC  $\geq 30$  kg/m<sup>2</sup>**

Factores basales (número)	Éxitos virológicos <sup>2</sup>	Fracaso virológico confirmado (%) <sup>3</sup>
0	694/732 (94,8)	3/732 (0,41)
1	261/272 (96,0)	1/272 (0,37) <sup>4</sup>
$\geq 2$	25/35 (71,4)	9/35 (25,7) <sup>5</sup>
<b>TOTAL</b> (Intervalo de confianza del 95%)	980/1039 (94,3) (92,74%; 95,65%)	13/1039 (1,25) (0,67%; 2,13%)

<sup>1</sup> Clasificación VIH-1 subtipo A1 o A6 basada en el panel de la Biblioteca Nacional de Los Alamos de la base de datos de secuencias de VIH (Junio de 2020)

<sup>2</sup> Basado en el algoritmo instantáneo de la FDA de ARN  $< 50$  copias/ml.

<sup>3</sup> Definido como dos mediciones consecutivas de ARN del VIH  $\geq 200$  copias/ml.

<sup>4</sup> Valor predictivo positivo (VPP)  $< 1\%$ ; valor predictivo negativo (VPN) 98%; sensibilidad 8%; especificidad 74%

<sup>5</sup> VPP 26%; VPN 99,6%; sensibilidad 69%; especificidad 97,5%

### *Población pediátrica*

La Agencia Europea de Medicamentos ha aplazado la obligación de presentar los resultados de los estudios con la inyección de REKAMBYS® en uno o más subgrupos de la población pediátrica en el tratamiento de la infección por VIH-1.

### **Propiedades farmacocinéticas**

Las propiedades farmacocinéticas de REKAMBYS® se han evaluado en adultos sanos e infectados con VIH-1.

**Tabla 11: Parámetros farmacocinéticos poblacionales después de la administración oral de rilpivirina una vez al día y luego del inicio y la continuación de las inyecciones**

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

**intramusculares de REKAMBYS® mensualmente o cada dos meses**

Fase de administración	Régimen posológico	Media geométrica (percentil 5°, 95°)		
		AUC <sub>(0-tau)</sub> <sup>b</sup> (ng•h/ml)	C <sub>máx</sub> (ng/ml)	C <sub>tau</sub> <sup>b</sup> (ng/ml)
Inicio por vía oral <sup>c</sup>	25 mg una vez al día	2083 (1125; 3748)	116 (48,6; 244)	79,4 (31,8; 177)
Inyección inicial <sup>a,d</sup>	Dosis inicial IM de 900 mg	44842 (21712; 87575)	144 (93,9; 221)	41,9 (21,7; 78,9)
Inyección mensual <sup>a,e</sup>	600 mg IM mensual	68324 (39042; 118111)	121 (68,1; 210)	85,8 (49,6; 147)
Inyección cada 2 meses <sup>a,e</sup>	900 mg IM cada 2 meses	132450 (76638; 221783)	138 (80,6; 228)	68,9 (38; 119)

<sup>a</sup> Basado en estimaciones post-hoc individuales del modelo farmacocinético poblacional de rilpivirina IM (datos combinados de FLAIR, ATLAS y ATLAS-2M).

<sup>b</sup> tau es el intervalo de administración: 24 horas para vía oral; 1 o 2 meses para inyecciones IM mensualmente o cada 2 meses.

<sup>c</sup> Para rilpivirina oral, C<sub>tau</sub> representa los datos agrupados observados de FLAIR, ATLAS y ATLAS-2M, AUC<sub>(0-tau)</sub> y C<sub>máx</sub> representan datos farmacocinéticos de los estudios de Fase 3 de rilpivirina oral

<sup>d</sup> Al administrarse con el inicio por vía oral, la C<sub>máx</sub> de la inyección de inicio refleja principalmente la administración oral, ya que la inyección de inicio se administró el mismo día que la última dosis oral. Al administrarse sin el inicio por vía oral (inyección directa, n=110), se obtuvo una media geométrica (percentil 5 y 95) de C<sub>máx</sub> (1 semana después de la inyección de inicio) para rilpivirina de 68,0 ng/ml (27,5; 220) y la C<sub>tau</sub> de 48,9 ng/ml (17,7; 138).

<sup>e</sup> Datos de la Semana 48.

Absorción

La inyección de rilpivirina de liberación prolongada exhibe una cinética limitada por la velocidad de absorción (es decir, farmacocinética flip-flop) que produce una absorción lenta del músculo glúteo hacia la circulación sistémica, resultando en concentraciones plasmáticas sostenidas de rilpivirina.

Después de una dosis intramuscular única, las concentraciones plasmáticas de rilpivirina son detectables el primer día y aumentan gradualmente hasta alcanzar concentraciones plasmáticas máximas después de una mediana de 3-4 días. Rilpivirina se ha detectado en plasma hasta durante 52 semanas o más después de la administración de una dosis única de REKAMBYS®. Después de 1 año de inyecciones mensuales o cada 2 meses, se alcanza aproximadamente el 80% de la exposición farmacocinética en estado estacionario de rilpivirina.

La exposición plasmática de rilpivirina aumenta en proporción o ligeramente menos que en proporción a la dosis después de inyecciones IM únicas y repetidas que oscilan entre 300 y 1200 mg.

Distribución

Rilpivirina se une aproximadamente en un 99,7% a las proteínas plasmáticas *in vitro*, principalmente a albúmina. Según un análisis de farmacocinética poblacional, se estimó que el volumen aparente típico del compartimento central (V<sub>c</sub>/F) para rilpivirina después de la administración IM era de 132 litros, reflejando una distribución moderada a los tejidos periféricos.

Rilpivirina está presente en el líquido cefalorraquídeo (LCR). En individuos infectados por VIH-1 que recibían un régimen de inyección de rilpivirina más inyección de cabotegravir, la

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

mediana de la relación de la concentración de rilpivirina entre LCR y plasma (n=16) fue del 1,07 al 1,32% (intervalo: no cuantificable a 1,69%). De acuerdo con las concentraciones terapéuticas de rilpivirina en el LCR, el ARN de VIH-1 en el LCR (n=16) fue <50 copias/ml en el 100% y <2 copias/ml en 15/16 (94%) de los individuos. En el mismo momento de medición, el ARN de VIH-1 en plasma (n=18) fue <50 copias/ml en el 100% y <2 copias/ml en 12/18 (66,7%) de los individuos.

### Biotransformación

Los experimentos *in vitro* indican que rilpivirina principalmente experimenta metabolismo oxidativo mediado por el sistema del citocromo P450 (CYP) 3A.

### Eliminación

La vida media aparente de rilpivirina después de la administración de REKAMBYS® es limitada por la velocidad de absorción y se estimó que era de entre 13 y 28 semanas.

Se estimó que la depuración plasmática aparente (CL/F) de rilpivirina era de 5,08 l/h.

Después de la administración de una dosis única de <sup>14</sup>C-rilpivirina oral, en promedio el 85% y 6,1% de la radioactividad podía recuperarse en heces y en orina, respectivamente. En heces, la rilpivirina inalterada representó un promedio del 25% de la dosis administrada. Solo se detectaron cantidades mínimas de rilpivirina inalterada (<1% de la dosis) en la orina.

### Poblaciones especiales

#### *Sexo*

No se observaron diferencias clínicamente relevantes en la exposición de rilpivirina después de la administración intramuscular (IM) entre hombres y mujeres.

#### *Raza*

No observó un efecto clínicamente relevante de la raza en la exposición de rilpivirina después de la administración intramuscular.

#### *IMC*

No observó un efecto clínicamente relevante del IMC en la exposición de rilpivirina después de la administración intramuscular.

#### *Pacientes de edad avanzada*

No observó un efecto clínicamente relevante de la edad en la exposición de rilpivirina después de la administración intramuscular. Los datos farmacocinéticos de rilpivirina en individuos >65 años de edad son limitados.

#### *Insuficiencia renal*

No se ha estudiado la farmacocinética de rilpivirina en pacientes con insuficiencia renal. La eliminación renal de rilpivirina es insignificante. No se requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderado. En pacientes con insuficiencia renal grave o enfermedad renal terminal, REKAMBYS® debe utilizarse con precaución, ya que las concentraciones plasmáticas pueden aumentar debido a alteraciones en la absorción, distribución y/o metabolismo del fármaco secundarias a la disfunción renal. En pacientes con insuficiencia renal grave o enfermedad renal terminal, la combinación de REKAMBYS® con un inhibidor potente de CYP3A solo debe utilizarse si el beneficio supera el riesgo. Debido a

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

que rilpivirina se une en gran medida a las proteínas plasmáticas, es improbable que sea retirada significativamente por hemodiálisis o diálisis peritoneal (ver “Posología y forma de administración”).

#### *Insuficiencia hepática*

Rilpivirina se metaboliza y elimina principalmente por el hígado. En un estudio que comparó a 8 pacientes con insuficiencia hepática leve (puntuación A de Child-Pugh) con 8 controles emparejados, y a 8 pacientes con insuficiencia hepática moderado (puntuación B de Child-Pugh) con 8 controles emparejados, la exposición con múltiples dosis de rilpivirina oral fue un 47% más alta en pacientes con insuficiencia hepática leve y un 5% más alta en pacientes con insuficiencia hepática moderado. Sin embargo, no puede excluirse que la exposición de rilpivirina farmacológicamente activa y no unida aumente significativamente con la insuficiencia hepática moderada. No se sugiere ajuste de dosis pero se recomienda precaución en pacientes con insuficiencia hepática moderada. No se ha estudiado REKAMBYS® en pacientes con insuficiencia hepática grave (puntuación C de Child-Pugh). Por lo tanto, REKAMBYS® no se recomienda en pacientes con insuficiencia hepática grave (ver “Posología y forma de administración”).

#### *Pacientes coinfectados con VHB/VHC*

El análisis farmacocinético poblacional indicó que la coinfección por el virus de la hepatitis B y/o C no tuvo un efecto clínicamente relevante en la exposición de rilpivirina después de la administración oral.

#### *Pacientes pediátricos*

No se ha establecido la farmacocinética de rilpivirina en niños y adolescentes <18 años con REKAMBYS®.

## **DATOS PRECLÍNICOS DE SEGURIDAD**

Todos los estudios se realizaron con rilpivirina para uso oral, excepto los estudios sobre tolerancia local con inyecciones de REKAMBYS®.

#### Toxicidad de dosis repetidas

Se observó toxicidad hepática asociada con inducción de enzimas hepáticas en roedores. En perros, se encontraron efectos similares a la colestasis.

#### Estudios de toxicología reproductiva

Los estudios en animales no mostraron evidencia de toxicidad embrionaria o fetal relevante o un efecto en la función reproductiva. No hubo teratogenicidad con rilpivirina oral en ratas y conejos. Las exposiciones embriofetales en el nivel sin efectos adversos observados (NOAEL) en ratas y conejos fueron respectivamente  $\geq 12$  y  $\geq 57$  veces la exposición en humanos a la dosis diaria máxima recomendada en humanos de 25 mg una vez al día en pacientes infectados por el VIH-1 o a la dosis de inyección intramuscular de 600 mg o 900 mg de suspensión inyectable de liberación prolongada de rilpivirina.

#### Carcinogénesis y mutagénesis

Se evaluó el potencial carcinogénico de rilpivirina oral mediante administración oral por sonda nasogástrica a ratones y ratas hasta las 104 semanas. A las dosis más bajas analizadas en los

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

estudios de carcinogenicidad, las exposiciones sistémicas (basadas en el AUC) a rilpivirina fueron  $\geq 17$  veces (ratones) y  $\geq 2$  veces (ratas) la exposición en humanos a la dosis diaria máxima recomendada en humanos de 25 mg una vez al día en pacientes infectados por el VIH-1 o a la dosis de inyección intramuscular de 600 mg o 900 mg de suspensión inyectable de liberación prolongada de rilpivirina. En ratas, no hubo neoplasias relacionadas con el medicamento. En ratones, rilpivirina fue positiva para neoplasias hepatocelulares tanto en machos como en hembras. Los hallazgos hepatocelulares observados en ratones pueden ser específicos de los roedores.

Rilpivirina fue negativa en ausencia y en presencia de un sistema de activación metabólico en la prueba de mutación inversa de Ames *in vitro* y en la prueba de clastogenicidad de linfoma de ratón *in vitro*. Rilpivirina oral no indujo daño cromosómico en la prueba de micronúcleo de ratones *in vivo*.

#### Tolerancia local para REKAMBYS®

Después de la administración IM repetida a largo plazo de REKAMBYS® en perros y minicerdos, se observó un eritema leve y de corta duración (es decir, de 1 a 4 días en los minicerdos) y en la autopsia se observaron depósitos blancos en los sitios de la inyección, acompañados de hinchazón y decoloración de los ganglios linfáticos supurados. El examen microscópico mostró infiltración de macrófagos y depósitos eosinofílicos en los sitios de la inyección. También se observó una respuesta de infiltración de macrófagos en los ganglios linfáticos supurados/regionales. Estos hallazgos se consideraron una reacción al material depositado más que una manifestación de irritación local.

## POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

El tratamiento debe ser prescrito por un médico con experiencia en el manejo de la infección por VIH. Cada inyección debe ser administrada por un profesional de la salud.

**Antes de iniciar el tratamiento con REKAMBYS®, el profesional de la salud debe seleccionar cuidadosamente a los pacientes que estén de acuerdo con el cronograma de inyecciones requeridas y aconsejarles sobre la importancia de cumplir con las citas de administración programadas para ayudar a mantener la supresión viral y reducir el riesgo de rebrote viral y el potencial desarrollo de resistencia asociada a la omisión de dosis.**

**Después de la interrupción de REKAMBYS® en combinación con la inyección de cabotegravir, es esencial adoptar un régimen antirretroviral alternativo totalmente supresor a más tardar dos meses después de la última inyección cada 2 meses de REKAMBYS® (ver “Advertencias y precauciones de empleo”).**

Se debe consultar el prospecto de la inyección de cabotegravir para conocer la dosis recomendada.

### Posología

Se puede iniciar la administración de REKAMBYS® con una dosificación inicial oral o sin ella (inyección directa).

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

El profesional de la salud y el paciente pueden decidir usar rilpivirina comprimidos como inicio por vía oral antes de iniciar las inyecciones de REKAMBYS® para evaluar la tolerabilidad (ver Tabla 1), o pasar directamente al tratamiento de REKAMBYS® (ver la Tabla 2 para las recomendaciones de dosificación cada 2 meses).

#### Inicio por vía oral

Cuando se utiliza el inicio por vía oral antes del inicio de REKAMBYS®, deben administrarse comprimidos orales de rilpivirina junto con comprimidos orales de cabotegravir durante aproximadamente 1 mes (al menos 28 días) para evaluar la tolerabilidad a rilpivirina y cabotegravir. Se debe tomar un comprimido de rilpivirina 25 mg con una comida junto con un comprimido de cabotegravir 30 mg una vez al día (ver Tabla 1).

**Tabla 1: Inicio por vía oral en adultos**

	<b>Inicio por vía oral</b>
<b>Medicamento</b>	<b>Durante 1 mes (al menos 28 días), seguido de la inyección de inicio<sup>a</sup></b>
Rilpivirina	25 mg una vez al día con una comida
Cabotegravir	30 mg una vez al día

<sup>a</sup> Ver la Tabla 2 para la dosificación de inyecciones cada 2 meses.

#### Administración cada 2 meses

##### *Inyecciones iniciales - 1 mes de diferencia (900 mg correspondientes a 3 ml)*

El día final del tratamiento antirretroviral actual o del inicio por vía oral, la dosis inicial recomendada de la inyección de rilpivirina en adultos es una inyección intramuscular única de 900 mg.

Un mes después, se debe administrar una segunda inyección intramuscular de 900 mg. Los pacientes pueden recibir la segunda inyección de 900 mg hasta 7 días antes o después de la fecha de administración programada.

##### *Inyecciones de continuación - 2 meses de diferencia (900 mg correspondientes a 3 ml)*

Después de las inyecciones iniciales, la dosis recomendada de la inyección de continuación de rilpivirina en adultos es una inyección intramuscular única de 900 mg administrada cada 2 meses. Los pacientes pueden recibir inyecciones hasta 7 días antes o después de la fecha del cronograma de inyecciones cada 2 meses.

**Tabla 2: Pauta posológica de inyecciones intramusculares cada 2 meses recomendada en pacientes adultos**

		<b>Inyecciones iniciales</b>	<b>Inyecciones de continuación</b>
<b>Medicamento</b>		<b>Inyección directa: meses 1 y 2 o Después de la dosificación inicial oral: meses 2 y 3</b>	<b>Dos meses después de la última inyección de inicio y cada 2 meses a partir de entonces</b>
Rilpivirina		900 mg	900 mg
Cabotegravir		600 mg	600 mg

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

## Dosis omitidas

Los pacientes que omiten una visita para la inyección deben volver a evaluarse clínicamente para asegurarse de que sea adecuado reanudar el tratamiento. Ver la Tabla 3 para conocer las recomendaciones posológicas después de omitir una inyección.

### Omisión de la inyección cada 2 meses (administración oral para reemplazar 1 inyección cada 2 meses)

Si un paciente planea omitir una visita de inyección programada durante más de 7 días, se puede utilizar el tratamiento oral diario (un comprimido de rilpivirina [25 mg] y un comprimido de cabotegravir [30 mg]) para reemplazar una visita de inyección ‘cada 2 meses’. La primera dosis de tratamiento oral debe tomarse aproximadamente dos meses ( $\pm 7$  días) después de las últimas dosis de inyección de REKAMBYS® y cabotegravir. La administración de la inyección debe reanudarse el día que finalice la administración oral, según se recomienda en la Tabla 3. En caso de que sea necesario cubrir más de dos meses; es decir, si se omiten más de una inyección ‘cada 2 meses’, se debe iniciar un régimen oral alternativo dos meses ( $\pm 7$  días) después de la inyección final de REKAMBYS®.

**Tabla 3: Recomendaciones posológicas de REKAMBYS® después de omitir inyecciones o tratamiento oral para pacientes que reciben la administración de inyección cada 2 meses**

Visita de inyección omitida	Tiempo desde la última inyección	Recomendación (todas las inyecciones son de 3 ml)
Inyección 2	$\leq 2$ meses	Continuar con la inyección de 900 mg tan pronto como sea posible y continuar con el cronograma de inyecciones cada 2 meses.
	$> 2$ meses	Reanudar la dosis de 900 mg, seguida de una segunda inyección inicial de 900 mg un mes después. Luego seguir el cronograma de inyecciones cada 2 meses.
Inyección 3 o posterior	$\leq 3$ meses	Continuar con la inyección de 900 mg tan pronto como sea posible y continuar con el cronograma de inyecciones cada 2 meses.
	$> 3$ meses	Reanudar la dosis de 900 mg, seguida de una segunda inyección inicial de 900 mg un mes después. Luego seguir el cronograma de inyecciones cada 2 meses.

## Poblaciones especiales

### Pacientes de edad avanzada

Hay información limitada respecto al uso de REKAMBYS® en pacientes  $> 65$  años de edad. No se requiere ajuste de la dosis de REKAMBYS® en pacientes mayores (ver “Propiedades farmacodinámicas” y “Propiedades farmacocinéticas”).

### Insuficiencia renal

No se requiere ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. En pacientes con insuficiencia renal grave o enfermedad renal terminal, la combinación de REKAMBYS® con un inhibidor potente del CYP3A solo debe utilizarse si el beneficio supera el riesgo. Los individuos con un aclaramiento estimado de creatinina  $< 50$  ml/min/1,73 m<sup>2</sup> no

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

se incluyeron en los estudios de Fase 3. No hay datos disponibles en individuos que reciben diálisis, aunque no se prevén diferencias en la farmacocinética en esta población (ver “Propiedades farmacocinéticas”).

#### Insuficiencia hepática

No se requiere ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada (puntuación Child-Pugh A o B), pero se recomienda tener precaución en pacientes con insuficiencia hepática moderada. No hay datos disponibles en pacientes con insuficiencia hepática grave (puntuación Child-Pugh C); por lo tanto, REKAMBYS® no se recomienda en estos pacientes (ver “Propiedades farmacocinéticas”).

#### Población pediátrica

No se han establecido la seguridad y eficacia de REKAMBYS® en niños y adolescentes <18 años. No hay datos disponibles.

### **Forma de administración**

Para uso intramuscular.

Se debe tener precaución para evitar la inyección accidental de REKAMBYS® en un vaso sanguíneo. La suspensión debe inyectarse lentamente (ver “Advertencias y Precauciones especiales de uso”).

Previo a la administración, el vial de REKAMBYS® debe llevarse a temperatura ambiente. REKAMBYS® debe ser administrado por un profesional de la salud. Para conocer las instrucciones de administración, ver “Instrucciones de uso”.

REKAMBYS® siempre debe ser coadministrado con la inyección de cabotegravir. Las inyecciones de REKAMBYS® y cabotegravir deben administrarse en sitios separados de inyección en el glúteo durante la misma visita. El orden de las inyecciones no es importante.

Al momento de administrar REKAMBYS®, los profesionales de la salud deben tener en cuenta el índice de masa corporal (IMC) del paciente para asegurarse de que la longitud de la aguja sea suficiente para alcanzar el músculo glúteo. El envase contiene 1 aguja para inyección (ver “Presentación”).

El vial debe sostenerse con firmeza y agitado vigorosamente durante 10 segundos completos. El vial debe invertirse y debe revisarse la resuspensión. Debe tener un aspecto uniforme. Si la suspensión no es uniforme, el vial debe ser agitado nuevamente. Es normal ver pequeñas burbujas de aire.

Las inyecciones deben administrarse en las regiones ventroglútea (recomendado) o dorsoglútea.

### **CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en “Composición”.

REKAMBYS® no debe coadministrarse con los siguientes medicamentos, ya que pueden

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

ocurrir disminuciones significativas en las concentraciones plasmáticas de rilpivirina (debido a la inducción enzimática de CYP3A), la cual puede resultar en la pérdida del efecto terapéutico de REKAMBYS® (ver “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”):

- Anticonvulsivantes: carbamazepina, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína
- Antimicobacterianos: rifabutina, rifampicina, rifapentina
- Glucocorticoides sistémicos: dexametasona, excepto como tratamiento de dosis única
- Hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*)

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

### **Riesgo de resistencia después de la interrupción del tratamiento**

**Para minimizar el riesgo de desarrollar resistencia viral, es esencial adoptar un régimen antirretroviral alternativo totalmente supresor como máximo dos meses después de la última inyección cada 2 meses de REKAMBYS®.**

**Si se sospecha de fracaso virológico, debe adoptarse un régimen alternativo lo antes posible.**

### **Propiedades de acción prolongada de la inyección de rilpivirina**

Las concentraciones residuales de rilpivirina pueden permanecer en circulación sistémica de los pacientes por períodos prolongados (hasta 4 años en algunos pacientes) y se deben considerar al interrumpir REKAMBYS® (ver “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”, “Fertilidad, embarazo y lactancia”, “Efecto sobre la capacidad de conducir y utilizar maquinarias”, “Sobredosificación”).

### **Factores basales asociados con la falla virológica**

Antes de comenzar el régimen, se debe tener en cuenta que los análisis multivariados indican que una combinación de al menos 2 de los siguientes factores basales pueden estar asociada con un mayor riesgo de falla virológica: mutaciones archivadas de resistencia a rilpivirina, VIH-1 subtipo A6/A1, o IMC  $\geq 30$  kg/m<sup>2</sup>. En pacientes con antecedentes de tratamientos incompletos o inciertos sin análisis de resistencia previos al tratamiento, se recomienda precaución en presencia de un IMC  $\geq 30$  kg/m<sup>2</sup> o del subtipo VIH-1A6/A1 (ver “Propiedades farmacodinámicas”).

### **Reacciones posteriores a la inyección**

La administración intravenosa accidental durante el procedimiento de inyección intramuscular puede resultar en reacciones adversas debido a concentraciones plasmáticas temporalmente altas. En los estudios clínicos, se notificaron reacciones graves posteriores a la inyección minutos después de la inyección de rilpivirina. Estos eventos incluyeron síntomas como disnea, broncoespasmo, agitación, calambres abdominales, erupción/urticaria, mareos, rubefacción, sudoración, entumecimiento oral, cambios en la presión arterial y dolor (por ejemplo, de espalda y pecho). Estos eventos fueron muy raros y comenzaron a resolverse minutos después de la inyección. Algunos de los pacientes recibieron tratamiento sintomático, según decisión del médico que les estaba tratando.

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

Siga cuidadosamente las “Instrucciones de uso” al preparar y administrar REKAMBYS® (ver “Posología y Forma de administración”). Observe a los pacientes brevemente (aproximadamente 10 minutos) después de la inyección. Si un paciente experimenta una reacción posterior a la inyección, se lo debe monitorear y tratar según fuera clínicamente indicado.

### **Cardiovasculares**

REKAMBYS® debe utilizarse con precaución cuando se administra simultáneamente con un medicamento con riesgo conocido de Torsade de Pointes. A dosis supratrapéuticas (75 y 300 mg una vez al día), rilpivirina oral se ha asociado con prolongación del intervalo QTc del electrocardiograma (ECG) (ver “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”, “Reacciones adversas” y “Propiedades farmacocinéticas”). Rilpivirina oral a la dosis recomendada de 25 mg una vez al día no se asocia con un efecto clínicamente importante en el QTc. Las concentraciones plasmáticas de rilpivirina después de las inyecciones de REKAMBYS® son comparables a aquellas observadas durante el tratamiento oral con rilpivirina.

### **Coinfección por Virus de la Hepatitis B/Virus de la Hepatitis C (VHB/VHC)**

Los pacientes coinfectados con hepatitis B se excluyeron de los estudios con REKAMBYS®. No se recomienda iniciar el tratamiento con REKAMBYS® en pacientes coinfectados con hepatitis B. En pacientes coinfectados con hepatitis B que recibieron rilpivirina oral, la incidencia de aumento de las enzimas hepáticas fue mayor que en pacientes que recibieron rilpivirina oral que no estaban coinfectados con hepatitis B. Los médicos deben consultar las guías de tratamiento vigentes para el manejo de la infección por VIH en pacientes coinfectados con el virus de la hepatitis B.

Se dispone de datos limitados en pacientes coinfectados con el virus de hepatitis C. En pacientes coinfectados con hepatitis C que recibieron rilpivirina oral, la incidencia de aumento de las enzimas hepáticas fue mayor que en pacientes que recibieron rilpivirina oral que no estaban coinfectados con hepatitis C. La exposición farmacocinética de rilpivirina oral e inyectable en pacientes coinfectados fue comparable a aquella en pacientes sin coinfección por hepatitis C. Se recomienda el monitoreo de la función hepática en pacientes coinfectados con hepatitis C.

### **Interacciones con otros medicamentos**

REKAMBYS® no debe administrarse con otros medicamentos antirretrovirales, excepto por la inyección de cabotegravir para el tratamiento de la infección por VIH-1 (ver “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”).

### **Embarazo**

Hay datos limitados sobre REKAMBYS® en mujeres embarazadas. REKAMBYS® no se recomienda durante el embarazo, al menos que el beneficio esperado justifique el potencial riesgo. Se observaron exposiciones más bajas de rilpivirina oral cuando se tomó rilpivirina 25 mg una vez al día durante el embarazo. En los estudios de Fase 3 con rilpivirina oral, se ha asociado una menor exposición a rilpivirina, similar a la observada durante el embarazo, con

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

un mayor riesgo de fracaso virológico, por lo que la carga viral debe monitorearse estrechamente. Alternativamente, se podría considerar el cambio a otro régimen de terapia antirretroviral (ART, por sus siglas en inglés) (ver “Fertilidad, embarazo y lactancia”, “Propiedades farmacodinámicas” y “Propiedades farmacocinéticas”).

### **Síndrome de reactivación inmune**

En aquellos pacientes infectados por el VIH con inmunodeficiencia grave, al momento de la institución del tratamiento antirretroviral combinado (CART, por sus siglas en inglés), puede aparecer una reacción inflamatoria a patógenos oportunistas asintomáticos o residuales y ocasionar afecciones clínicas graves o agravamiento de los síntomas. Típicamente, dichas reacciones se observaron dentro de las primeras semanas o meses de iniciado el CART. Los ejemplos relevantes son la retinitis por citomegalovirus, las infecciones micobacterianas generalizadas y/o focales, y la neumonía por *Pneumocystis jirovecii*. Cualquier síntoma inflamatorio debe evaluarse y debe administrarse el tratamiento cuando sea necesario. También se informaron trastornos autoinmunes (como enfermedad de Graves y hepatitis autoinmune) en el contexto de reconstitución inmunológica; no obstante, el tiempo informado hasta la aparición es más variable y estos eventos pueden producirse muchos meses después de iniciar el tratamiento.

### **Transmisión del VIH**

Mientras que la supresión viral efectiva con el tratamiento antirretroviral demostró disminuir significativamente el riesgo de transmisión sexual, no puede excluirse el riesgo residual. Se deben tomar precauciones para prevenir la transmisión de acuerdo con las guías nacionales.

### **Infecciones oportunistas**

Se debe aconsejar a los pacientes que REKAMBYS® o cualquier otra terapia antirretroviral no cura la infección por VIH y que podrían desarrollar infecciones oportunistas y otras complicaciones de la infección por VIH. Por lo tanto, los pacientes deben mantenerse bajo observación clínica estrecha por médicos experimentados en el tratamiento de estas enfermedades asociadas al VIH.

### **Excipientes**

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por inyección, esto es decir que es esencialmente “libre de sodio”.

## **INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN**

REKAMBYS®, en combinación con la inyección de cabotegravir, está indicado para usarse como un régimen completo para el tratamiento de la infección por VIH-1 y no debe administrarse con otros medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH-1. Por lo tanto, no se proporciona información sobre interacciones medicamentosas con otros medicamentos antirretrovirales. Desde una perspectiva de interacción medicamentosa, no hay limitaciones para el uso de otros medicamentos antirretrovirales después de interrumpir el

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

tratamiento con REKAMBYS®.

Para el tratamiento con rilpivirina en el inicio por vía oral y en caso de que las dosis omitidas se reemplacen con un tratamiento con rilpivirina oral, consultar el prospecto del comprimido de rilpivirina oral para obtener información sobre las interacciones medicamentosas.

### Medicamentos que afectan la exposición a rilpivirina

Rilpivirina es principalmente metabolizada por el citocromo P450 (CYP)3A. Por lo tanto, los medicamentos que inducen o inhiben CYP3A pueden afectar el clearance de rilpivirina (ver “Propiedades farmacocinéticas”). Se ha observado que la coadministración de rilpivirina y medicamentos que inducen CYP3A disminuyen las concentraciones plasmáticas de rilpivirina, lo cual podría disminuir el efecto terapéutico de rilpivirina.

Se ha observado que la coadministración de rilpivirina y medicamentos que inhiben CYP3A aumenta las concentraciones plasmáticas de rilpivirina.

Cuando se utiliza rilpivirina oral, los inhibidores de la bomba de protones están contraindicados (ver el prospecto de rilpivirina comprimidos).

### Medicamentos que son afectados por el uso de rilpivirina

Rilpivirina no parece tener un efecto clínicamente relevante en la exposición de medicamentos metabolizados por enzimas del CYP.

Rilpivirina inhibe a la glicoproteína P *in vitro* (IC<sub>50</sub> de 9,2 µM). En un estudio clínico, rilpivirina oral (25 mg una vez al día) no afectó significativamente la farmacocinética de digoxina.

Rilpivirina es un inhibidor *in vitro* del transportador MATE-2K con una IC<sub>50</sub> de <2,7 nM. Actualmente se desconocen las implicaciones clínicas de este hallazgo.

### Tabla de interacciones

En la Tabla 4 se enumeran interacciones establecidas y teóricas seleccionadas entre rilpivirina y medicamentos coadministrados, están basadas en los estudios realizados con rilpivirina oral, o son interacciones con medicamentos que pueden ocurrir potencialmente (el incremento está señalado como “↑”, la disminución como “↓”, sin cambio como “↔”, no aplica como “NA”, intervalo de confianza como “IC”).

**Tabla 4: Interacciones y recomendaciones posológicas con otros medicamentos**

Medicamentos por áreas terapéuticas	Interacción Cambio de la media geométrica (%) <sup>Ω</sup>	Recomendaciones respecto a la coadministración
<b>AGENTES ANTIVIRALES</b>		
Cabotegravir	AUC de cabotegravir ↔ C <sub>mín</sub> de cabotegravir ↔ C <sub>máx</sub> de cabotegravir ↔ AUC de rilpivirina ↔ C <sub>mín</sub> de rilpivirina ↓ 8% C <sub>máx</sub> de rilpivirina ↔	No se requiere ajuste de dosis.
Ribavirina	No estudiada. No se esperan	No se requiere ajuste de dosis.

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

	interacciones medicamentosas clínicamente importantes.	
<b>ANTICONVULSIVANTES</b>		
Carbamazepina Oxcarbazepina Fenobarbital Fenitoína	No estudiada. Se esperan disminuciones significativas en las concentraciones plasmáticas de rilpivirina.  (inducción de enzimas CYP3A)	Rilpivirina no debe utilizarse en combinación con esos anticonvulsivantes, ya que la coadministración puede producir una pérdida del efecto terapéutico de rilpivirina (ver “Contraindicaciones”).
<b>AGENTES ANTIFÚNGICOS AZÓLICOS</b>		
Ketoconazol <sup>*#</sup> 400 mg una vez al día	AUC de ketoconazol ↓ 24% C <sub>min</sub> de ketoconazol ↓ 66% C <sub>máx</sub> de ketoconazol ↔  (inducción de CYP3A debido a alta dosis de rilpivirina en el estudio)  AUC de rilpivirina ↑ 49% C <sub>min</sub> de rilpivirina ↑ 76% C <sub>máx</sub> de rilpivirina ↑ 30%  (inhibición de enzimas CYP3A)	No se requiere ajuste de dosis.
Fluconazol Itraconazol Posaconazol Voriconazol	No estudiada. El uso simultáneo de REKAMBYS® con los agentes antifúngicos azólicos puede causar un aumento en las concentraciones plasmáticas de rilpivirina.  (inhibición de enzimas CYP3A)	No se requiere ajuste de dosis.
<b>ANTIMICOBACTERIANOS</b>		
Rifabutina <sup>*#</sup> 300 mg una vez al día  300 mg una vez al día (+rilpivirina 25 mg una vez al día)  300 mg una vez al día (+rilpivirina 50 mg una vez al día)	AUC de rifabutina ↔ C <sub>min</sub> de rifabutina ↔ C <sub>máx</sub> de rifabutina ↔ AUC de 25-O-desacetil-rifabutina ↔ C <sub>min</sub> de 25-O-desacetil-rifabutin ↔ C <sub>máx</sub> de 25-O-desacetil-rifabutina ↔  AUC de rilpivirina ↓ 42% C <sub>min</sub> de rilpivirina ↓ 48% C <sub>máx</sub> de rilpivirina ↓ 31%  AUC de rilpivirina ↑ 16%* C <sub>min</sub> de rilpivirina ↔* C <sub>máx</sub> de rilpivirina ↑ 43%*  * comparada con rilpivirina 25 mg sola una vez al día  (inducción de enzimas CYP3A)	REKAMBYS® no debe utilizarse en combinación con rifabutina, ya que no se han establecido recomendaciones de dosis específicas. La coadministración probablemente conduzca a una pérdida del efecto terapéutico de rilpivirina (ver “Contraindicaciones”).
Rifampicina <sup>*#</sup> 600 mg una vez al día	AUC de rifampicina ↔ C <sub>min</sub> de rifampicina NA C <sub>máx</sub> de rifampicina ↔ AUC de 25-desacetil-rifampicina ↓ 9%	Rilpivirina no debe utilizarse en combinación con rifampicina, ya que es probable que la coadministración produzca una

Specialist: NP

MAF: LGS

HA approval date:

QC: REP

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

	$C_{\min}$ de 25-desacetil-rifampicina NA $C_{\max}$ de 25-desacetil-rifampicina ↔ AUC de rilpivirina ↓ 80% $C_{\min}$ de rilpivirina ↓ 89% $C_{\max}$ de rilpivirina ↓ 69%  (inducción de enzimas CYP3A)	pérdida del efecto terapéutico de rilpivirina (ver “Contraindicaciones”).
Rifapentina	No estudiada. Se esperan disminuciones significativas en las concentraciones plasmáticas de rilpivirina.  (inducción de enzimas CYP3A)	Rilpivirina no debe utilizarse en combinación con rifapentina, ya que es probable que la coadministración produzca una pérdida del efecto terapéutico de rilpivirina (ver “Contraindicaciones”).
<b>ANTIBIÓTICOS MACRÓLIDOS</b>		
Claritromicina Eritromicina	No estudiada. Se espera un aumento en la exposición de rilpivirina.  (inhibición de enzimas CYP3A)	Donde sea posible, deben considerarse alternativas como azitromicina.
<b>GLUCOCORTICOIDES O CORTICOSTEROIDES</b>		
Dexametasona (sistémica, excepto el uso de dosis única)	No estudiada. Se esperan disminuciones dependientes de la dosis en las concentraciones plasmáticas de rilpivirina.  (inducción de enzimas CYP3A)	Rilpivirina no debe utilizarse en combinación con dexametasona sistémica (excepto como dosis única), ya que la coadministración puede producir una pérdida del efecto terapéutico de rilpivirina (ver “Contraindicaciones”). Se deben considerar alternativas, en particular para el uso a largo plazo.
<b>ANALGÉSICOS NARCÓTICOS</b>		
Metadona* 60-100 mg una vez al día, dosis individualizada	$AUC$ de R(-) metadona ↓ 16% $C_{\min}$ de R(-) metadona ↓ 22% $C_{\max}$ de R(-) metadona ↓ 14% $AUC$ de rilpivirina ↔* $C_{\min}$ de rilpivirina ↔* $C_{\max}$ de rilpivirina ↔*  * según controles históricos	No requiere ajuste de dosis cuando comienza la coadministración de metadona con rilpivirina. Sin embargo, se recomienda el monitoreo clínico, ya que es posible que el tratamiento de mantenimiento con metadona deba ajustarse en algunos pacientes.
<b>ANTIARRÍTMICOS</b>		
Digoxina*	$AUC$ de digoxina ↔ $C_{\min}$ digoxina NA $C_{\max}$ de digoxina ↔	No se requiere ajuste de dosis.
<b>ANTIDIABÉTICOS</b>		
Metformina*	$AUC$ de metformina ↔ $C_{\min}$ de metformina NA $C_{\max}$ de metformina ↔	No se requiere ajuste de dosis.
<b>PRODUCTOS HERBALES</b>		
Hierba de San Juan ( <i>Hypericum perforatum</i> )	No estudiada. Se esperan disminuciones significativas en las concentraciones plasmáticas de rilpivirina.  (inducción de enzimas CYP3A)	Rilpivirina no debe utilizarse en combinación con productos que contienen hierba de San Juan, ya que la coadministración puede producir una pérdida del efecto terapéutico de rilpivirina (ver

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

		“Contraindicaciones”).
<b>ANALGÉSICOS</b>		
Paracetamol <sup>*#</sup> dosis única de 500 mg	AUC de paracetamol ↔ C <sub>mín</sub> de paracetamol NA C <sub>máx</sub> de paracetamol ↔ AUC de rilpivirina ↔ C <sub>mín</sub> de rilpivirina ↑ 26% C <sub>máx</sub> de rilpivirina ↔	No se requiere ajuste de dosis.
<b>ANTICONCEPTIVOS ORALES</b>		
Etinilestradiol* 0,035 mg una vez al día Noretindrona* 1 mg una vez al día	AUC de etinilestradiol ↔ C <sub>mín</sub> de etinilestradiol ↔ C <sub>máx</sub> de etinilestradiol ↑ 17% AUC de noretindrona ↔ C <sub>mín</sub> de noretindrona ↔ C <sub>máx</sub> de noretindrona ↔ AUC de rilpivirina ↔* C <sub>mín</sub> de rilpivirina ↔* C <sub>máx</sub> de rilpivirina ↔* * según controles históricos	No se requiere ajuste de dosis.
<b>INHIBIDORES DE LA HMG CO-A REDUCTASA</b>		
Atorvastatina <sup>*#</sup> 40 mg una vez al día	AUC de atorvastatina ↔ C <sub>mín</sub> de atorvastatina ↓ 15% C <sub>máx</sub> de atorvastatina ↑ 35% AUC de rilpivirina ↔ C <sub>mín</sub> de rilpivirina ↔ C <sub>máx</sub> de rilpivirina ↓ 9%	No se requiere ajuste de dosis.
<b>INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTERASA TIPO 5 (PDE-5)</b>		
Sildenafil <sup>*#</sup> dosis única de 50 mg	AUC de sildenafil ↔ C <sub>mín</sub> de sildenafil NA C <sub>máx</sub> de sildenafil ↔ AUC de rilpivirina ↔ C <sub>mín</sub> de rilpivirina ↔ C <sub>máx</sub> de rilpivirina ↔	No se requiere ajuste de dosis.
Vardenafilo Tadalafilo	No estudiada.	No se requiere ajuste de dosis.

<sup>Ω</sup> % de aumento/disminución según los estudios de interacción medicamentosa con rilpivirina oral.

\* La interacción entre rilpivirina y el medicamento se evaluó en un estudio clínico. Todas las otras interacciones medicamentosas que se muestran son predictivas.

# Este estudio de interacción se ha realizado con una dosis más alta que la recomendada para rilpivirina evaluando el efecto máximo en el medicamento administrado simultáneamente. La recomendación posológica es aplicable a la dosis recomendada de rilpivirina de 25 mg una vez al día.

### Medicamentos que prolongan el intervalo QT

Rilpivirina oral a la dosis recomendada de 25 mg una vez al día no se asocia con un efecto clínicamente importante en el QTc. Las concentraciones plasmáticas de REKAMBYS® después de las inyecciones a la dosis recomendada de 900 mg cada 2 meses son comparables a aquellas logradas con rilpivirina oral a una dosis de 25 mg una vez al día. En un estudio de individuos sanos, las dosis supraterapéuticas de rilpivirina oral (75 mg una vez al día y 300 mg una vez al día) demostraron prolongar el intervalo QTc del ECG (ver “Propiedades farmacodinámicas”). REKAMBYS® debe utilizarse con precaución cuando se administra simultáneamente con un medicamento con riesgo conocido de Torsade de Pointes (ver “Advertencias y precauciones de empleo”).

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

## FERTILIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA

### Embarazo

Se desconoce el efecto de REKAMBYS® sobre el embarazo en humanos.

Una cantidad moderada de datos en mujeres embarazadas tratadas con rilpivirina oral (entre 300-1000 resultados de embarazos) no indican toxicidad malformativa o fetal/neonatal.

Un estudio de 19 mujeres embarazadas tratadas con rilpivirina oral en combinación con un régimen de base durante el segundo y el tercer trimestre, y en el posparto, mostró exposiciones más bajas de rilpivirina oral durante el embarazo, por lo que la carga viral debe monitorearse estrechamente si se utiliza REKAMBYS® durante el embarazo.

Los estudios en animales no indican toxicidad para la reproducción (ver “Datos preclínicos sobre seguridad”).

REKAMBYS® no se recomienda durante el embarazo, a menos que el beneficio esperado justifique el riesgo potencial.

Se debe considerar un régimen oral alternativo de acuerdo con las guías de tratamiento actuales. Después de la discontinuación de REKAMBYS®, rilpivirina puede permanecer en la circulación sistémica durante hasta 4 años en algunos pacientes (ver “Advertencias y precauciones de empleo”).

### Lactancia

Basándose en los datos en animales, es previsible que la rilpivirina se excrete en la leche materna, aunque esto no se confirmó en humanos. En algunos pacientes, rilpivirina puede estar presente en la leche humana por hasta 4 años después de la interrupción de REKAMBYS®.

Se recomienda a las mujeres infectadas con VIH que no amamenten a sus hijos bajo ninguna circunstancia, con el propósito de evitar la transmisión del VIH.

### Fertilidad

No hay datos disponibles sobre el efecto de rilpivirina en la fertilidad. No se observaron efectos clínicamente importantes en la fertilidad en los estudios en animales (ver “Datos preclínicos sobre seguridad”).

## EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS

Se debe informar a los pacientes que pueden producirse fatiga, mareos y somnolencia durante el tratamiento con REKAMBYS® (ver “Reacciones adversas”).

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

## REACCIONES ADVERSAS

### Resumen del perfil de seguridad

Las reacciones adversas (RA) informadas con mayor frecuencia en los estudios de administración cada 1 mes fueron reacciones en el sitio de inyección (hasta 84%), cefalea (hasta 12%) y pirexia (10%).

Las RA informadas con mayor frecuencia con la administración cada 2 meses fueron reacciones en el sitio de la inyección (76%), cefalea (7%) y pirexia (7%).

### Resumen tabulado de reacciones adversas

Las RA identificadas para rilpivirina y/o cabotegravir se enumeran por sistema y órgano (SOC, por sus siglas en inglés) y por frecuencia (ver la Tabla 5).

Las frecuencias se definen como muy frecuentes ( $\geq 1/10$ ), frecuentes ( $\geq 1/100$  a  $< 1/10$ ) y poco frecuentes ( $\geq 1/1000$  a  $< 1/100$ ).

**Tabla 5: Resumen tabulado de reacciones adversas<sup>5</sup>**

Clasificación por sistema y órgano del MedDRA (SOC)	Categoría de frecuencia	RA para el régimen de rilpivirina + cabotegravir
Trastornos de la sangre y del sistema linfático	Frecuentes	disminución del recuento de glóbulos blancos <sup>4</sup> , disminución de la hemoglobina <sup>4</sup> , disminución del recuento de plaquetas <sup>4</sup>
Trastornos del sistema inmunológico	Poco frecuentes	síndrome de reactivación inmune <sup>4</sup>
Trastornos del metabolismo y de la nutrición	Muy frecuentes	aumento del colesterol total (en ayuno) <sup>4</sup> , aumento del colesterol LDL (en ayuno) <sup>4</sup>
	Frecuentes	disminución del apetito <sup>4</sup> , aumento de triglicéridos (en ayuno) <sup>4</sup>
Trastornos psiquiátricos	Frecuentes	Depresión, ansiedad, sueños anormales, insomnio, trastorno del sueño <sup>4</sup> , estado de ánimo deprimido <sup>4</sup>
Trastornos del sistema nervioso	Muy frecuentes	cefalea
	Frecuentes	mareos
	Poco frecuentes	somnolencia, reacciones vasovagales (en respuesta a las inyecciones)
Trastornos gastrointestinales	Muy frecuentes	aumento de amilasa pancreática <sup>4</sup>
	Frecuentes	náuseas, vómitos, dolor abdominal <sup>1</sup> , flatulencias, diarrea, malestar abdominal <sup>4</sup> , boca seca <sup>4</sup> , aumento de lipasa <sup>4</sup>
Trastornos hepato biliares	Poco frecuentes	hepatotoxicidad
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo	Frecuentes	erupción cutánea <sup>2</sup>
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo	Frecuentes	mialgia
Trastornos generales y afecciones en el sitio de administración	Muy frecuentes	reacciones en el sitio de inyección (dolor y malestar, nódulo, induración), pirexia <sup>3</sup>
	Frecuentes	reacciones en el sitio de inyección (hinchazón,

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

		eritema, prurito, moretones, calor, hematoma), fatiga, astenia, malestar general
	Poco frecuentes	reacciones en el sitio de inyección (celulitis, absceso, anestesia, hemorragia, decoloración)
Investigaciones	Frecuentes	aumento de peso
	Poco frecuentes	aumento de transaminasas, aumento de bilirrubina en sangre

<sup>1</sup> Dolor abdominal incluye los siguientes términos preferentes agrupados del MedDRA: dolor abdominal, dolor abdominal superior.

<sup>2</sup> Erupción cutánea incluye los siguientes términos preferentes agrupados del MedDRA: erupción cutánea, erupción cutánea eritematosa, erupción cutánea generalizada, erupción cutánea macular, erupción cutánea maculopapular, erupción cutánea morbiliforme, erupción cutánea papular, erupción cutánea prurítica.

<sup>3</sup> Pirexia incluye los siguientes términos preferentes agrupados del MedDRA: pirexia, sensación de calor, aumento de la temperatura corporal.

<sup>4</sup> Reacciones adversas adicionales a medicamentos observadas con rilpivirina oral en otros estudios.

<sup>5</sup> La frecuencia de las RA identificadas se basa en todas las ocurrencias informadas de los eventos y no se limita a aquellos considerados al menos posiblemente relacionados por el investigador.

El perfil general de seguridad en las semanas 96 y 124 del estudio FLAIR fue consistente con el que se observó en la semana 48, y no hubo nuevos hallazgos relacionados con la seguridad. En la fase de extensión del estudio FLAIR, en el inicio del régimen de inyección de rilpivirina más cabotegravir sin la dosificación inicial oral (inyección directa) no se observó ningún problema de seguridad nuevo relacionado con la omisión de la fase de dosificación inicial oral.

### Descripción de reacciones adversas seleccionadas

#### Reacciones locales en el sitio de inyección (RSI)

Hasta el 1% de los individuos interrumpieron el tratamiento con inyecciones de cabotegravir y rilpivirina debido a las RSI.

Las reacciones en el sitio de inyección fueron generalmente leves (Grado 1, 70%-75% de los individuos) o moderadas (Grado 2, 27%-36% de los individuos). El 3-4% de los individuos experimentaron RSI graves (Grado 3). La mediana de la duración de los eventos de RSI fue de 3 días. El porcentaje de individuos que informaron RSI disminuyó con el tiempo.

#### Aumento de peso

En el momento de medición de la Semana 48, los individuos en los estudios de Fase 3 FLAIR y ATLAS, que recibieron rilpivirina más cabotegravir, tuvieron una mediana de aumentos de peso de 1,5 kg; aquellos que continuaron en el grupo de tratamiento antirretroviral actual (TAR) tuvieron una mediana de aumentos de peso de 1 kg (análisis agrupado).

En los estudios individuales FLAIR y ATLAS, la mediana de los aumentos de peso en los grupos de rilpivirina más cabotegravir fueron de 1,3 kg y 1,8 kg respectivamente, comparado con 1,5 kg y 0,3 kg en los grupos de TAR.

En el momento de medición de 48 semanas, en ATLAS-2M, la mediana de aumentos de peso en los grupos de administración de rilpivirina + cabotegravir mensualmente y cada 2 meses fue de 1 kg.

#### Cambios en la química de laboratorio

Se observaron aumentos de transaminasas (ALT/AST) en individuos que recibieron rilpivirina

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

más cabotegravir durante los estudios clínicos. Estos aumentos se atribuyeron principalmente a la hepatitis viral aguda. Unos pocos individuos tratados con rilpivirina oral más cabotegravir oral tuvieron aumentos de transaminasas atribuidos a sospecha de hepatotoxicidad relacionada con el medicamento; estos cambios fueron reversibles con la interrupción del tratamiento.

Se observaron aumentos pequeños y no progresivos en la bilirrubina total (sin ictericia clínica) con el tratamiento con rilpivirina más cabotegravir. Estos cambios no se consideran clínicamente relevantes, ya que probablemente reflejan la competencia entre cabotegravir y la bilirrubina no conjugada por una vía de depuración común (UGT1A1).

Se observaron aumentos de lipasa durante los ensayos clínicos con rilpivirina más cabotegravir. Los aumentos de lipasa de Grado 3 y 4 ocurrió con una mayor incidencia con rilpivirina más cabotegravir en comparación con TAR. Estos aumentos fueron generalmente asintomáticos y no condujeron a la interrupción de rilpivirina más cabotegravir.

En el estudio ATLAS-2M, se informó un caso de pancreatitis mortal con lipasa Grado 4 y factores confusos (incluyendo antecedentes de pancreatitis) en el que no se pudo descartar la causalidad del régimen de inyección.

#### Notificación de presuntas reacciones adversas

La notificación de presuntas reacciones adversas después de la autorización del medicamento es importante. Permite el monitoreo continuo de la relación riesgo/beneficio del medicamento. Se solicita a los profesionales de la salud que informen cualquier presunta reacción adversa mediante el sistema nacional de notificación.

### **SOBREDOSIS**

Actualmente, existe una experiencia limitada con la sobredosis de REKAMBYS®. En caso de sobredosis, el paciente debe recibir tratamiento de soporte y según sea clínicamente indicado, con monitoreo de los signos vitales y ECG (intervalo QT), como sea necesario. Ya que rilpivirina se une en gran medida a las proteínas plasmáticas, no es probable que la diálisis produzca una eliminación significativa del principio activo.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología.

### **INCOMPATIBILIDADES**

Este medicamento no debe mezclarse con otros medicamentos o diluyentes.

### **CONDICIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN**

Conservar en la heladera entre 2°C y 8°C. No congelar.

Antes de la administración, el vial debe llevarse a temperatura ambiente (no mayor a 25°C). El

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

vial puede permanecer en la caja a temperatura ambiente durante un período máximo de 6 horas. Si sobrepasado el período de 6 horas no ha sido utilizado, debe descartarse.

Una vez que la suspensión es introducida en la jeringa, la inyección debe administrarse lo antes posible, aunque puede permanecer en la jeringa durante un período máximo de 2 horas. Superadas las 2 horas, se debe desechar el medicamento, la jeringa y la aguja.

## PRESENTACIÓN

REKAMBYS® se presenta en envases conteniendo 1 vial de 3 ml, 1 adaptador de vial, 1 jeringa y 1 aguja para inyección.

## MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado y acondicionamiento primario por: Cilag AG, Hochstrasse 201, Schaffhausen, Suiza.

Acondicionamiento secundario por: Stiftung Altra Schaffhausen, Mühlenstrasse 56, Schaffhausen, Suiza.

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A.  
Mendoza 1259, C1428DJG, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina  
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado N°:  
Directora Técnica: Farm. Georgina Rodriguez

### Centro de Atención al Cliente

Por correo electrónico: [infojanssen@janar.jnj.com](mailto:infojanssen@janar.jnj.com)

Por teléfono: 0800 122 0238

® Marca Registrada

### Fecha de última revisión:



BRUNO MAGNASCO Claudia Andrea  
CUIL 27180692407



LIMERES Manuel Rodolfo  
CUIL 20047031932

Specialist: NP

MAF: LGS

QC: REP

HA approval date:

AR\_RILP\_suspINJ\_PI\_EUPI Dec-21\_V2.0+D\_es

**PROYECTO DE ROTULO**  
**Envase primario (Etiqueta)**

---

**REKAMBYS®**  
**RILPIVIRINA 900 mg/3 ml**  
**Suspensión inyectable de liberación prolongada**

Únicamente para administración intramuscular en el glúteo

Certificado N°:

Industria suiza

LOTE:

VENCIMIENTO:



BRUNO MAGNASCO Claudia Andrea  
CUIL 27180692407



LIMERES Manuel Rodolfo  
CUIL 20047031932

## PROYECTO DE ROTULO

### Envase secundario

---

**REKAMBYS®**  
**RILPIVIRINA 900 mg/3 ml**  
**Suspensión inyectable de liberación prolongada**

Únicamente para administración intramuscular en el glúteo

Venta bajo receta archivada

Industria suiza

**Contenido:** 1 vial de 3 ml, 1 adaptador de vial, 1 jeringa y 1 aguja para inyección.

**Composición:** Cada vial de 3 ml contiene: Rilpivirina 900 mg (como rilpivirina base).  
Excipientes: Poloxámero 338, ácido cítrico monohidratado, glucosa monohidratada, fosfato diácido de sodio monohidratado, hidróxido de sodio, agua para inyectables.

**Información sobre el producto:** ver prospecto adjunto.

Para completar el tratamiento se necesita cabotegravir 600 mg (3 ml).

Conservar en la heladera entre 2°C y 8°C. No congelar.

### MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaboración y acondicionamiento primario en: Cilag AG, Hochstrasse 201, Schaffhausen, Suiza.  
Acondicionamiento secundario en: Stiftung Altra Schaffhausen, Mühlenstrasse 56, Schaffhausen, Suiza.

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A., Mendoza 1259 - C1428DJG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°:

Directora Técnica: Farm. Georgina Rodriguez

LOTE:

VENCIMIENTO:



BRUNO MAGNASCO Claudia Andrea  
CUIL 27180692407



LIMERES Manuel Rodolfo  
CUIL 20047031932

9 de mayo de 2022

**DISPOSICIÓN N° 3379****CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO  
DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (REM)****CERTIFICADO N° 59663****TROQUELES****EXPEDIENTE N° 1-0047-2001-000710-21-2****Datos Identificatorios Característicos de la Forma Farmacéutica****Troquel**

RILPIVIRINA 900 mg/ 3 ml - SUSPENSION INYECTABLE DE LIBERACION PROLONGADA

670026



SIERRAS Roberto Daniel  
CUIL 20182858685

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

**Productos Médicos**  
Av. Belgrano 1480  
(C1093AAP), CABA

**INAME**  
Av. Caseros 2161  
(C1264AAD), CABA

**INAL**  
Estados Unidos 25  
(C1087AAI), CABA

**Sede Alsina**  
Alsina 665/671  
(C1087AAI), CABA

**Sede Central**  
Av. de Mayo 869  
(C1084AAD), CABA

Página 1 de 1

Buenos Aires, 09 DE MAYO DE 2022.-

**DISPOSICIÓN N° 3379**

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO  
DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (REM)**

**CERTIFICADO N° 59663**

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autorizó la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

**1. DATOS DE LA EMPRESA TITULAR DEL CERTIFICADO**

Titular de especialidad medicinal: JANSSEN CILAG FARMACEUTICA SA

Representante en el país: No corresponde.

N° de Legajo de la empresa: 7034

**2. DATOS DE LA ESPECIALIDAD MEDICINAL**

Nombre comercial: REKAMBYS

Nombre Genérico (IFA/s): RILPIVIRINA

Concentración: 900 mg/ 3 ml

Forma farmacéutica: SUSPENSION INYECTABLE DE LIBERACION  
PROLONGADA

Fórmula Cualitativa y Cuantitativa por unidad de forma farmacéutica o

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

**Productos Médicos**  
Av. Belgrano 1480  
(C1093AAP), CABA

**INAME**  
Av. Caseros 2161  
(C1264AAD), CABA

**INAL**  
Estados Unidos 25  
(C1101AAA), CABA

**Sede Alsina**  
Alsina 665/671  
(C1087AAI), CABA

**Sede Central**  
Av. de Mayo 869  
(C1084AAD), CABA

porcentual

<b>Ingrediente (s) Farmacéutico (s) Activo (s) (IFA)</b>
--

RILPIVIRINA 900 mg/ 3 ml
--------------------------

<b>Excipiente (s)</b>
-----------------------

POLOXAMERO 338 150 mg
GLUCOSA MONOHIDRATADA 57,75 mg
ACIDO CITRICO MONOHIDRATADO 3 mg
HIDROXIDO DE SODIO 2,598 mg
FOSFATO DIACIDO DE SODIO MONOHIDRATADO 6 mg
AGUA PARA INYECTABLE CSP 3 ml

Origen y fuente del/de los Ingrediente/s Farmacéutico/s Activo/s: SINTÉTICO O SEMISINTÉTICO

Envase Primario: FRASCO AMPOLLA VIDRIO (I) CON TAPÓN ELASTOMÉRICO Y PRECINTO ALU

Contenido por envase primario: VIAL CONTENIENDO 900 MG DE RILPIVIRINA EN 3 ML.

Contenido por envase secundario: ENVASE CONTENIENDO 1 VIAL DE 3 ML, 1 ADAPTADOR DE VIAL, 1 JERINGA Y 1 AGUJA PARA INYECCION.

Presentaciones: 1

Período de vida útil: 24 MESES

Forma de conservación: Desde 2º C hasta 8º C

Otras condiciones de conservación: NO CONGELAR.

ANTES DE LA ADMINISTRACIÓN, EL VIAL DEBE LLEVARSE A TEMPERATURA AMBIENTE (NO MAYOR A 25°C). EL VIAL PUEDE PERMANECER EN LA CAJA A TEMPERATURA AMBIENTE DURANTE UN PERÍODO MÁXIMO DE 6 HORAS. SI SOBREPASADO EL PERÍODO DE 6 HORAS NO HA SIDO UTILIZADO, DEBE DESCARTARSE.

UNA VEZ QUE LA SUSPENSIÓN ES INTRODUCIDA EN LA JERINGA, LA INYECCIÓN DEBE ADMINISTRARSE LO ANTES POSIBLE, AUNQUE PUEDE PERMANECER EN LA JERINGA DURANTE UN PERÍODO MÁXIMO DE 2 HORAS. SUPERADAS LAS 2 HORAS, SE DEBE DESECHAR EL MEDICAMENTO, LA JERINGA Y LA AGUJA.

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

**Productos Médicos**  
Av. Belgrano 1480  
(C1093AAP), CABA

**INAME**  
Av. Caseros 2161  
(C1264AAD), CABA

**INAL**  
Estados Unidos 25  
(C1101AAA), CABA

**Sede Alsina**  
Alsina 665/671  
(C1087AAI), CABA

**Sede Central**  
Av. de Mayo 869  
(C1084AAD), CABA

FORMA RECONSTITUIDA

Tiempo de conservación: No corresponde

Forma de conservación, desde: No corresponde Hasta: No corresponde

Otras condiciones de conservación: No corresponde

Condición de expendio: BAJO RECETA ARCHIVADA

Código ATC: J05AG05

Acción terapéutica: Antivirales de uso sistémico, Inhibidor no nucleosídico de la transcriptasa reversa

Vía/s de administración: INTRAMUSCULAR

Indicaciones: REKAMBYS® está indicado, en combinación con la inyección de cabotegravir, para el tratamiento de la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana tipo 1 (VIH-1) en adultos virológicamente suprimidos (ARN del VIH-1 <50 copias/ml) bajo un régimen antirretroviral estable, sin evidencia actual o pasada de resistencia viral y sin fracaso virológico previo a agentes de las clases Inhibidores No Nucleosidos de la Transcriptasa Reversa (INNTIR) e Inhibidores de la Integrasa (INI).

### 3. DATOS DEL ELABORADOR/ES AUTORIZADO/S

#### Etapas de elaboración de la Especialidad Medicinal:

##### a)Elaboración hasta el granel y/o semielaborado:

Razón Social	Domicilio de la planta	Localidad	País
CILAG AG	HOCHSTRASSE 201	SCHAFFHAUSEN	SUIZA (CONFEDERACIÓN SUIZA)

##### b)Acondicionamiento primario:

Razón Social	Domicilio de la planta	Localidad	País
CILAG AG	HOCHSTRASSE 201	SHAFFHAUSEN	SUIZA (CONFEDERACIÓN SUIZA)

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

**Productos Médicos**  
Av. Belgrano 1480  
(C1093AAP), CABA

**INAME**  
Av. Caseros 2161  
(C1264AAD), CABA

**INAL**  
Estados Unidos 25  
(C1101AAA), CABA

**Sede Alsina**  
Alsina 665/671  
(C1087AAI), CABA

**Sede Central**  
Av. de Mayo 869  
(C1084AAD), CABA

**c) Acondicionamiento secundario:**

Razón Social	Domicilio de la planta	Localidad	País
STIFTUNG ALTRA SCHAFFHAUSEN	MÜHLENSTRASSE 56	SHAFFHAUSEN	SUIZA (CONFEDERACIÓN SUIZA)

**d) Control de calidad:**

Razón Social	Número de Disposición autorizante	Domicilio de la planta	Localidad	País
JANSSEN CILAG FARMACEUTICA S.A.	3143/15	RUTA 8, KM 63.5	FATIMA - BUENOS AIRES	ARGENTINA

País de elaboración: SUIZA (CONFEDERACIÓN SUIZA)

País de origen: SUIZA (CONFEDERACIÓN SUIZA)

País de procedencia del producto: SUIZA (CONFEDERACIÓN SUIZA) - BÉLGICA  
(REINO DE BÉLGICA)

El presente Certificado tendrá una validez de 5 años a partir de la fecha del mismo.

Expediente Nº: 1-0047-2001-000710-21-2

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

**Productos Médicos**  
Av. Belgrano 1480  
(C1093AAP), CABA

**INAME**  
Av. Caseros 2161  
(C1264AAD), CABA

**INAL**  
Estados Unidos 25  
(C1101AAA), CABA

**Sede Alsina**  
Alsina 665/671  
(C1087AAI), CABA

**Sede Central**  
Av. de Mayo 869  
(C1084AAD), CABA



Ministerio de Salud  
Argentina

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

**Productos Médicos**  
Av. Belgrano 1480  
(C1093AAP), CABA

**INAME**  
Av. Caseros 2161  
(C1264AAD), CABA

**INAL**  
Estados Unidos 25  
(C1101AAA), CABA

**Sede Alsina**  
Alsina 665/671  
(C1087AAI), CABA

**Sede Central**  
Av. de Mayo 869  
(C1084AAD), CABA



LIMERES Manuel Rodolfo  
CUIL 20047031932

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

**Productos Médicos**  
Av. Belgrano 1480  
(C1093AAP), CABA

**INAME**  
Av. Caseros 2161  
(C1264AAD), CABA

**INAL**  
Estados Unidos 25  
(C1101AAA), CABA

**Sede Alsina**  
Alsina 665/671  
(C1087AAI), CABA

**Sede Central**  
Av. de Mayo 869  
(C1084AAD), CABA