



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N°

7863

BUENOS AIRES,

19 NOV 2014

VISTO el Expediente N° 1-0047-0000-000040-13-6 del Registro de esta Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones LABORATORIOS CABUCHI S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de esta Administración Nacional, de una nueva especialidad medicinal, la que será elaborada en la República Argentina.

Que de la misma existe por lo menos un producto similar autorizado para su consumo público en el mercado interno de , país integrante del Anexo I del Decreto 150/92.

Que las actividades de elaboración y comercialización de especialidades medicinales se encuentran contempladas por la Ley 16463 y los Decretos 9763/64, 1890/92, y 150/92 (T.O. Decreto 177/93), y normas complementarias.

Que la solicitud presentada encuadra en el Art. 3° del Decreto 150/92 (T.O. Decreto 177/93).



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº **7 8 6 3**

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Gestión de Información Técnica.

Que consta la evaluación técnica producida por el Instituto Nacional de Medicamentos, en la que informa que el producto estudiado reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que los establecimientos declarados demuestran aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya inscripción en el Registro se solicita.

Que consta la evaluación técnica producida por el mencionado Instituto, en la que informa que la indicación, posología, vía de administración, condición de venta, y los proyectos de rótulos y de prospectos se consideran aceptables y reúnen los requisitos que contempla la norma legal vigente.

Que los datos identificatorios característicos a ser transcritos en los proyectos de la Disposición Autorizante y del Certificado correspondiente, han sido convalidados por las áreas técnicas precedentemente citadas.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta Administración Nacional, dictamina que se ha dado cumplimiento a los requisitos legales y formales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción en el REM de la especialidad medicinal objeto de la solicitud.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 1490/92 y del Decreto 1886/14.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN Nº **7863**

Por ello;

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º- Autorízase la inscripción en el Registro Nacional de Especialidades Medicinales (REM) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de la especialidad medicinal de nombre comercial DR. CABUCHI y nombre/s genérico/s ACIDO SALICILICO, la que será elaborada en la República Argentina, de acuerdo a lo solicitado, en el tipo de Trámite Nº 1.2.1, por LABORATORIOS CABUCHI S.A., con los Datos Identificatorios Característicos que figuran como Anexo I de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 2º- Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de prospecto/s figurando como Anexo II de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 3º- Extiéndese, sobre la base de lo dispuesto en los Artículos precedentes, el Certificado de Inscripción en el REM, figurando como Anexo III de la presente Disposición y que forma parte integrante de la misma.

ARTICULO 4º- En los rótulos y prospectos autorizados deberá figurar la leyenda: "ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD CERTIFICADO Nº...", con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN Nº

7863

norma legal vigente.

ARTICULO 5º- Con carácter previo a la comercialización del producto cuya inscripción se autoriza por la presente disposición, el titular del mismo deberá notificar a esta Administración Nacional la fecha de inicio de la elaboración o importación del primer lote a comercializar a los fines de realizar la verificación técnica consistente en la constatación de la capacidad de producción y de control correspondiente.

ARTICULO 6º- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 3º será por cinco (5) años, a partir de la fecha impresa en el mismo.

ARTICULO 7º- Regístrese. Inscribáse en el Registro Nacional de Especialidades Medicinales al nuevo producto. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la copia autenticada de la presente Disposición, conjuntamente con sus Anexos I, II, y III. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE Nº:1-0047-0000-000040-13-6

DISPOSICIÓN Nº:

7863

Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

ANEXO I

DATOS IDENTIFICATORIOS CARACTERÍSTICOS DE LA ESPECIALIDAD
MEDICINAL INSCRIPTA EN EL REM MEDIANTE DISPOSICIÓN ANMAT Nº:

7 8 6 3

Nombre comercial: DR. CABUCHI.

Nombre/s genérico/s: ACIDO SALICILICO.

Industria: ARGENTINA.

Lugar/es de elaboración: TUCUMAN 1301, ESQ. SAN JUAN, JESUS MARIA,
PROVINCIA DE CORDOBA.

Los siguientes datos identificatorios autorizados por la presente disposición se detallan a continuación:

Forma farmacéutica: GEL.

Nombre Comercial: DR. CABUCHI VL.

Clasificación ATC: D11AF.

Indicación/es autorizada/s: Se usa para la eliminación de callos y callosidades, zonas duras de la piel producidas por fricción o presión prolongada o repetida.

Concentración/es: 17 g% de ACIDO SALICILICO.

Fórmula completa por unidad de forma farmacéutica ó porcentual:

Genérico/s: ACIDO SALICILICO 17 g%.

Excipientes: HIDROXIPROPILCELULOSA 1.2 g%, ACIDO LACTICO 5 g%,



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

COLODION ELASTICO 16 g%, ETER 6 g%, ALCOHOL ETILICO 96° C.S.P. 100 g%.

Origen del producto: Sintético o Semisintético.

Vía/s de administración: TOPICA.

Envase/s Primario/s: POMO PE-ALU-PE, APLICADOR Y LIMA.

Presentación: ENVASES CONTENIENDO 4 y 8 GRAMOS DE GEL.

Contenido por unidad de venta: ENVASES CONTENIENDO 4 y 8 GRAMOS DE GEL.

Período de vida Útil: 24 meses.

Forma de conservación: TEMPERATURA desde 15°C hasta 30°C.

Condición de expendio: VENTA LIBRE.

Forma farmacéutica: GEL.

Nombre Comercial: DR. CABUCHI.

Clasificación ATC: D11 AF.

Indicación/es autorizada/s: esta indicado en el tratamiento y remoción de las verrugas vulgares (que aparecen en los dedos y palmas de las manos), verrugas plantares y callosidades.

Concentración/es: 26 g% de ACIDO SALICILICO.

Fórmula completa por unidad de forma farmacéutica ó porcentual:

Genérico/s: ACIDO SALICILICO 26 g%.

Excipientes: HIDROXIPROPILCELULOSA 1.2 g%, ACIDO LACTICO 5 g%,



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

COLODION ELASTICO 16 g%, ETER 6 g%, ALCOHOL ETILICO 96° C.S.P. 100 g%.

Origen del producto: Sintético o Semisintético.

Vía/s de administración: TOPICA.

Envase/s Primario/s: POMO PE-ALU-PE, APLICADOR Y LIMA.

Presentación: ENVASES CONTENIENDO 4 y 8 GRAMOS DE GEL.

Contenido por unidad de venta: ENVASES CONTENIENDO 4 y 8 GRAMOS DE GEL.

Período de vida Útil: 24 meses.

Forma de conservación: TEMPERATURA desde 15°C hasta 30°C.

Condición de expendio: BAJO RECETA.

Forma farmacéutica: LAPIZ.

Nombre Comercial: DR. CABUCHI.

Clasificación ATC: D11 AF.

Indicación/es autorizada/s: esta indicado en el tratamiento y remoción de las verrugas vulgares (que aparecen en los dedos y palmas de las manos), verrugas plantares y callosidades.

Concentración/es: 40 g% de ACIDO SALICILICO.

Fórmula completa por unidad de forma farmacéutica ó porcentual:

Genérico/s: ACIDO SALICILICO 40 g%.

Excipientes: VASELINA LIQUIDA 5.5 g%, VASELINA SOLIDA 4 g%, CERA DE



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ABEJAS 4 g%, ACEITE DE RICINO HIDROGENADO 18 g%, LANOLINA ANHIDRA 3 g%, CLOROBUTANOL 0.5 g%, MONOESTEARATO DE GLICERILO 25 g%.

Origen del producto: Sintético o Semisintético.

Vía/s de administración: TOPICA.

Envase/s Primario/s: PORTALAPIZ RETRACTIL DE PP.

Presentación: ENVASES CONTENIENDO 3 Y 5 GRAMOS.

Contenido por unidad de venta: ENVASES CONTENIENDO 3 Y 5 GRAMOS.

Período de vida Útil: 24 meses.

Forma de conservación: TEMPERATURA desde 15°C hasta 30°C.

Condición de expendio: BAJO RECETA.

DISPOSICIÓN N°:

7 8 6 3

Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.




Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO II

TEXTO DEL/LOS RÓTULO/S Y PROSPECTO/S AUTORIZADO/S
DE LA ESPECIALIDAD MEDICINAL INSCRIPTA EN EL REM MEDIANTE

DISPOSICIÓN ANMAT N°

7863


Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



PROYECTO DE RÓTULO

Dr. CABUCHI GEL
Ácido salicílico 26 %
Gel

Industria Argentina

7863

Venta Bajo Receta

Presentación: Pomo conteniendo 4 g, acompañado de aplicador y lima.

Fórmula cualicuantitativa:
Cada 100g contiene:

Acido Salicílico	26,00 g
Ácido láctico	5,00 g
Colodión elástico	16,00 g
Hidroxipropilcelulosa	1,20 g
Éter etílico	6,00 g
Alcohol etílico c.s.p	100,00 g

Posología: ver prospecto interno.

Conservación:

Mantener a temperatura ambiente, lejos de la luz directa y el calor.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

LABORATORIOS CABUCHI S.A.

Tucumán 1301 Esq. San Juan – Jesús María – Córdoba.

Teléfono: 0800-466-7777

Dirección Técnica: CARLOS DEGIOVANNI – Farmacéutico
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado N°

Lote:

Fecha de vencimiento:

Nota: El mismo texto acompañará al Gel por 8 g

LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
M.P. 5366
DIRECTOR TÉCNICO

LABORATORIOS CABUCHI S.A.
SERGIO MAURICIO CABUCHI
PRESIDENTE



PROYECTO DE RÓTULO

Dr. CABUCHI GEL "VL"
Ácido salicílico 17 %
Gel

Venta Libre

Industria Argentina

7863

Presentación: Pomo conteniendo 4 g, acompañado de aplicador y lima.

Fórmula cualicuantitativa:

Cada 100g de gel contiene:

Ácido Salicílico 17.0 gramos.

Excipientes: Ácido láctico, Colodión elástico, Hidroxipropilcelulosa, Éter etílico, Alcohol etílico, cs.

Posología: ver prospecto interno.

Conservación:

Mantener a temperatura ambiente, lejos de la luz directa y el calor.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico

LABORATORIOS CABUCHI S.A.

Tucumán 1301 Esq. San Juan – Jesús María – Córdoba.

Teléfono: 0800-466-7777

Dirección Técnica: CARLOS DEGIOVANNI – Farmacéutico
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado N°


Lote:

Fecha de vencimiento:

Nota: El mismo texto acompañará al Gel por 8 g.


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
(A.P. 5306)
DIRECTOR TÉCNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
SERGIO MAURICIO CABUCHI
PRESIDENTE



PROYECTO DE RÓTULO

Dr. CABUCHI LAPIZ
Ácido salicílico 40 %
Lápiz

Venta bajo Receta

Industria Argentina

7 8 6 3

Presentación: Envase conteniendo Lápiz Callicida por 3 g.

Fórmula cualicuantitativa:
Cada 100g contiene:

Acido Salicílico	40,00 g
Aceite de Ricino Hidrogenado	18,00 g
Monoestearato de glicerilo	25,00 g
Vaselina líquida	5,50 g
Vaselina sólida	4,00 g
Cera de abejas	4,00 g
Lanolina anhidra	3,00 g
Clorobutanol	0,50 g

Posología: ver prospecto interno.

Conservación:

Mantener a temperatura ambiente, lejos de la luz directa y el calor.

**MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS**

LABORATORIOS CABUCHI S.A.

Tucumán 1301 Esq. San Juan – Jesús María – Córdoba.


Teléfono: 0800-466-7777

Dirección Técnica: CARLOS DEGIOVANNI – Farmacéutico
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud
Certificado N°

Lote:

Fecha de vencimiento:

Nota: El mismo texto acompañará a Lápiz Callicida por 5 g.


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
I.I.P. 5366
DIRECTOR TÉCNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
SERGIO MAURICIO CABUCHI
PRESIDENTE



PROYECTO DE PROSPECTO

**Dr. CABUCHI GEL "VL"
ACIDO SALICILICO 17%
Gel**

7/8 6 3

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO

¿QUE CONTIENE DR. CABUCHI Gel?

Cada 100g contiene:

Ácido Salicílico 17.0 gramos.

Excipientes: Ácido láctico, Colodión elástico, Hidroxipropilcelulosa, Éter etílico, Alcohol etílico, c.s.

ACCIÓN:

El Ácido Salicílico tiene la propiedad de eliminar la capa más externa de la piel o disminuir su espesor.

¿PARA QUE SE USA DR. CABUCHI Gel?:

Dr. Cabuchi Gel se usa para la eliminación de callosidades, zonas dura de la piel producidas por fricción o presión prolongada o repetida.

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN UTILIZAR DR. CABUCHI Gel?:

NO USE este medicamento en niños menores de 12 años, sin Indicación del médico, o si usted es alérgico a alguno de sus ingredientes.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE EMPLEAR ESTE MEDICAMENTO?:

Es un medicamento de **USO EXTERNO EXCLUSIVAMENTE.**

Evitar el contacto con los ojos y mucosas.

No aplicar sobre lunares, marcas de nacimiento, verrugas en las que nace vello; así como tampoco en verrugas genitales, faciales, orales o nasales.

No emplear el producto sobre la piel irritada, infectada o enrojecida.

Tener en cuenta que la acción de eliminar la capa externa de la piel también ocurre sobre la piel sana que rodea el sitio a tratar, por lo que la aplicación se debe restringir sólo al área afectada.

No emplear en áreas extensas del cuerpo, ni por períodos prolongados, ni en exceso.

Si usted es diabético y/o sufre alguna enfermedad en la circulación, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento, pues puede producirse inflamación o ulceración, especialmente en las extremidades.

Si usted recibe algún otro medicamento, esta embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY UTILIZANDO ESTE MEDICAMENTO?

Suspenda su uso y consulte a su médico si aparece irritación excesiva en la piel sana que rodea la callosidad.

Si una vez iniciado el tratamiento, la callosidad persisten por más de 5 días o empeora, consulte a su médico.

En caso que por descuido, el producto entrara en contacto con los ojos o mucosas, lavar con abundante agua durante 15 minutos.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Utilizar Dr. Cabuchi Gel una vez al día, preferentemente por la noche antes de acostarse, siguiendo las instrucciones de uso.

Instrucciones de uso:

1. Antes de aplicar, sumergir el área afectada en agua tibia por 5 minutos y luego secar cuidadosamente.


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DECIOVANNI
M.P. 6308
DIRECTOR TECNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
SERGIO MAURICIO CABUCHI
PRESIDENTE



2. Si lo desea, puede pasar una lima fina sobre la callosidad (sin lastimar), para reducir el espesor de las mismas.
3. Aplicar una capa fina de gel (una o dos gotas) hasta cubrir la callosidad.
4. Dejar secar.
5. Aplicar hasta eliminar la callosidad o verruga, o por un tiempo máximo de 5 días.

7863

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA INGESTA ACCIDENTAL O SOBREDOSIS?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones o acuda al lugar más cercano de asistencia médica:

Hospital de Pediatría "Dr. Ricardo Gutiérrez", Tel.: (011) 4962-6666/2247

Hospital "Dr. A. Posadas", Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555.

Hospital de Niños de Córdoba, Tel.: (0351) 421-5303/422-0391.

Casafe de Rosario, Tel.: (0341) 448-0077/424-2727.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con LABORATORIOS CABUCHI S.A. al teléfono 0800-466-7777, vía e-mail a info@cabuchi.com o a través de la web: www.cabuchi.com.

También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

"Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños"

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico

FORMA DE CONSERVACIÓN: conservar en lugar fresco entre 15°C y 30°C.

Elaborado en: LABORATORIOS CABUCHI S.A.

Tucumán 1301 esq. San Juan. C.P. 5220. Jesús María. Pcia. de Córdoba, Argentina.

Teléfono 0800-466-7777, e-mail: info@cabuchi.com. Web: www.cabuchi.com

Director Técnico: Carlos Degiovanni. Farmacéutico.

**Medicamento Autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado N°**

Fecha de última revisión:

Presentaciones: 1 Pomo conteniendo 4 gramos y 8 gramos, acompañado de un aplicador y lima.


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
M.P. 5266
DIRECTOR TÉCNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
SERGIO MAURICIO CABUCHI
PRESIDENTE



7863

PROYECTO DE PROSPECTO

Dr. CABUCHI GEL
ACIDO SALICILICO 26%
Gel

Dr. CABUCHI LAPIZ
ACIDO SALICILICO 40%
Lápiz

VENTA BAJO RECETA

INDUSTRIA ARGENTINA

Fórmula Cual y Cuantitativa:

Dr. Cabuchi Gel 26%:

Principio activo: Ácido salicílico 26g/100 g

Excipientes: ácido láctico 5,0 g; colodión elástico 16,0 g; hidroxipropilcelulosa 1,20 g, éter etílico 6,00g, alcohol etílico 96° c.s.p. 100,0 g.

Dr. Cabuchi Lápiz 40%:

Principio activo: Ácido salicílico 40g/100 g

Excipientes: aceite de ricino hidrogenado 18,0 g; monoestearato de glicerilo 25,0 g; vaselina líquida 6,0 g; vaselina sólida 4,0 g; cera de abejas 4,0 g; lanolina anhidra 3,0 g; clorobutanol 0,49 g.

Acción terapéutica: Agente queratolítico.

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento y remoción de las verrugas comunes (que aparecen en los dedos y en las palmas de las manos), verrugas plantares y las callosidades.

Características farmacológicas:

Acción farmacológica:

El modo de acción del ácido salicílico en el tratamiento de las verrugas todavía no se conoce exactamente. Su actividad parece estar relacionada con su acción queratolítica, que resulta en la remoción mecánica de las células epidérmicas y la eliminación del virus causante de la verruga (HPV- Virus del Papiloma Humano)

Posología y forma de administración:

Antes de aplicar sumergir el área afectada por 5 minutos en agua tibia y luego secar cuidadosamente.

Limar suavemente la superficie de la verruga con una lima fina, de modo de retirar la capa superficial rugosa de la verruga, evitando el sangrado. En caso de que esto ocurra, interrumpir el tratamiento por tres días.

Gel: Colocar una fina capa de Dr. Cabuchi Gel (una o dos gotas) sobre la verruga o callosidad, una vez al día. Esperar que se seque y proteger con un pequeño apósito adhesivo. Evitar el contacto con la zona sana de piel que circunscribe a la verruga o callosidad.

Lápiz: Aplicar una fina capa de Dr. Cabuchi Lápiz sobre la callosidad o verruga, con cuidado de no extenderse demasiado a la piel sana que la rodea.

Continuar el tratamiento hasta que desaparezca la verruga o callosidad o por un máximo de hasta 5 días.


Contraindicaciones:

Está contraindicado su uso en pacientes con hipersensibilidad al ácido salicílico o cualquiera de sus componentes.

Está contraindicado en pacientes diabéticos o con problemas circulatorios en las extremidades.

No se debe aplicar sobre lunares, marcas de nacimiento o verrugas raras con pelos. Tampoco se debe utilizar en rostro, axilas y área genital.

Advertencias:


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
PABLO DEGIOVANNI
M.P. 5300
DIRECTOR TÉCNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
SERGIO MAURICIO CABUCHI
PRESIDENTE



El ácido salicílico debe ser usado con cuidado en áreas grandes de la piel, pues puede producir toxicidad sistémica. Su aplicación continua y frecuente en la piel puede causar dermatitis.

Evitar el contacto con los ojos y las mucosas. Si ocurre contacto lavar con abundante agua hasta remoción del producto, y continuar lavando durante 15 minutos más.

No emplear el producto sobre la piel irritada, infectada o enrojecida.

7863

Precauciones:

Interacciones: Se desaconseja el uso concomitante de otros productos que contengan agentes exfoliantes, alcohol, jabones abrasivos, cosméticos o jabones desecantes u otra medicación para la piel salvo mejor consejo médico.

Embarazo y lactancia:

No se han realizado estudios en seres humanos pero se debe tener en cuenta que el ácido salicílico puede absorberse sistémicamente. Se desconoce si el ácido salicílico pasa a leche materna.

Reacciones adversa:

Irritación local: frecuente, puede ser controlada por la suspensión temporaria de la terapia y por la aplicación del producto solamente sobre la verruga, evitando el contacto con la piel sana.

Sensación de hormigueo y/o sensibilidad en la zona tratada: poco frecuente.

Sobredosificación:

La ingestión accidental del producto puede producir efectos sistémicos tales como vómitos, dolor abdominal, aumento en la frecuencia respiratoria, acidosis y disturbios mentales. Puede provocar erupciones cutáneas en individuos sensibles.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Pediatría "Dr. Ricardo Gutiérrez", Tel.: (011) 4962-6666/2247.

Hospital: "Dr. A. Posadas", Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555.

Hospital de Niños de Córdoba, Tel.: (0351) 421-5303/422-0391.

Casa de Rosario, Tel.: (0341) 448-0077/424-2727.

Presentaciones:

Dr. Cabuchi Gel 26%: Pomos por 4g y 8 g, acompañado de un aplicador y lima.

Dr. Cabuchi Lápiz 40%: Lápiz por 3g y 5 g.

Condiciones de conservación y almacenamiento: conservar en lugar fresco entre 15°C y 30°C.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad medicinal Autorizado por el Ministerio de Salud
Certificado N°:

Elaborado en: LABORATORIOS CABUCHI S.A
Tucumán 1301 esq. San Juan C.P. 5220. Jesús María. Pcia. De Córdoba. Argentina
Teléfono 0800-466-7777, e-mail: info@cabuchi.com. Web: www.cabuchi.com

Director Técnico: Carlos Degiovanni. Farmacéutico.

Fecha de última revisión:


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
M.P. 5306
DIRECTOR TÉCNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
SERGIO MAURICIO CABUCHI
PRESIDENTE



7863

PROYECTO PARA

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Dr. CABUCHI GEL
ACIDO SALICILICO 26%
Gel

Dr. CABUCHI LAPIZ
ACIDO SALICILICO 40%
Lápiz

VENTA BAJO RECETA

INDUSTRIA ARGENTINA

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a utilizar el medicamento.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.

"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"

1. ¿Que acción tiene DR. CABUCHI GEL 26% y DR. CABUCHI LÁPIZ 40% y para que se utilizan?

DR. CABUCHI GEL 26% y DR. CABUCHI LÁPIZ 40% son productos descamantes que se utilizan para el tratamiento y remoción de las verrugas comunes (que aparecen en los dedos y en las palmas de las manos), verrugas plantares y las callosidades.

2. Antes de usar este medicamento:

Lea atentamente las instrucciones de cómo utilizar DR. CABUCHI.

No lo utilice:

- Si sabe que es alérgico al Acido Salicílico o a cualquier ingrediente.
- En pacientes diabéticos o con problemas circulatorios en las extremidades.

No se debe aplicar sobre lunares, marcas de nacimiento o verrugas raras con pelos. Tampoco se debe utilizar en rostro, axilas y área genital.

En caso que vaya a utilizarse en áreas grandes de la piel, pues puede producir toxicidad sistémica.

La aplicación continua y frecuente en la piel puede causar inflamación de la misma.

Evitar el contacto con los ojos y las mucosas. Si ocurre contacto lavar con abundante agua hasta remoción del producto, y continuar lavando durante 15 minutos más.

No emplear el producto sobre la piel irritada, infectada o enrojecida.

Se desaconseja su uso en forma simultánea con otros productos que contengan agentes exfoliantes, alcohol, jabones abrasivos, cosméticos o jabones desecantes u otra medicación para la piel salvo mejor consejo médico.

Embarazo y lactancia:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento

No se han realizado estudios en seres humanos pero se debe tener en cuenta que el ácido salicílico puede absorberse sistémicamente. Se desconoce si el ácido salicílico pasa a leche materna.


3. Uso apropiado del medicamento:


Siga las siguientes instrucciones salvo que su médico le haya dado indicaciones distintas:

Antes de aplicar sumergir el área afectada por 5 minutos en agua tibia y luego secar cuidadosamente.

Limar suavemente la superficie de la verruga con una lima fina, de modo de retirar la capa superficial rugosa de la verruga, evitando el sangrado. En caso de que esto ocurra, interrumpir el tratamiento por tres días.

3.1. DR. CABUCHI GEL 26%: Colocar una fina capa de gel sobre la verruga o callosidad, una vez al día. Esperar que se seque y proteger con un pequeño


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
M.P. 5366
CIERRE EN FEBRERO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
SERGIO MAURICIO CABUCHI
PRESIDENTE



863

apósito adhesivo. Evitar el contacto con la zona sana de piel que circunscribe a la verruga o callosidad.

3.2. **DR. CABUCHI LÁPIZ 40%:** Aplicar una fina capa sobre la callosidad o verruga, con cuidado de no extenderse demasiado a la piel sana que la rodea. Continuar el tratamiento hasta que desaparezca la verruga o callosidad o por un máximo de hasta 5 días.

4. Modo de conservación:

Conservar en lugar fresco entre 15°C y 30°C.

5. Efectos indeseables:

Irritación local: frecuente, por lo que se debe tener especial cuidado de aplicar el producto solamente en el área afectada, evitando el contacto con la piel sana. En caso de irritación suspender el tratamiento y consulte al médico.

Sensación de hormigueo y/o sensibilidad en la zona tratada: poco frecuente.

6. Información adicional

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:

Hospital de Pediatría "Dr. Ricardo Gutiérrez", Tel: (011) 4962-6666/2247.

Hospital: "Dr. A. Posadas", Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555.

Hospital de Niños de Córdoba, Tel.: (0351) 421-5303/422-0391.

Casa de Rosario, Tel.: (0341) 448-0077/424-2727.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad medicinal Autorizado por el Ministerio de Salud
Certificado N°:

Elaborado en: **LABORATORIOS CABUCHI S.A**

Tucumán 1301 esq. San Juan C.P. 5220. Jesús María. Pcia. De Córdoba. Argentina.

Teléfono 0800-466-7777, e-mail: info@cabuchi.com. Web: www.cabuchi.com

Director Técnico: Carlos Degiovanni. Farmacéutico.

Fecha de última revisión:


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
M.P. 6366
Buenos Aires


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
SERGIO MAURICIO CABUCHI
PRESIDENTE



PROYECTO DE PROSPECTO

786

Dr. CABUCHI GEL "VL"
ACIDO SALICILICO
Gel 17%

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO

¿QUE CONTIENE DR. CABUCHI Gel?

Cada 100g contiene:

Ácido Salicílico 17.0 gramos.

Excipientes: Ácido láctico, Colodión elástico, Hidroxipropilcelulosa, Éter etílico, Alcohol etílico, c.s.

ACCIÓN:

El Ácido Salicílico tiene la propiedad de eliminar la capa más externa de la piel o disminuir su espesor.

¿PARA QUE SE USA DR. CABUCHI Gel?:

Dr. Cabuchi Gel se usa para la eliminación de callosidades, zonas dura de la piel producidas por fricción o presión prolongada o repetida.

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN UTILIZAR DR. CABUCHI Gel?:

NO USE este medicamento en niños menores de 12 años, sin indicación del médico, o si usted es alérgico a alguno de sus ingredientes.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE EMPLEAR ESTE MEDICAMENTO?:

Es un medicamento de **USO EXTERNO EXCLUSIVAMENTE**.

Evitar el contacto con los ojos y mucosas.

No aplicar sobre lunares, marcas de nacimiento, verrugas en las que nace vello; así como tampoco en verrugas genitales, faciales, orales o nasales.

No emplear el producto sobre la piel irritada, infectada o enrojecida.

Tener en cuenta que la acción de eliminar la capa externa de la piel también ocurre sobre la piel sana que rodea el sitio a tratar, por lo que la aplicación se debe restringir sólo al área afectada.

No emplear en áreas extensas del cuerpo, ni por periodos prolongados, ni en exceso.

Si usted es diabético y/o sufre alguna enfermedad en la circulación, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento, pues puede producirse inflamación o ulceración, especialmente en las extremidades.

Si usted recibe algún otro medicamento, esta embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY UTILIZANDO ESTE MEDICAMENTO?

Suspenda su uso y consulte a su médico si aparece irritación excesiva en la piel sana que rodea la callosidad.

Si una vez iniciado el tratamiento, la callosidad persisten por más de 5 días o empeora, consulte a su médico.


En caso que por descuido, el producto entrara en contacto con los ojos o mucosas, lavar con abundante agua durante 15 minutos.


¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Utilizar Dr. Cabuchi Gel una vez al día, preferentemente por la noche antes de acostarse, siguiendo las instrucciones de uso.

Instrucciones de uso:

1. Antes de aplicar, sumergir el área afectada en agua tibia por 5 minutos y luego secar cuidadosamente.


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
M.P. 5366
DIRECTOR TECNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
GABRIEL EDUARDO CABUCHI
VICE-PRESIDENTE



2. Si lo desea, puede pasar una lima fina sobre la callosidad (sin lastimar), para reducir el espesor de las mismas.
3. Aplicar una capa fina de gel (una o dos gotas) hasta cubrir la callosidad.
4. Dejar secar.
5. Aplicar hasta eliminar la callosidad o verruga, o por un tiempo máximo de 5 días.

7803

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA INGESTA ACCIDENTAL O SOBREDOSIS?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones o acuda al lugar más cercano de asistencia médica:

Hospital de Pediatría "Dr. Ricardo Gutiérrez", Tel.: (011) 4962-6666/2247

Hospital "Dr. A. Posadas", Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555.

Hospital de Niños de Córdoba, Tel.: (0351) 421-5303/422-0391.

Casafe de Rosario, Tel.: (0341) 448-0077/424-2727.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con LABORATORIOS CABUCHI S.A. al teléfono 0800-466-7777, vía e-mail a info@cabuchi.com o a través de la web: www.cabuchi.com.

También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

"Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños"

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico

FORMA DE CONSERVACIÓN: conservar en lugar fresco entre 15°C y 30°C.

Elaborado en: LABORATORIOS CABUCHI S.A.

Tucumán 1301 esq. San Juan, C.P. 5220, Jesús María, Pcia. de Córdoba, Argentina.

Teléfono 0800-466-7777, e-mail: info@cabuchi.com. Web: www.cabuchi.com


Director Técnico: Carlos Degiovanni. Farmacéutico.

Medicamento Autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado N°

Fecha de última revisión:

Presentaciones: 1 Pomo conteniendo 4 gramos y 8 gramos, acompañado de un aplicador y lima.


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
M.P. 5366
DIRECTOR TÉCNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
GABRIEL EDUARDO CABUCHI
VICE-PRESIDENTE



PROYECTO DE PROSPECTO

7883

Dr. CABUCHI GEL
ACIDO SALICILICO
Gel 26%

Dr. CABUCHI LAPIZ
ACIDO SALICILICO
Lápiz 40%

VENTA BAJO RECETA

INDUSTRIA ARGENTINA

Fórmula Cual y Cuantitativa:

Dr. Cabuchi Gel 26%:

Principio activo: Ácido salicílico 26g/100 g

Excipientes: ácido láctico 5,0 g; colodión elástico 16,0 g; hidroxipropilcelulosa 1,20 g, éter etílico 6,00g, alcohol etílico 96° c.s.p. 100,0 g.

Dr. Cabuchi Lápiz 40%:

Principio activo: Ácido salicílico 40g/100 g

Excipientes: aceite de ricino hidrogenado 18,0 g; monoestearato de glicerilo 25,0 g; vaselina líquida 6,0 g; vaselina sólida 4,0 g; cera de abejas 4,0 g; lanolina anhidra 3,0 g; clorobutanol 0,49 g.

Acción terapéutica: Agente queratolítico.

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento y remoción de las verrugas comunes (que aparecen en los dedos y en las palmas de las manos), verrugas plantares y las callosidades.

Características farmacológicas:

Acción farmacológica:

El modo de acción del ácido salicílico en el tratamiento de las verrugas todavía no se conoce exactamente. Su actividad parece estar relacionada con su acción queratolítica, que resulta en la remoción mecánica de las células epidérmicas y la eliminación del virus causante de la verruga (HPV- Virus del Papiloma Humano)

Posología y forma de administración:

Antes de aplicar sumergir el área afectada por 5 minutos en agua tibia y luego secar cuidadosamente.

Limar suavemente la superficie de la verruga con una lima fina, de modo de retirar la capa superficial rugosa de la verruga, evitando el sangrado. En caso de que esto ocurra, interrumpir el tratamiento por tres días.

Gel: Colocar una fina capa de Dr. Cabuchi Gel (una o dos gotas) sobre la verruga o callosidad, una vez al día. Esperar que se seque y proteger con un pequeño apósito adhesivo. Evitar el contacto con la zona sana de piel que circunscribe a la verruga o callosidad.

Lápiz: Aplicar una fina capa de Dr. Cabuchi Lápiz sobre la callosidad o verruga, con cuidado de no extenderse demasiado a la piel sana que la rodea.

Continuar el tratamiento hasta que desaparezca la verruga o callosidad o por un máximo de hasta 5 días.

Contraindicaciones:

Está contraindicado su uso en pacientes con hipersensibilidad al ácido salicílico o cualquiera de sus componentes.


Está contraindicado en pacientes diabéticos o con problemas circulatorios en las extremidades.

No se debe aplicar sobre lunares, marcas de nacimiento o verrugas raras con pelos.

Tampoco se debe utilizar en rostro, axilas y área genital.

Advertencias:


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
M.P. 5366
DIRECTOR TÉCNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
GABRIEL EDUARDO CABUCHI
VICE-PRESIDENTE



7863

El ácido salicílico debe ser usado con cuidado en áreas grandes de la piel, pues puede producir toxicidad sistémica. Su aplicación continua y frecuente en la piel puede causar dermatitis.

Evitar el contacto con los ojos y las mucosas. Si ocurre contacto lavar con abundante agua hasta remoción del producto, y continuar lavando durante 15 minutos más.

No emplear el producto sobre la piel irritada, infectada o enrojecida.

Precauciones:

Interacciones: Se desaconseja el uso concomitante de otros productos que contengan agentes exfoliantes, alcohol, jabones abrasivos, cosméticos o jabones desecantes u otra medicación para la piel salvo mejor consejo médico.

Embarazo y lactancia:

No se han realizado estudios en seres humanos pero se debe tener en cuenta que el ácido salicílico puede absorberse sistémicamente. Se desconoce si el ácido salicílico pasa a leche materna.

Reacciones adversa:

Iritación local: frecuente, puede ser controlada por la suspensión temporaria de la terapia y por la aplicación del producto solamente sobre la verruga, evitando el contacto con la piel sana.

Sensación de hormigueo y/o sensibilidad en la zona tratada: poco frecuente.

Sobredosificación:

La ingestión accidental del producto puede producir efectos sistémicos tales como vómitos, dolor abdominal, aumento en la frecuencia respiratoria, acidosis y disturbios mentales. Puede provocar erupciones cutáneas en individuos sensibles.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Pediatría "Dr. Ricardo Gutiérrez", Tel: (011) 4962-6666/2247.

Hospital: "Dr. A. Posadas", Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555.

Hospital de Niños de Córdoba, Tel.: (0351) 421-5303/422-0391.

Casafé de Rosario, Tel.: (0341) 448-0077/424-2727.

Presentaciones:

Dr. Cabuchi Gel 26%: Pomos por 4g y 8 g, acompañado de un aplicador y lima.

Dr. Cabuchi Lápiz 40%: Lápiz por 3g y 5 g.

Condiciones de conservación y almacenamiento: conservar en lugar fresco entre 15°C y 30°C.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS


Especialidad medicinal Autorizado por le Ministerio de Salud
Certificado N°:

Elaborado en: LABORATORIOS CABUCHI S.A
Tucumán 1301 esq. San Juan C.P. 5220. Jesús María. Pcia. De Córdoba. Argentina
Teléfono 0800-468-7777, e-mail: info@cabuchi.com. Web: www.cabuchi.com

Director Técnico: Carlos Degiovanni. Farmacéutico.

Fecha de última revisión:


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
I.I. P. 5365
DIRECTOR TÉCNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
HORIEL EDUARDO CABUCHI
VICE-PRESIDENTE



7863

PROYECTO PARA

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Dr. CABUCHI GEL
ACIDO SALICILICO 26% - Gel

Dr. CABUCHI LAPIZ
ACIDO SALICILICO 40% - Lápiz

VENTA BAJO RECETA

INDUSTRIA ARGENTINA

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a utilizar el medicamento.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.

"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"

1. ¿Que acción tiene DR. CABUCHI GEL 26% y DR. CABUCHI LÁPIZ 40% y para que se utilizan?

DR. CABUCHI GEL 26% y DR. CABUCHI LÁPIZ 40% son productos descamantes que se utilizan para el tratamiento y remoción de las verrugas comunes (que aparecen en los dedos y en las palmas de las manos), verrugas plantares y las callosidades.

2. Antes de usar este medicamento:

Lea atentamente las instrucciones de cómo utilizar DR. CABUCHI.

No lo utilice:

- Si sabe que es alérgico al Acido Salicílico o a cualquier ingrediente.
- En pacientes diabéticos o con problemas circulatorios en las extremidades.

No se debe aplicar sobre lunares, marcas de nacimiento o verrugas raras con pelos. Tampoco se debe utilizar en rostro, axilas y área genital.

En caso que vaya a utilizarse en áreas grandes de la piel, pues puede producir toxicidad sistémica.

La aplicación continua y frecuente en la piel puede causar inflamación de la misma.

Evitar el contacto con los ojos y las mucosas. Si ocurre contacto lavar con abundante agua hasta remoción del producto, y continuar lavando durante 15 minutos más.

No emplear el producto sobre la piel irritada, infectada o enrojecida.

Se desaconseja su uso en forma simultánea con otros productos que contengan agentes exfoliantes, alcohol, jabones abrasivos, cosméticos o jabones desecantes u otra medicación para la piel salvo mejor consejo médico.

Embarazo y lactancia:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento

No se han realizado estudios en seres humanos pero se debe tener en cuenta que el ácido salicílico puede absorberse sistémicamente. Se desconoce si el ácido salicílico pasa a leche materna.

3. Uso apropiado del medicamento:


Siga las siguientes instrucciones salvo que su médico le haya dado indicaciones distintas:

Antes de aplicar sumergir el área afectada por 5 minutos en agua tibia y luego secar cuidadosamente.

Limar suavemente la superficie de la verruga con una lima fina, de modo de retirar la capa superficial rugosa de la verruga, evitando el sangrado. En caso de que esto ocurra, interrumpir el tratamiento por tres días.

- 3.1. DR. CABUCHI GEL 26%: Colocar una fina capa de gel sobre la verruga o callosidad, una vez al día. Esperar que se seque y proteger con un pequeño apósito adhesivo. Evitar el contacto con la zona sana de piel que circunscribe a la verruga o callosidad.


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
M.P. 5288
DIRECTOR TECNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
GR. DR. EL EDUARDO CABUCHI
VICE-PRESIDENTE



7831

3.2. **DR. CABUCHI LÁPIZ 40%:** Aplicar una fina capa sobre la callosidad o verruga, con cuidado de no extenderse demasiado a la piel sana que la rodea. Continuar el tratamiento hasta que desaparezca la verruga o callosidad o por un máximo de hasta 5 días.

4. Modo de conservación:
Conservar en lugar fresco entre 15°C y 30°C.

5. Efectos indeseables:
Iritación local: frecuente, por lo que se debe tener especial cuidado de aplicar el producto solamente en el área afectada, evitando el contacto con la piel sana. En caso de irritación suspenda el tratamiento y consulte al médico.

Sensación de hormigueo y/o sensibilidad en la zona tratada: poco frecuente.

6. Información adicional
ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:
Hospital de Pediatría "Dr. Ricardo Gutiérrez", Tel: (011) 4962-6666/2247.
Hospital: "Dr. A. Posadas", Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555.
Hospital de Niños de Córdoba, Tel.: (0351) 421-5303/422-0391.
Casafé de Rosario, Tel.: (0341) 448-0077/424-2727.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS


Especialidad medicinal Autorizado por le Ministerio de Salud
Certificado N°:

Elaborado en: **LABORATORIOS CABUCHI S.A**
Tucumán 1301 esq. San Juan C.P. 5220. Jesús María. Pcia. De Córdoba. Argentina.
Teléfono 0800-466-7777, e-mail: info@cabuchi.com. Web: www.cabuchi.com

Director Técnico: Carlos Degiovanni. Farmacéutico.

Fecha de última revisión:


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
M.P. 5366
DIRECTOR TÉCNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
GABRIEL EDUARDO CABUCHI
VICE-PRESIDENTE



7863

PROYECTO DE PROSPECTO

Dr. CABUCHI GEL "VL"
ACIDO SALICILICO
Gel 17%

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO

¿QUE CONTIENE DR. CABUCHI Gel?

Cada 100g contiene:

Ácido Salicílico 17.0 gramos.

Excipientes: Ácido láctico, Colodión elástico, Hidroxipropilcelulosa, Éter etílico, Alcohol etílico, c.s.

ACCIÓN:

El Ácido Salicílico tiene la propiedad de eliminar la capa más externa de la piel o disminuir su espesor.

¿PARA QUE SE USA DR. CABUCHI Gel?:

Dr. Cabuchi Gel se usa para la eliminación de callosidades, zonas dura de la piel producidas por fricción o presión prolongada o repetida.

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN UTILIZAR DR. CABUCHI Gel?:

NO USE este medicamento en niños menores de 12 años, sin indicación del médico, o si usted es alérgico a alguno de sus ingredientes.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE EMPLEAR ESTE MEDICAMENTO?:

Es un medicamento de **USO EXTERNO EXCLUSIVAMENTE.**

Evitar el contacto con los ojos y mucosas.

No aplicar sobre lunares, marcas de nacimiento, verrugas en las que nace vello; así como tampoco en verrugas genitales, faciales, orales o nasales.

No emplear el producto sobre la piel irritada, infectada o enrojecida.

Tener en cuenta que la acción de eliminar la capa externa de la piel también ocurre sobre la piel sana que rodea el sitio a tratar, por lo que la aplicación se debe restringir sólo al área afectada.

No emplear en áreas extensas del cuerpo, ni por períodos prolongados, ni en exceso.

Si usted es diabético y/o sufre alguna enfermedad en la circulación, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento, pues puede producirse inflamación o ulceración, especialmente en las extremidades.

Si usted recibe algún otro medicamento, esta embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY UTILIZANDO ESTE MEDICAMENTO?

Suspenda su uso y consulte a su médico si aparece irritación excesiva en la piel sana que rodea la callosidad.

Si una vez iniciado el tratamiento, la callosidad persisten por más de 5 días o empeora, consulte a su médico.

En caso que por descuido, el producto entrara en contacto con los ojos o mucosas, lavar con abundante agua durante 15 minutos.


¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Utilizar **Dr. Cabuchi Gel** una vez al día, preferentemente por la noche antes de acostarse, siguiendo las instrucciones de uso.

Instrucciones de uso:

1. Antes de aplicar, sumergir el área afectada en agua tibia por 5 minutos y luego secar cuidadosamente.


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
M.P. 5366
DIRECTOR TÉCNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
MIGUEL EDUARDO CABUCHI
VICE-PRESIDENTE



2. Si lo desea, puede pasar una lima fina sobre la callosidad (sin lastimar), para reducir el espesor de las mismas.
3. Aplicar una capa fina de gel (una o dos gotas) hasta cubrir la callosidad.
4. Dejar secar.
5. Aplicar hasta eliminar la callosidad o verruga, o por un tiempo máximo de 5 días.

7 8 6 3

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA INGESTA ACCIDENTAL O SOBREDOSIS?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones o acuda al lugar más cercano de asistencia médica:

Hospital de Pediatría "Dr. Ricardo Gutiérrez", Tel.: (011) 4962-6666/2247

Hospital "Dr. A. Posadas", Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555.

Hospital de Niños de Córdoba, Tel.: (0351) 421-5303/422-0391.

Casafe de Rosario, Tel.: (0341) 448-0077/424-2727.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con LABORATORIOS CABUCHI S.A. al teléfono 0800-466-7777, vía e-mail a info@cabuchi.com o a través de la web: www.cabuchi.com.

También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

"Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños"

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico

FORMA DE CONSERVACIÓN: conservar en lugar fresco entre 15°C y 30°C.

Elaborado en: LABORATORIOS CABUCHI S.A.

Tucumán 1301 esq. San Juan. C.P. 5220. Jesús María. Pcia. de Córdoba. Argentina.

Teléfono 0800-466-7777, e-mail: info@cabuchi.com. Web: www.cabuchi.com


Director Técnico: Carlos Degiovanni. Farmacéutico.

Medicamento Autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado N°

Fecha de última revisión:

Presentaciones: 1 Pomo conteniendo 4 gramos y 8 gramos, acompañado de un aplicador y lima.


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
M.P. 5366
DIRECTOR TÉCNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
GABRIEL EDUARDO CABUCHI
V. D. PRESIDENTE



PROYECTO DE PROSPECTO

7863

Dr. CABUCHI GEL
ACIDO SALICILICO
Gel 26%

Dr. CABUCHI LAPIZ
ACIDO SALICILICO
Lápiz 40%

VENTA BAJO RECETA

INDUSTRIA ARGENTINA

Fórmula Cual y Cuantitativa:

Dr. Cabuchi Gel 26%:

Principio activo: Ácido salicílico 26g/100 g

Excipientes: ácido láctico 5,0 g; colodión elástico 16,0 g; hidroxipropilcelulosa 1,20 g, éter etílico 6,00g, alcohol etílico 96° c.s.p. 100,0 g.

Dr. Cabuchi Lápiz 40%:

Principio activo: Ácido salicílico 40g/100 g

Excipientes: aceite de ricino hidrogenado 18,0 g; monoestearato de glicerilo 25,0 g; vaselina líquida 6,0 g; vaselina sólida 4,0 g; cera de abejas 4,0 g; lanolina anhidra 3,0 g; clorobutanol 0,49 g.

Acción terapéutica: Agente queratolítico.

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento y remoción de las verrugas comunes (que aparecen en los dedos y en las palmas de las manos), verrugas plantares y las callosidades.

Características farmacológicas:

Acción farmacológica:

El modo de acción del ácido salicílico en el tratamiento de las verrugas todavía no se conoce exactamente. Su actividad parece estar relacionada con su acción queratolítica, que resulta en la remoción mecánica de las células epidérmicas y la eliminación del virus causante de la verruga (HPV- Virus del Papiloma Humano)

Posología y forma de administración:

Antes de aplicar sumergir el área afectada por 5 minutos en agua tibia y luego secar cuidadosamente.

Limar suavemente la superficie de la verruga con una lima fina, de modo de retirar la capa superficial rugosa de la verruga, evitando el sangrado. En caso de que esto ocurra, interrumpir el tratamiento por tres días.

Gel: Colocar una fina capa de Dr. Cabuchi Gel (una o dos gotas) sobre la verruga o callosidad, una vez al día. Esperar que se seque y proteger con un pequeño apósito adhesivo. Evitar el contacto con la zona sana de piel que circunscribe a la verruga o callosidad.

Lápiz: Aplicar una fina capa de Dr. Cabuchi Lápiz sobre la callosidad o verruga, con cuidado de no extenderse demasiado a la piel sana que la rodea.

Continuar el tratamiento hasta que desaparezca la verruga o callosidad o por un máximo de hasta 5 días.

Contraindicaciones:

Está contraindicado su uso en pacientes con hipersensibilidad al ácido salicílico o cualquiera de sus componentes.

Está contraindicado en pacientes diabéticos o con problemas circulatorios en las extremidades.

No se debe aplicar sobre lunares, marcas de nacimiento o verrugas raras con pelos. Tampoco se debe utilizar en rostro, axilas y área genital.

Advertencias:

LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DE GIOVANNI
C.I.P. 5266
DIRECTOR TÉCNICO

GABRIEL EDUARDO CABUCHI
VICE-PRESIDENTE



7863

El ácido salicílico debe ser usado con cuidado en áreas grandes de la piel, pues puede producir toxicidad sistémica. Su aplicación continua y frecuente en la piel puede causar dermatitis.

Evitar el contacto con los ojos y las mucosas. Si ocurre contacto lavar con abundante agua hasta remoción del producto, y continuar lavando durante 15 minutos más.

No emplear el producto sobre la piel irritada, infectada o enrojecida.

Precauciones:

Interacciones: Se desaconseja el uso concomitante de otros productos que contengan agentes exfoliantes, alcohol, jabones abrasivos, cosméticos o jabones desecantes u otra medicación para la piel salvo mejor consejo médico.

Embarazo y lactancia:

No se han realizado estudios en seres humanos pero se debe tener en cuenta que el ácido salicílico puede absorberse sistémicamente. Se desconoce si el ácido salicílico pasa a leche materna.

Reacciones adversa:

Iritación local: frecuente, puede ser controlada por la suspensión temporaria de la terapia y por la aplicación del producto solamente sobre la verruga, evitando el contacto con la piel sana.

Sensación de hormigueo y/o sensibilidad en la zona tratada: poco frecuente.

Sobredosificación:

La ingestión accidental del producto puede producir efectos sistémicos tales como vómitos, dolor abdominal, aumento en la frecuencia respiratoria, acidosis y disturbios mentales. Puede provocar erupciones cutáneas en individuos sensibles.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Pediatría "Dr. Ricardo Gutiérrez", Tel: (011) 4962-6666/2247.

Hospital: "Dr. A. Posadas", Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555.

Hospital de Niños de Córdoba, Tel.: (0351) 421-5303/422-0391.

Casafé de Rosario, Tel.: (0341) 448-0077/424-2727.

Presentaciones:

Dr. Cabuchi Gel 26%: Pomos por 4g y 8 g, acompañado de un aplicador y lima.

Dr. Cabuchi Lápiz 40%: Lápiz por 3g y 5 g.

Condiciones de conservación y almacenamiento: conservar en lugar fresco entre 15°C y 30°C.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS


Especialidad medicinal Autorizado por le Ministerio de Salud
Certificado N°:

Elaborado en: LABORATORIOS CABUCHI S.A
Tucumán 1301 esq. San Juan C.P. 5220. Jesús María. Pcia. De Córdoba. Argentina
Teléfono 0800-466-7777, e-mail: info@cabuchi.com. Web: www.cabuchi.com

Director Técnico: Carlos Degiovanni. Farmacéutico.

Fecha de última revisión:


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
M.P. 5366
DIRECTOR TÉCNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
DANIEL EDUARDO CABUCHI
VICE-PRESIDENTE



PROYECTO PARA

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Dr. CABUCHI GEL
ACIDO SALICILICO 26% - Gel

Dr. CABUCHI LAPIZ
ACIDO SALICILICO 40% - Lápiz



VENTA BAJO RECETA

INDUSTRIA ARGENTINA

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a utilizar el medicamento.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.

"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"

1. ¿Que acción tiene DR. CABUCHI GEL 26% y DR. CABUCHI LÁPIZ 40% y para que se utilizan?

DR. CABUCHI GEL 26% y DR. CABUCHI LÁPIZ 40% son productos descamantes que se utilizan para el tratamiento y remoción de las verrugas comunes (que aparecen en los dedos y en las palmas de las manos), verrugas plantares y las callosidades.

2. Antes de usar este medicamento:

Lea atentamente las instrucciones de cómo utilizar DR. CABUCHI.

No lo utilice:

- Si sabe que es alérgico al Acido Salicílico o a cualquier ingrediente.
- En pacientes diabéticos o con problemas circulatorios en las extremidades.

No se debe aplicar sobre lunares, marcas de nacimiento o verrugas raras con pelos. Tampoco se debe utilizar en rostro, axilas y área genital.

En caso que vaya a utilizarse en áreas grandes de la piel, pues puede producir toxicidad sistémica.

La aplicación continua y frecuente en la piel puede causar inflamación de la misma.

Evitar el contacto con los ojos y las mucosas. Si ocurre contacto lavar con abundante agua hasta remoción del producto, y continuar lavando durante 15 minutos más.

No emplear el producto sobre la piel irritada, infectada o enrojecida.

Se desaconseja su uso en forma simultánea con otros productos que contengan agentes exfoliantes, alcohol, jabones abrasivos, cosméticos o jabones desecantes u otra medicación para la piel salvo mejor consejo médico.

Embarazo y lactancia:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento

No se han realizado estudios en seres humanos pero se debe tener en cuenta que el ácido salicílico puede absorberse sistémicamente. Se desconoce si el ácido salicílico pasa a leche materna.

3. Uso apropiado del medicamento:


Siga las siguientes instrucciones salvo que su médico le haya dado indicaciones distintas:

Antes de aplicar sumergir el área afectada por 5 minutos en agua tibia y luego secar cuidadosamente.

Limar suavemente la superficie de la verruga con una lima fina, de modo de retirar la capa superficial rugosa de la verruga, evitando el sangrado. En caso de que esto ocurra, interrumpir el tratamiento por tres días.

- 3.1. DR. CABUCHI GEL 26%: Colocar una fina capa de gel sobre la verruga o callosidad, una vez al día. Esperar que se seque y proteger con un pequeño apósito adhesivo. Evitar el contacto con la zona sana de piel que circunscribe a la verruga o callosidad.


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
M.P. 5386
DIRECTOR TÉCNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
MIGUEL EDUARDO GABUCHI
VICE-PRESIDENTE



7 8 6 3

3.2. **DR. CABUCHI LÁPIZ 40%:** Aplicar una fina capa sobre la callosidad o verruga, con cuidado de no extenderse demasiado a la piel sana que la rodea. Continuar el tratamiento hasta que desaparezca la verruga o callosidad o por un máximo de hasta 5 días.

4. Modo de conservación:

Conservar en lugar fresco entre 15°C y 30°C.

5. Efectos indeseables:

Irritación local: frecuente, por lo que se debe tener especial cuidado de aplicar el producto solamente en el área afectada, evitando el contacto con la piel sana. En caso de irritación suspenda el tratamiento y consulte al médico.

Sensación de hormigueo y/o sensibilidad en la zona tratada: poco frecuente.

6. Información adicional

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:

Hospital de Pediatría "Dr. Ricardo Gutiérrez", Tel: (011) 4962-6666/2247.

Hospital: "Dr. A. Posadas", Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555.

Hospital de Niños de Córdoba, Tel.: (0351) 421-5303/422-0391.

Casafé de Rosario, Tel.: (0341) 448-0077/424-2727.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad medicinal Autorizado por le Ministerio de Salud
Certificado N°:


Elaborado en: **LABORATORIOS CABUCHI S.A**


Tucumán 1301 esq. San Juan C.P. 5220. Jesús María. Pcia. De Córdoba. Argentina.

Teléfono 0800-466-7777, e-mail: info@cabuchi.com. Web: www.cabuchi.com

Director Técnico: Carlos Degiovanni. Farmacéutico.

Fecha de última revisión:


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
M.P. 5368
DIRECTOR TÉCNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
EDMUNDO EDUARDO CABUCHI
VICE-PRESIDENTE



PROYECTO DE PROSPECTO

7863

Dr. CABUCHI GEL "VL"
ACIDO SALICILICO
Gel 17%

VENTA LIBRE

INDUSTRIA ARGENTINA

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE MEDICAMENTO

¿QUE CONTIENE DR. CABUCHI Gel?

Cada 100g contiene:

Ácido Salicílico 17.0 gramos.

Excipientes: Ácido láctico, Colodión elástico, Hidroxipropilcelulosa, Éter etílico, Alcohol etílico, c.s.

ACCIÓN:

El Ácido Salicílico tiene la propiedad de eliminar la capa más externa de la piel o disminuir su espesor.

¿PARA QUE SE USA DR. CABUCHI Gel?:

Dr. Cabuchi Gel se usa para la eliminación de callosidades, zonas dura de la piel producidas por fricción o presión prolongada o repetida.

¿QUE PERSONAS NO PUEDEN UTILIZAR DR. CABUCHI Gel?:

NO USE este medicamento en niños menores de 12 años, sin indicación del médico, o si usted es alérgico a alguno de sus ingredientes.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE EMPLEAR ESTE MEDICAMENTO?:

Es un medicamento de USO EXTERNO EXCLUSIVAMENTE.

Evitar el contacto con los ojos y mucosas.

No aplicar sobre lunares, marcas de nacimiento, verrugas en las que nace vello; así como tampoco en verrugas genitales, faciales, orales o nasales.

No emplear el producto sobre la piel irritada, infectada o enrojecida.

Tener en cuenta que la acción de eliminar la capa externa de la piel también ocurre sobre la piel sana que rodea el sitio a tratar, por lo que la aplicación se debe restringir sólo al área afectada.

No emplear en áreas extensas del cuerpo, ni por períodos prolongados, ni en exceso.

Si usted es diabético y/o sufre alguna enfermedad en la circulación, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento, pues puede producirse inflamación o ulceración, especialmente en las extremidades.

Si usted recibe algún otro medicamento, esta embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY UTILIZANDO ESTE MEDICAMENTO?

Suspenda su uso y consulte a su médico si aparece irritación excesiva en la piel sana que rodea la callosidad.

Si una vez iniciado el tratamiento, la callosidad persisten por más de 5 días o empeora, consulte a su médico.

En caso que por descuido, el producto entrara en contacto con los ojos o mucosas, lavar con abundante agua durante 15 minutos.


¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Utilizar Dr. Cabuchi Gel una vez al día, preferentemente por la noche antes de acostarse, siguiendo las Instrucciones de uso.

Instrucciones de uso:

1. Antes de aplicar, sumergir el área afectada en agua tibia por 5 minutos y luego secar cuidadosamente.


LABORATORIO CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
M.P. 5366
DIRECTOR TÉCNICO


LABORATORIO CABUCHI S.A.
GABRIEL EDUARDO CABUCHI
VICE-PRESIDENTE



7863

2. Si lo desea, puede pasar una lima fina sobre la callosidad (sin lastimar), para reducir el espesor de las mismas.
3. Aplicar una capa fina de gel (una o dos gotas) hasta cubrir la callosidad.
4. Dejar secar.
5. Aplicar hasta eliminar la callosidad o verruga, o por un tiempo máximo de 5 días.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA ÍNGESTA ACCIDENTAL O SOBREDOSIS?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones o acuda al lugar más cercano de asistencia médica:

- Hospital de Pediatría "Dr. Ricardo Gutiérrez", Tel.: (011) 4962-6666/2247
- Hospital "Dr. A. Posadas", Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555.
- Hospital de Niños de Córdoba, Tel.: (0351) 421-5303/422-0391.
- Casafé de Rosario, Tel.: (0341) 448-0077/424-2727.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Ante cualquier duda o consulta puede comunicarse con LABORATORIOS CABUCHI S.A. al teléfono 0800-466-7777, vía e-mail a info@cabuchi.com o a través de la web: www.cabuchi.com.

También puede hacerlo a ANMAT Responde, al teléfono 0800-333-1234.

"Este medicamento, como cualquier otro debe mantenerse fuera del alcance de los niños"

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico

FORMA DE CONSERVACIÓN: conservar en lugar fresco entre 15°C y 30°C.

Elaborado en: LABORATORIOS CABUCHI S.A.

Tucumán 1301 esq. San Juan. C.P. 5220. Jesús María. Pcia. de Córdoba. Argentina.
Teléfono 0800-466-7777, e-mail: info@cabuchi.com. Web: www.cabuchi.com


Director Técnico: Carlos Degiovanni. Farmacéutico.

Medicamento Autorizado por el Ministerio de Salud.
Certificado N°

Fecha de última revisión:

Presentaciones: 1 Pomo conteniendo 4 gramos y 8 gramos, acompañado de un aplicador y lima.


 LABORATORIOS CABUCHI S.A.
 CARLOS DEGIOVANNI
 M.P. 5386
 DIRECTOR TÉCNICO


 LABORATORIOS CABUCHI S.A.
 GABRIEL EDUARDO CABUCHI
 VICE-PRESIDENTE



PROYECTO DE PROSPECTO

**Dr. CABUCHI GEL
ACIDO SALICILICO
Gel 26%**

**Dr. CABUCHI LAPIZ
ACIDO SALICILICO
Lápiz 40%**

VENTA BAJO RECETA

INDUSTRIA ARGENTINA

Fórmula Cual y Cuantitativa:

Dr. Cabuchi Gel 26%:

Principio activo: Ácido salicílico 26g/100 g

Excipientes: ácido láctico 5,0 g; colodión elástico 16,0 g; hidroxipropilcelulosa 1,20 g, éter etílico 6,00g, alcohol etílico 96° c.s.p. 100,0 g.

Dr. Cabuchi Lápiz 40%:

Principio activo: Ácido salicílico 40g/100 g

Excipientes: aceite de ricino hidrogenado 18,0 g; monoestearato de glicerilo 25,0 g; vaselina líquida 6,0 g; vaselina sólida 4,0 g; cera de abejas 4,0 g; lanolina anhidra 3,0 g; clorobutanol 0,49 g.

Acción terapéutica: Agente queratolítico.

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento y remoción de las verrugas comunes (que aparecen en los dedos y en las palmas de las manos), verrugas plantares y las callosidades.

Características farmacológicas:

Acción farmacológica:

El modo de acción del ácido salicílico en el tratamiento de las verrugas todavía no se conoce exactamente. Su actividad parece estar relacionada con su acción queratolítica, que resulta en la remoción mecánica de las células epidérmicas y la eliminación del virus causante de la verruga (HPV- Virus del Papiloma Humano)

Posología y forma de administración:

Antes de aplicar sumergir el área afectada por 5 minutos en agua tibia y luego secar cuidadosamente.

Limar suavemente la superficie de la verruga con una lima fina, de modo de retirar la capa superficial rugosa de la verruga, evitando el sangrado. En caso de que esto ocurra, interrumpir el tratamiento por tres días.

Gel: Colocar una fina capa de **Dr. Cabuchi Gel** (una o dos gotas) sobre la verruga o callosidad, una vez al día. Esperar que se seque y proteger con un pequeño apósito adhesivo. Evitar el contacto con la zona sana de piel que circunscribe a la verruga o callosidad.

Lápiz: Aplicar una fina capa de **Dr. Cabuchi Lápiz** sobre la callosidad o verruga, con cuidado de no extenderse demasiado a la piel sana que la rodea.

Continuar el tratamiento hasta que desaparezca la verruga o callosidad o por un máximo de hasta 5 días.

Contraindicaciones:


Está contraindicado su uso en pacientes con hipersensibilidad al ácido salicílico o cualquiera de sus componentes.

Está contraindicado en pacientes diabéticos o con problemas circulatorios en las extremidades.

No se debe aplicar sobre lunares, marcas de nacimiento o verrugas raras con pelos. Tampoco se debe utilizar en rostro, axilas y área genital.

Advertencias:


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
M.P. 5306
DIRECTOR TECNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
EUGENIO EDUARDO CABUCHI
VICE-PRESIDENTE



7 8 6 3

El ácido salicílico debe ser usado con cuidado en áreas grandes de la piel, pues puede producir toxicidad sistémica. Su aplicación continua y frecuente en la piel puede causar dermatitis.

Evitar el contacto con los ojos y las mucosas. Si ocurre contacto lavar con abundante agua hasta remoción del producto, y continuar lavando durante 15 minutos más.

No emplear el producto sobre la piel irritada, infectada o enrojecida.

Precauciones:

Interacciones: Se desaconseja el uso concomitante de otros productos que contengan agentes exfoliantes, alcohol, jabones abrasivos, cosméticos o jabones desecantes u otra medicación para la piel salvo mejor consejo médico.

Embarazo y lactancia:

No se han realizado estudios en seres humanos pero se debe tener en cuenta que el ácido salicílico puede absorberse sistémicamente. Se desconoce si el ácido salicílico pasa a leche materna.

Reacciones adversa:

Irritación local: frecuente, puede ser controlada por la suspensión temporaria de la terapia y por la aplicación del producto solamente sobre la verruga, evitando el contacto con la piel sana.

Sensación de hormigueo y/o sensibilidad en la zona tratada: poco frecuente.

Sobredosificación:

La ingestión accidental del producto puede producir efectos sistémicos tales como vómitos, dolor abdominal, aumento en la frecuencia respiratoria, acidosis y disturbios mentales. Puede provocar erupciones cutáneas en individuos sensibles.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Pediatría "Dr. Ricardo Gutiérrez", Tel: (011) 4962-6666/2247.

Hospital: "Dr. A. Posadas", Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555.

Hospital de Niños de Córdoba, Tel.: (0351) 421-5303/422-0391.

Casafé de Rosario, Tel.: (0341) 448-0077/424-2727.

Presentaciones:

Dr. Cabuchi Gel 26%: Pomos por 4g y 8 g, acompañado de un aplicador y lima.

Dr. Cabuchi Lápliz 40%: Lápliz por 3g y 5 g.

Condiciones de conservación y almacenamiento: conservar en lugar fresco entre 15°C y 30°C.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS


Especialidad medicinal Autorizado por le Ministerio de Salud
Certificado N°:

Elaborado en: LABORATORIOS CABUCHI S.A
Tucumán 1301 esq. San Juan C.P. 5220. Jesús María. Pcia. De Córdoba. Argentina
Teléfono 0800-466-7777, e-mail: info@cabuchi.com. Web: www.cabuchi.com

Director Técnico: Carlos Degiovanni. Farmacéutico.

Fecha de última revisión:


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
M.P. 5366
DIRECTOR TÉCNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
GABRIEL EDUARDO CABUCHI
V.CE-PRESIDENTE



7863

PROYECTO PARA

INFORMACION PARA EL PACIENTE

Dr. CABUCHI GEL
ACIDO SALICILICO 26% - Gel

Dr. CABUCHI LAPIZ
ACIDO SALICILICO 40% - Lápiz

VENTA BAJO RECETA

INDUSTRIA ARGENTINA

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a utilizar el medicamento.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.

"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"

1. ¿Que acción tiene DR. CABUCHI GEL 26% y DR. CABUCHI LÁPIZ 40% y para que se utilizan?

DR. CABUCHI GEL 26% y DR. CABUCHI LÁPIZ 40% son productos descamantes que se utilizan para el tratamiento y remoción de las verrugas comunes (que aparecen en los dedos y en las palmas de las manos), verrugas plantares y las callosidades.

2. Antes de usar este medicamento:

Lea atentamente las instrucciones de cómo utilizar DR. CABUCHI.

No lo utilice:

- Si sabe que es alérgico al Acido Salicílico o a cualquier ingrediente.
- En pacientes diabéticos o con problemas circulatorios en las extremidades.

No se debe aplicar sobre lunares, marcas de nacimiento o verrugas raras con pelos. Tampoco se debe utilizar en rostro, axilas y área genital.

En caso que vaya a utilizarse en áreas grandes de la piel, pues puede producir toxicidad sistémica.

La aplicación continua y frecuente en la piel puede causar inflamación de la misma.

Evitar el contacto con los ojos y las mucosas. Si ocurre contacto lavar con abundante agua hasta remoción del producto, y continuar lavando durante 15 minutos más.

No emplear el producto sobre la piel irritada, infectada o enrojecida.

Se desaconseja su uso en forma simultánea con otros productos que contengan agentes exfoliantes, alcohol, jabones abrasivos, cosméticos o jabones desecantes u otra medicación para la piel salvo mejor consejo médico.

Embarazo y lactancia:

Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento

No se han realizado estudios en seres humanos pero se debe tener en cuenta que el ácido salicílico puede absorberse sistémicamente. Se desconoce si el ácido salicílico pasa a leche materna.

3. Uso apropiado del medicamento:


Siga las siguientes instrucciones salvo que su médico le haya dado indicaciones distintas:

Antes de aplicar sumergir el área afectada por 5 minutos en agua tibia y luego secar cuidadosamente.

Limar suavemente la superficie de la verruga con una lima fina, de modo de retirar la capa superficial rugosa de la verruga, evitando el sangrado. En caso de que esto ocurra, interrumpir el tratamiento por tres días.

- 3.1. DR. CABUCHI GEL 26%: Colocar una fina capa de gel sobre la verruga o callosidad, una vez al día. Esperar que se seque y proteger con un pequeño apósito adhesivo. Evitar el contacto con la zona sana de piel que circunscribe a la verruga o callosidad.

LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DE GIOVANNI
M.P. 5366
DIRECTOR TECNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
GABRIEL EDUARDO CABUCHI
S. EN PRESIDENTE



7863

3.2. **DR. CABUCHI LÁPIZ 40%:** Aplicar una fina capa sobre la callosidad o verruga, con cuidado de no extenderse demasiado a la piel sana que la rodea. Continuar el tratamiento hasta que desaparezca la verruga o callosidad o por un máximo de hasta 5 días.

4. Modo de conservación:

Conservar en lugar fresco entre 15°C y 30°C.

5. Efectos indeseables:

Irritación local: frecuente, por lo que se debe tener especial cuidado de aplicar el producto solamente en el área afectada, evitando el contacto con la piel sana. En caso de irritación suspenda el tratamiento y consulte al médico.

Sensación de hormigueo y/o sensibilidad en la zona tratada: poco frecuente.

6. Información adicional

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA:

Hospital de Pediatría "Dr. Ricardo Gutiérrez", Tel.: (011) 4962-6666/2247.

Hospital: "Dr. A. Posadas", Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555.

Hospital de Niños de Córdoba, Tel.: (0351) 421-5303/422-0391.

Casa de Rosario, Tel.: (0341) 448-0077/424-2727.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad medicinal Autorizado por le Ministerio de Salud
Certificado N°:

Elaborado en: **LABORATORIOS CABUCHI S.A**

Tucumán 1301 esq. San Juan C.P. 5220. Jesús María. Pcia. De Córdoba. Argentina.
Teléfono 0800-466-7777, e-mail: info@cabuchi.com. Web: www.cabuchi.com

Director Técnico: Carlos Degiovanni. Farmacéutico.

Fecha de última revisión:


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
CARLOS DEGIOVANNI
M.P. 5368
DIRECTOR TECNICO


LABORATORIOS CABUCHI S.A.
GABRIEL EDUARDO CABUCHI
PRESIDENTE



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

ANEXO III

CERTIFICADO

Expediente Nº: 1-0047-0000-000040-13-6

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que, mediante la Disposición Nº 7863, y de acuerdo a lo solicitado en el tipo de Trámite Nº 1.2.1., por LABORATORIOS CABUCHI S.A., se autorizó la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre comercial: DR. CABUCHI.

Nombre/s genérico/s: ACIDO SALICILICO.

Industria: ARGENTINA.

Lugar/es de elaboración: TUCUMAN 1301, ESQ. SAN JUAN, JESUS MARIA, PROVINCIA DE CORDOBA.

Los siguientes datos identificatorios autorizados por la presente disposición se detallan a continuación:

Forma farmacéutica: GEL.

Nombre Comercial: DR. CABUCHI VL.

Clasificación ATC: D11AF.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Indicación/es autorizada/s: Se usa para la eliminación de callos y callosidades, zonas duras de la piel producidas por fricción o presión prolongada o repetida.

Concentración/es: 17 g% de ACIDO SALICILICO.

Fórmula completa por unidad de forma farmacéutica ó porcentual:

Genérico/s: ACIDO SALICILICO 17 g%.

Excipientes: HIDROXIPROPILCELULOSA 1.2 g%, ACIDO LACTICO 5 g%,
COLODION ELASTICO 16 g%, ETER 6 g%, ALCOHOL ETILICO 96° C.S.P. 100
g%.

Origen del producto: Sintético o Semisintético.

Vía/s de administración: TOPICA.

Envase/s Primario/s: POMO PE-ALU-PE, APLICADOR Y LIMA.

Presentación: ENVASES CONTENIENDO 4 y 8 GRAMOS DE GEL.

Contenido por unidad de venta: ENVASES CONTENIENDO 4 y 8 GRAMOS DE GEL.

Período de vida Útil: 24 meses.

Forma de conservación: TEMPERATURA desde 15°C hasta 30°C.

Condición de expendio: VENTA LIBRE.

Forma farmacéutica: GEL.

Nombre Comercial: DR. CABUCHI.

Clasificación ATC: D11 AF.

Indicación/es autorizada/s: esta indicado en el tratamiento y remoción de las



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

verrugas vulgares (que aparecen en los dedos y palmas de las manos), verrugas plantares y callosidades.

Concentración/es: 26 g% de ACIDO SALICILICO.

Fórmula completa por unidad de forma farmacéutica ó porcentual:

Genérico/s: ACIDO SALICILICO 26 g%.

Excipientes: HIDROXIPROPILCELULOSA 1.2 g%, ACIDO LACTICO 5 g%, COLODION ELASTICO 16 g%, ETER 6 g%, ALCOHOL ETILICO 96° C.S.P. 100 g%.

Origen del producto: Sintético o Semisintético.

Vía/s de administración: TOPICA.

Envase/s Primario/s: POMO PE-ALU-PE, APLICADOR Y LIMA.

Presentación: ENVASES CONTENIENDO 4 y 8 GRAMOS DE GEL.

Contenido por unidad de venta: ENVASES CONTENIENDO 4 y 8 GRAMOS DE GEL.

Período de vida Útil: 24 meses.

Forma de conservación: TEMPERATURA desde 15°C hasta 30°C.

Condición de expendio: BAJO RECETA.

Forma farmacéutica: LAPIZ.

Nombre Comercial: DR. CABUCHI.

Clasificación ATC: D11 AF.

Indicación/es autorizada/s: esta indicado en el tratamiento y remoción de las



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

verrugas vulgares (que aparecen en los dedos y palmas de las manos), verrugas plantares y callosidades.

Concentración/es: 40 g% de ACIDO SALICILICO.

Fórmula completa por unidad de forma farmacéutica ó porcentual:

Genérico/s: ACIDO SALICILICO 40 g%.

Excipientes: VASELINA LIQUIDA 5.5 g%, VASELINA SOLIDA 4 g%, CERA DE ABEJAS 4 g%, ACEITE DE RICINO HIDROGENADO 18 g%, LANOLINA ANHIDRA 3 g%, CLOROBUTANOL 0.5 g%, MONOESTEARATO DE GLICERILO 25 g%.

Origen del producto: Sintético o Semisintético.

Vía/s de administración: TOPICA.

Envase/s Primario/s: PORTALAPIZ RETRACTIL DE PP.

Presentación: ENVASES CONTENIENDO 3 Y 5 GRAMOS.

Contenido por unidad de venta: ENVASES CONTENIENDO 3 Y 5 GRAMOS.

Período de vida Útil: 24 meses.

Forma de conservación: TEMPERATURA desde 15°C hasta 30°C.

Condición de expendio: BAJO RECETA.

Se extiende a LABORATORIOS CABUCHI S.A. el Certificado N° **57573**, en la Ciudad de Buenos Aires, a los _____ días del mes de **19 NOV 2014** de _____, siendo su vigencia por cinco (5) años a partir de la fecha impresa en el mismo.

DISPOSICIÓN (ANMAT) N°:

7863

Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional