



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 10047

BUENOS AIRES, 23 NOV. 2015

VISTO el Expediente N° 1-0047-0000-000503-12-4 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma BAYER S.A. solicita la aprobación de nuevos proyectos de rótulos, prospectos e información para el paciente para el producto SUPRADYN FORTE / VITAMINAS – MINERALES - OLIGOELEMENTOS, forma farmacéutica: COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, autorizado por el Certificado N° 31.021.

Que los proyectos presentados se adecuan a la normativa aplicable Ley 16.463, Decreto N° 150/92 y Disposiciones N°: 5904/96, 2349/97 y Circular N° 4/13.

Que a fojas 426 obra el informe técnico favorable de la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1.490/92 y 1886/14.

R.



"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 10047

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. - Autorízase los proyectos de rótulos a fojas 391, 405 y 419, prospectos de fojas 384 a 390, 398 a 404 y 412 a 418, e información para el paciente de fojas 392 a 397, 406 a 411 y 420 a 425, desglosando a fojas 391, 384 a 390 y 392 a 397, para la Especialidad Medicinal denominada SUPRADYN FORTE / VITAMINAS - MINERALES - OLIGOELEMENTOS, forma farmacéutica: COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, propiedad de la firma BAYER S.A., anulando los anteriores.

ARTICULO 2º. - Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 31.021 cuando el mismo se presente acompañado de la copia autenticada de la presente Disposición.


ARTICULO 3º. - Regístrese; por mesa de entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la copia autenticada de la presente disposición conjuntamente con los rótulos, prospectos e información para el paciente, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de adjuntar al legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-0047-0000-000503-12-4

DISPOSICIÓN N°

10047
2


Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.

Rp.


23 Nov. 2013



PROYECTO DE PROSPECTO

SUPRADYN® FORTE

Vitaminas + minerales y oligoelementos

Comprimidos efervescentes

Venta bajo receta

Industria Argentina

Composición

Cada comprimido efervescente de **SUPRADYN® FORTE** sabor limón contiene 12 vitaminas: vitamina A 3.333 UI, vitamina B1 4,5 mg, vitamina B2 5,1 mg, vitamina B6 6,0 mg, vitamina B12 6,0 µg, vitamina C 180 mg, vitamina D3 200 UI, vitamina E (*) (DI- α -tocoferol) 10 mg, biotina 0,3 mg, ácido fólico 0,2 mg, nicotinamida 57 mg, ácido pantoténico 21 mg, 8 minerales y oligoelementos: calcio 50 mg, magnesio 40 mg, fósforo 50 mg, hierro 3,6 mg, manganeso 0,5 mg, cobre 0,4 mg, zinc 3,0 mg, cromo 0,01 mg. Excipientes: povidona K17 60 mg, ácido tartárico 1700 mg, bicarbonato de sodio 1100 mg, aspartame 70 mg, aroma de limón permaseal 84.260-51 40 mg, aroma de limón permaseal 60.827-71 60 mg, manitol 250,703 mg, sorbitol csp 4700 mg.

(*)dl-α- tocoferol acetato 14,9 mg.

Contiene aspartamo: Contraindicado para fenilcetonúricos.

Acción terapéutica

Aporte de vitaminas, minerales y oligoelementos.

Indicaciones

Suministro Insuficiente de vitaminas en caso de dietas para adelgazar muy prolongadas, formas de dieta especiales, enfermedades gastro-intestinales (por ejemplo, síndrome de malabsorción de diferente origen) y alcoholismo crónico.

Necesidad aumentada de vitaminas en caso de enfermedades agudas y crónicas, durante la convalecencia, el cansancio y agotamiento, tras intervenciones quirúrgicas, durante y después de una terapia con antibióticos o medicamentos quimioterapéuticos

Acción farmacológica

BAYER S.A.
VALERIA WILBERGER
FARMACEUTICA
AFIDERADA

1 de 14

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3652
4 VERONICA CASARO
CO-DIRECTORA TECNICA
MATRICULA PROFESIONAL 13119

PLB_Supradyn Forte comp eferv_ CCDS3.0 + CP052012 + CCDS 4

Grupo farmacoterapéutico: Multivitamínicos y minerales/oligoelementos

Código ATC: A11AA03

Propiedades farmacodinámicas:

SUPRADYN® FORTE comprimidos efervescentes es un preparado multivitamínico/multimineral que contiene vitaminas, en combinación con minerales y oligoelementos diseñado para asegurar el aporte adecuado de micronutrientes en pacientes con riesgo aumentado de deficiencia o con aumento de sus requerimientos ..

Las cantidades de vitaminas, minerales y trazas de oligoelementos de **SUPRADYN® FORTE comprimidos efervescentes** han sido basados en la Cantidad Diaria Recomendada (CDR) propuesta por el Consejo Europeo y el Instituto de Medicina de USA.

Las vitaminas son nutrientes esenciales. Son indispensables en el metabolismo de los hidratos de carbono, energético, de los lípidos, de los ácidos nucleicos y de las proteínas, así como también en la síntesis de los aminoácidos, del colágeno, de los neurotransmisores, etc.

Además de su participación en las reacciones metabólicas básicas, las vitaminas están involucradas en la regulación y coordinación de los procesos metabólicos. Las vitaminas son esenciales en el desarrollo óseo, en la cicatrización, la integridad vascular, en el metabolismo microsomal de drogas y de desintoxicación, en la función inmunitaria, en el desarrollo y diferenciación celular, etc.

Además de las conocidas consecuencias provocadas por deficiencias vitamínicas, existe información creciente que evidencia la importancia del balance de vitaminas en la prevención de enfermedades y en el mantenimiento de la salud y el rendimiento físico y mental.

Los minerales y los oligoelementos son nutrientes esenciales. Intervienen en diferentes funciones: *catalíticas* (numerosas reacciones enzimáticas); *estructurales* (enzimas, hormonas, neuropéptidos, receptores hormonales, huesos y dientes) y *funcionales* (metabolismo, transmisión nerviosa).

Una carencia de vitaminas y minerales puede originarse en las siguientes situaciones:

- Requerimientos aumentados debido a causas fisiológicas (crecimiento,

PLB_ Supradyn Forte comp eferv_ CCDS3.0 + CP052012 + CCDS 4

2 de 14
BAYER S.A.
VALERIA WILBERGER
FARMACEUTICA
APODERADA

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3652
VERÓNICA CASARO
CO-DIRECTORA TÉCNICA
MATRÍCULA PROFESIONAL 13119

embarazo, lactancia, senilidad, convalescencia, fatiga, tratamiento con antibióticos o debido a deficiencias causadas por medicación) o estilos de vida (ejercicio físico, consumo de alcohol o de drogas, exposición al humo de tabaco o a otros contaminantes).

- Ingesta disminuida (reducción de peso y dietas no balanceadas, desórdenes alimenticios, senilidad, enfermedad, trastornos gastrointestinales).

En estas situaciones, las deficiencias raramente afectan a una sola vitamina. Sumado a esto, frecuentemente se encuentran también comprometidos minerales y oligoelementos que a su vez son esenciales para muchos procesos metabólicos y estructuras dependientes de vitaminas. **SUPRADYN® FORTE comprimidos efervescentes** ha sido designado como un multivitamínico completo que ayuda a prevenir y tratar las deficiencias generales de vitaminas. La combinación de dosis de 3 CDR (Cantidad Diaria Recomendada) de vitaminas solubles en agua, con dosis de 1 CDR de vitaminas solubles en grasa permiten una mayor flexibilidad, eficacia y seguridad para enfrentar situaciones de mayor riesgo o deficiencia de las mismas, incorporando el consiguiente riesgo de una sobredosis de vitaminas liposolubles.

Propiedades farmacocinéticas

La salud y el bienestar humano dependen naturalmente de la absorción, de la distribución, del metabolismo y de la eliminación de las vitaminas que se mantienen por mecanismos fisiológicos específicos. Como **SUPRADYN® FORTE comprimidos efervescentes** se disuelve en forma completa o casi completa en el tracto gastrointestinal se asegura una buena disponibilidad de estos compuestos. No se han efectuado estudios farmacocinéticos específicos con **SUPRADYN® FORTE comprimidos efervescentes**, pero las propiedades farmacocinéticas de los componentes individuales se hallan ampliamente documentados en la bibliografía.

Posología y formas de administración

Adultos y mayores de 12 años: 1 comprimido efervescente por día. Los comprimidos efervescentes se disuelven en un vaso con agua.

SUPRADYN® FORTE no debe utilizarse en niños menores a 12 años

PLB_Supradyn Forte comp eferv_ CCDS3.0 + CP052012 + CCDS 4
3 de 14

BAYER S. A.
VALERIA WILBERGER
FARMACEUTICA
AFODERADA

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3652
VERONICA CASARO
CO-DIRECTORA TECNICA
MATRÍCULA PROFESIONAL 13.19



10047

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a una o varias sustancias activas y/o a sus excipientes.

- Trastornos metabólicos de hierro y/o cobre.
- Hipervitaminosis A y/o D.
- Tratamiento con otros preparados que contienen vitamina A y/o D.
- Tratamiento sistémico con retinoides
- Hipercalcemia, hipercalciuria severa.
- Hipermagnesemia, hiperfosfatemia.
- Nefrolitiasis, urolitiasis o insuficiencia renal.

Precauciones y advertencias

La dosis de 1 comprimido diario no debe ser excedida. Dosis muy altas de ciertos nutrientes, en particular la vitamina A, vitamina D, hierro y cobre pueden ser perjudiciales. En general no se observan reacciones adversas a las dosis recomendadas.

Debe prestarse atención cuando el paciente deba tomar algún suplemento vitamínico, otro vitamínico/ multivitamínico o medicación que contenga vitamina D y/o A y calcio o deba recibir un tratamiento médico, p.ej. antagonistas de Vit K u otro tratamiento anticoagulante.

Interacciones con medicamentos

Cuando se utiliza de acuerdo a lo indicado no se esperan interacciones. De acuerdo a la información actualmente disponible existen interacciones potenciales para los componentes individuales de la fórmula.

El paciente debe informar al médico si recibe otra medicación o si está bajo tratamiento médico.

SUPRADYN® FORTE comprimidos efervescentes puede afectar la biodisponibilidad de las siguientes drogas:

Anticoagulantes o drogas que afectan a la agregación plaquetaria: se ha reportado que la vitamina E debe ser utilizada con precaución en pacientes que reciben un tratamiento con anticoagulantes o drogas que afectan a la agregación plaquetaria.

Antibióticos orales y antivirales: el calcio, magnesio, hierro, cobre y zinc afectan

BAYER S.A.
VALERIA WILBERGER
FARMACEUTICA

PLB_Supradyn Forte comp eferv_ CCDS3.0 + CP052012 + CCDS 4
4 de 14

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3652
VERÓNICA CASARO
CO-DIRECTORA TÉCNICA
MATRÍCULA PROFESIONAL 13119



la absorción de los antibióticos orales y antivirales. Separar por lo menos 2 horas la administración entre las dos medicaciones.

Levodopa: la vit B6, incluso en dosis bajas, acelera la metabolización de la levodopa provocando un efecto antagónico en el tratamiento del Mal de Parkinson.

Interacciones con alimentos

Se recomienda no consumir **SUPRADYN® FORTE comprimidos efervescentes** dos horas antes o 2 horas después de consumidos alimentos como la espinaca, el ruibarbo o los cereales integrales. El ácido oxálico contenido en estos alimentos puede disminuir la absorción del calcio.

Empleo por pacientes con dieta Hiposódica

SUPRADYN® FORTE comprimidos efervescentes contiene 301 mg de sodio por comprimido. Por consiguiente, se recomienda tener en cuenta para los pacientes que sigan una dieta hiposódica.

Empleo por pacientes con fenilcetonuria:

SUPRADYN® FORTE comprimidos efervescentes no debe ser administrado a pacientes con fenilcetonuria ya que contiene una fuente de fenilalanina (Aspartame).

Embarazo, lactancia

SUPRADYN® FORTE comprimidos efervescentes puede ser utilizado durante el embarazo y la lactancia previa consulta médica. Las vitaminas y los minerales pueden ser tomados en las cantidades correspondientes a los requerimientos cotidianos pero no deben excederse las cantidades indicadas en "Posología y forma de administración".

Se ha demostrado el efecto teratogénico de la **vitamina A** cuando se administra en dosis mayores de 10.000 UI /día durante el primer trimestre de embarazo. La sobredosificación continua de **vitamina D** puede provocar daño al feto y al recién nacido.

BAYER S.A.
VALERIA WILBERGER
FARMACÉUTICA
APODERADA
5 de 14

Supradyn Forte comp eferv_ CCDS3.0 + CP052012 + CCDS 4

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3652
VERÓNICA CASARO
CO-DIRECTORA TÉCNICA
MATRÍCULA PROFESIONAL 13119

10047



nacido. **SUPRADYN® FORTE comprimidos efervescentes** no debe ser administrado con algún otro suplemento vitamínico, otro vitamínico/ multivitamínico o medicación que contenga isotretinoína, etretinato, beta caroteno o vitamina D debido a que altas dosis de los mismos son considerados dañinos para el feto.

Efectos en la capacidad para conducir y usar máquinas

No se han observado con este producto efectos sobre la habilidad para manejar y usar máquinas.

Reacciones adversas

En general, el producto es bien tolerado. En casos raros se han informado síntomas gastrointestinales (molestias abdominales, constipación, vómitos, diarreas y náuseas).

En casos muy raros ha habido reacción alérgica. Se incluye entre los síntomas: urticaria, edema facial, respiración sibilante, enrojecimiento de la piel, erupción, ampollas y shock.

Si ocurrieran reacciones alérgicas el paciente deberá suspender la medicación y consultar al médico.

Desordenes del sistema nervioso:

Dolor de cabeza, mareos, insomnio, nerviosismo.

Desordenes nutricionales y de metabolismo:

Hipercalciuria.

Tras la ingestión de **SUPRADYN® FORTE comprimidos efervescentes** se presenta a veces una ligera coloración amarilla de la orina. Esta coloración es inofensiva y se debe exclusivamente a la eliminación de la vitamina B₂, contenido en la preparación que es de color amarillo.

Sobredosificación

Con la dosis recomendada, no existe ningún riesgo de sobredosificación.

La mayoría, si no todos los reportes relacionados con sobredosificación se asocian con la toma concomitante de preparaciones vitamínicas conteniendo grandes cantidades de vitamina. Sobredosis aguda o durante un tiempo prolongado puede

PLB_ Supradyn Forte comp eferv_ CCDS3.0 + CP052012 + CCDS 4
6 de 14

BAYER S.A.
VALENTINA WILBERGER
FARMACEUTICA
ASOCIACION

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 2052
VERONICA CEBALLOS
CO-DIRECTORA TECNICA
MATRICULA PROFESIONAL 13119

10047



causar hipervitaminosis A y D e hipercalcemia, así como toxicidad por hierro y cobre. Los síntomas iniciales de sobredosificación son inespecíficos como ser el inicio abrupto de dolor de cabeza, confusión, y molestias gastrointestinales como constipación, diarrea, náuseas y vómitos.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez TE: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas TE: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata TE: (0221) 451-5555

Conservación

Conservar a temperatura inferior a 25°C y proteger de la humedad. Este medicamento no debe ser utilizado después de la fecha de vencimiento señalada en el envase.

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Presentación

Envases con 10 y 30 comprimidos efervescentes sabor limón .

® Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Fabricado en Calle 3 y del Canal, Parque Industrial Pilar, por BAYER S.A.,

Ricardo Gutiérrez 3652 - (B1605EHD)

Munro, Buenos Aires, Argentina.

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 31021

Versión: CCDS 03 + CCDS 4

BAYER S.A.
VALERIA WILBERGER
FARMACEUTICA
APODERADA

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3652
VERONICA CASARO
CO-DIRECTORA TECNICA
INSTRUMENTAL PROFESIONAL 13119

PLB_ Supradyn Forte comp eferv_ CCDS3.0 + CP052012 + CCDS 4

7 de 14

CN



SUPRADYN® FORTE

Vitaminas + minerales y oligoelementos

Comprimidos efervescentes

Venta bajo receta

Industria Argentina

Composición

Cada comprimido efervescente de **SUPRADYN® FORTE** sabor limón contiene: 12 vitaminas: vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E (Dl-a-tocoferol), biotina, ácido fólico, nicotinamida, ácido pantoténico, 8 minerales y oligoelementos: calcio, magnesio, fósforo, hierro, manganeso, cobre, zinc, cromo. Excipientes: povidona K17, ácido tartárico, bicarbonato de sodio, aspartame 70 mg, aroma de limón permaseal 84.260-51, aroma de limón permaseal 60.827-71 60 mg, manitol, sorbitol csp.

Posología y formas de administración

Ver prospecto adjunto.

Conservación

Conservar a temperatura inferior a 25°C y proteger de la humedad. Este medicamento no debe ser utilizado después de la fecha de vencimiento señalada en el envase.

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Presentación

Envases con 10 y 30 comprimidos efervescentes sabor limón.

® Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Fabricado en Calle 3 y del Canal, Parque Industrial Pilar, por BAYER S.A.,

Ricardo Gutiérrez 3652 - (B1605EHD)

Munro, Buenos Aires, Argentina.

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 31021

PLB_ Supradyn Forte comp eferv_ CCDS3.0 + CP052012 + CCDS 4

8 de 14

BAYER S.A.
VALERIA WILBERGER
FARMACEUTICA
APODERADA

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3652
VERÓNICA CASARO
CO-DIRECTORA TÉCNICA
MATRÍCULA PROFESIONAL 13118

10047



Información para el paciente

SUPRADYN® FORTE

Vitaminas, minerales y oligoelementos

Comprimidos Efervescentes

Industria Argentina

Venta bajo receta.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de tomar este medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna otra duda, pregunte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted. No debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, incluso si sus signos de enfermedad son los mismos que los suyos.
- Si considera que cualquiera de los eventos adversos que sufre es serio o si aprecia cualquier evento adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Contenido del prospecto

1. QUÉ ES **SUPRADYN® FORTE** Y CUANDO SE UTILIZA
2. QUÉ DEBE SABER ANTES DE TOMAR **SUPRADYN® FORTE**
3. CÓMO TOMAR **SUPRADYN® FORTE**
4. INTERACCIONES
5. POSIBLES EVENTOS ADVERSOS
6. SOBREDOSIFICACION
7. CONSERVACIÓN DE **SUPRADYN® FORTE**
8. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

BAYER S.A.
VALERIA WILBERGER
FARMACEUTICA
APODERADA

PLB_Supradyn Forte comp eferv_ CCDS3.0 + CP052012 + CCDS 4
9 de 14

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3652
VERÓNICA CASARO
CO-DIRECTORA TÉCNICA
MATRÍCULA PROFESIONAL 13119



10047

Cada comprimido efervescente de **SUPRADYN® FORTE** sabor limón contiene 12 vitaminas: vitamina A 3.333 UI, vitamina B1 4,5 mg, vitamina B2 5,1 mg, vitamina B6 6,0 mg, vitamina B12 6,0 µg, vitamina C 180 mg, vitamina D3 200 UI, vitamina E (*) (Dl- α -tocoferol) 10 mg, biotina 0,3 mg, ácido fólico 0,2 mg, nicotinamida 57 mg, ácido pantoténico 21 mg, 8 minerales y oligoelementos: calcio 50 mg, magnesio 40 mg, fósforo 50 mg, hierro 3,6 mg, manganeso 0,5 mg, cobre 0,4 mg, zinc 3,0 mg, cromo 0,01 mg.

(*)dl-α- tocoferol acetato 14,9 mg.

1. QUÉ ES **SUPRADYN® FORTE** Y CUANDO SE UTILIZA

SUPRADYN® FORTE contiene 12 vitaminas en proporciones equilibradas, así como los minerales y oligoelementos esenciales. Las vitaminas son sustancias indispensables para la vida que le son suministradas al cuerpo a través de los alimentos. Los minerales son indispensables para el metabolismo y como sustancias constitutivas del cuerpo (por ejemplo para huesos y sangre). Los oligoelementos finalmente son sustancias imprescindibles que el organismo sólo requiere en cantidades mínimas. Pero todas estas sustancias no siempre son aportadas en la cantidad necesaria a través de la alimentación diaria.

SUPRADYN® FORTE se utiliza para solucionar rápidamente los estados generales de carencia vitamínica o para evitar que estos se produzcan. Cubre la necesidad aumentada del cuerpo de vitaminas y sustancias minerales, en particular al enfermarse, en épocas de mayor exigencia, en casos de cansancio y al incrementarse las exigencias de rendimiento.

SUPRADYN® FORTE debe recomendarse siempre que exista el riesgo de una carencia de vitaminas y de sustancias minerales, en el periodo de convalecencia de enfermedades e intervenciones quirúrgicas, durante periodos prolongados de tratamiento para adelgazar o formas especiales de dieta, cuando se administran antibióticos y en casos de consumo crónico de alcohol.

PLB_ Supradyn Forte comp eferv_ CCDS3.0 + CP052012 + CCDS 4

VALERIA WILBERT
FARMACEUTICA
PRODERADA

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3652
VERÓNICA CASARÓ
CO-DIRECTORA TÉCNICA
MATRICULA PROFESIONAL 13119

10047



SUPRADYN® FORTE se puede utilizar si debe mantener una dieta hipo sódica.

2. QUÉ DEBE SABER ANTES DE TOMAR SUPRADYN® FORTE

No debe utilizarse SUPRADYN® FORTE cuando:

- ya existe un aumento de vitamina A y/o D (lo que se denomina hipervitaminosis)
- ingiere simultáneamente otros preparados que contienen vitamina A y/o D
- recibe un tratamiento con retinoides (por ejemplo para combatir el acné).
- es alérgico a una o varias sustancias de la composición
- en caso de un nivel demasiado elevado de calcio en sangre (hipercalcemia)
- con una función renal disminuida.
- Tiene trastornos metabólicos de hierro y/o cobre
- Existe aumento de calcio en orina (hipercalciuria severa).
- Existe un aumento de magnesio y/o fosfato en sangre. (Hipermagnesemia, hiperfosfatemia).

Se observó que un elevado suministro diario de SUPRADYN® FORTE, puede aumentar el riesgo de malformaciones en el feto (al contener vitamina A).

La sobredosificación continua de **vitamina D** puede provocar daño al feto y al recién nacido. **SUPRADYN® FORTE** no debe ser administrado con algún otro suplemento vitamínico, otro vitamínico/multivitamínico

3. CÓMO TOMAR SUPRADYN® FORTE

Adultos y adolescentes a partir de los 12 años: 1 comprimido recubierto diario.

Deben tomarse durante las comidas, por ejemplo en el desayuno, sin masticar y con abundante líquido.

La dosis de 1 comprimido diario no debe ser excedida.

SUPRADYN® FORTE no debe utilizarse en niños menores a 12 años.

4. INTERACCIONES

VALERIA WILBERGER
FARMACEUTICA
APO

Interacciones con medicamentos

PLB_ Supradyn Forte comp eferv_ CCDS3.0 + CP052012 + CCDS 4
11 de 14

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3652
VERÓNICA CASARO
CO-DIRECTORA TÉCNICA
MÉTRICER PROFESIONAL 13119

4

10047



Cuando se utiliza de acuerdo a lo indicado no se esperan interacciones. De acuerdo a la información actualmente disponible existen interacciones potenciales para los componentes individuales de la fórmula.

El paciente debe informar al médico si recibe otra medicación o si está bajo tratamiento médico.

SUPRADYN® FORTE puede generar interacción con:

Antibióticos orales y antivirales: el calcio, magnesio, hierro, cobre y zinc afectan la absorción de los antibióticos orales y antivirales. Separar por lo menos 2 horas la administración entre las dos medicaciones.

Levodopa: la vit B6, incluso en dosis bajas, acelera la metabolización de la levodopa provocando un efecto antagónico en el tratamiento del Mal de Parkinson.

Interacciones con alimentos

Se recomienda no consumir **SUPRADYN® FORTE** dos horas antes o 2 horas después de consumidos alimentos como la espinaca, el ruibarbo o los cereales integrales. El ácido oxálico contenido en estos alimentos puede disminuir la absorción del calcio.

Empleo por pacientes con fenilcetonuria:

SUPRADYN® FORTE comprimidos efervescentes no debe ser administrado a pacientes con fenilcetonuria ya que contiene una fuente de fenilalanina (Aspartame).

Empleo por pacientes con dieta Hiposódica:

SUPRADYN® FORTE comprimidos efervescentes contiene 301 mg de sodio por comprimido. Por consiguiente, se recomienda tener en cuenta para los pacientes que sigan una dieta hiposódica

5. POSIBLES EVENTOS ADVERSOS

En la dosis recomendada, no se observaron efectos adversos importantes, incluso después de un periodo de administración de varios meses. Los efectos

VALERIA WILBERGER
FARMACIA PLB
APODERADA
12 de 14

Supradyn Forte comp eferv_ CCDS3.0 + CP052012 + CCDS 4

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3652
VERONICA CASARO
CO-DIRECTORA TECNICA
METRICO PROFESIONAL 13119

10047



secundarios que se pueden producir son: trastornos leves de digestión (molestias abdominales, constipación, vómitos, diarreas y náuseas).

Y ocasionalmente puede darse una coloración amarillenta en la orina que carece de importancia y se debe al contenido de vitamina B2 (riboflavina).

Dosis muy altas de ciertos nutrientes, en particular la vitamina A, vitamina D, hierro y cobre pueden ser perjudiciales.

En casos muy raros ha habido reacción alérgica. Se incluye entre los síntomas: urticaria, edema facial, respiración sibilante, enrojecimiento de la piel, erupción, ampollas y shock.

Dolor de cabeza, mareos, insomnio, nerviosismo y aumento de calcio en orina (Hipercalciuria).

Si ocurrieran reacciones alérgicas el paciente deberá suspender la medicación y consultar al médico.

Efectos sobre la capacidad de conducir y la operación de maquinas

SUPRADYN® FORTE no afecta la capacidad de conducir, ni en el tránsito vial ni de operar maquinarias.

6. SOBREDOSIFICACION

Con la dosis recomendada, no existe ningún riesgo de sobredosificación.

Los síntomas iniciales de sobredosificación son inespecíficos como ser el inicio abrupto de dolor de cabeza, confusión, y molestias gastrointestinales como constipación, diarrea, náuseas y vómitos.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel.: (0221) 451-5555

7. CONSERVACIÓN DE SUPRADYN® FORTE

Conservar a temperatura inferior a 25°C. Proteger de la humedad.

PLB_ Supradyn Forte comp eferv_ CCDS3.0 + CP052012 + CCDS 4
13 de 14

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3652
VERONICA CASARO
CO-DIRECTORA TÉCNICA
MATRICULA PROFESIONAL 13119

VALEA WILBERGER
FARMACÉUTICA
ABODERADA

54

10047



8. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

Este medicamento no debe ser utilizado después de la fecha de vencimiento señalada en el envase.

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Cada comprimido efervescente de **SUPRADYN® FORTE** sabor limón contiene 12 vitaminas: vitamina A 3.333 UI, vitamina B1 4,5 mg, vitamina B2 5,1 mg, vitamina B6 6,0 mg, vitamina B12 6,0 µg, vitamina C 180 mg, vitamina D3 200 UI, vitamina E (*) (Dl- α -tocoferol) 10 mg, biotina 0,3 mg, ácido fólico 0,2 mg, nicotinamida 57 mg, ácido pantoténico 21 mg, 8 minerales y oligoelementos: calcio 50 mg, magnesio 40 mg, fósforo 50 mg, hierro 3,6 mg, manganeso 0,5 mg, cobre 0,4 mg, zinc 3,0 mg, cromo 0,01 mg.

(*)dl-α- tocoferol acetato 14,9 mg.

Excipientes: povidona K17, ácido tartárico, bicarbonato de sodio, aspartame, aroma de limón permaseal 84.260-51 , aroma de limón permaseal 60.827-71 , manitol 250 , sorbitol csp, (*)dl-α- tocoferol acetato.

Presentación

Envases con 10 y 30 comprimidos efervescentes sabor limón.

® Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Bajo licencia de Bayer AG, Alemania

Fabricado en Calle 3 y del Canal, Parque Industrial Pilar por BAYER S.A.

Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605HD), Munro, prov. de Buenos Aires, Argentina.

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 31021

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT

responde 0800-333-1234

VALERIA WILBERGER
FARMACEUTICA
APODERADA

PLB_ Supradyn Forte comp eferv_ CCDS3.0 + CP052012 + CCDS 4
14 de 14

BAYER S.A.
RICARDO GUTIERREZ 3652
VERONICA CASARQ
CO-DIRECTORA TECNICA
MATRICULA PROFESIONAL 13119

G