



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº **9804**

BUENOS AIRES, **18 NOV. 2015**

VISTO el Expediente Nº 1-47-2110-3044-14-4 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma F.A.V S.R.L, solicita la reinscripción para el Producto denominado Cebo raticida rodenticida en granos de cereal, Marca RODIFAV, inscripto mediante certificado de RNPUD Nº 0250001 bajo la categoría de Venta Profesional, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 228 el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud, informa que el producto reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que el establecimiento declarado demuestra aptitud para la elaboración y el control de calidad del producto cuya autorización de reinscripción se solicita, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 708/98.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de las Disposiciones ANMAT vigentes.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la

LD M.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

9804

intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y los Decretos N° 1886/14 y 1368/15.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la firma F.A.V S.R.L., titular del producto denominado Cebo raticida rodenticida en granos de cereal, Marca RODIFAV, inscripto mediante certificado de RNPUD N° 0250001 bajo la categoría de Venta Profesional, la reinscripción del mencionado producto, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0250001 que forma parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase los rótulos a fs. 207, 208, 211, 212, 213, 217, 219 y 221 que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 162, 166 y 227.

ARTÍCULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250001.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1º será de 5 años a partir del 30 de enero de 2014.

LD

MD



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 9804

ARTÍCULO 6º.- Cancélese el Certificado N° 0250001 otorgado por Expediente N° 1-47-2110-10974-07-2 obrante a fs. 121.

ARTÍCULO 7º.- Regístrase. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-47-2110-3044-14-4

DISPOSICION N° 9804

es off

Ing ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.

250 mm

114 mm

9904

GENERALIDADES:

El Bromadiolone, principio activo del RodifAV es un rodenticida anticoagulante para el control de ratas y ratones. Una sola ingestión causa la muerte del roedor a partir del 5to. día sin despertar sospechas en el resto de la colonia. Rata parda. Rata negra. Ratón doméstico o laucha. Ratones de campo.

PRIMEROS AUXILIOS:

IMPORTANTE: EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (LLEVAR ESTA ETIQUETA) Y LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE CONSULTATOXICOLÓGICA

EN CASO DE INGESTIÓN: proporcionar atención médica llevando el envase o rótulo del producto.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavarse con agua y jabón.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lavarlos con agua limpia durante 15 minutos. Consultar al médico si hay irritación.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:

PRODUCTO ANTICOAGULANTE ENERGICO DE ACTIVIDAD PROLONGADA: Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición al raticida.

Las medidas en caso de ingestión son el rescate de tóxico (vómito provocado, carbón activado, un purgante oséno). El monitoreo del tiempo de protrombina debe realizarse en las primeras 24 hrs. y repetirse a las 72 hs.

Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.

ANTIDOTO:

Vitamina K1. La administración y las dosis están determinadas por la evolución clínica. Realizar el seguimiento del nivel de protrombina durante 15-20 días.

Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad; se almacenan en las grasas y el hígado; presentan circulación enterohepática y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos.

Guardar el raticida en su envase original, en lugar fresco y seguro.

RIESGO AMBIENTAL:

Producto tóxico para mamíferos, aves y peces. No deben contaminarse los cursos de agua. Quemar o enterrar a los roedores muertos y eliminar los restos del producto en forma segura. Se advierte que cada autoridad jurisdiccional fija normas de eliminación de residuos para las empresas.



Rodenticida - Raticida

De potente acción sobre ratas y ratones.
Superwarfarínico - Raticida de acción prolongada.

VENTA Y USO EXCLUSIVO
PARA APLICADORES PROFESIONALES
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE



LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO Y LA CORRECTA DOSIFICACIÓN, ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES.

Composición	
Bromadiolone (hidro-4-cumaril-3-teril-3-(bromo-4-teril-4-)-1-propanol-1)	0.005 g
Amargante	0.002 g
Inertes c.s.p.	100.000 g

R.N.E.: 2000081
R.N.P.U.D.: 025001

Lot. N°:
Vencimiento:

F.A.V. s.r.l.; S. Weidmann 2980 - Tel. (03496) 422391
Depósito y Planta: R.P. Krieger 3633/48 - Tel. (03496) 424885
E-mail: fav@comet.com.ar - 3080 ESPERANZA (Sierra Fe)

Cont. **1 kg**
Neto:
INDUSTRIA ARGENTINA

RECOMENDACIONES DE USO:

Dosis por cada punto de cebado: 100 g para ratas; 50 g para lauchas o ratones. Colocar el cebo dentro de cebaderas de difícil acceso para niños y mascotas o animales no blancos, las cuales deben ser inviolables y proteger al cebo de las condiciones ambientales. Evitar su exposición a la intemperie. Reponer el cebo hasta observar cese de consumo. La aplicación debe realizarse en los lugares donde se hayan observado roedores o signos de su presencia distribuyendo la mayor cantidad posible de cebaderas distanciadas entre sí de 5 a 10 metros.

PRECAUCIONES GENERALES:

Durante su manipuleo evitar contacto con la piel, boca y ojos; utilizar guantes. No comer, beber ni fumar. Luego de la aplicación del producto y en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón; en contacto con los ojos lavarse abundantemente con agua. Aplicar en sitios inaccesibles para los niños y las mascotas. No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, tuberías de aire o fuente de ventilación que condicione la persistencia del raticida en el ambiente. Las mujeres embarazadas no pueden manejar el raticida ni estar expuestas a los lugares donde el mismo fue aplicado. Cado que exista la posibilidad que las superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores, pudiendo ser ésta la posible fuente de contaminación, se recomienda una permanente limpieza del lugar desratizado. Utilizar guantes, barbijo y protección ocular. Informar a los usuarios de las instalaciones donde se está realizando la aplicación del raticida y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

CAPITAL FEDERAL: Hospital Pedro Elizalde: Tel.: (011) 4307-5842 al 44. Hospital Municipal de Niños: Tel.: (011) 4962-6660/2247. Hospital de Clínicas, Sección Toxicología: Tel.: (011) 496-21280/18001. BUENOS AIRES: Alejandro Posadas: Tel.: (011) 4658-7777/4448/3001. Hospital de Niños de La Plata: Tel.: (0221) 451-5555. ROSARIO: Hospital de Emergencias de Rosario: Tel.: (0341) 482-0016. CÓRDOBA: Hospital de Emergencias Córdoba: Tel.: (0351) 422-7181. Centro de Toxicología del Hospital de Niños de Córdoba: Tel.: (0351) 423-3303. CATAMARCA: Hospital de Niños: Tel.: (0383) 342-5118/3028. Hospital Interzonal: Tel.: (0383) 342-3014/2100. CHACO: Hospital Dr. Julio Ferrando: Tel.: (0372) 242-5655/5924/7233. JUJUY: Hospital de Niños: Tel.: (0388) 242-2347/2033/2012. LA RIOJA: Hospital Pto. Plaza: Tel.: (0382) 242-3000/8538. MENDOZA: Hospital Central: Tel.: (03361) 425-2476/0476. SANTA FE: Hospital Pto. Tel.: (0342) 458-8770. SALTA: Centro de Emergencias: Tel.: (0387) 422-3333/4000/2222. NEUQUEN: Hospital Regional: Tel.: (0298) 443-1474/1478/1453/1456. TUCUMÁN: Hospital del Niño Jesús: Tel.: (0381) 424-4821/4405/4694.

F.A.V. s.r.l. garantiza la calidad de este producto en su envase original sin abrir, pero no asume responsabilidad alguna por un uso distinto al indicado en este

CUIDADO VENENO

igual rótulo cont.

EL ROTULO DEBERA CUMPLIR CON LA LEGISLACION VIGENTE
EXPTE. N° 2110-3044-14-4

OLGA D. TORTU
LIC. EN CS. QUÍM.
M.P. 4105

18 NOV. 2015

NÉSTOR JOAQUÍN MONTANO
INGENIERO AGRÓNOMO
MAT. N° 1-0125



19

30 210 325 210 325

105

285

105

7086

495

RECOMENDACIONES DE USO
 Dosis por cada punto de cebado: 100 y para ratas: 50 y para lechuzas o
 chorros. Colocar el cebado dentro de coberturas de 20x20 metros para
 ratas y lechuzas o cubiertas de 10x10 metros, las cubiertas deben ser
 lavadas y limpiar el área de las condiciones ambientales. Cerrar la
 exposición a la propiedad. Resguardar el cebado hasta el momento de
 aplicación. La aplicación debe realizarse en los lugares donde se haya
 observado actividad y signos de su presencia distribuyendo la mayor
 cantidad posible de coberturas distribuidas entre sí de 8 a 10 metros.

PRECAUCIONES GENERALES:
 Durante su manipulación evitar contacto con la piel, boca y ojos. Utilizar guantes,
 las manos, lavarse el rostro. Luego de la aplicación del producto y en caso de
 contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Evitar el contacto con los
 ojos lavando abundantemente con agua. Aplicar en otros insecticidas para las
 ratas y los humanos. No utilizar en ambientes cerrados, mal ventilados,
 habitación de día o fuente de ventilación que reduzca la permeabilidad de
 cebado en el ambiente. Los lugares embalsamados no pueden manipular el
 cebado ni estar expuestos a los vapores desde el mismo. Los aplicadores deben
 que evite la posibilidad que los superfarfánicos se encuentren en la materia
 fecal de los roedores, pudiendo ser toxica la posible fuente de contaminación,
 de referencia una permanente limpieza del lugar embalsamado. Usar
 guantes, botas y protección ocular. Informar a los usuarios de las
 indicaciones dadas en cada rotulado de la aplicación del cebado y los
 procedimientos a seguir en caso de emergencia en cualquier punto.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN
 CAPITAL FEDERAL: Hospital Pedro Ezeiza. Tel: (011) 4287-8842 of 44
 Hospital de Niños de Niños. Tel: (011) 4922-2247. Hospital de Niños
 Buenos Aires. Tel: (011) 4922-1200. BUENOS AIRES
 Provincia Buenos Aires: Tel: (011) 4688-7773/4442200. Hospital de Niños de
 La Plata. Tel: (0221) 451-4605. ROSARIO: Hospital de Emergencias de
 Rosario. Tel: (0341) 423-0019. CORDOBA: Hospital de Emergencias
 Córdoba. Tel: (0351) 322-2111. Centro de Toxicología del Hospital de Niños de
 Córdoba. Tel: (0351) 423-3261. CATAMARCA: Hospital de Niños. Tel:
 (0360) 343-3118/3581. Hospital Intermodal. Tel: (0363) 342-3011/3140
 CHACO: Hospital Dr. Julio Perdomo. Tel: (0372) 334-3600/3422/3233
 SALTA: Hospital de Niños. Tel: (0383) 241-2347/24337012. LA RIOJA:
 Hospital de Niños. Tel: (0352) 342-2222/3333. RIOJAS: Hospital
 Central. Tel: (0358) 1425-2430/2430/2430. SANTA FE: Hospital de Niños. Tel: (0342)
 254-1710. SALTA: Centro de Emergencias. Tel: (0387) 422-3333/4220/2222.
 MENDOZA: Hospital Regional. Tel: (0391) 423-1411/1478/1423/1424.
 TUCUMÁN: Hospital de Niños. Tel: (0341) 422-1448/1448/1448.
 FAV es el garante de la calidad de este producto en su versión original en
 caso de alguna responsabilidad alguna por un uso indebido o mal uso de
 este producto.

Rodenticida - Raticida
 De potente acción sobre ratas y ratones
 Superfarfánico - Raticida de acción prolongada

VENTA Y USO EXCLUSIVO PARA APLICADORES
 PROFESIONALES. PROHIBIDA SU
 VENTA LIBRE

RodifAV®
 Cebo en granos

**MODRO
 DOSICO**

**GUIRADO
 VENENO**

LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES
 DE USO Y LA CORRECTA DISTRIBUCION.
 ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
 MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS
 NIÑOS Y ANIMALES.

Cont. 48 bolsas
 Neto: de 100 g c/b
 INDUSTRIA ARGENTINA




GENERALIDADES:
 El Bromopirato, principio activo del RodifAV es un rodenticida
 superfarfánico para el control de ratas y ratones. Una sola ingestión basta para
 revertir del roedor a partir del día de su ingestión accediendo en el resto de la
 especie. Hito por: Rata negra. Rata doméstica o leucis. Ratones de
 campo.

PROFESORES AUXILIADOS:
 IMPORTANTE: EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR INMEDIATAMENTE
 AL MEDICO O LLAMAR A LA ETIQUETA Y LLAMAR A LOS TELEFONOS DE
 CONSULTA OXIDOLÓGICA.

EN CASO DE INTOXICACION: proporcionar su nombre médico buscando el apoyo
 a Hable del médico. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, lavar con
 agua y jabón. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, lavarlos con agua
 durante 15 minutos. Consultar al médico si no hay mejoría.

ADVERTENCIA PARA EL MEDICO:
PREVENCIÓN DE INTOXICACIONES:
EN RIGUROSO ACTIVO Y PROLONGADA.
 Los superfarfánicos pueden causar náuseas y vómitos homocinéticos con
 prolongación del tiempo de procesamiento, con una duración de hasta 10 días,
 después de una ingestión de cebado.
 Los roedores en caso de ingestión ven al roedor de líneas (líneas) presentes,
 cuando sobrevive, un surtido entre 1 y 2 semanas del tiempo de procesamiento
 debe realizarse en las primeras 24 hs y repetirse a las 72 hs. Se propone el
 mantenimiento de un control de toxicología para el seguimiento y
 tratamiento del paciente.

INDICACIONES:
 Ratas y ratones. La administración y los dosis están determinadas por la
 cantidad de cebado. Realizar el seguimiento del nivel de procesamiento durante
 15-20 días.

Los superfarfánicos presentan una elevada toxicidad, se absorben en
 los gases y al hígado, presentan actividad neurotóxica y tienen largo
 tiempo de vida. La administración del tratamiento puede ser prolongada.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
 No transportar ni almacenar con otros medicamentos.
 Guardar el rotulado en su envase original, en lugar fresco y seguro.

EFECCO AMBIENTAL:
 Producto tóxico para mamíferos, aves y peces. No debe contaminarse las
 aguas de agua. Cerrar el envase a los roedores muertos y eliminar los
 restos del producto en forma segura. Se advierte que este producto
 profesional de normas de almacenamiento de roedores para los roedores.

Rodenticida - Raticida
 De potente acción sobre ratas y ratones
 Superfarfánico - Raticida de acción prolongada

VENTA Y USO EXCLUSIVO PARA APLICADORES
 PROFESIONALES. PROHIBIDA SU
 VENTA LIBRE

RodifAV®
 Cebo en granos

**MODRO
 DOSICO**

composición

Bromopirato (hidro-4-cumil-3,7,3-terc-3)	0.005 g
Bromo-4-terc-4'-7'-1-propanil-1)	0.002 g
Amalgama	100.000 g
Inertes c.a.p.	100.000 g

Cont. 48 bolsas
 Neto: de 100 g c/b
 INDUSTRIA ARGENTINA




FAV S.A. Administración S. Weidmann 2980 - Tel: (03496) 422391
 Depósito y Planta: R.P. Kreder 3038/46 - Tel: (03496) 424625
 e-mail: faver@netbiz.com.ar - www.favsa.com.ar - (3080) Esperanza (Sant. Fe)



EL ROTULO DEBERA CUMPLIR
 CON LA LEGISLACION VIGENTE
 EXPTE. N° 2110-3044-14-1/00

Jorge TORTU NESTOR QUAYMONTE
 LIC. EN D.S. O.C.A.S. INGENIERO AGRÓNOMO
 N.P. 4105 MAT. N° 1-0135



140 mm

CONSULTA TOXICOLÓGICA.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO:
PRODUCTO ANTICOAGULANTE ENERGICO DE ACTIVIDAD PROLONGADA

Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición al raticida.

Las medidas en caso de ingestión son el rescate de tóxico (vómito provocado, carbón activado, un purgante salino). El monitoreo del tiempo de protrombina debe realizarse en los primeros 24 hs. y reiterarse a las 72 hs.

Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.

ANTÍDOTO:

Vitamina K1. La administración y las dosis están determinadas por la evolución clínica. Realizar el seguimiento del nivel de protrombina durante 15-20 días. Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad; se almacenan en las grasas y el hígado; presentan circulación enterohepática y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:

Hospital de Clínicas, Sección Toxicología: Tel.: (011) 496-21280 (16001). Alejandro Posadas: Tel.: (011) 4658-7777/4448/3001. Hospital de Emergencias Córdoba: Tel.: (0351) 422-7181.

Rodenticida - Raticida

De potente acción sobre ratas y ratones. Superwarfarínico - Raticida de acción prolongada



CUIDADO VENENO ATENCION CUIDADO!!!

VENTA Y USO EXCLUSIVO PARA APLICADORES PROFESIONALES PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

RodifAV
Cebo en granos **MONO DOSICO**

Peso Neto: **50g**



Lea detenidamente las instrucciones de uso y la correcta dosificación, antes de utilizar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños y animales.

R.N.E. 21003088 Lote N°:
R.N.P.U.D. 0250001 Venenimtor

INDUSTRIA ARGENTINA

composición	
Bromadiolone (hidroxil-4'-cumaril-3') fenil-3-(bromo-4-bifenil-4')-1 propanol-1)	0,005 g
Amargante	0,002 g
Inertes c.s.p.	100,000 g

F.A.V. s.r.l. garantiza la calidad de este producto en su envase original sin abrir pero no asume responsabilidad alguna por un uso distinto al indicado en esta etiqueta.

F.A.V. s.r.l.: Administración: S.Weldmann 2930 - Tel.: (03496) 422391
Depósito y Planta: R.P.Kreder 3638/46 - Tel.: (03496) 424685

e-mail: favsr@arnetbiz.com.ar - www.favsr.com.ar - (3080) Esperanza (Santa Fe)

RECOMENDACIONES DE USO:

Dosis por cada punto de cebado: 100 g para ratas; 50 g para lauchas o ratones. Colocar el cebo dentro de cebaderas de difícil acceso para niños y mascotas o animales no blanco, las cuales deben ser involucables y proteger al cebo de las condiciones ambientales.

PRECAUCIONES GENERALES:

Evitar contacto con la piel, boca y ojos; utilizar guantes. No comer, beber ni fumar.

Luego de la aplicación del producto y en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón; en contacto con los ojos lavarse abundantemente con agua.

Las mujeres embarazadas no pueden manejar el raticida ni estar expuestas a los lugares donde el mismo fue aplicado.

Dado que existe la posibilidad que las superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores, pudiendo ser ésta la posible fuente de contaminación, se recomienda una permanente limpieza del lugar desratizado. Utilizar guantes, barbijo y protección ocular.

Informar a los usuarios de las instalaciones donde se está realizando la aplicación del raticida y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.

PRIMEROS AUXILIOS:


IMPORTANTE: EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (LLEVAR ESTA ETIQUETA) Y LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE

706

Obec
TORTU
C/O. CS. GCAS.
M.P. 4105

100g y
200g

NÉSTOR JUSTO MONTÚ
INGENIERO AGRÓNOMO
MAT. 11-0125



EL ROTULO DEBERA CUMPLIR CON LA LEGISLACION VIGENTE.
EXPTE. N° 2110-3044-14-4



9804



Proyecto de rótulo - Venta profesional

Envase secundario

(Para cajas con 36 sobres de 50 g/ 48 y 50 sobres de 100 g/ 24 sobres de 200 g/ potes con 100 sobres de 50 g, de ~~600 g~~ y 5 kg y bolsa de 25 kg)

Panel principal

**VENTA Y USO EXCLUSIVO
PARA APLICADORES PROFESIONALES
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE**

Rodenticida – Raticida

De potente acción sobre ratas y ratones
Superwarfarínico – Raticida de acción prolongada

INDUSTRIA ARGENTINA

Rodi FAV®

**MONO
DOSICO**

Cebo en granos

Lea detenidamente las instrucciones de uso y la correcta dosificación
antes de utilizar el producto
Mantener fuera del alcance de los niños y animales

CUIDADO! VENENO



**EL ROTULO DEBERA CUMPLIR
CON LA LEGISLACION VIGENTE
EXFTE. N° 2110-3044-14-y**

Composición:

Bromadiolone	
(hidroxi-4'-cumarinil-3')-3-fenil-3-(bromo-4-bifenil-4')-1-propanol-1).....	0.005 g.
Amargante	0.002 g.
Inertes c.s.p.	100.000 g.

R.N.E.: 210030881

R.N.P.U.D.: 0250001

Lote nº:

Vencimiento:

Contenido neto: (según presentación)

F. A. V. s.r.l.

S. Weidmann 2980 – Tel. (03496) 422391 Depósito y Planta: R.P. Kreder 3638/46
Tel. (03496) 424685 – e-mail: favsrl@favsrl.com.ar - 3080 Esperanza (Santa Fe)

217

Logo
NÉSTOR JUAN MONTÚ
INGENIERO AGRÓNOMO
MAT. N° 110125
M.P. 4105



Lateral inferior

9804

GENERALIDADES

El Bromadiolone, principio activo del **RodiFAV** es un rodenticida anticoagulante para el control de ratas y ratones. Una sola ingestión causa la muerte del roedor a partir del 5to. día sin despertar sospechas en el resto de la colonia. Rata parda. Rata negra. Ratón doméstico o laucha. Ratones de campo.

PRIMEROS AUXILIOS

IMPORTANTE: EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (LLEVAR ESTA ETIQUETA) Y LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA.

EN CASO DE INGESTIÓN: proporcionar atención médica llevando el envase o rótulo del producto.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavarse con agua y jabón.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lavarlos con agua limpia durante 15 minutos. Consultar al médico si hay irritación.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO

PRODUCTO ANTICOAGULANTE ENÉRGICO DE ACTIVIDAD PROLONGADA

Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses después de una exposición al raticida.

Las medidas en caso de ingestión son el rescate de tóxico (vómito provocado con carbón activado, un purgante salino). El monitoreo del tiempo de protrombina realizarse en las primeras 24 hs. y reiterarse a las 72 hs.

Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.

ANTÍDOTO

Vitamina K1. La administración y las dosis están determinadas por la evolución clínica. Realizar el seguimiento del nivel de protrombina durante 15-20 días.

Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad; se almacenan en grasas y el hígado; presentan circulación enterohepática y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos. Guardar el raticida en su envase original, en lugar fresco y seguro.

RIESGO AMBIENTAL

Producto tóxico para mamíferos, aves y peces.

No deben contaminarse los cursos de agua.

Quemar o enterrar a los roedores muertos y eliminar los restos del producto en forma segura. Se advierte que cada autoridad jurisdiccional fija normas de eliminación de residuos para las empresas.

EL RÓTULO DEBERÁ COMPLETARSE CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
EXFTE. N° 210-3044-14

BY

Olga C. Tortú
OLGA C. TORTÚ
LIC. EN CS. QCA.S.
M.P. 4105

Néstor Juan Montú
NÉSTOR JUAN MONTÚ
INGENIERO AGRÓNOMO
MAT. 0125



Lateral superior

RECOMENDACIONES DE USO

Dosis por cada punto de cebado: 100 g para ratas; 50 g para lauchas o ratones. Colocar el cebo dentro de cebaderas de difícil acceso para niños y mascotas o animales no blanco, las cuales deben ser involucables y proteger al cebo de las condiciones ambientales. Evitar su exposición a la intemperie. Reponer el cebo hasta observar cese de consumo. La aplicación debe realizarse en los lugares donde se hayan observado roedores o signos de su presencia distribuyendo la mayor cantidad posible de cebaderas distanciadas entre sí de 5 a 10 metros.

PRECAUCIONES GENERALES

Durante su manipuleo evitar contacto con la piel, boca y ojos; utilizar guantes. No comer, beber ni fumar.

Luego de la aplicación del producto y en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón; en contacto con los ojos lavarse abundantemente con agua.

Aplicar en sitios inaccesibles para los niños y las mascotas.

No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, tuberías de aire o fuente de ventilación que condicione la persistencia del raticida en el ambiente.

Las mujeres embarazadas no pueden manejar el raticida ni estar expuestas a los lugares donde el mismo fue aplicado.

Dado que existe la posibilidad que las superwarfarinas se encuentren en materia fecal de los roedores, pudiendo ser ésta la posible fuente de contaminación, se recomienda una permanente limpieza del lugar desratado.

Utilizar guantes, barbijo y protección ocular.

Informar a los usuarios de las instalaciones donde se está realizando la aplicación del raticida y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

CAPITAL FEDERAL: Hospital Pedro Elizalde: Tel.: (011) 4307-5842. Hospital Municipal de Niños: Tel.: (011) 4962-6666/2247. Hospital de Clínicas: Sección Toxicología: Tel.: (011) 496-21280/16001. BUENOS AIRES: Alejandro Posadas: Tel.: (011) 4658-7777/4448/3001. Hospital de Niños de La Plata: Tel.: (0221) 451-5555. ROSARIO: Hospital de Emergencias de Rosario: Tel.: (0341) 482-0016. CÓRDOBA: Hospital de Emergencias Córdoba: Tel.: (0351) 422-7181. Centro de Toxicología del Hospital de Niños de Córdoba: Tel.: (0351) 423-3303. CATAMARCA: Hospital de Niños: Tel.: (0383) 342-5118/3028. Hospital Interzonal: Tel.: (0383) 342-3014/2100. CHACO: Hospital Dr. Julio Perrando: Tel.: (0372) 242-50550/5924/7233. JUJUY: Hospital de Niños: Tel.: (0388) 242-2347/2033/2012. LA RIOJA: Hospital Pte. Plaza: Tel.: (0382) 242-3000/8538. MENDOZA: Hospital Central: Tel.: (00361) 425-2476/0476. SANTA FE: Hospital Piloto: Tel.: (0342) 459-8770. SALTA: Centro de Emergencias: Tel.: (0387) 422-3333/4000/2222. NEUQUEN: Hospital Regional: Tel.: (0299) 443-1474/1479/1453/1456. TUCUMÁN: Hospital del Niño Jesús: Tel.: (0381) 424-4821/4405/4694.

F.A.V. s.r.l. garantiza la calidad de este producto en su envase original sin abrir, pero no asume responsabilidad alguna por un uso distinto al indicado en esta etiqueta.

EN ROTULO DEBERA CUMPLIR
 CON LA LEGISLACION VIGENTE
 DE LA REPUBLICA ARGENTINA
 EXORTE. N.º 2110-110-4

LD

OLEGIO TORTÚ
 LIC. EN QS. OCAS.
 P.P. 4105

NÉSTOR JUAN MONTÚ
 INGENIERO AGRÓNOMO
 MAT. Nº 1-0125

980 

Proyecto de rótulo - Venta profesional
Envase primario
(Para sobres de 50, 100 y 200 g)



Frente

VENTA Y USO EXCLUSIVO
PARA APLICADORES PROFESIONALES
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE

Rodenticida – Raticida

De potente acción sobre ratas y ratones
Superwarfarínico – Raticida de acción prolongada

INDUSTRIA ARGENTINA

Rodi FAV®

MONO
DOSICO

Cebo en granos

Lea detenidamente las instrucciones de uso y la correcta dosificación
antes de utilizar el producto
Mantener fuera del alcance de los niños y animales

CUIDADO! VENENO



EL ROTULO DEBERA CUMPLIR
CON LA LEGISLACION VIGENTE
EXPT.E. N° 2110-3044-14-4

Composición:

Bromadiolone	
(hidroxi-4'-cumarinil-3')-3-fenil-3-(bromo-4-bifenil-4')-1-propanol-1).....	0.005 g.
Amargante	0.002 g.
Inertes c.s.p.	100.000 g.

R.N.E.: 210030881
Lote n°:


R.N.P.U.D.:0250001
Vencimiento:

Contenido neto: (según presentación)

F. A. V. s.r.l.

S. Weidmann 2980 – Tel. (03496) 422391 Depósito y Planta: R.P. Kreder 3638/46
Tel. (03496) 424685 – e-mail: favsrl@favsrl.com.ar - 3080 Esperanza (Santa Fe)

LD


OLGA C. TORTÚ
LIC. EN CS. QCA3.
M.P. 4105


NÉSTOR JUAN MONTÚ
INGENIERO AGRÓNOMO
MAD. N° 1-0125

Dorso

9804

6



RECOMENDACIONES DE USO

Dosis por cada punto de cebado: 100 g para ratas; 50 g para lauchas o ratones. Colocar el cebo dentro de cebaderas de difícil acceso para niños y mascotas o animales no blanco, las cuales deben ser involucables y proteger al cebo de las condiciones ambientales.

PRECAUCIONES GENERALES

Evitar contacto con la piel, boca y ojos; utilizar guantes. No comer, beber ni fumar. Luego de la aplicación del producto y en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón; en contacto con los ojos lavarse abundantemente con agua.

Las mujeres embarazadas no pueden manejar el raticida ni estar expuestas a los lugares donde el mismo fue aplicado.

Dado que existe la posibilidad que las superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores, pudiendo ser ésta la posible fuente de contaminación, se recomienda una permanente limpieza del lugar desratizado.

Utilizar guantes, barbijo y protección ocular.

Informar a los usuarios de las instalaciones donde se está realizando la aplicación del raticida y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.

PRIMEROS AUXILIOS

IMPORTANTE: EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUDIR INMEDIATAMENTE MÉDICO (LLEVAR ESTA ETIQUETA) Y LLAMAR A LOS TELÉFONOS CONSULTA TOXICOLÓGICA.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO

PRODUCTO ANTICOAGULANTE ENÉRGICO DE ACTIVIDAD PROLONGADA

Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos y prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición al raticida.

Las medidas en caso de ingestión son el rescate de tóxico (vómito provocado, carbón activado, un purgante salino). El monitoreo del tiempo de protrombina debe realizarse en las primeras 24 hs. y reiterarse a las 72 hs.

Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.

ANTÍDOTO

Vitamina K1. La administración y las dosis están determinadas por la evolución clínica. Realizar el seguimiento del nivel de protrombina durante 15-20 días.

Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad; se almacenan en las grasas y el hígado; presentan circulación enterohepática y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN

Hospital de Clínicas, Sección Toxicología: Tel.: (011) 496-21280/16001. Alejandro Posadas: Tel.: (011) 4658-7777/4448/3001. Hospital de Emergencias Córdoba: Tel.: (0351) 422-7181.

EL TÍTULO DEBERÁ CUMPLIR CON LA LEGISLACION VIGENTE EXPTE. N°



[Signature]
DORACÉ TORTÚ
LIC. EN CS. OCAS.
M.P. 4105

[Signature]
NÉSTOR JUAN MONTÚ
INGENIERO AGRÓNOMO
MAT. N° 1-0125



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250001

1. **Certifíquese la Inscripción del Producto:** CEBO RATICIDA RODENTICIDA EN GRANOS DE CEREAL
2. **Marca:** RODIFAV
3. **Origen:** ARGENTINA
4. **Principios Activos:** BROMADIOLONE 0,005 %
5. **Forma de Presentación:** SOBRES POR 50G (POR 36 Y 100 UNIDADES), 100G (POR 48 Y 50 UNIDADES) Y 200G (POR 24 UNIDADES). POTE POR 1KG Y 5KG. BOLSA POR 25KG PARA SER APLICADOS EN CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS.
6. **Venta:** VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. **Titular del Producto:** F.A.V. S.R.L.
8. **Domiciliado en:** S. WEIDMANN 2980 - ESPERANZA - SANTA FE
9. **Establecimiento TITULAR:** RNE N° : 210030881
10. **Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud**
Según Expediente Nro.: 1-0047-2110-003044-14-4.

Disposición N°: **9 8 0 4**

Fecha: **18 NOV. 2013**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consiguada en la disposición de autorización.

Este producto de riesgo IIB elaborado de acuerdo a las exigencias de la Resolución ex MS y AS N° 709/98, es de libre circulación y comercialización en todo el territorio de la República Argentina. Dicha comercialización será revocada por la Autoridad Sanitaria en caso de que la misma compruebe irregularidades o inexactitudes en la declaración jurada presentada sobre el producto, independientemente de las sanciones que pudieran corresponder al elaborador responsable.

QUEDA BAJO EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL ELABORADOR REALIZAR LOS CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN, ROTULADO, FORMA DE PRESENTACIÓN, SI FUERAN NECESARIOS, PARA CUMPLIMENTAR LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES.

Sello y Firma del Funcionario Responsable