



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número:

Referencia: EX-2019-82429847-APN-DGA#ANMAT

VISTO el Expediente EX-2019-82429847-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma ROEMMERS SAICF solicita la aprobación de nuevos proyectos de rótulos, prospectos e información para el paciente para la Especialidad Medicinal denominada MERIDIAN / ESCITALOPRAM, Forma Farmacéutica y Concentración: COMPRIMIDOS RECUBIERTOS / ESCITALOPRAM 10 y 20 mg; aprobada por Certificado N° 50750.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición N°: 5904/96 y Circular N° 4/13.

Que la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. – Autorízase a la firma ROEMMERS SAICF propietaria de la Especialidad Medicinal denominada MERIDIAN / ESCITALOPRAM, Forma Farmacéutica y Concentración: COMPRIMIDOS RECUBIERTOS / ESCITALOPRAM 10 y 20 mg; el nuevo proyecto de prospecto obrante en el documento IF-2019-94174513-APN-DERM#ANMAT; e información para el paciente obrante en el documento IF-2019-94172246-APN-DERM#ANMAT.

ARTICULO 2º. – Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 50750, cuando el mismo se presente acompañado de la presente Disposición.

ARTICULO 3º. - Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición y rótulos, prospectos e información para el paciente. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2019-82429847-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio
Date: 2019.11.27 09:09:55 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.11.27 09:09:54 -03:00



ROEMMERS
INDUSTRIA ARGENTINA

VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA. PSI IV

Meridian
Escitalopram
Comprimidos recubiertos 10 y 20 mg
Vía oral

FÓRMULAS

Meridian comprimidos recubiertos:

Cada comprimido recubierto contiene: Escitalopram oxalato (equivalente a escitalopram base 10,0 mg) 12,770 mg; Croscarmelosa sódica tipo A 3,780 mg; Dióxido de silicio coloidal 0,58 mg; Celulosa microcristalina PH 101 97,06 mg; Talco 8,05 mg; Estearato de magnesio 2,76 mg; Hidroxipropilmetilcelulosa 2,21 mg; Dióxido de titanio 0,98 mg; Triacetina 0,31 mg.

Meridian 20 comprimidos recubiertos:

Cada comprimido recubierto contiene: Escitalopram oxalato (equivalente a escitalopram base 20,0 mg) 25,54 mg; Croscarmelosa sódica tipo A 7,56 mg; Dióxido de silicio coloidal 1,16 mg; Celulosa microcristalina PH 101 194,12 mg; Talco 16,1 mg; Estearato de magnesio 5,52 mg; Hidroxipropilmetilcelulosa 4,42 mg; Dióxido de titanio 1,96 mg; Triacetina 0,62 mg.

ACCION TERAPEUTICA

Antidepresivo (Clasificación ATC N06A B10)

INDICACIONES

- Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. (DSM IV)
- Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. (DSM IV)
- Tratamiento de la fobia social. (DSM IV)
- Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. (DSM IV)
- Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC). (DSM IV)



ROEMMERS SAICF
JORGELINA D'ANGELO
FARMACEUTICA
DIRECTORA TECNICA
M.N. 12.663
APODERADA

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT

PROPIEDADES FARMACOLOGICAS

Mecanismo de acción

Escitalopram es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (5-HT) con alta afinidad por el sitio de unión primario. También se une a un sitio alostérico del transportador de la serotonina, con una afinidad 1000 veces menor. La modulación alostérica del transportador de serotonina intensifica la unión del Escitalopram al sitio de unión primario, resultando en una más completa inhibición de la recaptación de serotonina.

Escitalopram no tiene o tiene una baja afinidad por receptores como 5-HT_{1A}, 5-HT₂, receptores dopaminérgicos D₁ y D₂, α_1 , α_2 , β -adrenérgicos, histaminérgicos H₁, colinérgicos muscarínicos, benzodiazepínicos y opioides.

La inhibición de la recaptación de la 5-HT es el único mecanismo de acción probable que explique los efectos farmacológicos y clínicos de Escitalopram. El Escitalopram es el enantiómero (S) del racemato (citalopram) y al que se le atribuye la actividad terapéutica.

Estudios farmacológicos demostraron que el enantiómero (R) no es inactivo y neutraliza la potenciación de la serotonina y consecuentemente las propiedades farmacológicas del enantiómero (S).

Farmacocinética

Absorción:

La absorción es casi completa e independiente de la ingestión de alimentos (T_{max} de 4 horas (valor medio) tras dosis múltiples). Al igual que el Citalopram, la biodisponibilidad del Escitalopram es de alrededor del 80%.

Distribución:

El volumen aparente de distribución ($V_{d,\beta}/F$) tras la administración oral es de 12 a 26 l/kg aproximadamente. La unión del Escitalopram y de sus metabolitos principales a las proteínas plasmáticas es inferior al 80%.

Biotransformación:

Escitalopram es metabolizado en el hígado a los metabolitos desmetilado y didesmetilado. Ambos metabolitos son farmacológicamente activos. Por otro lado, el nitrógeno se puede oxidar para formar el metabolito N-óxido. Tanto la molécula original como los metabolitos se excretan parcialmente como glucurónidos. Tras la administración de dosis múltiples las concentraciones medias de los metabolitos desmetilado y didesmetilado suelen ser 28-31% y <5% de la concentración de Escitalopram, respectivamente. La biotransformación de Escitalopram al metabolito desmetilado, está mediada principalmente por el CYP2C19, aunque es posible que CYP3A4 y CYP2D6 contribuyan a la misma.

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT

ROEMMERS SAICF
JORGELINA D'ANGELO
FARMACEUTICA
REPUBLICA ARGENTINA
M.N. 12.663
APODERADA



ROEMMERS

Eliminación:

La vida media de eliminación ($t_{1/2,\beta}$) tras dosis múltiples es de 30 horas y el clearance plasmático oral (Cl_{oral}) de 0,6 l/min, aproximadamente. Los principales metabolitos tienen una vida media significativamente más prolongada.

Se asume que el Escitalopram y sus metabolitos principales se eliminan por vía hepática (metabólica) y vía renal. La mayor parte de la dosis se excreta en forma de metabolitos a través de la orina.

La farmacocinética es lineal. Las concentraciones plasmáticas en estado de equilibrio se alcanzan en una semana aproximadamente. Las concentraciones medias en estado de equilibrio de 50 nmol/l (intervalo 20 a 125 nmol/l) se alcanzan a una dosis diaria de 10 mg.

Pacientes ancianos (> 65 años):

Escitalopram se elimina más lentamente en los pacientes ancianos que en los pacientes jóvenes. La exposición sistémica (ABC) es de alrededor del 50% mayor en personas ancianas respecto a voluntarios jóvenes. (ver Posología y forma de administración).

En insuficiencia hepática:

En pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada (criterios Child-Pugh A y B) la vida media de escitalopram fue aproximadamente dos veces más larga y la exposición fue aproximadamente un 60% mayor que en sujetos con función hepática normal. (ver apartado Posología y forma de administración).

En insuficiencia renal:

En pacientes con insuficiencia renal (10-53 ml/min), se ha observado que el citalopram racémico presenta una vida media más larga y un menor incremento de la exposición. Las concentraciones plasmáticas de los metabolitos no han sido estudiadas pero podrían estar elevadas (ver Posología y forma de administración).

Polimorfismo:

Se ha observado que los metabolizadores pobres con respecto a CYP2C19 presentan el doble de la concentración plasmática de Escitalopram como en los metabolizadores amplios. No se observaron cambios significativos de la exposición en los metabolizadores pobres con respecto a CYP2D6 (ver Posología y forma de administración).

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION

No se ha demostrado aún la seguridad del Escitalopram administrado a dosis mayores a 20 mg diarios.

Escitalopram se administra en dosis única diaria y puede ingerirse junto con o sin alimentos.

ROEMMERS SAICE
LABORATORIA SUCESORAS
FARMACEUTICA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.663
APODERADA

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT



Tratamiento del trastorno depresivo mayor:

La dosis habitual es de 10 mg una vez al día. La dosis diaria puede aumentarse hasta un máximo de 20 mg, según la respuesta individual del paciente.

Generalmente, el efecto antidepresivo se obtiene entre 2 y 4 semanas de tratamiento. El tratamiento de los episodios depresivos requiere de tratamiento inicial así como también, de tratamiento de mantenimiento. Después de la resolución de los síntomas durante el tratamiento inicial, se requiere un periodo de tratamiento durante por lo menos 6 meses para consolidar la respuesta.

Tratamiento de trastorno de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia:

Se recomienda iniciar el tratamiento con una dosis única de 5 mg diarios durante la primera semana, antes de incrementar la dosis a 10 mg diarios. La dosis diaria puede aumentarse hasta un máximo de 20 mg, según la respuesta individual del paciente.

La máxima eficacia en el tratamiento de los trastornos de pánico se alcanza al cabo de 3 meses de tratamiento aproximadamente. Es un tratamiento prolongado.

Tratamiento de la fobia social:

La dosis habitual es de 10 mg una vez al día. La dosis diaria puede aumentarse hasta un máximo de 20 mg, según la respuesta individual del paciente. Generalmente se observan síntomas de alivio a las 2-4 semanas de tratamiento. Se recomienda continuar el tratamiento durante por lo menos 12 semanas para consolidar la respuesta y controlar regularmente al paciente para evaluar los beneficios del tratamiento.

Tratamiento del trastorno de la ansiedad generalizada:

La dosis habitual es de 10 mg una vez al día. La dosis diaria puede aumentarse hasta un máximo de 20 mg, según la respuesta individual del paciente.

Se recomienda continuar el tratamiento durante por lo menos 12 semanas para consolidar la respuesta. El tratamiento de largo plazo durante 6 meses ha mostrado prevenir las recaídas, por lo que puede tomarse en consideración sobre la base de la respuesta individual del paciente. El beneficio del tratamiento debe reevaluarse a intervalos regulares.

Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo:

La dosis inicial es de 10 mg una vez al día. La dosis puede aumentarse hasta un máximo de 20 mg al día, según la respuesta individual del paciente.

Como el trastorno obsesivo-compulsivo es una enfermedad crónica, los pacientes deben ser tratados durante un periodo suficiente como para asegurar la ausencia de síntomas. Los beneficios del tratamiento y las dosis deben reevaluarse regularmente.

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT

ROEMMERS AN
ANGELA G. ANGELI
FARMACEUTICA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.663
APODERADA



Posologías Especiales

Pacientes Ancianos (> 65 años de edad):

Se debe considerar iniciar el tratamiento con la mitad de la dosis usualmente recomendada y una dosis máxima más baja (ver Farmacocinética).

Niños y adolescentes (< 18 años):

No se recomienda su administración en niños y adolescentes menores de 18 años de edad (ver Advertencias y Precauciones Especiales de Empleo).

Pacientes con insuficiencia renal:

No es necesario un ajuste de la dosis en los pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. Se aconseja administrar con precaución en pacientes con función renal severamente disminuida (clearance de creatinina < 30 ml/min) (ver Farmacocinética).

Pacientes con insuficiencia hepática:

Se recomienda una dosis inicial de 5 mg durante las 2 primeras semanas de tratamiento. La dosis puede aumentarse hasta 10 mg según la respuesta individual del paciente. (ver Farmacocinética).

Metabolizadores pobres del CYP2C19:

En pacientes con antecedentes conocidos de ser metabolizadores pobres con respecto al CYP2C19, se recomienda una dosis inicial de 5 mg diarios durante las primeras dos semanas de tratamiento. La dosis puede incrementarse hasta 10 mg diarios, según la respuesta individual del paciente (ver Farmacocinética).

Discontinuación del tratamiento:

Cuando deba interrumpirse el tratamiento con Escitalopram, la dosis debe disminuirse de manera gradual durante un período de una a dos semanas para evitar posibles reacciones de supresión (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo).

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al Escitalopram o a alguno de los excipientes. Tratamiento concomitante con inhibidores de la MAO (IMAO). Tratamiento concomitante con pimozida (ver Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO

El uso de antidepresivos con indicación aprobada por ensayos clínicos controlados en adultos con Trastorno Depresivo Mayor y otras condiciones psiquiátricas deberá establecerse en un marco terapéutico adecuado a cada paciente en particular. Esto incluye:

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT

ROEMMERS SMCF
JORGELINA D'ANGELO
FARMACEUTICA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.663
BPOKERADA



- a) que la indicación sea hecha por especialistas que puedan monitorear rigurosamente la emergencia de cualquier signo de agravamiento o aumento de la ideación suicida, como así también cambios conductuales con síntomas del tipo de agitación;
- b) que se tengan en cuenta los resultados de los últimos ensayos clínicos controlados;
- c) que se considere que el beneficio clínico debe justificar el riesgo potencial.

Han sido reportados en pacientes adultos tratados con antidepresivos IRS o con otros antidepresivos con mecanismo de acción compartida tanto para el Trastorno Depresivo Mayor como para otras indicaciones (psiquiátricas y no psiquiátricas) los siguientes síntomas: ansiedad, agitación, ataques de pánico, insomnio, irritabilidad, hostilidad (agresividad), impulsividad, acatisia, hipomanía y manía. Aunque la causalidad ante la aparición de éstos síntomas y el empeoramiento de la depresión y/o la aparición de impulsos suicidas no ha sido establecida existe la inquietud de que dichos síntomas puedan ser precursores de ideación suicida emergente.

Estudios clínicos no mostraron incremento del riesgo de suicidio comparado con placebo en adultos mayores a 24 años de edad; se observó una reducción en el riesgo de suicidio con antidepresivos comparado con placebo en pacientes adultos mayores a 65 años de edad.

Un metanálisis de ensayos clínicos con antidepresivos controlados con placebo en pacientes adultos con trastornos psiquiátricos, demostró un aumento del riesgo de conductas suicidas con antidepresivos comparados con placebo en pacientes menores de 25 años. Un seguimiento cercano de los pacientes y en particular en aquellos con alto riesgo, debería acompañar al tratamiento farmacológico, especialmente al inicio del tratamiento, así como después de un cambio de dosis.

Los familiares y quienes cuidan a los pacientes deberían estar alertados acerca de la necesidad de seguimiento de los pacientes en relación tanto de los síntomas descriptos como de la aparición de ideación suicida y reportarlo inmediatamente a los profesionales tratantes. Dicho seguimiento debe incluir la observación diaria de los pacientes por sus familiares o quienes estén a cargo de sus cuidados.

Si se toma la decisión de discontinuar el tratamiento la medicación debe ser reducida lo más rápidamente posible, pero teniendo en cuenta el esquema indicado para cada principio activo, dado que en algunos casos la discontinuación abrupta puede asociarse con ciertos síntomas de retirada.

ROEMMERS SAICE
 FARMACEUTICA
 DIRECTORA TÉCNICA
 M.N. 12.663
 APODERADA

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT



ROEMMERS

La seguridad y eficacia en pacientes menores de 18 años no ha sido establecida.

Se recomienda considerar las siguientes advertencias y precauciones relacionadas con el grupo terapéutico de los ISRS (Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina).

Niños y Adolescentes (menores a 18 años de edad):

Se desaconseja el uso de antidepresivos en niños y adolescentes menores de 18 años de edad. La conducta suicida (intentos de suicidio e ideas de suicidio) y la hostilidad (predominantemente agresión, comportamiento de confrontación e irritación), fueron constatadas con más frecuencia en ensayos clínicos con niños, adolescentes y jóvenes (entre 18 y 24 años de edad) tratados con antidepresivos frente a aquellos tratados con placebo. Si se decide efectuar el tratamiento se recomienda una supervisión cuidadosa.

Ansiedad paradójica:

Algunos pacientes con trastornos de pánico pueden presentar un aumento de la ansiedad al inicio del tratamiento con antidepresivos. Esta reacción paradójica normalmente desaparece en el plazo de 2 semanas, con la continuación del tratamiento. Se recomienda administrar una dosis inicial baja para reducir la probabilidad de un efecto ansiogénico (ver Posología y forma de administración).

Convulsiones:

El tratamiento debe ser interrumpido en pacientes que desarrollen convulsiones al iniciar el mismo o si se observa un incremento de la frecuencia del episodio convulsivo (en pacientes con diagnóstico previo de epilepsia). Los ISRS no se deben administrar a pacientes con epilepsia inestable y los pacientes con epilepsia controlada deben ser cuidadosamente monitorizados. El tratamiento con ISRS se debe interrumpir si se observa un aumento de la frecuencia de convulsiones.

Manía:

Los ISRS se deben utilizar con precaución en pacientes con antecedentes de manía/hipomanía. La administración de ISRS se debe interrumpir en los pacientes que desarrollen una fase maníaca.

Diabetes:

En pacientes con diabetes, el tratamiento con un ISRS puede alterar el control glucémico, posiblemente debido a la mejoría de los síntomas de depresión. Puede ser necesario un ajuste de la dosis de insulina y/o de los hipoglucemiantes orales.

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT

[Handwritten signature]
ROEMMERS S.A.
JORGELINO ANGELO
FARMACEUTICA
DIRECTORA TECNICA
M.N. 12.683
APODERADA



ROEMMERS

Acatisia/ Inquietud psicomotora:

El uso de ISRS/IRSN se ha asociado con la aparición de acatisia, caracterizada por una sensación subjetiva de inquietud molesta y desagradable y por la necesidad de moverse, a menudo acompañadas de dificultad para sentarse o permanecer de pie, su aparición es más probable durante las primeras semanas de tratamiento. En los pacientes en los que aparece esta sintomatología, el aumento de dosis puede ser perjudicial.

Hiponatremia:

Raramente se ha observado hiponatremia, probablemente debida a una inapropiada secreción de la hormona antidiurética, con el uso de los ISRS, la cual generalmente resuelve con la discontinuación del tratamiento. Se recomienda administrar con precaución, especialmente en pacientes en riesgo, tal como en pacientes ancianos, pacientes cirróticos o en pacientes tratados concomitantemente con medicamentos que ocasionen hiponatremia.

Hemorragia:

Se han descrito alteraciones del sangrado cutáneo, como equimosis y púrpura con los ISRS. Se recomienda precaución en pacientes tratados con ISRS, especialmente en aquellos tratados concomitantemente con fármacos que afectan la función plaquetaria (p.ej. antipsicóticos atípicos y fenotiazinas, la mayoría de los antidepresivos tricíclicos, aspirina y antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), ticlopidina y dipiridamol), así como en pacientes con antecedentes de tendencia al sangrado.

Terapia electroconvulsiva (TEC):

La experiencia clínica sobre la administración concomitante de ISRS y TEC es limitada, por lo que se recomienda precaución.

Inhibidores Selectivos Reversibles de la MAO-A:

La combinación de Escitalopram con inhibidores selectivos de la MAO-A no está recomendada debido al riesgo de síndrome serotoninérgico (ver Interacciones con Otros Medicamentos y Otras Formas de Interacción).

Síndrome Serotoninérgico:

Se recomienda administrar con precaución cuando el Escitalopram se utiliza concomitantemente con otros fármacos con efectos serotoninérgicos tal como el sumatriptan y otros triptanos, tramadol y triptofano.

Se ha reportado síndrome serotoninérgico, en raras ocasiones, en pacientes que utilizan concomitantemente ISRS con medicamentos serotoninérgicos. La observancia de una combinación de síntomas, tales como agitación, temblor, mioclonus e hipertermia podría indicar el desarrollo de esta condición. De ocurrir, se debe inmediatamente discontinuar el

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT

Página 33 de 87

ROEMMERS S.A.
MORIELINA D'ANGELO
FARMACEUTICA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.663
APODERADA



ROEMMERS

tratamiento con el ISRS y el medicamento serotoninérgico e iniciar un tratamiento sintomático.

Hierba de San Juan (también conocido como Hipérico, Corazoncillo):

La administración concomitante de ISRS y remedios herbales que contengan Hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*) puede aumentar la incidencia de reacciones adversas (ver Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción).

Síntomas de retirada observados durante la suspensión del tratamiento:

Cuando se suspende el tratamiento es frecuente que aparezcan síntomas de retirada, particularmente si la suspensión del tratamiento se realiza de forma brusca (ver apartado Reacciones adversas). En los ensayos clínicos las reacciones adversas observadas durante la suspensión del tratamiento se presentaron en aproximadamente el 25% de los pacientes tratados con escitalopram y en el 15% de los pacientes que utilizaron placebo.

El riesgo de síntomas de retirada puede depender de varios factores entre los que se encuentran la duración del tratamiento, la dosis utilizada y el ritmo de la reducción de dosis. Las reacciones más comúnmente notificadas son mareos, alteraciones sensoriales (incluyendo parestesia y sensaciones de shock eléctrico), alteraciones del sueño (incluyendo insomnio y sueños intensos), agitación o ansiedad, náuseas y/o vómitos, temblor, confusión, sudoración, cefalea, diarrea, palpitaciones, inestabilidad emocional, irritabilidad y alteraciones visuales. Generalmente estos síntomas son de leves a moderados, sin embargo, en algunos pacientes pueden ser graves.

Estos síntomas suelen presentarse durante los primeros días de suspensión del tratamiento; sin embargo en raras ocasiones se han comunicado casos de pacientes en los que han aparecido estos síntomas tras olvidar una dosis de forma inadvertida.

Normalmente estos síntomas son autolimitados y se resuelven en 2 semanas, aunque en algunos pacientes su duración se puede prolongar (2-3 meses o más). Por lo tanto, es importante tener en cuenta que cuando se suspende el tratamiento con escitalopram debe reducirse gradualmente la dosis durante un periodo de varias semanas o meses según las necesidades de cada paciente (ver "Discontinuación del tratamiento" en el apartado Posología y forma de administración).

Abuso y Dependencia:

Estudios en animales sugieren que la posibilidad de incurrir en abuso es baja. Escitalopram no ha sido sistemáticamente estudiado en humanos por su potencial para el abuso, tolerancia o dependencia física. Los datos clínicos y preclínicos no indican que el Escitalopram cause dependencia. De todos modos, se recomienda administrar con precaución en pacientes con antecedentes de abuso de drogas y realizar un estrecho seguimiento de tales pacientes, observando los posibles signos de mal uso o abuso del

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT

ROEMMERS SAISE
JORGELINA D. ANGELO
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.668
APODERADA



ROEMMERS

fármaco (por ejemplo desarrollo de tolerancia, incremento de la dosis, procurar conseguir el fármaco).

Glaucoma de ángulo cerrado:

Los ISRS, incluyendo escitalopram pueden tener un efecto sobre el tamaño de la pupila y causar una midriasis de la misma. Este efecto midriático tiene el potencial de reducir el ángulo del ojo, lo que produce un aumento de la presión intraocular y glaucoma de ángulo cerrado, especialmente en pacientes predispuestos. Por lo tanto, el escitalopram debe usarse con precaución en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado o antecedentes de glaucoma.

Prolongación del intervalo QT:

Se observó que escitalopram produce prolongación del intervalo QT y que la misma es dosis dependiente, y arritmia ventricular que incluye *torsade de pointes*, predominantemente en pacientes de sexo femenino, con hipopotasemia o con antecedentes de prolongación del intervalo QT u otras enfermedades cardíacas.

Se recomienda precaución el uso de escitalopram en pacientes con bradicardia significativa, en pacientes con cardiopatía coronaria o insuficiencia cardíaca no compensada.

Si aparecen signos de arritmia cardíaca durante el tratamiento con escitalopram se debe suspender el tratamiento y realizar un ECG.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN

Interacciones farmacodinámicas:

Combinaciones Contraindicadas

Inhibidores de la monoamino-oxidasa, irreversibles , no selectivos:

Se han notificado casos de reacciones graves en pacientes que recibían un ISRS en combinación con un inhibidor de la monoaminoxidasa irreversible (IMAO) y en pacientes que han dejado de tomar un ISRS y han iniciado tratamiento con un IMAO. En algunos casos, el paciente desarrolló un síndrome serotoninérgico (ver Reacciones adversas).

Escitalopram no se debe administrar en combinación con un IMAO no selectivo irreversible. El tratamiento con Escitalopram se puede iniciar 14 días después de interrumpir el tratamiento con un IMAO irreversible. Debe respetarse un descanso mínimo de 7 días entre la discontinuación del tratamiento con Escitalopram y el inicio de un tratamiento con un IMAO no selectivo irreversible.

Pimozida:

La co-administración de una única dosis de pimozida 2 mg en pacientes tratados con citalopram racémico 40 mg/día durante 11 días causó aumento del área bajo la curva y el C_{máx} de

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT



ROEMMERS

pimozida, aunque no fue consistente a lo largo de todo el estudio. La co-administración de pimozida y citalopram resultó en un aumento promedio del intervalo QTc de aproximadamente 10 msegundos. Debido a la interacción observada a bajas dosis de pimozida, la administración concomitante de escitalopram y pimozida está contraindicada.

Combinaciones que requieren precaución de uso

Inhibidor selectivo reversible de la MAO-A (moclobemida):

Debido al riesgo de síndrome serotoninérgico, la combinación de escitalopram con un inhibidor de la MAO-A, como moclobemida no es recomendada (ver apartado Contraindicaciones). Si la combinación fuera necesaria, debería iniciarse con la dosis mínima recomendada y la monitorización clínica debería reforzarse.

El tratamiento con Escitalopram puede iniciarse por lo menos un día después de haber discontinuado el tratamiento con el IMAO (IMAR) reversible moclobemida.

Selegilina:

En combinación con selegilina (inhibidor irreversible de la MAO-B), se requiere precaución debido al riesgo de desarrollar síndrome serotoninérgico

Medicamentos Serotoninérgicos:

La administración conjunta con fármacos serotoninérgicos (por ej. tramadol, sumatriptán) puede provocar un síndrome serotoninérgico.

Medicamentos que disminuyen el umbral convulsivo:

Los ISRS pueden disminuir el umbral convulsivo, por lo cual se recomienda precaución cuando se administra concomitantemente con otros fármacos capaces de disminuirlo. (por ejemplo: antidepresivos (tricíclicos, ISRS), neurolépticos (fenotiazinas, tioxantenos y butirofenonas), mefloquina, bupropión y tramadol.

Lítio, Triptofano:

Se han informado casos de potenciación de efectos, cuando los ISRS se han administrado con litio o triptofano, por lo que la administración concomitante de ISRS con estos fármacos debe realizarse con precaución.

Hierba de San Juan (Hipérico):

La administración concomitante de ISRS con remedios herbales que contienen Hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*) puede aumentar la incidencia de reacciones adversas (ver Advertencias y precauciones especiales de empleo).

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT

ROEMMERS SAICF
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.603
APODERADA



ROEMMERS

Hemorragia:

La administración concomitante de Escitalopram con anticoagulantes orales podría ocasionar efectos anticoagulantes alterados. En consecuencia, se recomienda controlar cuidadosamente a los pacientes que están recibiendo una terapia anticoagulante cuando se inicia o discontinúa el tratamiento con Escitalopram.

La administración concomitante con fármacos anti-inflamatorios no esteroideos (AINEs) puede aumentar la tendencia al sangrado (ver Advertencias y Precauciones Generales de Empleo).

Alcohol:

Aunque no es de esperar interacciones farmacodinámicas o farmacocinéticas entre el Escitalopram y el alcohol, al igual que con otros fármacos psicoactivos, no se aconseja la combinación de Escitalopram con alcohol.

Interacciones farmacocinéticas:

Influencia de otros productos medicinales en la farmacocinética del Escitalopram:

El metabolismo de Escitalopram está mediado principalmente por CYP2C19. CYP3A4 y CYP2D6 pueden también contribuir en menor grado a su metabolismo. El metabolismo de su mayor metabolito, el S-DCT, parece ser parcialmente catalizado por el CYP2D6.

La administración conjunta de fármacos que inhiben el CYP2C19 conduce a un aumento de las concentraciones plasmáticas de Escitalopram. Se recomienda precaución con la utilización conjunta de tales medicamentos, por ejemplo omeprazol. Una reducción de la dosis de Escitalopram podría ser necesaria.

La administración conjunta de citalopram con cimetidina (inhibidor enzimático general moderadamente potente) aumentó las concentraciones plasmáticas del escitalopram (aproximadamente 70%). Por lo tanto, se debe tener precaución en el nivel superior del intervalo de dosis de Escitalopram cuando se utiliza concomitantemente con inhibidores de CYP2C19 (por ejemplo: omeprazol, fluoxetina, fluvoxamina, lansoprazol, ticlopidina) y con cimetidina. Una reducción de la dosis de Escitalopram podría ser necesaria sobre la base de un criterio clínico.

La administración conjunta con ketoconazol (potente inhibidor de CYP3A4) no modificó la farmacocinética del Escitalopram.

Efecto del Escitalopram en la farmacocinética de otros fármacos:

Escitalopram es un inhibidor moderado de la enzima CYP2D6. Se recomienda precaución cuando se administren conjuntamente otros fármacos cuyo metabolismo sea catalizado por esta enzima, y que tienen un rango terapéutico estrecho tal como flecainida, propafenona y metoprolol, o algunos fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central que son

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT

ROEMMERS SAICF
JORGELINA D. ANGELO
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.663
APODERADA



ROEMMERS

metabolizados principalmente por la CYP2D6, por ejemplo antidepresivos como la desipramina, clomipramina y nortriptilina o, antipsicóticos como la risperidona, tioridazina y haloperidol. Puede ser necesario un ajuste de la dosificación.

La co-administración de Escitalopram con desipramina o metoprolol duplicó las concentraciones plasmáticas de estos dos sustratos de la CYP2D6.

Estudios *in vitro* han demostrado que Escitalopram puede ocasionar una débil inhibición del CYP2C19. Se recomienda precaución en la utilización concomitante de fármacos que son metabolizados por CYP2C19.

CARCINOGENESIS, MUTAGENESIS Y DETERIORO DE LA FERTILIDAD

Basado en los resultados de los estudios de toxicidad en reproducción (segmento I, II y III), no existe especial preocupación por el uso de Citalopram racémico en mujeres fértiles. Citalopram racémico aparece en la leche en pequeñas concentraciones.

Estudios de embriotoxicidad en ratas con dosis de 56 mg/kg/día, la cual ocasiona toxicidad maternal demostró anomalía ósea en la región de la columna vertebral y costillas. El nivel plasmático maternal resultó 2-3 veces la concentración terapéutica en el hombre. Citalopram racémico no tuvo efectos sobre la fertilidad, el embarazo y el desarrollo postnatal en ratas pero disminuyó el peso de las crías al nacimiento. Citalopram y sus metabolitos alcanzaron concentraciones fetales 10-15 veces el nivel plasmático maternal. La experiencia clínica del uso en mujeres embarazadas y durante la lactancia es limitada. El Citalopram racémico no posee potencial mutagénico ni carcinogénico.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LACTANCIA

Embarazo:

Se dispone de limitados datos clínicos sobre la administración de Escitalopram durante el embarazo.

Se observó efectos embriotóxicos (reducción del peso fetal y retraso menor en la osificación) en estudios de toxicidad reproductiva en ratas pero no se observó efecto sobre la viabilidad fetal ni aumento en la incidencia de malformaciones. El riesgo en humanos es desconocido.

Se debe vigilar a los recién nacidos si la madre continua utilizando Escitalopram durante las últimas etapas del embarazo, en particular en el tercer trimestre. Se puede observar síntomas de discontinuación en el recién nacido si el Escitalopram se utiliza durante o justo antes del nacimiento.

El uso de ISRS durante el tercer trimestre del embarazo puede ocasionar efectos tales como trastornos neuro-conductuales en el recién nacido.

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT

JORGELINA D'ANGELO
FARMACEUTICA
DIRECTORA TECNICA
M.N. 12.669
APODERADA



ROEMMERS

Los siguientes efectos se reportaron en neonatos de madres a las que se les administró ISRS/IRSN durante las etapas finales del embarazo: dificultad respiratoria, cianosis, apnea, convulsiones, inestabilidad de la temperatura corporal, dificultad en la succión, vómitos, hipoglucemia, hipertonia, hipotonía, hiperreflexia, temblores, temblor, irritabilidad, letargo, llanto constante, somnolencia y dificultad para dormir. Estos síntomas podrían indicar efectos serotoninérgicos como así también síndrome de supresión. En la mayoría de los casos, los efectos aparecen inmediatamente o poco después del alumbramiento (dentro de las 24 horas). La administración de los ISRS no debe ser discontinuada abruptamente si son utilizados durante el embarazo.

Escitalopram no se debe administrar a mujeres embarazadas a menos que sea claramente necesario y, sólo tras una evaluación cuidadosa del riesgo/beneficio.

Datos epidemiológicos sugirieron que el uso de los ISRS durante el embarazo, particularmente durante las etapas finales del embarazo, podrían incrementar el riesgo de hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido. El riesgo observado fue de aproximadamente 5 casos por 1000 embarazos. En la población general se observó 1 a 2 casos de hipertensión pulmonar persistente por 1000 embarazos.

Lactancia:

Escitalopram puede ser excretado a través de la leche materna. Las mujeres en período de lactancia no deben ser tratadas con Escitalopram o la lactancia debe ser discontinuada.

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MAQUINARIAS

Escitalopram no altera ni la función intelectual ni el rendimiento psicomotor. No obstante, al igual que otros fármacos psicoactivos, se recomienda advertir a los pacientes sobre su capacidad para manejar vehículos u operar maquinarias.


EVENTOS ADVERSOS

Las reacciones adversas son más frecuentes durante la primera o segunda semana del tratamiento y habitualmente disminuyen en intensidad y frecuencia con la continuación del tratamiento.

Las reacciones adversas conocidas de los ISRSs y también comunicadas para Escitalopram en estudios clínicos controlados con placebo o como reacciones espontáneas post-comercialización se enumeran más abajo por sistemas orgánicos y frecuencia. Las frecuencias especificadas no están corregidas respecto al placebo. Las frecuencias se definen como: muy frecuente ($\geq 1/10$), frecuente ($\geq 1/100, <1/10$), poco frecuente ($\geq 1/1000, \leq 1/100$), rara ($\geq 1/10000, \leq 1/1000$), muy rara ($\leq 1/10000$) o desconocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT

ROEMMERS SAICF
FARMACEUTICA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.663
APODERADA



Sistema-Órgano	Frecuencia	Evento indeseable
Alteración sanguínea y linfática	Desconocida	Trombocitopenia
Alteración del sistema inmune	Rara ($\geq 1/10000$ a $\leq 1/1000$)	Reacción anafiláctica
Alteración endócrina	Desconocida	Secreción inadecuada de ADH
Metabolismo y alteraciones nutricionales	Frecuente ($>1/100$, $<1/10$)	Disminución del apetito; Aumento del apetito
	Poco Frecuente $\geq 1/1000$ a $\leq 1/100$	Aumento de peso Disminución de peso
	Desconocida	Hiponatremia; anorexia ²
Alteraciones psiquiátricas	Frecuente ($>1/100$, $<1/10$)	Ansiedad, agitación, sueño anormal. Disminución de la libido (hombre y mujer), anorgasmia (mujeres)
	Poco Frecuente $\geq 1/1000$ a $\leq 1/100$	Bruxismo, agitación, nerviosismo, pánico, estado confusional
	Rara ($\geq 1/10000$ a $\leq 1/1000$)	Agresión, despersonalización, alucinaciones.
	Desconocida	Manía; eventos relacionados a suicidio (ideación, comportamiento suicida) ¹
Alteraciones del sistema nervioso central	Frecuente ($>1/100$, $<1/10$)	Insomnio, somnolencia, mareos, parestesia, temblor
	Poco frecuente ($>1/1000$, $<1/100$)	Trastornos del sabor, trastornos del sueño, síncope
	Rara ($\geq 1/10000$ a $\leq 1/1000$)	Síndrome de serotonina
	Desconocida	Disquinesia, alteración del movimiento, convulsión; Acatisia/inquietud psicomotora ²
Molestia Ocular	Poco frecuente ($>1/1000$, $<1/100$)	Midriasis, visión anormal.
Alteración del oído y laberinto	Poco frecuente ($>1/1000$, $<1/100$)	Tinnitus
Alteración cardíaca	Poco frecuente ($>1/1000$, $<1/100$)	Taquicardia
	Rara ($\geq 1/10000$ a $\leq 1/1000$)	Bradycardia
	Desconocida	Prolongación QT en el electrocardiograma
Alteración vascular	Desconocida	Hipotensión ortostática
Alteraciones respiratorias, torácicas y del mediastino	Frecuente ($>1/100$, $<1/10$)	Sinusitis, bostezos
	Poco frecuente ($>1/1000$, $<1/100$)	Epistaxis
Alteraciones gastrointestinales	Muy frecuente ($>1/10$)	Náuseas
	Frecuente ($>1/100$, $<1/10$)	Diarrea, estreñimiento, vómitos, sequedad bucal
	Poco frecuente ($>1/1000$, $<1/100$)	Hemorragia gastrointestinal (incluye hemorragia rectal)
	Desconocida	Hepatitis; prueba de la función hepática anormal

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT

JORGENNA ANGELO
FARMACEUTICA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.663
APODERADA



Piel y alteraciones del tejido subcutáneo	Frecuente (>1/100, <1/10)	Aumento de la sudoración
	Poco frecuente (>1/1000, <1/100)	Urticaria, alopecia, rash, prurito
	Desconocida	Equimosis, angioedema
Alteraciones músculo-esqueléticas, tejido conectivo y huesos	Frecuente (>1/100, <1/10)	Artralgia, mialgia.
Alteraciones renales y urinarias	Desconocida	Retención urinaria
Alteraciones de la mama y reproductivas	Frecuente (>1/100, <1/10)	Trastorno de eyaculación, impotencia
	Poco frecuente (>1/1000, <1/100)	Metrorragia, menorragia
	Desconocida	Priapismo (hombre), galactorrea
Alteraciones generales	Frecuente (>1/100, <1/10)	Fatiga, pirexia
	Poco frecuente (>1/1000, <1/100)	Edema

¹ Casos de ideación de suicidio y comportamiento suicida reportados durante la terapia con Escitalopram o tempranamente después de la discontinuación del tratamiento (ver Advertencias y Precauciones Especiales de Empleo)

² Estos eventos se reportaron para la clase terapéutica de los ISRSs.

Se han registrado casos de prolongación del QT durante el período de post comercialización, predominantemente en pacientes con enfermedad cardiaca previa. En un estudio doble ciego, controlado con placebo en sujetos sanos, el cambio sobre la línea de base en el QT (corrección de Fridericia) fue de 4.3 msec con la dosis de 10 mg/día y de 10.7 msec con una dosis de 30 mg/ día.

Estudios epidemiológicos, principalmente realizados en pacientes mayores de 50 años de edad que estaban recibiendo ISRSs y ATCs mostraron un incremento de fractura ósea. El mecanismo relacionado a este evento es desconocido.

SOBREDOSIS

Toxicidad:

Los datos clínicos de sobredosis con Escitalopram son limitados y en muchos casos están implicadas sobredosis concomitantes de otros fármacos. En la mayoría de los casos no se han observado síntomas o han sido leves. Raramente se han observado casos fatales de sobredosis con Escitalopram solo; la mayoría de los casos han implicado sobredosis con medicaciones concomitantes. Se han ingerido dosis entre 400 y 800 mg de Escitalopram solo sin ningún síntoma grave.

Síntomas:

Los síntomas de sobredosificación con Escitalopram incluyen principalmente los relacionados con el sistema nervioso central (desde mareos, temblor y agitación a casos raros de síndromes serotoninérgicos, convulsiones y coma), el sistema gastrointestinal (náuseas/

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT

ROEMMERS SAICF
 JURISDICCION BUENOS AIRES
 FARMACEUTICA
 DIRECTORA TECNICA
 M.N. 12.663
 APODERADA



ROEMMERS

vómitos) y el sistema cardiovascular (hipotensión, taquicardia, prolongación del QT y arritmia) y estados del equilibrio hidroelectrolítico (hipopotasemia, hiponatremia).

Tratamiento:

No existe un antídoto específico. Se recomienda establecer y mantener la permeabilidad de las vías aéreas, asegurar la oxigenación adecuada y la función respiratoria. Se debe considerar el lavado gástrico y el uso de carbón activado. El lavado gástrico se debe realizar lo antes posible tras la ingestión oral del medicamento. Se recomienda controlar los signos vitales y cardíacos además de establecer las medidas de apoyo sintomático.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
- Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777
- Hospital Fernández: (011) 4801-7767.

Optativamente otros Centros de Intoxicaciones.

PRESENTACION

Meridian comprimidos recubiertos 10 mg: Envases conteniendo 10, 15, 20, 30, 50, 60 y 100 comprimidos recubiertos.

Meridian 20 comprimidos recubiertos 20mg: Envases conteniendo 10, 15, 20, 30, 50, 60 y 100 comprimidos recubiertos.

ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO DEBE REPETIRSE SIN UNA NUEVA RECETA MÉDICA.

Fecha de última revisión:

**Producto medicinal. Mantener fuera del alcance de los niños
Conservar en lugar fresco a temperatura inferior a 30° C**


ROEMMERS SA/CF
JORGE NA D'ANGELO
FARMACEUTICA
DIRECTORA TÉCNICA
APODERADA

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT



ROEMMERS

MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

CERTIFICADO N° 50.750

Directora Técnica: Jorgelina D'Angelo - Farmacéutica

Elaborado en José E. Rodó 6424 – C1440AKJ – Capital Federal y/o Álvaro Barros 1113 – B1838CMC - Luis Guillón – Pcia. de Buenos Aires.

LABORATORIO ROEMMERS S.A.I.C.F.

Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos, Pcia. de Buenos Aires

Información al consumidor ☎ 0-800-333-5658

www.roemmers.com.ar

ROEMMERS SAICF
JORGELINA D'ANGELO
FARMACEUTICA
DIRECTORA TECNICA
APODERADA

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo


Número:

Referencia: EX-2019-82429847 PROSP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 18 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.18 12:25:46 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.18 12:25:48 -03:00



PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

MERIDIAN
ESCITALOPRAM
Comprimidos recubiertos 10 y 20mg
Vía oral
VENTA BAJO RECETA ARCHIVADA. PSI IV

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar a tomar este medicamento.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.
- Este medicamento se le ha recetado a usted sólo para su problema médico actual. No se lo recomiende a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarle.

QUÉ ES MERIDIAN Y PARA QUÉ SE UTILIZA

Meridian contiene escitalopram, que pertenece al grupo de antidepresivos denominados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRSs), que actúan sobre el sistema serotoninérgico a nivel del cerebro, aumentando los niveles de serotonina. Las alteraciones del sistema serotoninérgico se consideran un factor importante en el desarrollo de la depresión y enfermedades relacionadas.

Meridian está indicado para el tratamiento:

- Trastorno de la depresivo y mantenimiento de su recaída.
- Trastorno de angustia (ataques de pánico), con o sin agorafobia.
- Trastorno de la fobia social (ansiedad social).
- Trastorno de ansiedad generalizada.
- Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

ANTES DE USAR MERIDIAN

No tome Meridian:

- Si es alérgico a escitalopram o a cualquier componente de la formulación de este medicamento.
- Si toma otros medicamentos que pertenecen al grupo denominados inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAOs), incluyéndose selegilina (utilizado para el tratamiento de la enfermedad Parkinson), moclobemida (utilizada para el tratamiento de la depresión).
- Si está tomando medicamentos para alteraciones del ritmo cardiaco o que pueden alterar el ritmo cardiaco, como pimozida.
- Si está embarazada o en período de lactancia.

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT

[Handwritten signature]
 ROEMMERS SAIZK
 GERCELINA D'ANGELO
 FARMACEUTICA
 DIRECTORA TÉCNICA
 M.H. 12.663
 ARCHIVADA




Antes de iniciar el tratamiento con Meridian, informe a su médico si usted padece o tiene cualquiera de las situaciones anteriores descriptas.

Tenga especial cuidado con Meridian si:

Por favor, informe a su médico si padece algún otro trastorno o enfermedad ya que su médico puede necesitar tener en cuenta. En concreto, informe a su médico:

- Si presenta pensamientos suicidas, empeoramiento de su depresión, o trastorno de ansiedad.
- No se aconseja el tratamiento con Meridian en niños y adolescentes menores de 18 años.
- Algunos pacientes con trastorno de pánico pueden presentar aumento de la ansiedad al comienzo del tratamiento. Esta reacción paradójica normalmente desaparece a las 2 semanas aproximadamente con la continuación del tratamiento.
- Si aparecen convulsiones al iniciar el tratamiento, o se observa un incremento de la frecuencia de convulsiones en pacientes con epilepsia. En ambos casos, el tratamiento con Meridian debe ser interrumpido.
- Tiene antecedentes de manía o hipomanía, ya que puede aparecer una fase de manía. Esto se caracteriza por un cambio de ideas poco común y rápido, alegría desproporcionada y una actividad física excesiva. Si usted lo experimenta, contacte con su médico.
- Si padece diabetes. El tratamiento con Meridian puede alterar el control glucémico. Puede ser necesario un ajuste de la dosis de insulina y/o de antidiabéticos orales.
- Si aparecen acatisia o inquietud psicomotora: Esto se caracteriza por una sensación de inquietud, molesta y desagradable, y por la necesidad de moverse, que se puede acompañar con una dificultad para sentarse o permanecer de pie. Por lo general estos síntomas aparecen durante las primeras semanas del tratamiento.
- Si se presenta disminución de los niveles de sodio en sangre (hiponatremia).
- Si padece de sangrados de la piel (puntos rojos) o si tiene antecedentes de tendencia al sangrado.
- Si está recibiendo terapia electroconvulsiva.
- Si el tratamiento se suspende en forma abrupta, pueden aparecer diferentes reacciones (reacciones de supresión), tales como: Mareos, alteración en la sensibilidad (hormigueos, sensación de electricidad), alteración del sueño, agitación, ansiedad, náuseas, vómitos, temblor, confusión, dolor de cabeza, diarrea, palpitaciones, inestabilidad emocional, irritabilidad, alteraciones visuales.
- Si presenta antecedentes de abuso de drogas.

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT


 ROEMMERS S.A.S.
 ARGENTINA
 FARMACEUTICA
 DIRECTORA TÉCNICA
 M.N. 12.663
 APODERADA



ROEMMERS

- Si presenta aumento de la presión de los ojos (glaucoma).
- Si presenta alteraciones en el ritmo cardíaco (arritmias, prolongación del intervalo QT).
- Si presenta alteración severa en la función de los riñones.

Uso de otros medicamentos y Meridian

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta, como vitaminas, o suplementos a base de hierbas.

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando:

- Medicamentos del grupo conocidos como Inhibidores no selectivos de la Monoaminoxidasa (IMAOS).
- Selegilina (medicamento para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson).
- Pimozida, flecainida, propafenona, (medicamento para el tratamiento de las alteraciones del ritmo de los latidos del corazón).
- Tramadol (medicamento para el tratamiento del dolor grave).
- Sumatriptan (medicamento para el tratamiento de la migraña).
- Bupropión, fluoxetina, fluvoxamina, clomipramida, nortriptilina, desipramina, moclobemida (medicamentos antidepresivos).
- Medicamentos para tratar la esquizofrenia o la psicosis (neurolépticos), tales como fenotiazinas, tioxentanos, butirofenonas).
- Mefloquina (para el tratamiento de la malaria).
- Litio (para el tratamiento del trastorno maniaco-depresivo) y triptófano.
- Medicamento herbario como la Hierba de San Juan (para el tratamiento de la depresión).
- Warfarina y otros medicamentos para el tratamiento de la coagulación de la sangre u otros fármacos antiinflamatorios (por ejemplo, aspirina) que puedan alterar la coagulación de la sangre.
- Alcohol.
- Omeprazol, lansoprazol, cimetidina (para el tratamiento de la acidez o úlceras gástrica).
- Ticlopidina (para reducir el riesgo de accidente cerebrovasculares).
- Ketoconazol (para el tratamiento de hongos).
- Metoprolol (medicamento para tratar la hipertensión arterial y la angina de pecho).
- Risperidona, tioridazina, haloperidol (medicamentos antipsicóticos).

COMO USAR MERIDIAN

Siga exactamente las instrucciones de administración indicadas por su médico. Consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

Meridian se administra con dosis única por día (un comprimido por día) y se puede ingerir con o sin alimentos.

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT

[Handwritten signature]
 JORCELINA G. ANGELI
 FARMACÉUTICA
 DIRECTORA TÉCNICA
 M.N. 12.663
 APODERADA



ROEMMERS

Adultos

Tratamiento del trastorno depresivo mayor.

La dosis habitual es de 10mg, una vez al día. Su médico puede aumentarla hasta un máximo de 20mg al día.

Generalmente, el efecto antidepresivo se obtiene entre 2 y 4 semanas de tratamiento. Después de la resolución de los síntomas durante el tratamiento inicial, es probable que el médico le indique continuar con el tratamiento por lo menos por 6 meses, para consolidar la respuesta al mismo.

Tratamiento del trastorno de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia:

La dosis inicial recomendada es de 5mg por día, durante la primera semana de tratamiento, antes de incrementarla a 10mg por día. La dosis se puede aumentar hasta un máximo de 20mg por día. La eficacia máxima al tratamiento se logra aproximadamente a los 3 meses.

Tratamiento de la fobia social (ansiedad social):

La dosis habitual es de 10mg al día. La dosis se puede incrementar hasta 20mg por día. Habitualmente se observan síntomas de alivio a las 2-4 semanas de tratamiento. Se recomienda continuar con el mismo durante, por lo menos, 12 semanas.

Tratamiento del trastorno de la ansiedad generalizada:

La dosis habitual es de 10mg al día. La dosis se puede incrementar hasta 20mg por día. Se recomienda continuar el tratamiento durante por lo menos 12 semanas para obtener respuesta al mismo. El tratamiento de 6 meses de duración ha mostrado prevenir las recaídas.

Tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (TOC):

La dosis habitual es de 10mg al día. La dosis se puede incrementar hasta 20mg por día. El tratamiento debe ser seguido por un tiempo suficiente como para asegurar la ausencia de los síntomas.

Pacientes ancianos (mayores de 65 años)

Estos pacientes deben comenzar con dosis de escitalopram de 5mg al día y no superar los 10mg por día.

Niños y adolescentes (menores de 18 años)

No se recomienda Meridian en este grupo de pacientes.

Pacientes con alteración en la función del hígado

Se recomienda comenzar el tratamiento con 5mg de Meridian durante las primeras 2 semanas de tratamiento y la dosis puede aumentarse hasta 10mg por día.

Duración del tratamiento

Pueden pasar un par de semanas antes de que empiece a sentirse mejor. Siga tomando Meridian tal como se lo indicó su médico, aunque si empieza a sentirse mejor.

No cambie la dosis de Meridian sin que se lo haya indicado su médico.

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT

ROEMMERS S.A.C.
JORGELINA D'ANGELO
FARMACEUTICA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.663
APODERADA



40.

Si se olvida de tomar Meridian

Si Ud. se olvida de tomar una dosis de Meridian, tómelas tan pronto lo recuerde. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si toma más Meridian de lo que debería

Si toma más de la dosis indicada o si otra persona ha utilizado su medicamento, consulte a su médico.

Pueden ocurrir los siguientes efectos indeseables: mareos, temblor, agitación, convulsión, coma, náuseas, vómitos, cambios en el ritmo cardíaco, disminución del sodio y/o potasio en sangre, disminución de la presión sanguínea.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse a los Centros de Toxicología del Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez al teléfono: (011) 4962-6666 / 2247 o del Hospital A. Posadas, al teléfono: (011) 4654-6648 / 4658-7777. Opcionalmente otros centros de intoxicaciones.

Si interrumpe el tratamiento con Meridian

Si interrumpe el tratamiento con Meridian, la dosis debe disminuirse en forma gradual durante un tiempo de una o dos semanas, ya que la suspensión abrupta el mismo, puede producir posibles efectos de supresión.

Manejo de vehículos y utilización de maquinarias

Escitalopram no altera la capacidad en el manejo o utilización de vehículos y/o de maquinarias. No obstante, se debe tener precaución hasta que conozca cómo le puede afectar el tratamiento con Meridian.

EFECTOS INDESEABLES

Como todos los medicamentos, este medicamento puede causar efectos indeseables, aunque no todos los tienen.

Los efectos indeseables incluyen:

- Disminución de las plaquetas en sangre.
- Reacción alérgica severa (hinchazón de la piel, de la lengua, labios, cara, dificultad para respirar o para tragar).
- Aumento en la cantidad de orina excretada (secreción inadecuada de ADH).
- Disminución o aumento del apetito, aumento o disminución de peso.
- Disminución de los niveles de sodio en sangre.
- Ansiedad, agitación, alteración del sueño insomnio o somnolencia), disminución del deseo sexual, dificultad para alcanzar el orgasmo (mujeres).
- Hacer chirriar los dientes (bruxismo), nerviosismo, estado de pánico, estado confusional.
- Agresión, despersonalización, alucinaciones.
- Manía, ideas o comportamiento suicida.
- Sensación de hormigueo en brazos o piernas (parestias).

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT

ROEMMERS SAICF
JORGELINA D'ANGELO
FARMACEUTICA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.663
APODERADA



ROEMMERS

- Alteración del gusto o sabor.
- Desmayo (síncope).
- Síndrome serotoninérgico, que se caracteriza por: fiebre alta, agitación, confusión, temblores, contracciones repentina de los músculos.
- Movimientos involuntarios y anormales (disquinesia), alteración en los movimientos, inquietud motora (acatisia), inquietud psicomotora.
- Dilatación de la pupila, alteraciones visuales.
- Zumbido de los oídos.
- Aumento o disminución del ritmo de los latidos del corazón, alteración en el ritmo de los latidos del corazón.
- Disminución de la presión arterial al ponerse de pie.
- Sinusitis, bostezos.
- Sangrado de la nariz.
- Náuseas, diarrea, estreñimiento, vómitos, sequedad bucal.
- Sangrado gastrointestinal o rectal.
- Hepatitis, alteración de las enzimas del hígado en sangre.
- Aumento de la sudoración.
- Urticaria, picazón de la piel, pérdida del cabello.
- Hematomas (equimosis), hinchazón de piel y mucosas (angioedema).
- Dolor articular, dolor muscular.
- Retención urinaria.
- Alteración en la eyaculación, impotencia, erección dolorosa del pene (priapismo).
- Alteraciones menstruales. Secreción de leche por pezón sin estar embarazada (galactorrea).
- Fiebre, cansancio.
- Edema.

Si alguno de estos efectos indeseables se vuelve molesto, informe a su médico. Si experimenta efectos indeseables, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos indeseable que no aparecen en el prospecto.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Meridian comprimidos recubiertos 10mg:

Ingrediente activo: Escitalopram oxalato (equivalente a escitalopram base 10,0 mg) 12,770 mg.

Ingredientes inactivos: Croscarmelosa sódica tipo A; Dióxido de silicio coloidal; Celulosa microcristalina PH 101; Talco; Estearato de magnesio; Hidroxipropilmetilcelulosa; Dióxido de titanio; Triacetina.

ROEMMERS SAICF
 JORGELINA D'ANGELO
 FARMACÉUTICA
 DIRECTORA TÉCNICA
 M.N. 12.663
 APODERADA

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT



ROEMMERS

Meridian 20 comprimidos recubiertos:

Ingrediente activo: Escitalopram oxalato (equivale a escitalopram base 20,0 mg) 25,540 mg. **Ingredientes inactivos:** Croscarmelosa sódica tipo A; Dióxido de silicio coloidal; Celulosa microcristalina PH 101; Talco; Estearato de magnesio; Hidroxipropilmetilcelulosa; Dióxido de titanio; Triacetina.

PRESENTACIONES

Meridian comprimidos recubiertos 10mg: Envases conteniendo 10, 15, 20, 30, 50, 60 y 100 comprimidos recubiertos.

Meridian 20 comprimidos recubiertos: Envases conteniendo 10, 15, 20, 30, 50, 60 y 100 comprimidos recubiertos.

RECORDATORIO

Este producto ha sido prescripto sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas.

ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO DEBE REPETIRSE SIN UNA NUEVA RECETA MÉDICA.

MODO DE CONSERVACIÓN

**Producto medicinal. Mantener fuera del alcance de los niños
Conservar en lugar fresco a temperatura inferior a 30° C**

No use este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el embalaje.

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL

CERTIFICADO N°:

Directora Técnica: Dra. Jorgelina D'Angelo – Farmacéutica

Elaborado en José E. Rodó 6424 – C1440AKJ – Capital Federal y/o Álvaro Barros 1113 – B1838CMC - Luis Guillón – Pcia. de Buenos Aires.

LABORATORIO ROEMMERS S.A.I.C.F.
Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos, Pcia. de Buenos Aires
Información al consumidor ☎ 0-800-333-5658
www.roemmers.com.ar

IF-2019-83585864-APN-DGA#ANMAT

ROEMMERS SAICF
JORGELINA D'ANGELO
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.663
APODERADA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2019-82429847 INF PAC

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.18 12:21:57 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2019.10.18 12:21:58 -03:00