



"2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813"

Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° **2092**

BUENOS AIRES, **15 ABR 2013**

VISTO el Expediente N° 1-0047-0000-003645-13-6 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma MERCK SHARP & DOHME ARGENTINA INC. representante en Argentina de MERCK & CO INC. solicita la aprobación de nuevos proyectos de prospectos para la Especialidad Medicinal denominada VYTORIN / EZETIMIBE - SIMVASTATINA, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS, 10 mg - 10 mg; 10 mg - 20 mg; 10 mg - 40 mg, 10 mg - 80 mg, aprobada por Certificado N° 51.685.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición N°: 5904/96.

Que los procedimientos para las modificaciones y/o rectificaciones de los datos característicos correspondientes a un certificado de Especialidad Medicinal otorgado en los términos de la Disposición ANMAT N° 5755/96, se encuentran establecidos en la Disposición ANMAT N° 6077/97.



"2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813"

Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.7.

DISPOSICIÓN N° 2092

Que a fojas 249 obra el informe técnico favorable de la Dirección de Evaluación de Medicamentos.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros.: 1.490/92 y 425/10.

Por ello:

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. - Autorízase el cambio de prospectos presentado para la Especialidad Medicinal denominada VYTORIN / EZETIMIBE - SIMVASTATINA, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS, 10 mg - 10 mg; 10 mg - 20 mg; 10 mg - 40 mg, 10 mg - 80 mg, aprobada por Certificado N° 51.685 y Disposición N° 5545/04, propiedad de la firma MERCK SHARP & DOHME ARGENTINA INC. representante en Argentina de MERCK & CO INC., cuyos textos constan de fojas 57 a 143.

ARTICULO 2º. - Sustitúyase en el Anexo II de la Disposición autorizante ANMAT N° 5545/04 los prospectos autorizados por las fojas 57 a 85, de las aprobadas en el artículo 1º, los que integrarán en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 3º. - Acéptase el texto del Anexo de Autorización de modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente



"2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813"

Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 2092

disposición y el que deberá agregarse al Certificado N° 51.685 en los términos de la Disposición ANMAT N° 6077/97.

ARTICULO 4º. - Regístrese; por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la copia autenticada de la presente disposición conjuntamente con los prospectos y Anexos, gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente, Cumplido, Archívese.

EXPEDIENTE N° 1-0047-0000-003645-13-6

DISPOSICIÓN N°

2092

nc

Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.



"2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813"

Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

### ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N°...**2092**... a los efectos de su anexo en el Certificado de Autorización de Especialidad Medicinal N° 51.685 y de acuerdo a lo solicitado por la firma MERCK SHARP & DOHME ARGENTINA INC. representante en Argentina de MERCK & CO INC., del producto inscripto en el registro de Especialidades Medicinales (REM) bajo:

Nombre comercial / Genérico/s: VYTORIN / EZETIMIBE - SIMVASTATINA,  
Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS, 10 mg - 10 mg; 10 mg - 20 mg; 10 mg - 40 mg, 10 mg - 80 mg.-

§ Disposición Autorizante de la Especialidad Medicinal N° 5545/04.-  
Tramitado por expediente N° 1-47-0000-004115-04-0.-

DATO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION AUTORIZADA
Prospectos.	Anexo de Disposición N° 2305/12.-	Prospectos de fs. 57 a 143, corresponde desglosar de fs. 57 a 85.-

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del REM a la firma MERCK SHARP & DOHME ARGENTINA INC. representante en



"2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813"

Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

Argentina de MERCK & CO INC., Titular del Certificado de Autorización N°  
51.685 en la Ciudad de Buenos Aires, a los días....., del mes de.....

15 ABR 2013

Expediente N° 1-0047-0000-003645-13-6

DISPOSICIÓN N° 2092

nc

  
Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.







**PROYECTO DE PROSPECTO INTERNO**

**VYTORIN®**

**EZETIMIBE / SIMVASTATINA**

**10/10 - 10/20 - 10/40 - 10/80 mg**

**Comprimidos**

**INDUSTRIA ITALIANA**

**VENTA BAJO RECETA**

**FÓRMULA:**

Cada comprimido de **VYTORIN®** para la administración oral contiene:

<b>VYTORIN®</b>	<b>10/10 mg</b>	<b>10/20 mg</b>	<b>10/40 mg</b>	<b>10/80 mg</b>
<b>Ezetimibe</b>	10,00 mg	10,00 mg	10,00 mg	10,00 mg
<b>Simvastatina</b>	10,00 mg	20,00 mg	40,00 mg	80,00 mg
Lactosa monohidrato	58,23 mg	126,50 mg	262,90 mg	535,80 mg
Celulosa Microcristalina	15,00 mg	30,00 mg	60,00 mg	120,00 mg
Hidroxipropilmetilcelulosa 2910	2,00 mg	4,00 mg	8,00 mg	16,00 mg
Croscarmellosa sódica	3,00 mg	6,00 mg	12,00 mg	24,00 mg
Ácido cítrico monohidrato	0,25 mg	0,50 mg	1,00 mg	2,00 mg
Butilhidroxianisol	0,02 mg	0,04 mg	0,08 mg	0,16 mg
Galato de propilo	0,005 mg	0,01 mg	0,02 mg	0,04 mg
Estearato de magnesio	1,50 mg	3,00 mg	6,00 mg	12,00 mg

**ACCIÓN TERAPÉUTICA:**

**VYTORIN®** (ezetimibe / simvastatina) es un producto reductor de los lípidos que inhibe selectivamente la absorción intestinal del colesterol y los fitoesteroles relacionados, como así también la síntesis endógena de colesterol.

Según código ATC se clasifica como: inhibidores de la HMG-CoA Reductasa en combinación con otros agentes modificadores de lípidos – C10BA02.

**MECANISMO DE ACCIÓN:**

**VYTORIN:**

El colesterol plasmático deriva de la absorción intestinal y de la síntesis endógena. **VYTORIN** contiene ezetimibe y simvastatina, dos compuestos reductores del colesterol con mecanismos de acción complementarios. **VYTORIN** reduce el colesterol total (C-total) elevado, colesterol unido a lipoproteína de baja densidad (C-LDL), Apolipoproteína B

Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Nerone**  
**Apoderado**

1

MERCK SHARP & DOHME ARG. INC  
 Farm. Sebastián Darío Goldentul  
 DIRECTOR TÉCNICO  
 MATRICULA NACIONAL 15436

(Apo B), Triglicéridos (TG) y colesterol que no es HDL (C-No HDL), y aumenta el colesterol unido a lipoproteína de alta densidad (C-HDL) a través de una inhibición dual tanto de la absorción del colesterol como de su síntesis.

**Ezetimibe:**

Ezetimibe inhibe la absorción intestinal del colesterol. Es activo por vía oral y posee un mecanismo de acción que difiere del de otras clases de compuestos reductores del colesterol (Por Ej.: estatinas, agentes secuestrantes de ácidos biliares [resinas], fibratos y estanoles vegetales). La molécula blanco del ezetimibe es el transportador de esteroides, Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1), responsable de la absorción intestinal de colesterol y fitosteroides.

Ezetimibe se localiza en el borde en cepillo del intestino delgado e inhibe la absorción del colesterol, promoviendo una disminución en la llegada de colesterol intestinal al hígado; las estatinas disminuyen la síntesis de colesterol en el hígado. La combinación de estos mecanismos diferentes brinda una reducción de colesterol complementaria.

En un ensayo clínico de 2 semanas realizado en 18 pacientes hipercolesterolémicos, ezetimibe inhibió la absorción del colesterol intestinal en un 54%, en comparación con placebo.

Se llevaron a cabo una serie de estudios preclínicos para determinar la selectividad de ezetimibe en la inhibición la absorción del colesterol. Ezetimibe inhibió la absorción de [<sup>14</sup>C] colesterol sin producir efectos sobre la absorción de triglicéridos, ácidos grasos, ácidos biliares, progesterona, etinilestradiol o vitaminas liposolubles A y D.

**Simvastatina:**

Luego de la ingestión oral, simvastatina, una lactona inactiva, es hidrolizada en el hígado a la forma β-hidroxiácida correspondiente. Este es un metabolito principal y un inhibidor de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) reductasa, la enzima que cataliza un paso temprano que limita la velocidad de la biosíntesis del colesterol.

Simvastatina ha demostrado reducir las concentraciones normales y elevadas de C-LDL. El LDL se forma a partir de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y es catabolizado en su mayor parte por el receptor de LDL de alta afinidad.


El mecanismo para reducir el LDL de la simvastatina involucra tanto la reducción de las concentraciones de C-VLDL como la inducción del receptor de LDL, promoviendo así una reducción de la producción de LDL y un incremento de su catabolismo. Los niveles de Apo B también disminuyen en el tratamiento con simvastatina. Además, la simvastatina aumenta moderadamente C-HDL y reduce los TG plasmáticos. Como resultado de estos cambios, se reduce la relación C-total / C-HDL y C-LDL/C-HDL.

**FARMACOCINÉTICA:**

**Absorción:**

**Ezetimibe**

Después de la administración oral, ezetimibe se absorbe rápidamente y se une extensamente a un glucurónido fenólico (ezetimibe-glucurónido) farmacológicamente activo. La concentración plasmática máxima promedio (C<sub>máx</sub>) de ezetimibe-glucurónido se alcanza en el lapso de 1 a 2 horas y la de ezetimibe dentro de 4 a 12 horas. La biodisponibilidad absoluta de ezetimibe no puede determinarse dado que el compuesto es virtualmente insoluble en el medio acuoso adecuado para inyección.

  
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**Jose Nerone**  
Apoderado

2

  
MERCK SHARP & DOHME ARG. INC.  
Farm. Sebastian Dario Goldentul  
DIRECTOR TECNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436

La administración concomitante de alimentos (comidas ricas en grasas o no) no tuvo efecto sobre la biodisponibilidad oral del ezetimibe cuando se administró en comprimidos de 10 mg.

#### Simvastatina

La disponibilidad del  $\beta$ -hidroxiácido en la circulación sanguínea luego de una dosis oral de simvastatina fue menor al 5% de la dosis, de acuerdo al primer paso hepático. Los principales metabolitos de la simvastatina presentes en plasma humano son el  $\beta$ -hidroxiácido y 4 metabolitos activos adicionales.

En relación con el estado de ayuno, los perfiles plasmáticos de los inhibidores activos y totales no fueron afectados cuando la simvastatina se administró inmediatamente antes de una comida de prueba.

#### Distribución:

##### Ezetimibe

Ezetimibe y ezetimibe-glucurónido se ligan en un 99,7% y un 88 a 92% a las proteínas plasmáticas humanas, respectivamente.

##### Simvastatina

Tanto simvastatina como el  $\beta$ -hidroxiácido se unen a proteínas plasmáticas en un 95%.

La farmacocinética de dosis únicas y múltiples de simvastatina mostró que no se produce acumulación de la droga luego de múltiples dosis. En todos los estudios farmacocinéticos, la concentración plasmática máxima de inhibidores ocurrieron de 1,3 a 2,4 horas luego de la dosis.

#### Metabolismo:


##### Ezetimibe

Ezetimibe se metaboliza principalmente en el intestino delgado y en el hígado a través de la conjugación con glucurónido (una reacción fase II) con la subsecuente excreción biliar. En todas las especies evaluadas se ha observado un metabolismo oxidativo mínimo (una reacción fase I). Ezetimibe y ezetimibe-glucurónido son los principales compuestos derivados de la droga detectados en el plasma y constituyen aproximadamente un 10 a 20%, y un 80 a 90% del total de la droga en plasma, respectivamente. Tanto ezetimibe como ezetimibe-glucurónido se eliminan lentamente del plasma y evidencian una significativa recirculación enterohepática. La vida media de ezetimibe y ezetimibe-glucurónido es de aproximadamente 22 horas.


##### Simvastatina

La simvastatina es una lactona inactiva que es hidrolizada *in vivo* a la forma  $\beta$ -hidroxiácida correspondiente, un potente inhibidor de la HMG-CoA Reductasa. La hidrólisis se da principalmente en el hígado, la velocidad de hidrólisis en el plasma humano es muy baja.

En el hombre, simvastatina es bien absorbida y sufre un extenso primer paso hepático. La extracción en el hígado es dependiente del flujo sanguíneo hepático. El hígado es el sitio principal de su acción, con excreción subsecuente de

  
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Nerone**  
Apoderado

3

  
MERCK SHARP & DOHME ARG. INC  
Farm. Sebastian Dario Goldentu  
DIRECTOR TECNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436



equivalentes de droga en la bilis. Consecuentemente, la disponibilidad de la droga activa en la circulación sistémica es baja.

Luego de una inyección intravenosa del metabolito  $\beta$ -hidroxiácido, su vida media promedió las 1,9 horas.

*Eliminación:*

**Ezetimibe**

Luego de la administración de  $^{14}\text{C}$ -ezetimibe (20 mg) a sujetos humanos, aproximadamente el 93% de la radiactividad total del plasma correspondió al ezetimibe total. Aproximadamente el 78% y el 11% de la radioactividad administrada se recuperaron en heces y orina, respectivamente, tras un período de recolección de 10 días. Después de 48 horas, no se registraron niveles detectables de radiactividad en plasma.

**Simvastatina**

Luego de una dosis oral de simvastatina radiactiva a hombres, el 13% de la radioactividad fue excretada en la orina y el 60% en heces dentro de las 96 horas. La cantidad recuperada en heces representa a los equivalentes de la droga absorbida excretada en la bilis así como también la droga no absorbida. Luego de una inyección intravenosa del metabolito  $\beta$ -hidroxiácido un promedio de solo el 0,3% de la dosis intravenosa fue excretada en orina como inhibidores.

**INDICACIONES:**

- *Hipercolesterolemia Primaria:*

**VYTORIN** está indicado como tratamiento asociado a la dieta para reducir el colesterol total elevado (C-total), el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C), la apolipoproteína B (Apo B), los triglicéridos (TG), y el colesterol de lipoproteínas de no-alta densidad (no-HDL-C), y para incrementar el colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) en pacientes adultos y adolescentes (10 a 17 años) con hipercolesterolemia primaria (heterocigota familiar y no-familiar) o con hiperlipidemia mixta.

Se puede asociar fenofibrato a **VYTORIN** en pacientes con hiperlipidemia mixta que requieran una reducción mayor de los TG y de las no-HDL-C, e incremento de las HDL-C.


- *Hipercolesterolemia Familiar Homocigota (HoFH):*

**VYTORIN** está indicado para reducir los niveles elevados de colesterol total y LDL-C en pacientes adultos y adolescentes (10 a 17 años) con HoFH. Los pacientes también pueden recibir tratamientos adyuvantes (por ejemplo, aféresis de LDL).

- *Prevención de Eventos Vasculares Mayores en pacientes con Enfermedad Renal Crónica:*

**VYTORIN** está indicado para reducir el riesgo de Eventos Vasculares Mayores en pacientes con Enfermedad Renal Crónica.

**POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN:**

  
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**Jose Negrone**  
Apoderado

  
MERCK SHARP & DOHME ARG. INC.  
Farm. Sebastián Darío Goldentul  
DIRECTOR TÉCNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436

Se debe indicar al paciente una dieta hipolipemiante estándar antes de recibir **VYTORIN**, la que deberá mantenerse durante el tratamiento con **VYTORIN**. La dosis debe ser individualizada de acuerdo al nivel de LDL-C basal, la meta de tratamiento recomendada y la respuesta del paciente. **VYTORIN** debe administrarse en una dosis diaria única por la noche, con o sin los alimentos.

El rango de dosis se encuentra entre 10/10 mg/día hasta 10/80 mg/día. La dosis inicial usual recomendada es de 10/20 mg/día. Puede considerarse el inicio del tratamiento con 10/10 mg/día en los pacientes que requieran reducciones menos agresivas del LDL-C. Los pacientes en los que sea necesaria una reducción mayor del LDL-C (mayor del 55%) pueden comenzar el tratamiento con 10/40 mg/día. Al cabo de dos o más semanas de iniciada la administración o efectuada la titulación de **VYTORIN**, se pueden controlar los niveles de lípidos y ajustar la posología, de ser necesario.

La dosis máxima es de 10/40 mg/día. Podrán seguir recibiendo dosis de 10/80 mg/día aquellos pacientes que vienen recibiendo dicha dosis por más de 12 meses sin signos de compromiso muscular.

*Restricción de la dosis de 10/80 mg:*

Debido al aumento del riesgo de miopatía, incluyendo rabdomiólisis, especialmente durante el primer año de tratamiento, la dosis de **VYTORIN** 10/80 mg sólo debe ser utilizada en pacientes que han estado tomando **VYTORIN** 10/80 mg crónicamente (por ejemplo, por 12 meses o más) sin evidencia de toxicidad muscular.

La dosis de 10/80 mg de **VYTORIN** sólo es recomendada en pacientes con alto riesgo de complicaciones cardiovasculares que no logren el objetivo del tratamiento con dosis menores y cuando los beneficios superen los potenciales riesgos. (Ver **PRECAUCIONES, Miopatía/ Rabdomiólisis**)

*Co-administración con Fenofibrato:*

Cuando se administre en forma concomitante con fenofibrato, la dosis recomendada de **VYTORIN** es de 10/10 mg/día ó 10/20 mg/día. (Ver **PRECAUCIONES, Miopatía/Rabdomiólisis**).

*Posología en pacientes con Hipercolesterolemia Familiar Homocigota:*

La dosis de **VYTORIN** recomendada en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota es de 10/40 mg/día ó 10/80 mg/día, por la noche. La dosis de 10/80 mg de **VYTORIN** sólo se recomienda cuando los beneficios superen los potenciales riesgos. (Ver **CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES, Miopatía/Rabdomiólisis**). En estos pacientes **VYTORIN** debe utilizarse como terapia adyuvante de otros tratamientos reductores de lípidos (por ejemplo, aféresis de LDL), o si no se dispone de dichos tratamientos.

*Uso en pacientes pediátricos (10 a 17 años):*

La dosis usual recomendada para iniciar la terapia es de 10/10 mg una vez por día por la noche. El rango terapéutico recomendado es de 10/10 mg a 10/40 mg por día como máximo. Las dosis deben ser individualizadas de acuerdo al

Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
José Nerone  
Apoderado

5

MERCK SHARP & DOHME ARG. INC  
Farm. Sebastián Darío Goldentul  
DIRECTOR TÉCNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436

objetivo de terapia recomendado.

*Uso en niños menores a 10 años:*

No se recomienda el tratamiento con **VYTORIN**.

*Uso en pacientes de edad avanzada:*

No es necesario realizar ajustes de la dosis en los pacientes de edad avanzada.

*Uso en pacientes con insuficiencia hepática:*

En los pacientes con insuficiencia hepática leve (puntaje de Child Pugh de 5 a 6), no se requiere un ajuste de la dosis. El tratamiento con **VYTORIN** no se recomienda en los pacientes con disfunción hepática moderada (puntaje de Child Pugh de 7 a 9) o grave (puntaje de Child Pugh > 9) (ver **PRECAUCIONES**).

*Uso en pacientes con insuficiencia renal / Enfermedad renal crónica:*

En los pacientes con insuficiencia renal leve (TFG > 60ml/min/1.73m<sup>2</sup>) no se requieren ajustes de la posología. En pacientes con enfermedad renal crónica y una TFG < 60ml/min/1.73m<sup>2</sup> la dosis de **VYTORIN** es de 10/20 mg una vez por día por la noche. En estos pacientes, el uso de dosis más altas debe ser cuidadosamente monitoreado.

*Co-administración con otros medicamentos:*

**VYTORIN** debe administrarse dos o más horas antes, o cuatro o más horas después de la administración de un secuestrante de ácidos biliares.


En pacientes que toman Amiodarona, Verapamilo o Diltiazem concomitantemente con **VYTORIN**, la dosis de **VYTORIN** no debe superar los 10/20 mg/día. (Ver **PRECAUCIONES, Miopatía/Rabdomiólisis e INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS**).

En pacientes en tratamiento con Amlodipina concomitante con **VYTORIN**, la dosis de **VYTORIN** no debe exceder los 10/40 mg/día. (Ver **PRECAUCIONES, Miopatía/Rabdomiólisis e INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS**).


No se ha estudiado la seguridad y eficacia de **VYTORIN** administrado con fibratos, a excepción del fenofibrato. Por lo tanto, la combinación de **VYTORIN** con otros fibratos que no sea fenofibrato debe ser evitada. (Ver **CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES, Miopatía y Rabdomiólisis e INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS**).

### **CONTRAINDICACIONES:**

- Hipersensibilidad a los principios activos o a cualquiera de los componentes del producto.
- Enfermedad hepática activa o elevaciones persistentes inexplicadas de las transaminasas séricas.
- Embarazo y lactancia (Ver **Uso durante el embarazo / Uso durante la lactancia**).
- Cuando se indique la administración conjunta de **VYTORIN** con fenofibrato, por favor verificar la información de

  
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Nerone**  
Apoderado

6

  
MERCK SHARP & DOHME ARG. INC.  
Farm. Sebastián Darío Goldentul  
DIRECTOR TÉCNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436

prospecto del fenofibrato.

- Administración concomitante de inhibidores potentes de CYP3A4 (Por Ej.: Itraconazol, Ketoconazol, Posaconazol, Voriconazol, Inhibidores de la proteasa de HIV, Boceprevir, Telaprevir, Eritromicina, Claritromicina, Telitromicina y Nefazodona). (Ver **PRECAUCIONES, Miopatía/Rabdomiólisis e INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS**).
- Administración concomitante con Gemfibrozilo, Ciclosporina o Danazol (Ver **PRECAUCIONES, Miopatía/Rabdomiólisis e INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS**).

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:**

Cuando se indique la administración conjunta de **VYTORIN** con fenofibrato, por favor verificar la información de prospecto del fenofibrato.


***MIOPATÍA / RABDOMIÓLISIS:***

Tal como sucede con otros inhibidores de la HMG-CoA reductasa, la simvastatina ocasionalmente puede provocar miopatía, la cual se manifiesta por dolor muscular, sensibilidad o debilidad con niveles de creatinquinasa (CK) por encima de 10 veces el límite superior normal (LSN). La miopatía a veces toma la forma de Rabdomiólisis con o sin insuficiencia renal aguda secundaria a mioglobinuria, y raramente se han producido casos fatales. El riesgo de miopatía aumenta en presencia de niveles elevados de actividad inhibitoria de la HMG-CoA reductasa en plasma. Algunos factores predisponentes para el desarrollo de miopatía, incluyen: edad avanzada ( $\geq 65$  años), sexo femenino, hipotiroidismo no controlado y falla renal.


**Al igual que con otros inhibidores de la HMG-CoA reductasa, el riesgo de miopatía/Rabdomiólisis está relacionado con la dosis de simvastatina.** En una base de datos de ensayos clínicos en los que 41.413 pacientes fueron tratados con simvastatina, 24.747 (60%) de los cuales fueron incluidos en los estudios con un seguimiento medio de al menos 4 años, la incidencia de miopatía fue de aproximadamente 0,03%, 0,08% y 0,61% con 20, 40 y 80 mg/día, respectivamente. En estos ensayos, los pacientes fueron cuidadosamente vigilados y algunos medicamentos que interactúan fueron excluidos.

En un ensayo clínico en el que los pacientes con antecedentes de infarto de miocardio fueron tratados con simvastatina 80 mg/día (seguimiento medio de 6,7 años), la incidencia de miopatía fue de aproximadamente 1,0% frente al 0,02% para los pacientes con 20 mg/día. Aproximadamente la mitad de estos casos de miopatía se produjeron durante el primer año de tratamiento. La incidencia de miopatía durante cada año de tratamiento fue de aproximadamente 0,1%.

El riesgo de miopatía es mayor en pacientes tratados con simvastatina 80 mg en comparación con otras estatinas con similar eficacia para la reducción de C-LDL. Por lo tanto, la dosis de 10/80 mg de **VYTORIN** sólo debe utilizarse en pacientes que han estado tomando **VYTORIN** 10/80 mg crónicamente (por ejemplo, por 12 meses o más) sin evidencia de toxicidad muscular y que tengan un alto riesgo de complicaciones cardiovasculares y no hayan logrado su objetivo de tratamiento con dosis más bajas y cuando los beneficios superen los potenciales riesgos. En pacientes que toman **VYTORIN** 10/80 mg y requieren un medicamento adicional con interacciones farmacológicas, se debe utilizar

  
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Merone**  
Apoderado

7

  
MERCK SHARP & DOHME ARG. INC.  
Farm. Sebastián Darío Goldentú  
DIRECTOR TÉCNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436

una dosis más baja de **VYTORIN** o un régimen alternativo de ezetimibe-estatina con un menor potencial de interacciones farmacológicas. (Ver **POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN** y **CONTRAINDICACIONES**).

**Todos los pacientes que inician tratamiento con VYTORIN, o cuya dosis de VYTORIN es aumentada, deben ser advertidos del riesgo de miopatía y deben informar rápidamente de cualquier dolor, sensibilidad o debilidad muscular inexplicable.** El tratamiento con **VYTORIN** debe suspenderse inmediatamente si se diagnostica o se sospecha de miopatía. La presencia de estos síntomas, y un nivel de CK > 10 veces el límite superior de lo normal indican miopatía. En la mayoría de los casos, al suspenderse inmediatamente el tratamiento, los síntomas musculares y el incremento de CK se resolvieron (Ver **EFFECTOS ADVERSOS**). Deben considerarse determinaciones periódicas de CK en pacientes que inician tratamiento con **VYTORIN** o cuya dosis se aumenta. También se recomiendan determinaciones periódicas de CK para pacientes que estén ajustando su dosis a 10/80 mg. Este monitoreo no asegura la prevención de miopatía.

Muchos de los pacientes que han presentado Rabdomiólisis durante el tratamiento con simvastatina tenían complicaciones médicas previas, incluyendo insuficiencia renal por lo general como consecuencia de diabetes mellitus de larga data. Estos pacientes merecen una vigilancia más estrecha. El tratamiento con **VYTORIN** deberá interrumpirse temporalmente unos pocos días antes de una cirugía mayor programada y cuando se produce cualquier proceso médico o quirúrgico importante.

En un ensayo clínico donde 9.000 pacientes con enfermedad renal crónica fueron azarosamente tratados diariamente con **VYTORIN** 10/20 mg (n=4.650) o con placebo (n=4.620) (seguimiento promedio de 4.9 años), la incidencia de Miopatía/ Rabdomiólisis fue del 0.2% para **VYTORIN** y del 0.1% para el placebo. (Ver **EFFECTOS ADVERSOS**).

#### *INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS:*

**Debido a que VYTORIN contiene simvastatina, el riesgo de miopatía/Rabdomiólisis se ve incrementado por el uso concomitante de VYTORIN con las siguientes drogas:**

#### **Drogas contraindicadas:**

- **Inhibidores potentes del CYP3A4:** Está contraindicado el uso concomitante con medicinas que posean un potencial efecto inhibitorio sobre CYP3A4 a dosis terapéuticas (Por Ej., **itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol, eritromicina, claritromicina, telitromicina, inhibidores de proteasa para HIV, boceprevir, telaprevir, o nefazodona**). Si el tratamiento con inhibidores potentes del CYP3A4 es inevitable, se debe suspender la terapia con **VYTORIN** durante el curso del tratamiento. (Ver **CONTRAINDICACIONES, INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS Y FARMACOCINÉTICA**).
- **Gemfibrozilo, ciclosporina o danazol:** Está contraindicado el uso concomitante de estas drogas con **VYTORIN**. (Ver **CONTRAINDICACIONES, INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS, FARMACOCINÉTICA**)

Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
José Nerone  
Apoderado

Otras drogas:

- Amiodarona: En un estudio clínico, se reportó miopatía en el 6% de los pacientes que recibieron simvastatina 80 mg y amiodarona. La dosis de **VYTORIN** no debe superar los 10/20 mg diarios en pacientes que reciben concomitantemente medicación con amiodarona. (Ver **INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS**)

- Bloqueantes de canales de calcio:

Verapamilo o Diltiazem: Los pacientes bajo tratamiento concomitante con diltiazem y simvastatina 80 mg tuvieron un incremento en el riesgo de miopatía. La dosis de **VYTORIN** no debe exceder los 10/20 mg diarios en pacientes que reciban concomitantemente medicación con verapamilo o diltiazem. (Ver **INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS**)

Amlodipina: en un estudio clínico, los pacientes en tratamiento concomitante con amlodipina y simvastatina 80 mg tuvieron un ligero incremento en el riesgo de miopatía. La dosis de **VYTORIN** no debe exceder los 10/40 mg diarios en pacientes que reciban concomitantemente medicación con amlodipina. (Ver **INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS**).

- Inhibidores moderados de CYP3A4: Los pacientes tomando medicinas con efecto inhibitorio moderado sobre CYP3A4 concomitantemente a **VYTORIN**, particularmente a altas dosis de **VYTORIN**, pueden presentar un riesgo incrementado de miopatía. Cuando se coadministre **VYTORIN** junto a un inhibidor moderado de CYP3A4, será necesario un ajuste de la dosis de **VYTORIN**.

- Fenofibrato: En un estudio en el cual se coadministró VYTORIN 10/20 mg/día y fenofibrato 160 mg/día a 184 pacientes por hasta 12 semanas, no existieron reportes de miopatía. Dosis de **VYTORIN** por encima de 10/20 mg/día y fenofibrato no han sido estudiadas. Se debe tener precaución cuando se prescribe **VYTORIN** y fenofibrato, ya que fenofibrato puede causar miopatía cuando se administra solo. En otro estudio de 12 semanas de duración, 411 pacientes recibieron simvastatina 20mg/día y fenofibrato 160mg/día, la coadministración fue bien tolerada. Si se sospecha colestasis en un paciente que recibe **VYTORIN** y fenofibrato, debe indicarse estudios de vesícula biliar y considerarse una terapia hipolipemiente alternativa (Ver **EFFECTOS ADVERSOS** y el Prospecto del fenofibrato).

- Otros fibratos: No ha sido estudiada la seguridad y eficacia de **VYTORIN** administrado con otros fibratos que no sean fenofibrato. **Por lo tanto, se debe evitar el uso concomitante de VYTORIN y fibratos, excepto fenofibrato. El uso de gemfibrozil está contraindicado. (Ver CONTRAINDICACIONES)**

- Ácido Fusídico: En los pacientes en tratamiento concomitante con ácido fusídico y **VYTORIN** el riesgo de miopatía/Rabdomiólisis puede tener un incremento. La co-administración con ácido fusídico no es recomendable. Se puede considerar la suspensión temporaria del tratamiento con **VYTORIN**, en pacientes donde el uso de ácido fusídico

Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
Jose Nerone  
Apoderado

sistémico es considerado esencial. En circunstancias excepcionales, donde tratamientos prolongados con ácido fusídico sistémico es necesario, por ej. en tratamientos de infecciones severas, los pacientes que estén tratados concomitantemente con ácido fusídico y **VYTORIN** deben ser monitoreados. (Ver **INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS, otras interacciones medicamentosas**).

- Niacina (≥ 1 g/día): Casos de miopatía/Rabdomiólisis han sido observados con la coadministración de simvastatina con dosis modificadoras de lípidos (≥ 1 g/día) de niacina.

En un estudio doble ciego actualmente en curso realizado en China, Inglaterra y Escandivia, un análisis preliminar del comité independiente de seguimiento de seguridad reveló que la incidencia de miopatía entre aproximadamente 4.700 pacientes ingleses/escandinavos tratados con Niacina de liberación prolongada/Laropiprant 2 g/40 mg coadministrado con simvastatina 40 mg ó ezetimibe/simvastatina 10/40 mg es similar a la incidencia global de 0,08% reportado en la información de prescripción de simvastatina 40 mg. Sin embargo, en aproximadamente 3.900 pacientes chinos en el mismo tratamiento, la incidencia es más alta que la esperada (aproximadamente 0,9%). El riesgo de miopatía no aumentó entre 8.600 pacientes chinos, ingleses o escandinavos en el grupo control (placebo más simvastatina 40 mg ó ezetimibe/simvastatina 10/40 mg).

Dado que la incidencia de miopatía es mayor que la esperada en pacientes chinos, se debe tener precaución cuando se trata a estos pacientes con niacina en dosis modificadoras de lípidos (≥ 1g/día) o productos conteniendo niacina coadministrado con **VYTORIN**, (particularmente dosis de 10/40 mg o más).

Como el riesgo de miopatía está relacionado a la dosis, el uso de **VYTORIN** 10/80 mg con dosis modificadoras de lípidos (≥ 1 g/día) de niacina o productos conteniendo niacina no es recomendado en pacientes chinos. Se desconoce si existe un riesgo incrementado de miopatía con la coadministración en otros pacientes asiáticos. (Ver **INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS**).

- Anticoagulantes:

Si **VYTORIN** se administra junto a warfarina o algún otro anticoagulante cumarínico, o fluindiona, la Razón Internacional Normalizada (RIN) debe ser monitoreado apropiadamente (Ver **INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS**).

**ENZIMAS HEPÁTICAS:**

En los ensayos controlados de coadministración, en los pacientes que recibían ezetimibe con simvastatina se observaron elevaciones sucesivas de las transaminasas (≥ 3 veces el LSN) (Ver **REACCIONES ADVERSAS**).

En un estudio clínico en el cual 9.000 pacientes con Enfermedad Renal Crónica fueron randomizados para recibir **VYTORIN** 10/20 mg/día (N= 4.650) o placebo (N= 4.620) (con un seguimiento medio de 4,9 años), la incidencia de transaminasas elevadas (≥ 3 veces el Límite Superior Normal) fue de 0,7% para **VYTORIN** frente a 0,6% para placebo. (Ver **EFFECTOS ADVERSOS**).

*[Signature]*  
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**Jose Nerone**  
Apoderado

*[Signature]*  
MERCK SHARP & DOHME ARG. INC.  
Farm. Sebastian Darío Goldentul  
DIRECTOR TECNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436

209

67

Se recomienda realizar pruebas de función hepática antes de iniciar el tratamiento con **VYTORIN** y, de ahí en adelante, cuando resulte clínicamente indicado. Los pacientes que sean titulados hasta 10/80 mg deben someterse a un análisis adicional antes de la titulación, a los 3 meses de haber aumentado la dosis hasta 10/80 mg, y periódicamente con posterioridad (por ejemplo, cada seis meses) durante el primer año de tratamiento. Se debe prestar especial atención a los pacientes que desarrollen niveles elevados de transaminasas séricas. En dichos pacientes se deben repetir de inmediato las mediciones, y luego realizarlas con mayor frecuencia. Si los niveles de transaminasas muestran evidencias de progresión, particularmente si se elevan 3 veces el LSN y persisten, se debe discontinuar el medicamento. La ALAT puede provenir del músculo, por lo tanto un valor de ALAT elevado junto a CK puede indicar miopatía (Ver **PRECAUCIONES, Miopatía/Rabdomiólisis**).

Ha habido raros reportes de postcomercialización de insuficiencia hepática fatal y no fatal en pacientes que toman estatinas, incluyendo la simvastatina. Si durante el tratamiento con **VYTORIN** llegase a ocurrir lesión hepática grave con síntomas clínicos y/o hiperbilirrubinemia o ictericia, rápidamente interrumpir la terapia. Si no se encuentra una etiología alternativa, no restituya la terapia con **VYTORIN**.

**VYTORIN** debe utilizarse con precaución en los pacientes que consumen cantidades sustanciales de alcohol y/o cuentan con antecedentes de enfermedad hepática. Las patologías hepáticas activas o las elevaciones de transaminasas persistentes o inexplicadas constituyen contraindicaciones para el uso de **VYTORIN**.

**INSUFICIENCIA HEPÁTICA:**

Debido a que no se conocen los efectos del aumento de la exposición a ezetimibe en los pacientes con insuficiencia hepática moderada o severa, no se recomienda el empleo de **VYTORIN** en estos pacientes.

**USO EN EMBARAZO:**

La aterosclerosis es un proceso crónico, y comúnmente la discontinuación de las drogas hipolipemiantes durante el embarazo tendría un impacto mínimo sobre el riesgo a largo plazo asociado con la hipercolesterolemia primaria.

**VYTORIN:**

**VYTORIN** está contraindicado durante el embarazo.

**Simvastatina:**

No se ha establecido la seguridad de simvastatina en mujeres embarazadas. No se han llevado a cabo ensayos clínicos controlados con simvastatina en mujeres durante la gestación. Luego de la exposición intrauterina a inhibidores de la HMG-CoA reductasa, en raras ocasiones se recibieron comunicaciones de anomalías congénitas. Sin embargo, en un análisis de aproximadamente 200 embarazos expuestos durante el primer trimestre a simvastatina o a otro inhibidor de la HMG-CoA reductasa (estrechamente relacionado con ella), cuyo seguimiento se realizó en forma prospectiva, la incidencia de anomalías congénitas fue comparable a la observada en la población general. Esta cantidad de embarazos resultó estadísticamente suficiente como para excluir un incremento de 2,5

Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Néstor Apoderado**

**MERCK SHARP & DOHME ARG. INC.**  
Farm. Sebastián Darío Goldentul  
DIRECTOR TÉCNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436



veces o mayor en las anomalías congénitas con respecto a la incidencia previa disponible.

Si bien no existe ninguna evidencia de que la incidencia de anomalías congénitas en la descendencia de pacientes que recibieron simvastatina u otro inhibidor de la HMG-CoA reductasa estrechamente relacionado con ella difiere de la observada en la población general. El tratamiento materno con simvastatina puede reducir los niveles fetales de mevalonato, un precursor de la biosíntesis de colesterol. Por tal motivo, **VYTORIN** no debe utilizarse en las mujeres embarazadas, en las mujeres que traten de quedar embarazadas o en las que se sospeche un embarazo. El tratamiento con **VYTORIN** debe suspenderse durante todo el curso del embarazo o hasta que se haya determinado que la mujer no está embarazada (ver **CONTRAINDICACIONES**).

*Ezetimibe:*

No se dispone de ningún dato clínico sobre la exposición a ezetimibe durante la gestación.

Cuando ezetimibe se administró en combinación con simvastatina, no se observaron efectos teratogénicos en los estudios de desarrollo embriofetal realizados en ratas gestantes. En conejas preñadas, se observó una baja incidencia de malformaciones esqueléticas.

*PERÍODO DE LACTANCIA:*

Los estudios realizados en ratas demostraron que ezetimibe se excreta en la leche. Se desconoce si los componentes activos de **VYTORIN** se excretan en la leche materna; por lo tanto, **VYTORIN** no debe administrarse a las mujeres durante la lactancia.

*USO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS:*

La seguridad y eficacia de **VYTORIN** en pacientes de 10 a 17 años de edad con hipercolesterolemia heterocigota familiar han sido evaluadas en un estudio clínico controlado en varones adolescentes y en niñas que hayan tenido su primera menstruación al menos un año antes. Los pacientes adolescentes tratados con **VYTORIN** tuvieron un perfil similar de experiencias adversas que el de los pacientes adultos tratados con **VYTORIN**. **Dosis mayores a 10/40 mg/día no han sido estudiadas en esta población.** En este estudio controlado, no hubo efectos detectables sobre el crecimiento o la maduración sexual en los varones y mujeres adolescentes, o algún efecto sobre la duración del ciclo menstrual en las niñas (Ver **POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN** y **EFFECTOS SECUNDARIOS**). **VYTORIN** no ha sido estudiado en pacientes menores de 10 años de edad o en niñas que no hayan tenido su menstruación.

*USO EN PERSONAS DE EDAD AVANZADA:*

Dado que la edad avanzada ( $\geq 65$  años) es un factor predisponente para desarrollar miopatía, **VYTORIN** debe ser prescripto con precaución en pacientes añosos. En un estudio clínico de pacientes tratados con simvastatina 80 mg/día, los pacientes mayores a 65 años tuvieron un riesgo incrementado de miopatía comparado con pacientes menores a 65 años.

Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
José Néron  
Aprobado

12

MERCK SHARP & DOHME ARG. INC.  
Farm. Sebastián Darío Goldent  
DIRECTOR TÉCNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436

**INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS:**

**VYTORIN:**

Cuando ezetimibe se coadministró con simvastatina no se observó ninguna interacción farmacocinética clínicamente significativa.

**VYTORIN** resulta bioequivalente a la coadministración de ezetimibe y simvastatina.

**DROGAS CONTRAINDICADAS:**

Está contraindicado el uso concomitante con las siguientes drogas:

*Inhibidores potentes del CYP3A4:* En los estudios preclínicos se ha demostrado que ezetimibe no induce la actividad de las enzimas metabolizadoras de fármacos del citocromo P450. No se han observado interacciones farmacocinéticas clínicamente significativas entre ezetimibe y las drogas que se sabe que son metabolizadas a través de los citocromos P450 1A2, 2D6, 2C8, 2C9, y 3A4, o N-acetil-transferasa. Simvastatina es metabolizada por la CYP3A4, pero no tiene actividad inhibitoria sobre dicha enzima; por lo tanto, no cabe esperar que afecte las concentraciones plasmáticas de otras drogas que son metabolizadas por la CYP3A4. Los inhibidores potentes de CYP3A4 aumentan el riesgo de miopatía al disminuir la eliminación del simvastatina, componente de **VYTORIN**: Está contraindicado el uso concomitante con drogas que tengan un potente efecto inhibitorio sobre CYP3A4 (Por Ej.: itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol, eritromicina, claritromicina, telitromicina, inhibidores de proteasa para HIV, boceprevir, telaprevir, o nefazodona). (Ver **CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES, Miopatía/Rabdomiólisis, FARMACOCINÉTICA**)

*Gemfibrozilo, ciclosporina o danazol:* (Ver **CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES, Miopatía/Rabdomiólisis**)

**Gemfibrozil:** En un estudio farmacocinético, la administración concomitante de gemfibrozilo aumentó las concentraciones totales de ezetimibe en aproximadamente 1,7 veces. Este aumento no se considera clínicamente significativo. No hay datos clínicos disponibles. (Ver **CONTRAINDICACIONES y PRECAUCIONES Miopatía/Rabdomiólisis**)

*Ciclosporina:* En un estudio de ocho pacientes con trasplante renal con aclaramiento de creatinina > 50 ml/min sobre una dosis estable de ciclosporina, una única dosis de 10 mg de ezetimibe aumentó 3,4 veces (rango de 2,3 a 7,9 veces) el AUC promedio de ezetimibe total en comparación con una población control sanas de otro estudio (N=17). En un estudio diferente, un paciente con trasplante renal e insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina de 13,2 ml/min/1.73 m<sup>2</sup>) que estaba recibiendo múltiples medicamentos, incluyendo ciclosporina, demostró una exposición 12 veces mayor al ezetimibe total en comparación con controles concurrentes. En un estudio cruzado de dos periodos en doce sujetos sanos, la administración diaria de 20 mg de ezetimibe durante 8 días con una dosis única de 100 mg de ciclosporina en el día 7 resultó en un incremento medio del 15% del AUC de ciclosporina en comparación con una dosis única de 100 mg de ciclosporina sola. (Ver **CONTRAINDICACIONES y PRECAUCIONES,**

Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Nelson**  
**Apoderado**

13

**MERCK SHARP & DOHME ARG. INC**  
Farm. Sebastián Darío Goidentui  
DIRECTOR TECNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436

**Miopatía/Rabdomiólisis)**

*Otras interacciones farmacológicas:*

*Fenofibrato:* En un estudio clínico, en el cual se coadministró **VYTORIN** 10/20 mg/día y fenofibrato 160 mg/día en 184 pacientes durante 12 semanas, no hubo reportes de miopatía y ningún paciente experimentó eventos relacionados con la vesícula biliar. (Ver **PRECAUCIONES, Miopatía/Rabdomiólisis**).

En un estudio farmacocinético, la administración concomitante de fenofibrato aumentó las concentraciones totales de ezetimibe aproximadamente 1,5 veces. Este aumento no se considera clínicamente significativo. La seguridad y eficacia de ezetimibe coadministrada con fenofibrato han sido evaluadas en un estudio clínico (ver **EFFECTOS ADVERSOS**).

*Otros fibratos:* La seguridad y eficacia de **VYTORIN** administrado con fibratos, excepto fenofibrato, no han sido estudiados. Los fibratos pueden aumentar la excreción de colesterol en la bilis promoviendo colelitiasis.

La coadministración de ezetimibe con otros fibratos no ha sido estudiada. En un estudio preclínico en perros, ezetimibe aumentó el colesterol en la vesícula biliar. A pesar de que la relevancia de este hallazgo preclínico en humanos sea desconocida, no se recomienda la administración conjunta de **VYTORIN** con fibratos, excepto fenofibrato, hasta que el uso en pacientes sea estudiado.

*Amiodarona:* El riesgo de Miopatía/Rabdomiólisis se incrementa con el uso concomitante de amiodarona y **VYTORIN**. (Ver **POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION** y **PRECAUCIONES, Miopatía/Rabdomiólisis**)

*Bloqueadores de los canales de calcio:* El riesgo de miopatía/Rabdomiólisis se incrementa por la administración concomitante de verapamilo, diltiazem o amlodipina. (Ver **POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINSTRACION** y **PRECAUCIONES Miopatía/Rabdomiólisis**).

*Colestiramina:* La administración concomitante de colestiramina disminuyó el AUC promedio de ezetimibe total (ezetimibe + glucurónido de ezetimibe) aproximadamente un 55%. La reducción adicional del LDL-C derivada de agregar **VYTORIN** a la colestiramina, puede verse disminuida por esta interacción.

*Inhibidores moderados de CYP3A4:* Los pacientes que estén tomando medicinas con efecto inhibitorio moderado sobre CYP3A4 concomitantemente a **VYTORIN**, particularmente a altas dosis, pueden presentar un riesgo incrementado de miopatía. (Ver **PRECAUCIONES, Miopatía/Rabdomiólisis**)

*Ácido fusídico:* En los pacientes tratados con ácido fusídico a los que se agrega en forma concomitante **VYTORIN**, se puede incrementar el riesgo de miopatía/rabdomiólisis. (Ver **PRECAUCIONES, Miopatía/Rabdomiólisis**).

Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Nerpne**  
**Apoderado**

14

**MERCK SHARP & DOHME ARG. INC**  
Farm. Sebastián Darío Goldentul  
DIRECTOR TÉCNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436

**Niacina:** en un estudio de 15 adultos sanos, el uso concomitante de **VYTORIN** (10/20 mg diarios por 7 días) causó un pequeño incremento en el AUC promedio de Niacina (22%) y de ácido nicotínico (19%), administrados como ácido nicotínico, comprimidos de liberación prolongada (1.000 mg por 2 días y 20.00 mg por 5 días luego de un desayuno bajo en grasas). En el mismo estudio, la administración concomitante de ácido nicotínico en comprimidos de liberación prolongada, incrementó levemente el AUC medio de ezetimibe (9%), ezetimibe total (26%) y simvastatina en su forma de ácido (35%). Estos incrementos no son considerados clínicamente significativos. (Ver **PRECAUCIONES, Miopatía/Rabdomiólisis**)


**Colchicina:** Ha habido informes de miopatía y Rabdomiólisis con la administración concomitante de colchicina y **VYTORIN** en pacientes con insuficiencia renal. Se recomienda un monitoreo clínico de los pacientes que tomen esta combinación.

*Otras interacciones:*

El jugo de pomelo contiene uno o más componentes que inhiben la CYP3A4 y pueden incrementar los niveles plasmáticos de las drogas metabolizadas por CYP3A4. El efecto del consumo habitual (un vaso diario de 250 ml) es mínimo (13% de incremento de la actividad inhibitoria de la HMG-CoA reductasa en plasma, medida a través de área bajo la curva de concentración-tiempo) y sin relevancia clínica. Sin embargo, el consumo de grandes cantidades (más de 1 litro diario), aumenta significativamente los niveles de actividad inhibitoria de la HMG-CoA reductasa en plasma durante el tratamiento con simvastatina, y debe evitarse mientras dure el tratamiento con **VYTORIN** (ver **PRECAUCIONES, Miopatía/Rabdomiólisis**).

**Anticoagulantes:** En dos estudios clínicos, uno en voluntarios sanos y el otro en pacientes hipercolesterolémicos, simvastatina en dosis de 20-40 mg/día potenció ligeramente el efecto de los anticoagulantes cumarínicos: el tiempo de protrombina, informado como Relación Internacional Normalizada (RIN), aumentó desde un nivel basal de 1,7 a 1,8 y de 2,6 a 3,4 en los estudios realizados en voluntarios y en pacientes, respectivamente. En los pacientes que reciben anticoagulantes cumarínicos, el tiempo de protrombina debe determinarse antes de comenzar con la administración de **VYTORIN**, y lo suficientemente frecuente durante la etapa temprana del tratamiento para garantizar que no se produzca una alteración significativa del mismo. Una vez que se ha documentado un tiempo de protrombina estable, los tiempos de protrombina se pueden controlar a los intervalos usualmente recomendados para los pacientes en tratamiento con anticoagulantes cumarínicos. Si la dosis de **VYTORIN** se modifica o se discontinúa la terapia, debe repetirse el mismo procedimiento. El tratamiento con simvastatina no estuvo asociado con sangrado, ni con cambios en el tiempo de protrombina en los pacientes que no recibían anticoagulantes.

La administración concomitante de ezetimibe (10 mg una vez al día) no tuvo efecto significativo sobre la biodisponibilidad de la warfarina y el tiempo de protrombina en un estudio de 12 hombres voluntarios sanos. Hubo reportes en la etapa post-comercialización de incrementos en el Rango Normalizado Internacional en pacientes en quienes se agregó ezetimibe a la warfarina o la fluindiona. La mayoría de estos pacientes también estaban tratados con otras medicaciones. (Ver **PRECAUCIONES**).

  
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Nerone**  
Apoderado

El efecto de **VYTORIN** sobre el tiempo de protrombina no ha sido estudiado.

*Antiácidos:* La administración concomitante de antiácidos disminuyó la tasa de absorción de ezetimibe pero no tuvo efecto sobre la biodisponibilidad de la droga. Este descenso de la tasa de absorción no se consideró clínicamente significativo.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Se evaluó la seguridad de **VYTORIN** (o la administración concomitante de ezetimibe y simvastatina equivalente a **VYTORIN**) en aproximadamente 12.000 pacientes en ensayos clínicos. **VYTORIN** por lo general fue bien tolerado.

Se informaron las siguientes reacciones adversas frecuentes ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ) o infrecuentes ( $\geq 1/1000$ ,  $< 1/100$ ) relacionadas con la droga, en los pacientes que recibían **VYTORIN** (N=2.404) y con una incidencia mayor que placebo (N= 1.340):

- Investigaciones:

Frecuentes: incrementos en ALAT y/o ASAT; CK sérica aumentada

Infrecuentes: incremento en la bilirrubina sérica, ácido úrico y gamma glutamil transferasa, RIN aumentado, proteinuria presente, pérdida de peso.

- Trastornos del Sistema nervioso:

Infrecuentes: mareos, dolor de cabeza

- Trastornos gastrointestinales:

Infrecuentes: dolor y discomfort abdominal, dolor abdominal superior, dispepsia, flatulencia, náuseas, vómitos.

- Trastornos dermatológicos y del tejido subcutáneo:

Infrecuentes: prurito, rash.

- Trastornos del tejido conectivo y musculoesqueléticos:


Infrecuentes: artralgia, espasmos musculares, debilidad muscular, discomfort muscular, dolor de cuello, dolor en las extremidades.

- Trastornos generales y condiciones del sitio de administración:

Infrecuentes: astenia, fatiga, malestar, edema periférico.

- Trastornos psiquiátricos:

Infrecuentes: alteraciones del sueño.

  
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Néron**  
**Apoderado**

Se informaron las siguientes reacciones adversas frecuentes ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ) o infrecuentes ( $\geq 1/1000$ ,  $< 1/100$ ) relacionadas con la droga, en los pacientes que recibían **VYTORIN** (N=9.595) y con una incidencia mayor administrando estatinas solas (N= 8.883):

- Investigaciones:

Frecuentes: incrementos en ALAT y/o ASAT

Infrecuentes: incremento en la bilirrubina sérica, CK sérica, gamma glutamil transferasa.

- Trastornos del Sistema nervioso:

Infrecuentes: dolor de cabeza, parestesia

- Trastornos gastrointestinales:

Infrecuentes: distensión abdominal, diarrea, boca seca, dispepsia, flatulencia, reflujo gastroesofágico, vómitos.

- Trastornos dermatológicos y del tejido subcutáneo:

Infrecuentes: prurito, rash, urticaria

- Trastornos del tejido conectivo y musculoesqueléticos:

Frecuentes: mialgia

Infrecuentes: artralgia, dolor de espalda, espasmos musculares, debilidad muscular, dolor muscular, dolor en las extremidades

- Trastornos generales y condiciones del sitio de administración:

Infrecuentes: astenia, dolor de pecho, fatiga, edema periférico.

- Trastornos psiquiátricos:


Infrecuentes: insomnio

**VYTORIN** en uso concomitante con Fenofibrato:


En un estudio clínico controlado, el perfil de reacciones adversas reportado del uso concomitante de **VYTORIN** y fenofibrato fue concordante con lo reportado para **VYTORIN** y/o fenofibrato por separado.

*Pacientes pediátricos (10 a 17 años):*

En un estudio llevado a cabo con adolescentes (10 a 17 años) con hipercolesterolemia familiar heterocigota (N= 248), el perfil de seguridad y tolerabilidad del grupo tratado con **VYTORIN** fue similar a aquel en pacientes adultos tratados

  
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**Jose Nerone**  
Apoderado

17

  
MERCK SHARP & DOHME ARG. INC.  
Farm. Sebastián Darío Goldent  
DIRECTOR TECNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436

con **VYTORIN** (Ver **POSOLOGÍA y FORMA DE ADMINISTRACIÓN, Uso pediátrico**)

*Pacientes con Enfermedad Renal Crónica:*

En el estudio clínico SHARP, con más de 9.000 pacientes tratados con **VYTORIN** 10/20 mg al día (N=4.650) o placebo (N=4.620), los perfiles de seguridad fueron comparables durante un seguimiento medio de 4,9 años. En este ensayo, sólo se registraron eventos adversos graves y discontinuaciones debidas a eventos adversos. Las tasas de discontinuación debidas a eventos adversos fueron comparables (10,4% en pacientes tratados con **VYTORIN**; 9,8% en pacientes tratados con placebo). La incidencia de miopatía/Rabdomiólisis fue del 0,2% en los pacientes tratados con **VYTORIN** y 0,1% en pacientes tratados con placebo. Elevaciones consecutivas de las transaminasas (> 3 veces LSN) ocurrieron en el 0,7% de los pacientes tratados con **VYTORIN** frente al 0,6% de los pacientes tratados con placebo. En este ensayo, no hubo aumentos estadísticamente significativos de la incidencia de efectos adversos pre-especificados, incluyendo cáncer (9,4% para **VYTORIN**, 9,5% para placebo), hepatitis, colecistectomía o complicaciones de los cálculos biliares o pancreatitis.

**Experiencias en el período de Post-comercialización:**

Las reacciones adversas reportadas para **VYTORIN** son concordantes con las previamente observadas con ezetimibe y/o simvastatina.

Las siguientes reacciones adversas han sido informadas durante la experiencia post comercialización con **VYTORIN** o con alguno de sus componentes individuales o durante ensayos clínicos:

Investigaciones: pruebas de función hepática alteradas

Trastornos en la sangre y el sistema linfático: trombocitopenia, anemia

Trastornos del sistema nervioso: neuropatía periférica.

Trastornos respiratorios, mediastínicos y torácicos: tos, enfermedad intersticial pulmonar


Trastornos gastrointestinales: constipación, pancreatitis, gastritis.

Trastornos dermatológicos y del tejido subcutáneo: alopecia, reacciones de hipersensibilidad, incluyendo rash, urticaria, anafilaxis, angioedema, eritema multiforme.

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo: calambres musculares, miopatía/Rabdomiólisis (Ver **PRECAUCIONES**).

Ha habido reportes muy raros de miopatía inmune necrotizante (IMNM), una miopatía inmune, asociada al uso de estatina. IMNM es caracterizada por: debilitamiento muscular proximal y elevada creatin quinasa sérica, que persiste a pesar la discontinuación del tratamiento con estatina; biopsia muscular que muestra miopatía necrotizante sin inflamación significativa; mejoramiento con agente inmunosupresivos. (Ver **PRECAUCIONES, Miopatía/Rabdomiólisis**)

Trastornos metabólicos y nutricionales: disminución del apetito.

  
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Nerone**  
Apoderado

18

  
MERCK SHARP & DOHME ARG. INC.  
Farm. Sebastián Darío Goldentul  
DIRECTOR TÉCNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436

20912

FE  
75

Trastornos vasculares: sofocos, hipertensión.

Trastornos generales y condiciones del sitio de administración: dolor

Trastornos hepaticos: hepatitis / ictericia, falla hepática fatal y no fatal, colelitiasis, colecistitis.

Trastornos del sistema reproductor: disfunción eréctil

Trastornos psiquiátricos: depresión.

En raras oportunidades se informó un síndrome de hipersensibilidad aparente que incluyó algunas de las siguientes características: angioedema, síndrome de tipo lupus; polimialgia reumática, dermatomiositis, vasculitis, trombocitopenia, eosinofilia, aumento de la eritrosedimentación, artritis y artralgia, urticaria, fotosensibilidad, fiebre, ruborización, disnea y malestar.

Ha habido raros reportes de postcomercialización de deterioro cognitivo (Por ejemplo, pérdida y deterioro de memoria, olvidos, amnesia, confusión) asociados al uso de estatinas. Estas cuestiones cognitivas han sido reportadas para todas las estatinas. Los informes no suelen ser serios, y son reversibles al suspender el tratamiento. Los tiempos de comienzo y resolución de los síntomas son variables, de 1 día a años, y promedio de 3 semanas, respectivamente.

*Ezetimibe en uso concomitante con fenofibrato:*

En un estudio clínico multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo en pacientes con hiperlipidemia mixta, se trataron 625 pacientes en un período de hasta 12 semanas y 576 hasta un año. Este estudio no fue diseñado para comparar eventos infrecuentes entre grupos de tratamiento. El rango de incidencia (95% CI) para los incrementos de importancia clínica (>3 x el límite superior normal, consecutivo) de la transaminasa sérica fue de 4,5% (1,9; 8,8) y 2,7% (1,2; 5,4) para la administración de fenofibrato solo, y la co-administración de ezetimibe y fenofibrato respectivamente, ajustado según la exposición al tratamiento. Los correspondientes rangos de incidencia de colestectomía fueron de 0,6% (0,0; 3,1) y 1,7% (0,6; 4,0) para fenofibrato solo, y la co-administración de ezetimibe y fenofibrato respectivamente. (Ver **PRECAUCIONES**). No se observaron elevaciones de la CPK > a 10 x el límite superior normal en ninguno de los grupos de tratamiento en este estudio.

*Valores de laboratorio:*

En los ensayos clínicos controlados de co-administración, la incidencia de elevaciones clínicamente importantes de las transaminasas séricas (ALT y/o AST  $\geq$  3 el LSN, consecutivas) fue del 1,7% en los pacientes tratados con **VYTORIN**. Estas elevaciones por lo general fueron asintomáticas, no estuvieron asociadas con colestasis, y retornaron a los niveles basales tanto después de la interrupción del tratamiento como con la continuación del mismo (ver **PRECAUCIONES**).

Se observaron elevaciones clínicamente importantes de la creatinquinasa ( $\geq$ 10 el LSN) en 0,2% de los pacientes tratados con **VYTORIN**.

  
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Nerone**  
**Apoderado**



Se han reportado aumentos en los niveles de HbA1c y de glucemia en ayunas con estatinas, incluyendo simvastatina.

### **ESTUDIOS CLÍNICOS:**

#### ***Prevención de Eventos Vasculares Mayores en la Enfermedad Renal Crónica:***

Study of Heart and Renal Protection (SHARP) fue un estudio multinacional, aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, realizado en 9.438 pacientes con Enfermedad Renal Crónica, un tercio de los cuales estaban en diálisis al inicio del estudio. Durante el primer año, los pacientes fueron aleatorizados en una proporción de 4:4:1, respectivamente, a **VYTORIN** 10/20 mg, placebo ó Simvastatina 20 mg/día. El brazo de simvastatina de 1 año se ha incluido para permitir la comparación de **VYTORIN** con la simvastatina sola en materia de seguridad y lípidos. En un año, el grupo de simvastatina sólo se volvió a aleatorizar 1:1 con **VYTORIN** 10/20 mg ó placebo. Un total de 4.650 pacientes fueron asignados a **VYTORIN** 10/20 mg y 4.620 a placebo, y fueron seguidos durante una media de 4,9 años. Los pacientes tenían una edad media de 62 años, y el 63% eran varones, 72% caucásicos, 23% diabéticos y, para aquellos que no estaban en diálisis, la tasa media de filtración glomerular estimada (TFGe) fue de 26,5 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>. No hubo criterios de inclusión de lípidos. El valor promedio de C-LDL al inicio del estudio fue de 108 mg/dl. A partir de la medición de 1 año, el C-LDL se redujo un 26% en relación a placebo con simvastatina 20 mg en monoterapia y un 38% con **VYTORIN** 10/20 mg. En el punto medio del estudio (2,5 años) la reducción promedio de C-LDL con **VYTORIN** respecto a placebo fue del 32%. Todas las determinaciones de lípidos incluyeron a pacientes que no tomaban la medicación de estudio.

En el análisis primario del grupo de intención a tratar, 639 de 4.193 (15,2%) pacientes tratados con **VYTORIN** y 749 de 4.191 (17,9 %) tratados con placebo sufrieron un Evento Vascular Mayor (definido como: Infarto de Miocardio no fatal, muerte coronaria, ACV hemorrágico y no hemorrágico y procedimiento de revascularización). Esto corresponde a una reducción del riesgo relativo del 16% (p= 0,001) (Ver Figura 1).

De manera similar, 526 de 4.650 (11,3%) pacientes tratados con **VYTORIN** y 619 de 4.620 (13,4%) pacientes tratados con placebo experimentaron un Evento Aterosclerótico Mayor (Definido como Infarto de Miocardio no fatal, muerte coronaria, ACV no hemorrágico y procedimiento de revascularización), correspondiente a una reducción del riesgo relativo del 17% (p=0,002).


El ensayo demostró que el tratamiento con **VYTORIN** 10/20 mg vs. placebo redujo el riesgo de Eventos Vasculares Mayores y Eventos Ateroscleróticos Mayores en esta población con Enfermedad Renal Crónica.

  
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Nerone**  
Apoderado

20

  
MERCK SHARP & DOHME ARG. INC.  
Fabr. Sebastián Darío Goldentur  
DIRECTOR TÉCNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436

**Figura 1:** Efecto de Ezetimibe combinado con Simvastatina sobre el punto final primario de Riesgo de Eventos Vasculares Mayores.



Los componentes individuales de los Eventos Vasculares Mayores en todos los pacientes aleatorizados se presentan en la Tabla 1. **VYTORIN** redujo significativamente el riesgo de infarto y cualquier revascularización, con diferencias numéricas no significativas favoreciendo a **VYTORIN** frente a infartos de miocardio y muerte coronaria.

**Tabla 1:** Eventos Vasculares Mayores por grupo de tratamiento en todos los pacientes aleatorizados en SHARP.

<u>Resultado</u>	VYTORIN 10/20 mg (N=4.650)	Placebo (N=4.620)	Relación de Riesgo (IC = 95%)	Valor p
Eventos Vasculares Mayores	701 (15.1%)	814 (17.6%)	0.85 (0.77-0.94)	0.001
Infarto de Miocardio No Fatal	134 (2.9%)	159 (3.4%)	0.84 (0.66-1.05)	0.12
Muerte coronaria	253 (5.4%)	272 (5.9%)	0.93 (0.78-1.10)	0.38
ACV	171 (3.7%)	210 (4.5%)	0.81 (0.66-0.99)	0.038
ACV No hemorrágico	131 (2.8%)	174 (3.8%)	0.75 (0.60-0.94)	0.011
ACV Hemorrágico	45 (1.0%)	37 (0.8%)	1.21 (0.78-1.86)	0.40
Revascularización	284 (6.1%)	352 (7.6%)	0.79 (0.68-0.93)	0.004
Eventos Ateroscleróticos Mayores	526 (11.3%)	619 (13.4%)	0.83 (0.74-0.94)	0.002

**SOBREDOSIFICACIÓN:**

**VYTORIN:**

No se puede recomendar un tratamiento específico para la sobredosis con **VYTORIN**. En caso de sobredosis deben emplearse medidas sintomáticas y de sostén. En los estudios de toxicidad oral aguda en ratones y ratas la

Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Néron**  
Apoderado

MERCK SHARP & DOHME ARG. INC  
Farm. Sebastián Darío Goldentul  
DIRECTOR TÉCNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436

coadministración de ezetimibe (1.000 mg/kg) y simvastatina (1.000 mg/kg) fue bien tolerada. No se observaron signos clínicos de toxicidad en estos animales. La dosis letal 50 (DL<sub>50</sub>) oral estimada para ambas especies fue ezetimibe  $\geq 1.000$  mg/kg / simvastatina  $\geq 1.000$  mg/kg.

*Ezetimibe:*

En los estudios clínicos, la administración de ezetimibe 50 mg/día a 15 sujetos sanos durante un máximo de 14 días, de 40 mg/día a 18 pacientes con hipercolesterolemia primaria durante un máximo de 56 días y de 40 mg/día a 27 pacientes con sitosterolemia homocigótica por 26 semanas, por lo general fue bien tolerada.

Se informaron unos pocos casos de sobredosis; la mayoría no estuvo asociada con reacciones adversas. Las experiencias adversas informadas no fueron graves.

*Simvastatina:*

Se comunicaron unos pocos casos de sobredosificación; la dosis máxima recibida fue 3,6 g. Todos los pacientes se recuperaron sin secuelas.

**ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN, CONCURRIR AL HOSPITAL MÁS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS SIGUIENTES CENTROS TOXICOLÓGICOS:**

**HOSPITAL DE PEDIATRÍA RICARDO GUTIÉRREZ: (011) 4962-6666/2247 – 0800-444-8694**

**HOSPITAL A. POSADAS: (011) 4654-6648/4658-7777**

**PRESENTACIONES:**

**VYTORIN® 10/10, 10/20, 10/40 y 10/80 mg** se presenta en envases conteniendo 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50 y 60 comprimidos.

**CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:** MANTENER EL ENVASE CERRADO Y PROTEGIDO DE LA LUZ, A TEMPERATURA POR DEBAJO DE LOS 30°C.


**“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**ESTE MEDICAMENTO DEBE SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA. INFORMACIÓN DETALLADA Y COMPLETA SOBRE INDICACIONES, POSOLOGÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES Y EFECTOS COLATERALES SE HALLA DISPONIBLE A SOLICITUD DEL MÉDICO.**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 51.685

Última revisión ANMAT:

  
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Nerone**  
Apoderado

**NOMBRE Y TÍTULO DEL DIRECTOR TÉCNICO:** Sebastián Darío Goldentul – Farmacéutico

**IMPORTADO Y COMERCIALIZADO POR:**  
**MERCK SHARP & DOHME (ARGENTINA) INC.**

Avda. Del Libertador 1410 – Vicente López – Prov. de Buenos Aires

**ELABORADO POR:**

**MSD TECHNOLOGY SINGAPORE PTE LTD.**

21, Tuas South Avenue 6,  
SINGAPORE 637766, Singapur

**ELABORADO POR:**

**MERCK SHARP & DOHME (Italia) S.p.A.**

Via Emilia 21,  
27100 Pavia, Italia

**WPC- MK0653A-T-10201**

**INFORMACIÓN SOBRE VYTORIN® PARA EL PACIENTE**

Por favor lea este prospecto minuciosamente antes de empezar a tomar su medicamento, aunque haya repetido la receta. Puede haber cambiado alguna información respecto al prospecto previo. Ud. debe leer asimismo cualquier información suministrada con los otros medicamentos que esté tomando en la actualidad.

Recuerde que su médico le recetó este medicamento sólo para Ud. Nunca se lo dé a otra persona.

**¿Qué es VYTORIN?**

VYTORIN (ezetimibe/ simvastatina) es un comprimido que se encuentra disponible en cuatro concentraciones:

- VYTORIN 10/ 10 (ezetimibe 10 mg/ simvastatina 10 mg)
- VYTORIN 10/ 20 (ezetimibe 10 mg/ simvastatina 20 mg)
- VYTORIN 10/ 40 (ezetimibe 10 mg/ simvastatina 40 mg)
- VYTORIN 10/ 80 (ezetimibe 10 mg/ simvastatina 80 mg)

Además, VYTORIN contiene los siguientes ingredientes inactivos: lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, hidroxipropilmetilcelulosa 2910, croscarmellosa sódica, ácido cítrico monohidrato, butilhidroxianisol, galato de propilo, estearato de magnesio, c.s.

VYTORIN es un medicamento que se emplea para reducir los niveles en sangre de colesterol total, colesterol LDL (el malo), y sustancias grasas denominadas triglicéridos. Además, VYTORIN eleva los niveles de colesterol HDL (el

Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Nerpne**  
Apoderado

23

**MERCK SHARP & DOHME ARG. INC.**  
Farm. Sebastián Darío Goldentul  
DIRECTOR TÉCNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436

bueno). VYTORIN es para adultos y adolescentes (de 10 a 17 años) que no pueden controlar sus niveles de colesterol sólo con la dieta. Mientras tome este medicamento debe seguir una dieta reductora del colesterol.

VYTORIN también es para los pacientes que tengan una afección por la cual los riñones no funcionen adecuadamente. Las personas que tengan dicha afección se encuentran ante un mayor riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares, y ciertos tipos de cirugía cardíaca. VYTORIN demostró reducir tal riesgo.

Además de la dieta, los adultos pueden tomar VYTORIN solo o con fenofibratos, otro medicamento reductor del colesterol.

### ¿Cómo actúa VYTORIN?

VYTORIN actúa reduciendo su colesterol de dos formas. Reduce el colesterol absorbido en su tracto digestivo, como así también el colesterol que su organismo genera por sí mismo. VYTORIN no le ayuda a bajar de peso.

VYTORIN se suma al efecto reductor del colesterol del fenofibrato.

### ¿Por qué mi médico me recetó VYTORIN?

Su médico le recetó VYTORIN para reducir la cantidad de colesterol y triglicéridos en su sangre. El colesterol es una de las diferentes sustancias grasas que se hallan en el torrente sanguíneo. Su colesterol total está formado, principalmente, por colesterol LDL y HDL.

El colesterol LDL a menudo se denomina colesterol "malo" porque se puede acumular en las paredes de sus arterias y formar placa. Finalmente dicha acumulación de placa puede conducir a un estrechamiento de las arterias. Tal estrechamiento puede hacer más lento o bloquear el flujo sanguíneo hacia órganos vitales como el corazón y el cerebro. Tal bloqueo del flujo sanguíneo puede generar un infarto o un accidente cerebrovascular.


El colesterol HDL a menudo se denomina colesterol "bueno" porque ayuda a evitar que el colesterol malo se acumule en las arterias y porque protege contra las enfermedades cardíacas.

Los triglicéridos son otra forma de grasa que se encuentra en la sangre, y que puede aumentar su riesgo para contraer enfermedades cardíacas.

### ¿Cómo se puede tratar el colesterol alto?

El colesterol alto puede ser tratado de dos maneras principales:

**Cambios en el estilo de vida** - lo cual incluye una dieta reductora del colesterol, mayor actividad física, y manejo del peso.

  
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Neroni**  
Apoderado

  
MERCK SHARP & DOHME ARG. INC.  
Farm. Sebastián Darío Goldenti  
DIRECTOR TÉCNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436

**Medicación** - Los medicamentos reductores del colesterol se utilizan junto con cambios en el estilo de vida para ayudar a disminuir el colesterol. Su médico le recetó VYTORIN para ayudarlo a reducir el colesterol.

**¿Qué es lo que debo saber antes de tomar VYTORIN y durante el tratamiento?**

Es importante que continúe tomando VYTORIN diariamente tal como se lo recetó su médico.

Aunque Ud. tome una medicación para tratar el colesterol alto, es importante que se haga medir el colesterol en forma regular. Ud. debe saber también sus niveles y metas para el colesterol.

Uso en personas de edad avanzada

No existen precauciones especiales.

Uso en niños

VYTORIN no se recomienda en niños de menos de 10 años.

**¿Quién no debe tomar VYTORIN?**

Los pacientes que:

- son hipersensibles (alérgicos) a ezetimibe, simvastatina, o cualquiera de los demás ingredientes de los comprimidos de VYTORIN
- tienen una enfermedad hepática activa
- están embarazadas o amamantan
- toman cualquiera de los medicamentos siguientes:
  - ciertos medicamentos antimicóticos (como ser itraconazol, ketoconazol, posaconazol, o voriconazol)
  - inhibidores de la proteasa del HIV (como indinavir, nelfinavir, ritonavir, y saquinavir)
  - ciertos inhibidores de la proteasa del virus de la hepatitis C (como boceprevir o telaprevir)
  - ciertos antibióticos (como eritromicina, claritromicina, o telitromicina)
  - el antidepresivo nefazodona
  - gemfibrozilo (un medicamento a base de ácido fibrótico para reducir el colesterol)
  - ciclosporina
  - danazol


Consulte a su médico si Ud. no está seguro si su medicamento se encuentra enumerado en esta lista.


**¿Qué debo decirle a mi médico (o farmacéutico) antes de tomar VYTORIN (o mientras lo uso)?**

Informe a su médico sobre:

Embarazo: No utilice VYTORIN si está embarazada, trata de quedar embarazada, o sospecha que está embarazada. Si mientras toma VYTORIN Ud. queda embarazada, deje de tomar el medicamento y póngase en contacto de inmediato con su médico.

Lactancia: No utilice VYTORIN si amamanta.

  
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Narone**  
Apoderado

  
MERCK SHARP & DOHME ARG. INC.  
Farm. Sebastián Darío Goldent  
DIRECTOR TÉCNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436

Otros medicamentos: Infórmele de cualquier otro medicamento que tome o planea tomar. Incluya los que toma sin receta.

Problemas médicos o alergias: Infórmele sobre cualquier problema médico (inclusive una enfermedad hepática o problemas hepáticos) o alergia que tenga o haya tenido antes.

Informe a su médico si toma cantidades sustanciales de alcohol o tiene antecedentes de una enfermedad hepática en el pasado.

**Tome contacto con su médico con prontitud si sufre dolor, sensibilidad o debilidad muscular sin explicación. Es porque, en raras ocasiones, los problemas musculares pueden ser serios e incluir colapso muscular, cuyo resultado es daño renal que puede conducir a la muerte.**


- El riesgo de colapso muscular es mayor a las dosis más altas de VYTORIN, particularmente a la dosis de 10/80 mg.
- El riesgo de colapso muscular también es mayor para pacientes añosos (65 años y mayores), pacientes femeninas, pacientes con problemas renales y pacientes con problemas tiroideos.

**¿Puedo tomar VYTORIN con otros medicamentos o sustancias?**

Dado que tomar VYTORIN con cualquiera de los fármacos o sustancias siguientes puede aumentar el riesgo de problemas musculares (consulte "¿Cuáles efectos no deseados puede tener VYTORIN?"), resulta particularmente importante que informe a su médico si toma:

- agentes antimicóticos (como itraconazol, posaconazol, ketoconazol, o voriconazol)
- inhibidores de la proteasa del HIV (como indinavir, nelfinavir, ritonavir, y saquinavir)
- boceprevir o telaprevir (medicamentos utilizados para tratar la infección por el virus de la hepatitis C)
- antibióticos como eritromicina, claritromicina, telitromicina y ácido fusídico.
- el antidepresivo nefazodona
- ciclosporina
- danazol
- derivados del ácido fíbrico (como gemfibrozilo y bezafibrato)
- amiodarona (un medicamento empleado para el tratamiento de los latidos cardiacos irregulares)
- verapamilo, diltiazem, o amlodipina (medicamentos empleados para tratar la hipertensión, la angina, u otras afecciones cardiacas)
- jugo de pomelo (debe evitar tomarlo mientras tome VYTORIN)

También resulta importante que informe a su médico si toma anticoagulantes (medicamentos que evitan la formación de coágulos en la sangre, como warfarina, fenprocumon o acenocumarol), colchicina (una medicación utilizada para la

  
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Nerone**  
Apoderado

  
MERCK SHARP & DOHME ARG. INC  
Farm. Sebastián Darío Goldentú  
DIRECTOR TÉCNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436

gota), niacina, o fenofibrato, otro derivado del ácido fíbrico. Asimismo, informe a su médico si toma niacina o un producto que contiene niacina, y si Ud. es de origen chino.

Algunos de estos medicamentos han sido enumerados en la sección anterior **¿Quién no debe tomar VYTORIN?**

Ud. siempre debe informar a su médico sobre cualquier medicación que tome o planea tomar, inclusive las que tome sin receta médica. También debe informar a cualquier médico que le prescriba una medicación nueva que está tomando VYTORIN.

**¿Puedo manejar u operar maquinaria mientras uso VYTORIN?**

Con VYTORIN se informaron efectos colaterales que pueden afectar su capacidad para manejar un automóvil u operar maquinaria. Las respuestas individuales a VYTORIN pueden variar. (Consulte la sección ¿Qué efectos no deseados puede tener VYTORIN?)


**¿Cómo debo tomar VYTORIN?**

- Adultos: Tome un comprimido de VYTORIN 10/10, 10/20, 10/40 o 10/80 por vía oral diariamente, a la noche.
- Dado el aumento del riesgo de problemas musculares, el comprimido 10/80 de VYTORIN sólo es para pacientes que se encuentran ante un gran riesgo de presentar problemas cardíacos, que no alcanzaron su meta de colesterol a dosis más bajas.
- Adolescentes (10 a 17 años): Tome un comprimido de VYTORIN 10/10, 10/20 o 10/40 por vía oral diariamente, a la noche.
- Tome VYTORIN con o sin alimentos.
- Su médico puede indicarle que tome VYTORIN junto con otro medicamento conocido como fenofibrato, para ayudarlo a controlar mejor su colesterol. Si Ud. está tomando fenofibrato, VYTORIN se puede tomar al mismo tiempo que el fenofibrato.
- Si su médico le recetó VYTORIN junto con colestiramina (un secuestrante del ácido biliar), o cualquier otro secuestrante del ácido biliar, VYTORIN se debe tomar al menos 2 horas antes o 4 horas después de tomar el secuestrante del ácido biliar.
- VYTORIN se debe tomar tal como le indicó su profesional de la salud. Salvo que su médico le indique suspenderlos, continúe tomando sus otros medicamentos reductores del colesterol.

**¿Qué debo hacer si tomo más VYTORIN de lo debido?**

Tome VYTORIN únicamente como se lo recetó el médico. Si toma más VYTORIN que la recetada, tome contacto con su médico o farmacéutico.

**¿Qué debo hacer si omito una dosis?**

  
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Nerone**  
Apoderado

27 

  
MERCK SHARP & DOHME ARG. INC.  
Farm. Sebastián Darío Goidenti  
DIRECTOR TÉCNICO  
MATRICULA NACIONAL 1543F



Trate de tomar VYTORIN como se lo recetaron. Sin embargo, si omite una dosis, simplemente retome el cronograma habitual de un comprimido diario.

**¿Qué efectos no deseados puede tener VYTORIN?**

En estudios clínicos, VYTORIN resultó generalmente bien tolerado. Los efectos colaterales generalmente fueron leves, temporarios, y similares en tipo y frecuencia a los efectos colaterales registrados en pacientes que recibían ezetimibe solo o simvastatina sola (consulte la sección ¿Qué debo decirle a mi médico (o farmacéutico) antes de tomar VYTORIN (o mientras lo uso)?

Se informaron los siguientes efectos colaterales comunes: dolores musculares, elevaciones en los análisis de sangre de laboratorio de la función hepática (transaminasas) y/o muscular (creatinaquinasa).

Se informaron los siguientes efectos colaterales poco comunes: elevaciones en los análisis de sangre de la función hepática, elevaciones en el nivel de ácido úrico en sangre, elevaciones en el tiempo de coagulación de la sangre, proteínas en orina, disminución del peso, mareos, cefaleas, sensación de hormigueo, dolor abdominal, indigestión, flatulencia, náuseas, vómitos, hinchazón abdominal, diarrea, boca seca, pirosis, exantema, comezón, urticaria, dolor articular, dolor, sensibilidad, debilidad, o espasmos musculares, dolor de cuello, dolor en brazos y piernas, dorsalgia, cansancio o debilidad inusual, sensación de cansancio, dolor de pecho, inflamación, especialmente en manos y pies, trastornos del sueño, y problemas para dormir.


En forma adicional, se informaron los siguientes efectos colaterales en el uso general, ya sea con los comprimidos de VYTORIN, ezetimibe, o simvastatina (comprimidos que contienen los ingredientes activos de VYTORIN):

- reacciones alérgicas, incluso inflamación facial, labial, de la lengua y/o la garganta que puede causar dificultades para respirar o tragar (lo cual puede exigir tratamiento inmediato), exantema, y urticaria, exantema rojo sobreelevado, algunas veces con lesiones con forma de blanco de tiro, dolor, sensibilidad, o debilidad muscular (que en casos muy excepcionales pueden no desaparecer luego de suspender VYTORIN), alteraciones en algunos de los análisis de sangre de laboratorio, problemas hepáticos (algunas veces serios), inflamación del páncreas, constipación, depresión, cálculos vesiculares, inflamación de la vesícula, mala memoria, pérdida de la memoria, confusión, disfunción eréctil, problemas al respirar, los cuales incluyen tos persistente y/o falta de aire, o fiebre.

Consulte a su médico toda vez que tenga un problema médico que cree está relacionado con VYTORIN.


Si se le receta VYTORIN, su profesional médico probablemente desee efectuarle análisis de sangre para verificar su función hepática antes y después de iniciar el tratamiento y si Ud. presenta cualquier síntoma de problemas hepáticos mientras toma VYTORIN. Llame a su médico de inmediato si presenta los síntomas siguientes de problemas hepáticos:

- se siente cansado o débil
- pérdida del apetito

  
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Merone**  
Apoderado

no

  
MERCK SHARP & DOHME ARG. INC.  
Farm. Sebastián Darío Goldentu  
DIRECTOR TECNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436



- dolor abdominal superior
- orina oscura
- piel amarillenta o blanco del ojo amarillento

**¿Cómo puedo aprender más sobre VYTORIN y mi afección?**

Puede obtener información adicional de su médico o farmacéutico.

**¿Por cuánto tiempo debo guardar mi medicación?**

No use este medicamento después de la fecha que se observa sobre el estuche a continuación de Vencimiento.

**WPPI-MK0653A-T-102012**

  
Merck Sharp & Dohme (Argentina) Inc.  
**José Nerone**  
Apoderado

  
MERCK SHARP & DOHME ARG. INC  
Farm. Sebastián Darío Goldent  
DIRECTOR TÉCNICO  
MATRICULA NACIONAL 15436