



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.7.*

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

DISPOSICIÓN N° **3 1 3 8**

BUENOS AIRES, **22 ABR 2015**

VISTO el Expediente N° 1-0047-0000-002104-15-4 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C.F., solicita la aprobación de nuevos proyectos de prospectos e información para el paciente para la Especialidad Medicinal denominada PIOGLIT / PIOGLITAZONA, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS, PIOGLITAZONA 15 mg – 30 mg – 45 mg, aprobada por Certificado N° 48.581.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición N°: 5904/96 y Circular N° 4/13.

Que los procedimientos para las modificaciones y/o rectificaciones de los datos característicos correspondientes a un certificado de Especialidad Medicinal otorgado en los términos de la Disposición ANMAT N° 5755/96, se encuentran establecidos en la Disposición ANMAT N° 6077/97.



*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A. 7.*

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

DISPOSICIÓN N° **3138**

Que a fojas 157 obra el informe técnico favorable de la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros.: 1.490/92 y 1886/14.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. - Autorízase el cambio de prospectos e información para el paciente presentado para la Especialidad Medicinal denominada PIOGLIT / PIOGLITAZONA, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS, PIOGLITAZONA 15 mg - 30 mg - 45 mg, aprobada por Certificado N° 48.581 y Disposición N° 1696/00, propiedad de la firma LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C.F., cuyos textos constan de fojas 39 a 77, para los prospectos, y de fojas 79 a 96, para la información para el paciente.

ARTICULO 2º. - Sustitúyase en el Anexo II de la Disposición autorizante ANMAT N° 1696/00 los prospectos autorizados por las fojas 39 a 51 y la información para el paciente autorizada por las fojas 79 a 84, de las aprobadas en el artículo 1º, los que integrarán el Anexo de la presente.



"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° **3 1 3 8**

ARTICULO 3°. - Acéptase el texto del Anexo de Autorización de modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado N° 48.581 en los términos de la Disposición ANMAT N° 6077/97.

ARTICULO 4°. - Regístrese; por mesa de entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la copia autenticada de la presente disposición conjuntamente con los prospectos e información para el paciente, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de adjuntar al legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-0047-0000-002104-15-4

DISPOSICIÓN N° **3 1 3 8**

Jfs



Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.7.

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **3138** a los efectos de su anexo en el Certificado de Autorización de Especialidad Medicinal N° 48.581 y de acuerdo a lo solicitado por la firma LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C.F., del producto inscripto en el registro de Especialidades Medicinales (REM) bajo:

Nombre comercial / Genérico/s: PIOGLIT / PIOGLITAZONA, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS, PIOGLITAZONA 15 mg - 30 mg - 45 mg.

Disposición Autorizante de la Especialidad Medicinal N° 1696/00.

Tramitado por expediente N° 1-47-0000-012163-99-9.

DATO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION AUTORIZADA
Prospectos de información para el paciente.	e Anexo de Disposición N° 5246/13.	Prospectos de fs. 39 a 77, corresponde desglosar de fs. 39 a 51. Información para el paciente de fs. 79 a 96, corresponde desglosar de fs. 79 a 84.

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.



"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del REM a la firma LABORATORIOS PHOENIX S.A.I.C.F., Titular del Certificado de Autorización N° 48.581 en la Ciudad de Buenos Aires, a los días.....,del mes de....**22 ABR 2015**

Expediente N° 1-0047-0000-002104-15-4

DISPOSICIÓN N°

3138

Jfs


Ing. ROGELIO LOPEZ
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



PROYECTO DE PROSPECTO

PIOGLIT PIOGLITAZONA Comprimidos

Industria Argentina
Venta bajo receta

Fórmula

Cada comprimido de PIOGLIT 15 mg contiene:

Pioglitazona clorhidrato (equivalente a 15 mg de Pioglitazona base) 16,54 mg.

Excipientes: lactosa monohidrato 96,16 mg, klucel LF 3,60 mg, croscarmelosa sódica 2,50 mg, estearato de magnesio 1,20 mg.

Cada comprimido PIOGLIT 30 mg contiene:

Pioglitazona clorhidrato (equivalente a 30 mg de Pioglitazona base) 33,07 mg.

Excipientes: lactosa monohidrato 108,63 mg, klucel LF 3,60 mg, croscarmelosa sódica 3,50 mg, estearato de magnesio 1,20 mg.

Cada comprimido PIOGLIT 45 mg contiene:

Pioglitazona clorhidrato (equivalente a 45 mg de Pioglitazona base) 49,61 mg.

Excipientes: lactosa monohidrato 119,39 mg, klucel LF 5,40 mg, croscarmelosa sódica 3,80 mg, estearato de magnesio 1,80 mg.

Acción terapéutica

Pioglitazona es un antidiabético oral que actúa principalmente disminuyendo la resistencia a la insulina. Se utiliza para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 (también conocida como diabetes mellitus no insulino dependiente (DMNID), o como diabetes del adulto). Según indican los estudios farmacológicos, pioglitazona aumenta la sensibilidad a la insulina en el músculo y el tejido adiposo, e inhibe la gluconeogénesis hepática. Mejora el control de la glucemia y, a la vez, reduce los niveles de insulina circulante.

Código ATC: A10BG03.

Indicaciones

La pioglitazona está indicada como tratamiento de segunda o tercera elección de la diabetes mellitus tipo 2:

Como monoterapia:

En pacientes adultos (particularmente pacientes con sobrepeso) inadecuadamente controlados con dieta y ejercicio y para quienes la metformina es inapropiada por sus contraindicaciones o intolerancia.

Como tratamiento dual en combinación con:

Metformina, en pacientes adultos (particularmente en pacientes con sobrepeso) con insuficiente control glucémico a pesar de la dosis máxima tolerada de *metformina* como monoterapia.

Laboratorios Phoenix S.A. ICF
Victoria Carolina Martínez
Calle Comercio 15239



Una sulfonilurea, sólo en pacientes adultos quienes mostraron intolerancia a la metformina o en quienes la metformina está contraindicada, con insuficiente control glucémico a pesar de la dosis máxima tolerada de una sulfonilurea como monoterapia.

Como triple terapia oral en combinación con:

Metformina y una sulfonilurea, en pacientes adultos (particularmente pacientes con sobrepeso) con insuficiente control glucémico a pesar de la terapia dual oral.

En combinación con insulina

Pioglitazona está también indicada en combinación con insulina en pacientes adultos con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 con insuficiente control glucémico con insulina, para los cuales la metformina es inapropiada debido a que está contraindicada o es intolerada.

Una vez iniciado el tratamiento con pioglitazona, se debe controlar a los pacientes después de 3 a 6 meses para evaluar si la respuesta al tratamiento fue adecuada (por ejemplo: reducción de la HbA1c). En pacientes que no presenten una respuesta adecuada, debe interrumpirse la administración de pioglitazona. Dados los posibles riesgos de un tratamiento prolongado, los médicos que prescriben deben confirmar, en controles de rutina posteriores, que el beneficio de la pioglitazona se mantenga (ver *Advertencias y precauciones*).

Propiedades farmacológicas

Acción farmacológica

Los efectos de la pioglitazona pueden estar mediados por una reducción de la resistencia a la insulina. La pioglitazona parece actuar mediante la activación de receptores nucleares específicos (receptor gamma activado por un proliferador de peroxisomas) llevando a un aumento de la sensibilidad de la insulina en el hígado, tejido adiposo y músculo esquelético en animales. El tratamiento con pioglitazona ha mostrado reducir la producción de glucosa hepática y aumentar la eliminación de glucosa periférica en casos de insulinoresistencia. En pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 mejora el control glucémico en ayunas y postprandial. Esta mejora en el control glucémico está asociado con una reducción en la concentración de insulina tanto en ayunas como postprandial.

Farmacocinética

Absorción

Luego de la administración oral, la pioglitazona es rápidamente absorbida, y el pico plasmático de concentración de pioglitazona inalterada se alcanza usualmente a las 2 horas posteriores a la administración. Se observaron aumentos proporcionales de la concentración plasmática para dosis de 2 mg - 60 mg. El estado estacionario es alcanzado tras 4 - 7 días de iniciado el tratamiento. La administración repetida no resulta en la acumulación de los componentes o de sus metabolitos. La absorción no es influenciada por la ingesta de comida. La biodisponibilidad absoluta es mayor al 80%.

Distribución

El volumen estimado de distribución en humanos es 0,25 l/kg.

Pioglitazona y todos sus metabolitos activos se unen extensamente a las proteínas plasmáticas (>99%).

Laboratorio Phoenix S. de C.V.
Victoria Carolina Martínez
Co. Directora Técnica M.P. 19239

3 1 3 8
PHOENIX



Metabolismo

La pioglitazona es sometida a un extenso metabolismo hepático mediante hidroxilación de los grupos metileno alifáticos. Se metaboliza predominantemente vía citocromo P450 2C8 aunque otras isoformas pueden estar involucradas en menor grado. Tres de los seis metabolitos identificados son activos (M-II, M-III y M-IV). Cuando se toma en cuenta la actividad, concentración y unión a proteínas, la pioglitazona y el metabolito M-III contribuyen de igual manera a la eficacia. Sobre esta base, la contribución a la eficacia de M-IV es aproximadamente tres veces la de pioglitazona, mientras que la relativa eficacia de M-II es mínima.

Estudios *in vitro* no han mostrado evidencia de que la pioglitazona inhiba algún subtipo del citocromo P450. En hombres no hay inducción de las principales isoenzimas inducibles del citocromo P450 1A, 2C8/9, y 3A4 en hombres.

Estudios de interacción han mostrado que la pioglitazona no tiene efectos relevantes ni en la farmacocinética ni en la farmacodinamia de la digoxina, warfarina, fenprocumona y metformina. La administración concomitante de pioglitazona con gemfibrozilo (un inhibidor del citocromo P450 2C8) o con rifampicina (un inductor del citocromo P450 2C8) aumenta o disminuye, respectivamente, la concentración plasmática de pioglitazona.

Eliminación

Luego de la administración oral de pioglitazona radiomarcada a hombres, la mayor parte de la dosis marcada se recuperó principalmente en las heces (55%) y menor cantidad en la orina (45%). En animales, solo una pequeña cantidad de pioglitazona inalterada puede detectarse en orina o en heces. La vida media de eliminación de la pioglitazona inalterada en hombres es de 5 a 6 horas y para sus metabolitos activos totales es de 16 a 23 horas.

Características en grupos especiales de pacientes

Ancianos

El estado estacionario es similar en pacientes de 65 años o más y en sujetos jóvenes.

Pacientes con insuficiencia renal

En pacientes con insuficiencia renal, las concentraciones plasmáticas de pioglitazona y sus metabolitos son más bajas que en aquellas observadas en sujetos con función renal normal, pero el clearance oral de la sustancia original es similar. Por ende, la concentración de pioglitazona libre (no unida a proteínas) no cambia.

Pacientes con insuficiencia hepática

La concentración plasmática total no se modifica, pero aumenta el volumen de distribución. Por consiguiente el clearance intrínseco disminuye, junto con una mayor fracción de pioglitazona no unida a proteínas.

Posología y modo de administración

El tratamiento puede iniciarse con 15 ó 30 mg una vez al día. La dosis puede aumentarse progresivamente, hasta un máximo de 45 mg una vez al día.

En combinación con insulina, la dosis actual de insulina puede mantenerse al iniciar el tratamiento con pioglitazona.

Si los pacientes experimentan hipoglucemia, la dosis de insulina debe disminuirse.

Laboratorios Phoenix S.A.I.C.F.
Victoria Carolina Martínez
Co-Ordinadora Técnica / M.P. 15239



Poblaciones especiales

Ancianos

No se necesita ajuste de dosis en pacientes ancianos. Los médicos deben iniciar el tratamiento con la dosis más baja disponible y aumentar la dosis gradualmente, en particular, cuando la pioglitazona se usa en combinación con insulina (ver *Advertencias y precauciones*).

Insuficiencia renal

No se necesita ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal (clearance de creatinina > 4 ml/min). No hay información disponible en pacientes sometidos a diálisis por lo tanto no se debe administrar pioglitazona en dichos pacientes.

Insuficiencia hepática

Pioglitazona no se debe administrar en pacientes con insuficiencia hepática.

Población pediátrica

No se ha establecido la seguridad y eficacia en niños y adolescentes menores de 18 años. No hay datos disponibles.

Método de administración

Los comprimidos de pioglitazona deben ingerirse una vez al día con o sin alimentos. Los comprimidos se deben tomar con un vaso de agua.

Contraindicaciones

Pioglitazona está contraindicada en pacientes con:

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de sus excipientes.

Insuficiencia cardíaca o antecedentes de insuficiencia cardíaca (clases I a IV según NYHA).

Insuficiencia hepática.

Cetoacidosis diabética.

Cáncer de vejiga en curso o antecedentes de cáncer de vejiga.

Hematuria macroscópica no investigada.


Advertencias y precauciones

Retención de líquidos e insuficiencia cardíaca

Pioglitazona puede ocasionar retención de líquidos, la cual puede exacerbar o precipitar insuficiencia cardíaca. Cuando se trata con pioglitazona a pacientes con al menos un factor de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca congestiva (por ejemplo: infarto de miocardio previo o enfermedad coronaria sintomática o en los ancianos), los médicos tratantes deben iniciar el tratamiento con la dosis más baja disponible y luego aumentarla gradualmente. Los pacientes deben ser monitoreados continuamente en busca de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, ganancia de peso, disnea o edema, particularmente aquellos con baja reserva cardíaca; luego del inicio de la terapia y/o al aumentar la dosis. En caso que se presenten estos síntomas, deben recibir el manejo adecuado para la insuficiencia cardíaca. Deberá considerarse la reducción de la dosis y/o la suspensión de la droga.

Hubieron reportes poscomercialización de casos de insuficiencia cardíaca durante la administración de pioglitazona en combinación con insulina o en pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca. Se debe monitorear continuamente a los pacientes bajo tratamiento combinado de pioglitazona e insulina, en busca de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, ganancia de peso y edema. Dado que tanto la insulina como la pioglitazona se asocian a retención de líquidos, la administración concomitante de ambas puede aumentar el riesgo de edema. Después de la comercialización también se reportaron casos de edema periférico e insuficiencia cardíaca con el

Laboratorios Phoenix SAICF
Victoria Carolina Martínez
Co-Directora Técnica M.P. 12239



uso concomitante de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) incluyendo inhibidores selectivos de la COX-2. Debe discontinuarse la administración de pioglitazona si se deteriora la función cardíaca. Se ha realizado un estudio en el que se valoraron variables cardiovasculares en pacientes menores de 75 años con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad macrovascular mayor preexistente. Se añadió pioglitazona o placebo al tratamiento de base durante 3,5 años. Este estudio mostró un aumento de casos de insuficiencia cardíaca, sin embargo no se evidenció un aumento en la tasa de mortalidad.

Ancianos

El uso combinado con insulina debe considerarse con precaución en pacientes de edad avanzada, dado el aumento del riesgo de insuficiencia cardíaca seria.

Dados los riesgos relacionados con la edad (especialmente, cáncer de vejiga, fracturas e insuficiencia cardíaca), se deben evaluar minuciosamente los riesgos y beneficios, tanto antes como durante el tratamiento en pacientes de edad avanzada.

Cáncer de vejiga

En un metanálisis de estudios clínicos controlados con pioglitazona, se observaron más frecuentemente, casos de cáncer de vejiga, comparado con el grupo control.

Después de excluir a los pacientes en quienes la exposición al fármaco del estudio era inferior a un año en el momento del diagnóstico de cáncer de vejiga, hubo 7 casos en los grupos de pioglitazona y 2 casos en los grupos de control. Los datos epidemiológicos disponibles también sugieren la existencia de un pequeño aumento del riesgo de cáncer de vejiga en pacientes diabéticos tratados con pioglitazona, en particular, en los pacientes tratados durante los períodos más extensos y con las dosis acumulativas más altas. No puede excluirse la posibilidad de cierto riesgo después del tratamiento a corto plazo.

Antes de iniciar el tratamiento con pioglitazona, se deben evaluar los factores de riesgo de cáncer de vejiga (entre los riesgos se incluyen la edad, los antecedentes de tabaquismo y la exposición a ciertos agentes ocupacionales o quimioterapéuticos por ejemplo, las ciclofosfamidias o un tratamiento previo con radioterapia en la región pélvica). Se debe investigar toda hematuria macroscópica antes de comenzar el tratamiento con pioglitazona.

Se debe aconsejar a los pacientes que busquen de inmediato atención médica si, durante el tratamiento, desarrollan síntomas de hematuria macroscópica u otros síntomas, como disuria o urgencia urinaria.

Monitoreo de la función hepática

Hubieron raros reportes de disfunción hepatocelular durante la experiencia poscomercialización. Por lo tanto, se recomienda someter a los pacientes bajo tratamiento con pioglitazona a un monitoreo periódico de enzimas hepáticas. Las enzimas hepáticas deben analizarse en todos los pacientes antes de iniciar el tratamiento con pioglitazona. El tratamiento con pioglitazona no debe iniciarse en pacientes con las enzimas hepáticas aumentadas (ALT > 2,5 veces por encima del límite normal) o con cualquier otra evidencia de enfermedad hepática.

Luego del inicio del tratamiento con pioglitazona, se recomienda que, basado en el juicio clínico, se monitoreen periódicamente las enzimas hepáticas. Si los niveles de ALT (alanina aminotransferasa) se elevan 3 veces por encima del límite superior normal durante el tratamiento con pioglitazona, deben reevaluarse las enzimas hepáticas a la brevedad. Si los niveles de ALT permanecen 3 veces por encima del límite superior normal, el tratamiento debe discontinuarse. Si algún paciente desarrolla síntomas que sugieren disfunción hepática, que puede incluir náuseas inexplicables,

Laboratorios Phoenix SAICF
Victoria Carolina Martínez
C. - Dirección Técnica / M.P. 15239



vómitos, dolor abdominal, fatiga, anorexia y/u orina oscura, deben medirse los niveles de enzimas hepáticas. La decisión de continuar o no con el tratamiento con pioglitazona en estos pacientes debe ser guiado por el criterio médico en espera de los resultados de laboratorio. Si se observa ictericia, debe discontinuarse el tratamiento con pioglitazona.

Ganancia de peso

En estudios clínicos con pioglitazona hubo evidencia de aumento de peso relacionada con la dosis, la cual puede deberse a una acumulación de grasa y en algunos casos asociada a retención de líquidos. En algunos casos el aumento de peso puede ser un síntoma de insuficiencia cardiaca, por lo tanto el peso debe ser estrictamente monitoreado. Parte del tratamiento de la diabetes es el control de la dieta. Se debe recomendar a los pacientes que se adhieran estrictamente a una dieta controlada en calorías.

Hematología

Hubo una pequeña reducción en la hemoglobina media (4% de reducción relativa) y hematocrito (4,1% de reducción relativa) durante el tratamiento con pioglitazona, consistente con hemodilución. En estudios comparativos controlados se han visto cambios similares en pacientes tratados con metformina (reducción relativa de hemoglobina de 3-4% y hematocrito de 3,6-4,1%) y en menor grado con sulfonilureas e insulina (reducción relativa de hemoglobina 1-2% y de hematocrito 1-3,2%).

Hipoglucemia

Como consecuencia de un aumento de la sensibilidad a la insulina, los pacientes que reciben pioglitazona en dual o triple terapia oral con sulfonilureas o, en tratamiento combinado con insulina, pueden estar en riesgo de padecer hipoglucemia relacionada con la dosis, y puede ser necesaria una reducción en la dosis de la sulfonilurea o de la insulina.


Alteraciones oculares


Se han reportado durante la poscomercialización la aparición o el agravamiento de edema macular diabético con disminución de la agudeza visual durante el tratamiento con tiazolidinedionas, incluyendo la pioglitazona. Muchos de estos pacientes reportaron edema periférico concomitante. No está claro si existe o no una asociación directa entre la pioglitazona y el edema macular, pero los médicos tratantes deben estar alertas a la posibilidad de aparición de edema macular si los pacientes reportan alteraciones en la agudeza visual; debe considerarse una interconsulta con un especialista en oftalmología.

Otras

Existe un leve aumento del riesgo de padecer cáncer de vejiga en los pacientes que reciben pioglitazona. No deberán recibir pioglitazona: pacientes con antecedentes de cáncer de vejiga o hematuria en la que aún no se diagnostique la causa. Se deberán controlar los pacientes cada 3 a 6 meses y si no hay respuesta terapéutica deberá suspenderse el medicamento. Descartar otros factores de riesgo: edad, tabaco, exposición a fármacos y tóxicos previo al inicio del tratamiento con pioglitazona. En los pacientes añosos considerar la menor dosis efectiva posible.

Se evidenció un aumento en la incidencia de fracturas óseas en mujeres en un análisis conjunto de reacciones adversas de fracturas óseas en un estudio randomizado, controlado y doble ciego.


 Laboratorios Phoenix S.A.I.C.F.
 Victoria Carolina Martínez
 Cc - Directora Técnica / M.P. 19239



Las fracturas se observaron en un 2,6% de mujeres que tomaban pioglitazona comparado con 1,7% de mujeres tratadas con un comparador. No se evidenció un aumento en la frecuencia de fracturas en hombres tratados con pioglitazona (1,3%) versus el comparador (1,5%).

La incidencia de fracturas fue calculada en 1,9 fracturas por cada 100 pacientes mujeres tratadas con pioglitazona y 1,1 fracturas por cada 100 pacientes mujeres tratadas con el comparador. El exceso de riesgo de fracturas observado para mujeres en estos datos es sin embargo 0,8 fracturas por cada 100 pacientes por año de uso.

No se observó un aumento de riesgo de fracturas en hombres tratados con pioglitazona (1,7%) versus el comparador (2,1%).

Estudios epidemiológicos han demostrado un aumento del riesgo de fracturas óseas similar tanto en mujeres como en hombres.

Se debe considerar el riesgo de fracturas en el cuidado a largo plazo de pacientes tratados con pioglitazona.

Como consecuencia de la mejora en la función de la insulina, el tratamiento con pioglitazona en pacientes con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico puede resultar en la reanudación de la ovulación. Estos pacientes pueden estar en riesgo de embarazo. Los pacientes deben estar al tanto de los riesgos de embarazo y si una paciente desea el embarazo o resulta embarazada, el tratamiento debe discontinuarse.

La pioglitazona debe ser usada con precaución durante la administración concomitante de inhibidores del citocromo P450 2C8 (por ejemplo, gemfibrozilo) o con inductores del mismo (por ejemplo, rifampicina). Debe monitorearse de cerca el control glucémico. Debe considerarse el ajuste de dosis de pioglitazona dentro de la posología recomendada o cambios en el tratamiento diabético. Este producto contiene lactosa dentro de sus excipientes y por lo tanto no debe administrarse a pacientes con raros problemas hereditarios de intolerancia a la galactosa, deficiencia de Lapp-lactasa o malabsorción de glucosa-galactosa.

Efectos en la capacidad de conducir y operar maquinarias

Pioglitazona tiene efecto nulo o insignificante sobre la capacidad para manejar u operar maquinaria. No obstante los pacientes que experimenten alteraciones visuales deben tener precaución cuando manejen vehículos o usen maquinarias.

Interacciones medicamentosas

Estudios de interacción han mostrado que la pioglitazona no tiene efecto relevante en la farmacocinética ni en la farmacodinamia de la digoxina, warfarina, fenprocumona y metformina. La administración concomitante de pioglitazona con sulfonilureas no parece afectar la farmacocinética de la sulfonilurea. Estudios en humanos sugieren que no hay inducción del principal citocromo P450, 1A, 2C8/9 y 3A4. Estudios *in vitro* han demostrado que no hay inhibición de ningún subtipo de citocromo P450. No se espera interacción con ninguna sustancia metabolizada por esta enzima, por ejemplo: anticonceptivos, ciclosporina, bloqueantes de canales cálcicos, inhibidores de la HMG-CoA reductasa.

Se ha reportado que la administración concomitante de pioglitazona con gemfibrozilo (un inhibidor del citocromo P450 2C8) resultó en un aumento de 3 veces el ABC (área bajo la curva) de la pioglitazona. Dado que hay un potencial aumento de eventos adversos relacionados con la dosis, puede ser necesaria una disminución en la dosis de pioglitazona cuando se administra junto con gemfibrozilo.

Debe considerarse un monitoreo estricto del control glucémico. La administración de pioglitazona con rifampicina (un inductor del citocromo P450 2C8) resultó en una disminución del 54% en el ABC

Laboratorios Phoenix S.A.I.C.F.
Victoria Carolina Martínez
Co-Directora Técnica M.P. 19239



de pioglitazona. Puede ser necesario aumentar la dosis de pioglitazona cuando se administra concomitantemente con rifampicina.

Carcinogénesis, mutagénesis y trastornos de fertilidad

En estudios de fertilidad en animales no hubo efecto en la copulación, impregnación o índice de fertilidad.

En estudios toxicológicos, la expansión del volumen plasmático con hemodilución, anemia, e hipertrofia cardíaca excéntrica reversible fue aparente luego de dosis repetidas de pioglitazona en ratones, ratas, perros, y monos. Además, se observó aumento del depósito de grasa e infiltración. Estos hallazgos fueron observados en todas las especies estudiadas con concentraciones plasmáticas ≤ 4 veces la exposición clínica.

La pioglitazona no mostró evidencia de potencial genotóxico en numerosos estudios *in vivo* e *in vitro* de genotoxicidad. Se evidenció un aumento en la incidencia de hiperplasia (hembras y machos) y tumores (machos) del epitelio de la vejiga urinaria en ratas tratadas con pioglitazona durante 2 años. El desarrollo y presencia de cálculos renales con la consecuente irritación e hiperplasia fue postulado como mecanismo de base para la respuesta tumorigénica en ratas macho. En un estudio de 24 meses de duración en ratas macho se demostró que la administración de pioglitazona resultó en un aumento en la incidencia de modificaciones hiperplásicas en la vejiga. La acidificación de la dieta redujo significativamente pero no abolió completamente la incidencia de tumores. La presencia de microcristales exacerbó la respuesta hiperplásica pero no fue considerada la causa primaria de los cambios hiperplásicos. La relevancia en humanos de estos hallazgos tumorigénicos en ratas machos no puede ser excluida.

No hubo respuesta tumorigénica en ratones de ambos sexos. No se observó hiperplasia de la vejiga en perros o monos tratados con pioglitazona durante 12 meses.

En un modelo animal de poliposis adenomatosa familiar (PAF), el tratamiento con otras dos tiazolidinedionas aumentó la multiplicidad de tumores en el colon. La relevancia de estos hallazgos es desconocida.

Evaluación de riesgo ambiental: no se anticipa ningún impacto ambiental por el uso clínico de pioglitazona.

Efectos teratogénicos

Fue evidente la restricción del crecimiento fetal en estudios en animales tratados con pioglitazona. Esto fue atribuido a la acción de la pioglitazona de disminuir la hiperinsulinemia y aumentar la resistencia a la insulina que ocurre durante el embarazo de modo que reduce la disponibilidad de sustratos metabólicos para el crecimiento fetal.

Embarazo

No hay datos adecuados en humanos para determinar la seguridad de pioglitazona durante el embarazo. Una restricción del crecimiento fetal fue aparente en estudios en animales con pioglitazona. Esto fue atribuible a la acción de la pioglitazona de disminuir la hiperinsulinemia materna y aumentar la resistencia a la insulina que ocurre durante el embarazo reduciendo de ese modo la disponibilidad como sustrato metabólico para el crecimiento fetal. La relevancia de tal mecanismo en humanos es desconocida y la pioglitazona no debe utilizarse durante el embarazo.

Laboratorios Phoenix S.A. I.C.F.
Victoria Carolina Martínez
Co - Dirección Técnica I.M.P. 19239




Lactancia


Pioglitazona ha mostrado estar presente en la leche de ratas durante la lactancia. No se sabe si la pioglitazona es secretada o no en la leche materna en humanos. Por lo tanto, la pioglitazona no debe administrarse durante la lactancia materna.

Reacciones adversas


Las reacciones adversas reportadas con mayor frecuencia (>0,5%) con placebo y más que casos aislados en pacientes que reciben pioglitazona en estudios doble ciego se enlistan a continuación por sistema u órgano y según frecuencia absoluta. Las frecuencias son definidas como: muy frecuente ($\geq 1/10$); frecuente ($\geq 1/100$ a $< 1/10$); poco frecuente ($\geq 1/1000$ a $< 1/100$); rara ($\geq 1/10000$ a $< 1/1000$); muy rara ($< 1/10000$); desconocida (no puede estimarse la frecuencia a partir de los datos disponibles). Dentro de cada grupo de frecuencia, las reacciones adversas son presentadas en orden decreciente de incidencia y severidad.

Reacciones adversas	Frecuencia de reacciones adversas con pioglitazona según régimen de tratamiento				
	Monoterapia	Combinación			
		Con metformina	Con una sulfonilurea	Con metformina y sulfonilurea	Con insulina
Infecciones e infestaciones					
Infección del tracto respiratorio superior	Frecuente	Frecuente	Frecuente	Frecuente	Frecuente
Bronquitis					Frecuente
Sinusitis	Poco frecuente	Poco frecuente	Poco frecuente	Poco frecuente	Poco frecuente
Alteraciones del sistema linfático y sanguíneo					
Anemia		Frecuente			
Alteraciones del sistema inmune					
Hipersensibilidad y reacciones alérgicas ¹	Desconocida	Desconocida	Desconocida	Desconocida	Desconocida
Alteraciones del metabolismo y nutrición					
Hipoglucemia			Poco frecuente	Muy frecuente	Frecuente
Aumento del apetito			Poco frecuente		
Alteraciones del sistema nervioso central					
Hipoestesia	Frecuente	Frecuente	Frecuente	Frecuente	Frecuente
Cefalea		Frecuente	Poco frecuente		
Mareos			Frecuente		


 Laboratorios Phoenix SAICF
 Victoria Carolina Martínez
 Co. - Dirección Técnica M.P. 19730



PHOENIX



Reacciones adversas	Frecuencia de reacciones adversas con pioglitazona según régimen de tratamiento				
	Monoterapia	Combinación			
Insomnio	Poco frecuente	Poco frecuente	Poco frecuente	Poco frecuente	Poco frecuente
Alteraciones oculares					
Alteraciones visuales ²	Frecuente	Frecuente	Poco frecuente		
Edema macular ³	Desconocida	Desconocida	Desconocida	Desconocida	Desconocida
Alteraciones en el oído y en el laberinto					
Vértigo			Poco frecuente		
Alteraciones cardíacas					
Insuficiencia cardíaca ⁴					Frecuente
Neoplasias benignas, malignas e inespecíficas (incluidos los quistes y pólipos)					
Cáncer de vejiga	Poco frecuente	Poco frecuente	Poco frecuente	Poco frecuente	Poco frecuente
Alteraciones respiratorias, torácicas y mediastínicas					
Disnea					Frecuente
Alteraciones gastrointestinales					
Flatulencia		Poco frecuente	Frecuente		
Alteraciones en la piel y tejido celular subcutáneo					
Sudoración			Poco frecuente		
Alteraciones músculo esqueléticas y del tejido conectivo					
Fracturas óseas ⁵	Frecuente	Frecuente	Frecuente	Frecuente	Frecuente
Artralgia		Frecuente		Frecuente	Frecuente
Dolor de espalda					Frecuente
Alteraciones renales y urinarias					
Hematuria		Frecuente			
Glicosuria			Poco frecuente		
Proteinuria			Poco		


 Laboratorios Phoenix S.A.I.C.F.
 Victoria Carolina Martínez
 Cc - Directora Técnica / M.P. 19239



Reacciones adversas	Frecuencia de reacciones adversas con pioglitazona según régimen de tratamiento				
	Monoterapia	Combinación			
			Frecuente		
Alteraciones del sistema reproductor y mamario					
Disfunción eréctil		Frecuente			
Alteraciones generales y condiciones del sitio de administración					
Edema					Muy frecuente
Fatiga			Poco frecuente		
Investigaciones					
Aumento de peso ⁶	Frecuente	Frecuente	Frecuente	Frecuente	Frecuente
Aumento de creatinina – fosfo - kinasa plasmática				Frecuente	
Aumento de lactato deshidrogenasa			Poco frecuente		
Aumento de alanina aminotransferasa ⁷	Desconocida	Desconocida	Desconocida	Desconocida	Desconocida

¹ Se han reportado casos de reacciones de hipersensibilidad en pacientes tratados con pioglitazona. Estas reacciones incluyen anafilaxia, angioedema y urticaria.

² Se han reportado alteraciones visuales principalmente al comienzo del tratamiento y es relacionado a cambios en la glucosa sanguínea debido a alteraciones temporales en la turgencia y el índice refractivo del cristalino tal como se vio en otros tratamientos hipoglucémicos.

³ Se reportó edema en el 6 - 9% de los pacientes tratados con pioglitazona en estudios clínicos controlados por más de un año. Las tasas de edema para grupos comparadores (sulfonilurea, metformina) fue 2 - 5%. Los reportes de edema fueron generalmente de leves a moderados y usualmente no requirieron la discontinuación del tratamiento.

⁴ En estudios clínicos controlados la incidencia de reportes de insuficiencia cardíaca durante el tratamiento con pioglitazona fue el mismo que con los grupos de placebo, metformina y sulfonilurea, pero fue mayor cuando se realizó tratamiento combinado con insulina. En un estudio con pacientes con enfermedad macrovascular mayor preexistente, la incidencia de insuficiencia cardíaca severa fue 1,6% más alta con pioglitazona que con placebo, cuando se añadió al tratamiento insulina. Sin embargo, esto no llevó a un aumento en la mortalidad en este estudio. En dicho estudio, se observó un mayor porcentaje de pacientes con insuficiencia cardíaca de ≥ 65 años de edad en comparación con aquellos menores de 65 años de edad (9,7 % comparado con 4,0 %). En pacientes tratados con insulina de forma no concomitante con pioglitazona el índice de insuficiencia cardíaca fue 8,2 % en aquellos de ≥ 65 años de edad en comparación con 4,0 % en pacientes menores de 65 años de edad. Se ha reportado insuficiencia cardíaca raramente durante la comercialización de pioglitazona, pero de manera más frecuente cuando la pioglitazona fue usada en combinación con insulina o en pacientes con historia de insuficiencia cardíaca.

⁵ Se ha llevado a cabo un análisis combinado de reacciones adversas consistentes en fracturas óseas de diferentes estudios clínicos. Se observó una mayor frecuencia de fracturas en mujeres

Laboratorios Phoenix S.A.I.C.F.
Victoria Carolina Martínez
Calle Dredos, Tepic, Jalisco, M.P. 19239



bajo tratamiento con pioglitazona (2,6%) versus comparador (1,7%). No se observó un aumento en la incidencia de fracturas en hombres tratados con pioglitazona (1,3%) versus comparador (1,5%).

⁶ En estudios clínicos se evidenció que la ganancia de peso media con pioglitazona en monoterapia fue 2 kg - 3 kg durante un año. Esto es similar a lo observado en el grupo tratado con una sulfonilurea. En estudios en los cuales se administró concomitantemente pioglitazona y metformina la ganancia de peso fue de 1,5 kg en el periodo de un año y cuando se administró pioglitazona y una sulfonilurea fue de 2,8 kg. En un estudio comparativo donde se añadió una sulfonilurea al tratamiento con metformina resultó en una ganancia de 1,3 kg; y cuando se añadió metformina al tratamiento con una sulfonilurea se evidenció una reducción de peso de 1 kg.

⁷ En estudios clínicos con pioglitazona la incidencia de aumento de ALT por encima de tres veces el límite superior fue igual al grupo placebo pero menor a aquellos observados en los grupos control tratados con metformina o sulfonilurea. Los niveles medios de enzimas hepáticas disminuyeron con el tratamiento de pioglitazona. Ha ocurrido raros casos de aumento de enzimas hepáticas y disfunción hepatocelular durante la experiencia poscomercialización. Aunque en algunos raros casos se ha reportado un desenlace fatal, la relación causal no ha sido establecida.

Sobredosificación

En estudios clínicos, los pacientes han tomado pioglitazona a dosis más altas que la dosis máxima recomendada de 45 mg/día. Lo máximo reportado fue de 120 mg/día durante cuatro días, luego 180 mg/día durante siete días; y no se ha asociado a ningún síntoma.

En combinación con sulfonilureas o insulina se puede presentar hipoglucemia. En caso de sobredosis debe realizarse tratamiento sintomático y medidas de soporte general.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666/2247.

Hospital Dr. Alejandro Posadas. Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

Hospital General de Agudos J. A. Fernández. Tel.: (011) 4808-2655.

Centro de Asistencia Toxicológica La Plata. Tel.: (0221) 451-5555.

Condiciones de conservación y almacenamiento

Conservar a una temperatura de hasta 30 °C.

Presentación

Se presenta en envases que contienen 14, 15, 20, 28, 30, 50, 100, 500 y 1000 comprimidos, siendo los dos últimos para uso hospitalario exclusivo.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 48.581.

Directora Técnica: Romina Farrú - Farmacéutica



Laboratorios PHOENIX S. A. I. C. y F.

Calle (R202) Gral. Juan Gregorio Lemos 2809 (B1613AUE), Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires.

e-mail: info@phoenix.com.ar

"El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial impreso en sistema Braille para facilitar su identificación por los pacientes no videntes"

Laboratorios Phoenix S.A.I.C.F.
Victoria Carolina Martínez
C.C. - U. N.º 10.000 / M.P. 19239



"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"

NCDSv04

Fecha de última revisión:.....- Disp. N°.....


Laboratorios Phoenix S.A.I.C.F.
Virginia Carolina Martinez
Calle 14 de Septiembre 15239



INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Lea con cuidado esta información antes de usar el medicamento

Composición de PIOGLIT

El principio activo de PIOGLIT es pioglitazona.

Cada comprimido de PIOGLIT 15 mg contiene pioglitazona clorhidrato (equivalente a 15 mg de Pioglitazona base) 16,54 mg.

Los demás componentes del comprimido son: lactosa monohidrato, klucel LF, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio.

Cada comprimido de PIOGLIT 30 mg contiene pioglitazona clorhidrato (equivalente a 30 mg de Pioglitazona base) 33,07 mg.

Los demás componentes del comprimido son: lactosa monohidrato, klucel LF, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio.

Cada comprimido de PIOGLIT 45 mg contiene pioglitazona clorhidrato (equivalente a 45 mg de Pioglitazona base) 49,61 mg.

Los demás componentes del comprimido son: lactosa monohidrato, klucel LF, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar el medicamento.

- Conserve este prospecto, ya que puede necesitar volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que los puede perjudicar.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si experimenta cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

¿Qué es y para qué se utiliza PIOGLIT?

PIOGLIT es un medicamento antidiabético que se usa para tratar la diabetes mellitus tipo 2 (no dependiente de la insulina) en adultos, cuando metformina no es adecuada o no ha funcionado correctamente. Este tipo de diabetes se presenta generalmente en los adultos.

PIOGLIT ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre si padece de diabetes tipo 2, permitiendo que su cuerpo utilice mejor la insulina que produce. Su médico puede controlar el efecto de PIOGLIT entre los 3 y los 6 meses luego de iniciado el tratamiento.

Los comprimidos de PIOGLIT se pueden utilizar sólo en pacientes que no pueden tomar metformina cuando la dieta y el ejercicio no han sido suficientes para controlar el nivel de azúcar o se pueden administrar concomitantemente con otros tratamientos (como metformina, sulfonilurea o insulina) si estos no han conseguido proporcionar un control suficiente de los niveles de azúcar.

Antes de usar PIOGLIT

No tome PIOGLIT

- si es alérgico (hipersensible) a la pioglitazona o a cualquiera de los demás componentes de PIOGLIT.

Laboratorios Phoenix S.A. de C.V.
Victoria Carolina Martínez
C.C. Dirección Técnica / M.P. 19236



- si padece o ha padecido insuficiencia cardíaca.
- si tiene alguna enfermedad del hígado.
- si ha tenido cetoacidosis diabética (una complicación de la diabetes que produce una rápida pérdida de peso, náuseas o vómitos).
- si padece o ha padecido cáncer de vejiga.
- si observa sangre en la orina la cual no haya sido controlada por su médico.

Tenga especial cuidado con PIOGLIT

Consulte con su médico antes de tomar este medicamento si:

- tiene retención de líquidos o si tiene problemas del corazón, particularmente si es mayor de 75 años de edad. Informe a su médico si toma medicamentos antiinflamatorios ya que también pueden provocar retención de líquidos e hinchazón.
- tiene un tipo especial de enfermedad ocular diabética llamada edema macular (hinchazón del fondo del ojo).
- tiene quistes en los ovarios (síndrome de ovario poliquístico). Pueden aumentar las posibilidades de quedar embarazada, ya que al tomar PIOGLIT puede volver a ovular. Si éste es su caso utilice métodos anticonceptivos adecuados para evitar la posibilidad de un embarazo no planeado.
- tiene problemas de hígado o corazón. Antes de comenzar el tratamiento con PIOGLIT se le debe realizar un análisis de sangre para comprobar la función del hígado. Estos análisis deben realizarse periódicamente. Algunos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de larga duración y enfermedad del corazón o accidente cerebrovascular previo que recibieron PIOGLIT e insulina, desarrollaron insuficiencia cardíaca. Informe a su médico lo antes posible si experimenta signos de insuficiencia cardíaca tales como sensación de falta de aire, aumento rápido de peso o hinchazón localizada (edema).

Si toma PIOGLIT junto con otros medicamentos para la diabetes, es probable que su nivel de azúcar descienda por debajo del límite normal (hipoglucemia).

También puede experimentar una reducción del recuento de células de la sangre (anemia).

Fracturas óseas.

Se ha observado un mayor número de fracturas de hueso en las mujeres (pero no en hombres) que tomaban pioglitazona. Su médico tendrá esto en cuenta cuando trate su diabetes.

Ante síntomas urinarios (sangre en la orina, dolor al orinar, urgencia miccional): consulte con su médico.

Niños

No se recomienda su uso en niños menores de 18 años.

Otros medicamentos y PIOGLIT

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta médica.

Generalmente puede seguir tomando otros medicamentos mientras esté en tratamiento con PIOGLIT. Sin embargo ciertos medicamentos tienen una mayor probabilidad de afectar los niveles de azúcar en sangre:

- gemfibrozilo (utilizado para reducir el colesterol)
- rifampicina (utilizada para tratar la tuberculosis y otras infecciones)

Laboratorios Phoenix S.A. C.F.
Victoria Carolina Martínez
C.C. - Directora de Recursos Humanos, 19239



Informe a su médico o farmacéutico si está tomando alguno de estos medicamentos. Se controlará su nivel de azúcar en sangre y puede que requiera modificar la dosis de **PIÖGLIT**.

PIÖGLIT alimentos y bebidas

Puede tomar los comprimidos con o sin alimentos. Tómelos con un vaso de agua.

Embarazo y lactancia

Informe a su médico si:

- está embarazada, sospecha que puede estarlo o planea un embarazo.
- está en periodo de lactancia o planea estarlo.

Su médico le puede indicar discontinuar el tratamiento.

Conducir y operar maquinarias

La pioglitazona no afecta la capacidad para conducir o utilizar maquinarias, pero debe tener precaución si experimenta alteraciones visuales.

Información importante sobre algunos de los componentes de PIÖGLIT

Este medicamento contiene lactosa monohidrato. Si su médico le ha informado de que tiene intolerancia a algunos azúcares, contacteáctelo con a su médico antes de tomar **PIÖGLIT**.

Uso apropiado del medicamento

Cómo tomar PIÖGLIT

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Debe tomar un comprimido de 15 mg, 30 mg o 45 mg de pioglitazona una vez al día. De ser necesario su médico le indicará si tiene que tomar una dosis diferente.

Si cree que **PIÖGLIT** le está haciendo poco efecto, consulte con su médico.

Cuando tome **PIÖGLIT** en combinación con otros medicamentos utilizados para tratar la diabetes (como insulina, clorpropamida, glibenclamida, gliclazida, tolbutamida), su médico le indicará si tiene que tomar una menor dosis de esos medicamentos.

Su médico le puede pedir que se haga análisis de sangre periódicos mientras esté en tratamiento con **PIÖGLIT**. Estos análisis son necesarios para controlar que su hígado funciona correctamente.

Si sigue una dieta para diabéticos, manténgala mientras tome **PIÖGLIT**.

Debe controlar su peso con regularidad. Si aumenta de peso, informe a su médico.

Si ha tomado más PIÖGLIT del prescripto por su médico

Si usted o alguien más, incluyendo niños, ha tomado más **PIÖGLIT** de lo que debe, póngase en contacto inmediatamente con su médico, centro de toxicología o diríjase a la sala de emergencias más cercana. Es probable que su nivel de azúcar disminuya por debajo de los valores normales, estos niveles puede aumentar con la ingesta de azúcar. Se recomienda que lleve con usted terrones de azúcar, caramelos, galletas o jugo de fruta azucarados.

Si olvidó tomar PIÖGLIT

Tome **PIÖGLIT** todos los días, tal como se lo ha indicado su médico. Si olvidó tomar una dosis, tome la siguiente dosis programada. No tome una dosis doble para compensar una dosis olvidada.

Laboratorio Phoenix SAICF
Victoria Carolina Martínez
Calle Yedra Técnica M.P. 19239



Si interrumpe el tratamiento con PIOGLIT

PIOGLIT se debe tomar diariamente para que el tratamiento tenga el efecto adecuado. Si interrumpe la toma de PIOGLIT puede aumentarle el nivel de azúcar en sangre. Consulte con su médico antes de interrumpir el tratamiento.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico o farmacéutico.

Efectos indeseables

Como todos los medicamentos, PIOGLIT puede tener efectos indeseables, aunque no todas las personas los sufran.

En particular, los pacientes han presentado los siguientes efectos indeseables graves:

Insuficiencia cardíaca, de presentación frecuente (entre 1 y 10 de cada 100 pacientes) en los pacientes que toman PIOGLIT en combinación con insulina. Los síntomas son sensación de ahogo inusual o aumento rápido de peso o hinchazón localizada (edema). Si experimenta alguno de estos síntomas, sobre todo si tiene más de 65 años, consulte con su médico de inmediato.

Con poca frecuencia (afecta a 1 y 10 de cada 1.000 pacientes) se ha desarrollado cáncer de vejiga en pacientes que toman PIOGLIT. Los signos y síntomas incluyen sangre en la orina, dolor al orinar o necesidad urgente de orinar. Si experimenta alguno de estos síntomas consulte con su médico inmediatamente.

Los pacientes que toman PIOGLIT en combinación con insulina también presentaron de manera frecuente hinchazón localizada (edema). Consulte con su médico lo antes posible si experimenta este efecto adverso.

Fracturas óseas: se han notificado de manera frecuente (afecta a 1 y 10 de cada 100 pacientes) en mujeres que toman PIOGLIT. Consulte con su médico inmediatamente si experimenta este efecto adverso.

También se ha notificado visión borrosa debido a la hinchazón (o líquido) en el fondo del ojo (frecuencia desconocida) en pacientes que toman PIOGLIT. Si experimenta este síntoma por primera vez o si ya lo presentaba y empeora, consulte con su médico de manera inmediata.

Se han reportado reacciones alérgicas (frecuencia desconocida) en pacientes que toman PIOGLIT. Si usted tiene una reacción alérgica seria, urticaria e hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta que puedan provocar dificultades para respirar o tragar, debe discontinuar el uso de este medicamento y consultar con su médico inmediatamente.

Otros efectos indeseables que han experimentado algunos pacientes al tomar PIOGLIT son:

frecuentes (afectan a 1 y 10 de cada 100 pacientes)

- infección respiratoria,
- anomalías de la visión,
- aumento de peso,
- entumecimiento

poco frecuentes (afectan a 1 y 10 de cada 1.000 pacientes)

- inflamación de los senos nasales (sinusitis)
- dificultad para dormir (insomnio)


Laboratorios Phoenix SAICF
Victoria Carolina Martínez
Calle Comercio Interior / M.P. 19239



desconocida (no se puede estimar la frecuencia con los datos disponibles)

- aumento de las enzimas hepáticas
- reacciones alérgicas

Otros efectos indeseables que han experimentado algunos pacientes al tomar PIOGLIT junto con otros medicamentos antidiabéticos son:

muy frecuentes (afectan a más de 1 de cada 10 pacientes)

- disminución del azúcar en la sangre (hipoglucemia)

frecuentes (afectan a entre 1 y 10 de cada 100 pacientes)

- dolor de cabeza
- mareo
- dolor de las articulaciones
- impotencia
- dolor de espalda
- falta de aire
- ligera reducción del recuento de células rojas de la sangre
- gases (flatulencia)

poco frecuentes (afectan a entre 1 y 10 de cada 1.000 pacientes)

- azúcar en la orina, proteínas en la orina
- aumento de las enzimas
- vértigo
- sudoración
- fatiga
- aumento del apetito

Si considera que alguno de los efectos indeseables que sufre es grave o si experimenta cualquier efecto indeseable no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Condiciones de conservación y almacenamiento

Conservar a una temperatura de hasta 30 °C.

Presentación

Se presenta en envases que contienen 14, 15, 20, 28, 30, 50, 100, 500 y 1000 comprimidos, siendo los dos últimos para uso hospitalario exclusivo.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 48.581.

Directora Técnica: Romina Farrú - Farmacéuticas.

Laboratorios PHOENIX S. A. I. C. y F.

Calle (R202) Gral. Juan Gregorio Lemos 2809 (B1613AUE), Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires.

e-mail: info@phoenix.com.ar

Laboratorios Phoenix S.A.I.C.F.
Victoria Carolina Martínez
C.C. - Directora Técnica M.P. 19239

3138




"El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial impreso en sistema Braille para facilitar su identificación por los pacientes no videntes".

"Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234"

NCDSv04

✓
Fecha de última revisión:..... – Disp. N°.....


Laboratorios Phoenix S.A.I.C.F.
Victoria Carolina Martinez
D.C. - Dirección Técnica / M.P. 13239