



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Disposición**

**Número:** DI-2018-7738-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Miércoles 1 de Agosto de 2018

**Referencia:** 1-0047-0000-16795-17-2

---

VISTO el Expediente N° 1-0047-0000-16795-17-2 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones la firma MSD ARGENTINA S.R.L., solicita la aprobación de nuevos proyectos de prospectos e información para el paciente para la Especialidad Medicinal denominada ELOCON / FUROATO DE MOMETASONA 1 mg / g, Forma farmacéutica y concentración: CREMA, LOCION Y UNGÜENTO - 1 mg / g; aprobada por Certificado N° 40.204.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición N°: 5904/96 y Circular N° 4/13.

Que la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 de fecha 16 de Diciembre de 2015.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

**DISPONE:**

ARTICULO 1°. – Autorízase a la firma MSD ARGENTINA S.R.L. propietaria de la Especialidad Medicinal denominada ELOCON / FUROATO DE MOMETASONA 1 mg / g, Forma farmacéutica y concentración: CREMA, LOCION Y UNGÜENTO - 1 mg / g, el nuevo proyecto

de prospecto obrante en el documento IF-2018-29020483-APN-DERM#ANMAT; e información para el paciente obrante en el documento IF-2018-29020486-APN-DERM#ANMAT.

ARTICULO 2º. – Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 40.204, cuando el mismo se presente acompañado de la presente Disposición.

ARTICULO 3º. - Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición y prospecto e información para el paciente. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-0047-0000-16795-17-2

Digitally signed by CHIALE Carlos Alberto  
Date: 2018.08.01 17:14:07 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carlos Alberto Chiale  
Administrador  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica


Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117584  
Date: 2018.08.01 17:14:14 -0300'



**INFORMACIÓN PARA EL PRESCRIPTOR**

**ELOCON®**

**Furoato de Mometasona 1 mg/g**  
**Crema, Loción y Ungüento – Vía Tópica**  
**VENTA BAJO RECETA**



**FÓRMULA**

Cada gramo de ELOCON Crema contiene: FUROATO DE MOMETASONA 1,0 mg. Excipientes: Parafina blanca suave 674 mg; Cera de abejas blancas 50 mg; Fosfatidilcolina 15 mg; Hexilenglicol 120 mg; Dióxido de Titanio 10 mg; Octenilsuccinato aluminico de almidón 100mg; Agua purificada 30 mg; Ácido fosfórico diluido para ajustar pH c.s.

Cada gramo de ELOCON Loción contiene: FUROATO DE MOMETASONA 1,0 mg. Excipientes: Alcohol isopropílico 400,00 mg; Propilenglicol 300,00 mg; Hidroxipropilcelulosa 1,50 mg; Fosfato de sodio monobásico monohidrato 2,00 mg; Agua purificada c.s.

Cada gramo de ELOCON Ungüento contiene: FUROATO DE MOMETASONA 1,00 mg. Excipientes: Hexileno glicol 120,00 mg; Propilenglicol ésterato 20,00 mg; Cera blanca 50,00 mg; Vaselina blanca 779,00 mg; Agua purificada 30,00 mg.

**ACCIÓN TERAPÉUTICA**

Antiinflamatorio, antipruriginoso y vasoconstrictor de acción local. Código ATC: D07AC13.

**INDICACIONES**

ELOCON crema y ungüento está indicado para el alivio de la inflamación y las manifestaciones pruríticas de la dermatosis sensible a glucocorticoides, como la psoriasis, la dermatitis atópica, la dermatitis irritativa y / o la dermatitis de contacto alérgica.

Se recomienda ELOCON loción para el alivio de las manifestaciones inflamatorias y pruriginosas de las dermatosis sensibles a los glucocorticoides de áreas pilosas como el cuero cabelludo, como la psoriasis.

**PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS**


**Mecanismo de Acción**


La actividad farmacológica de ELOCON está directamente relacionada con la presencia de furoato de mometasona. Este es un corticosteroide que pertenece a la clase de preparaciones potentes.

**Efectos farmacodinámicos**

Los estudios de vasoconstricción realizados en humanos han demostrado que ELOCON crema, ELOCON ungüento y ELOCON loción son tan potentes o más potentes que las preparaciones correspondientes de aminonida, betametasona y fluocinolona.

El análisis espectroscópico de reflectancia de lesiones inflamatorias inducidas por radiación UV ha demostrado objetivamente que se obtiene una mejor vasoconstricción con ELOCON crema en comparación con valerato o crema de dipropionato de betametasona al 0,1%, con actividad prolongada durante 24 horas.

  
José Nerone  
Apoderado  
MSD ARGENTINA S.R.L.

  
Alejandro Galones  
IF-2018-20920483-APN-DERM#ANMAT  
MSD ARGENTINA S.R.L.

Se ha observado una buena correlación entre los estudios de vasoconstricción y los estudios clínicos para el tratamiento de la psoriasis. Se obtuvieron resultados similares o mejores con ELOCON en comparación con las preparaciones de betametasona correspondientes. También se ha demostrado que ELOCON ungüento y ELOCON crema son más efectivos que el acetónido de fluocinolona al 0.1% para esta recomendación.

**Farmacocinética**

La absorción percutánea de la pomada y la crema lipófila de furoato de 3H-mometasona se ha estudiado en humanos para medir la absorción sistémica y la excreción. Los resultados muestran que aproximadamente el 0,7% de la dosis aplicada como una pomada y el 0,4% de la aplicada como crema lipófila se absorbe sistémicamente, cuando se aplica a la piel intacta de voluntarios sanos sin oclusión durante 8 horas.

La absorción percutánea de la solución tópica de furoato de 3H-mometasona no se ha estudiado en humanos. Los estudios para evaluar la posible biodisponibilidad sistémica en humanos (midiendo la inhibición del eje hipotálamico-pituitario-adrenal) militan a favor de un bajo potencial de absorción percutánea del furoato de mometasona.

**POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN**

Dosificación:

Debe aplicarse una película delgada de crema o ungüento en las áreas afectadas de la piel una vez al día.

Aplique unas gotas de la loción en las áreas pilosas, incluido el cuero cabelludo, una vez al día.

Población pediátrica: ELOCON solo se puede utilizar con cuidado en niños de 2 años o más, en los que no se haya podido establecer la seguridad y la eficacia durante periodos de uso de más de tres semanas. Dado que la seguridad y la eficacia de ELOCON no pudieron establecerse en pacientes pediátricos menores de 2 años, no se recomienda para este grupo de edad.

Administración:

El ungüento se preferirá para el tratamiento de lesiones muy secas, escamosas y agrietadas, la loción es preferible para tratar dermatosis de áreas pilosas como el cuero cabelludo, mientras que la crema es preferida para otros tipos de lesiones cutáneas indicadas.

**CONTRAINDICACIONES**

ELOCON están contraindicadas en pacientes con hipersensibilidad al furoato de mometasona, a otros corticosteroides o a cualquier otro componente de la preparación.

Al igual que con otros glucocorticosteroides tópicos, ELOCON tampoco se recomienda para pacientes con acné común, rosácea, atrofia cutánea, dermatitis perioral y perianal, prurito genital o erupción de pañal y en pacientes con infecciones bacterianas de la piel (por ejemplo, impétigo, piodermatitis), infecciones cutáneas virales (herpes simple, herpes zóster, varicela, verrugas comunes, verrugas venéreas, molusco contagioso) o infecciones cutáneas parasitarias o fúngicas (p. ej., candida o dermatofitos). ELOCON no se debe administrar en heridas o en la piel ulcerada.

ELOCON tampoco se recomienda para la varicela, las reacciones post-vacuna, la tuberculosis y la sífilis.

**ADVERTENCIAS ESPECIALES Y PRECAUCIONES DE USO**

  
José Nerone  
Apoderado  
MSD ARGENTINA S.R.L.

FR

  
Alejandro Balonas  
IF-2018-09026483-APN-DERM#ANMAT  
MSD ARGENTINA S.R.L.

Al igual que con todas las preparaciones tópicas de glucocorticoides, evite aplicar ELOCON debajo de los apósitos oclusivos, durante períodos prolongados, en grandes áreas de la piel, en la cara y en los pliegues de la piel. El tratamiento facial no debe exceder los 5 días. Se debe evitar el tratamiento continuo a largo plazo en todos los pacientes, cualquiera que sea su edad.

Se debe administrar la cantidad más pequeña de glucocorticoides requerida para la eficacia, especialmente en niños.

El uso de esteroides tópicos para la psoriasis puede ser peligroso por una serie de razones, como recaídas secundarias con tolerancia adquirida, riesgo de psoriasis pustulosa generalizada y el desarrollo de toxicidad local o sistémica que puede imputarse a una reducción de la función de la barrera cutánea. Se requiere una supervisión cuidadosa si se utiliza ELOCON para la psoriasis.

Al igual que con todos los glucocorticoides tópicos potentes, evite la interrupción repentina del tratamiento. Cuando se detiene el tratamiento tópico a largo plazo con glucocorticoides potentes, se puede desarrollar un fenómeno de rebote que toma la forma de dermatitis con intenso enrojecimiento, escozor y sensaciones de ardor. Esto se puede prevenir reduciendo gradualmente el tratamiento continuando el tratamiento de manera intermitente en particular antes de suspender el tratamiento.

Se debe iniciar una terapia antibiótica adecuada si las lesiones inflamatorias están infectadas.

Evite el contacto con ojos, heridas y membranas mucosas.

ELOCON no debe usarse para la aplicación oftálmica en los párpados debido al muy leve riesgo de glaucoma de ángulo ancho o catarata subcapsular.

Tenga en cuenta que los glucocorticoides pueden cambiar la apariencia de ciertas lesiones, dificultar un diagnóstico adecuado y retrasar la cicatrización.

Población pediátrica:

ELOCON solo se puede usar con cuidado en niños de 2 años o más, en los que no se haya podido establecer la seguridad y la eficacia durante períodos de uso de más de tres semanas. Dado que la seguridad y la eficacia de ELOCON no pudieron establecerse en pacientes pediátricos menores de 2 años, no se recomienda para este grupo de edad.

Evite aplicar ELOCON debajo de los vendajes oclusivos, durante períodos prolongados, en grandes áreas de la piel y en la cara y en los pliegues de la piel. El tratamiento facial no debe exceder los 5 días. Se debe evitar un tratamiento continuo a largo plazo. Esto es especialmente importante en los niños. Dado que los niños tienen una mayor relación superficie / peso corporal en comparación con los adultos, pueden ser más sensibles que los adultos a la inhibición del eje hipotalámico-pituitario-adrenal y al síndrome de Cushing inducido por los glucocorticoides.


Se debe administrar la cantidad más pequeña de glucocorticoides requerida para obtener un resultado efectivo, especialmente en niños. La terapia crónica con glucocorticoides puede interferir con el crecimiento y desarrollo de los niños.

ELOCON loción contiene propilenglicol, que puede causar irritación de la piel.


ELOCON crema contiene propilenglicol estearato, que puede causar reacciones cutáneas locales (por ejemplo, eczema).

Disturbio visual:

Se pueden reportar alteraciones visuales con el uso de corticosteroides sistémicos y tópicos (incluidos, intranasales, inhalados e intraoculares). Si un paciente presenta síntomas tales como visión borrosa u otras alteraciones visuales, se debe considerar la derivación a un oftalmólogo.



José Nerone  
Apoderado  
MSD ARGENTINA S.R.L.



Alejandro Balones  
IF-2016-09020483-APN-DERM#ANMAT  
MSD ARGENTINA S.R.L.



para la evaluación de posibles causas de trastornos visuales que pueden incluir cataratas, glaucoma o enfermedades raras como coriorretinopatía serosa central (CSCR) que se han informado después del uso de corticosteroides sistémicos y tópicos.

**Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

Ninguna conocida.

**Uso durante el embarazo y la lactancia**

Aún no ha sido establecida la seguridad del uso de ELOCON durante el embarazo.

Durante el embarazo y la lactancia, el tratamiento con ELOCON debe realizarse solo por orden del médico. Incluso entonces, se debe evitar la aplicación en áreas de gran superficie corporal o durante un período prolongado.

Embarazo: al igual que con todos los glucocorticoides aplicados tópicamente en mujeres embarazadas, se debe considerar la posibilidad de que el crecimiento del feto se vea afectado por el paso de glucocorticoides a través de la barrera placentaria.

Lactancia: Los glucocorticoides se excretan en la leche materna. Si se indica tratamiento con dosis más altas o una aplicación a largo plazo, la lactancia debe interrumpirse.

**Efectos en la capacidad de conducir y usar máquinas**

ELOCON no tiene ningún efecto sobre la capacidad de conducir y usar máquinas.

**REACCIONES ADVERSAS**

Las siguientes reacciones indeseables locales se han notificado raramente o muy raramente con ELOCON: escozor / hormigueo, picazón, signos de atrofia de la piel, ardor, foliculitis, reacción acneiforme, pápulas, pústulas y telangiectasia.


La frecuencia de los siguientes efectos indeseables es desconocida (no se puede estimar basándose en los datos disponibles): infecciones, forúnculos, parestesias, dermatitis de contacto, hipopigmentación, hipertriosis, estrías, dermatitis acneiforme, dolor en el lugar de administración.

Las siguientes reacciones indeseables locales se han notificado con poca frecuencia cuando se usan otros glucocorticoides tópicos. Sin embargo, pueden aparecer durante el uso de ELOCON: piel seca, irritación, dermatitis, dermatitis perioral, dermatitis de contacto alérgica, maceración de la piel, infección secundaria, miliaria.

Se puede observar una absorción sistémica (consulte "Advertencias y precauciones especiales de uso") cuando se aplica en áreas de gran superficie corporal o durante un período prolongado, especialmente cuando se utiliza un vendaje oclusivo. Todas las reacciones indeseables que se han reportado durante la administración de glucocorticoides sistémicos, incluida la inhibición de la función hipotálamo-pituitaria-adrenal, también pueden ocurrir con glucocorticoides tópicos, especialmente en lactantes y niños (consulte "advertencias y precauciones especiales de uso").

Visión borrosa (ver también la sección Advertencias y precauciones especiales de uso) se ha informado con el uso de corticosteroides ((frecuencia desconocida).

**SOBREDOSIFICACIÓN**



José Nerone  
Apoderado  
MSD ARGENTINA S.R.L.



Alejandro Balonas  
IF-2018-00020488-42 PN-DERM#ANMAT  
MSD ARGENTINA S.R.L.

**PROYECTO DE PROSPECTO**



Hasta la fecha, no se han reportado casos de sobredosis con ELOCON.

En el caso de una sobredosis, el tratamiento sintomático y de apoyo general debe iniciarse inmediatamente, y debe continuarse durante el tiempo que sea necesario.

**Síntomas:** el uso prolongado y excesivo de glucocorticoides tópicos puede inhibir la función hipotalámico-pituitariaadrenal y dar como resultado una insuficiencia suprarrenal secundaria.

**Tratamiento:** se indica un tratamiento sintomático adecuado. Los síntomas agudos del hiper cortisolismo son en realidad reversibles. Si es necesario, se deben tratar los desequilibrios electrolíticos. En caso de intoxicación crónica, se recomienda reducir gradualmente el tratamiento con corticosteroides.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247, 0800-444-8694.

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

**PRESENTACIONES**

ELOCON Crema: Pomo conteniendo 5g, 15g, 30g o 500g.

ELOCON Loción: Frasco conteniendo 5ml, 15ml, 20ml, 30 ml, 60ml, 250ml o 500ml.

ELOCON Ungüento: 5g, 15 g, 30g o 500g.

**CONSERVACION**

ELOCON Crema: Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 25°C.

ELOCON Loción: Conservar a temperatura ambiente hasta 30°C.

ELOCON Ungüento: Conservar a temperatura ambiente hasta 30°C.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ESTÉ MEDICAMENTO DEBE SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA.**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 40.204

ELOCON Crema: Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-Op-Den-Berg, Bélgica.

INDUSTRIA BELGA.

ELOCON Loción: Eurofarma Argentina S.A., Av. San Martín 4550, La Tablada, La Matanza, Provincia de Buenos Aires.


INDUSTRIA ARGENTINA

ELOCON Ungüento: Sanofi Aventis Argentina S.A., Av. San Martín 4550, La Tablada, La Matanza, Provincia de Buenos Aires.

INDUSTRIA ARGENTINA

  
José Nerone  
Apoderado  
MSD ARGENTINA S.R.L.

FP

  
Alejandro Balóns  
MSD ARGENTINA S.R.L.

IF-2018-39020483-APN-DERM#ANMAT  
MSD ARGENTINA S.R.L.

**PROYECTO DE PROSPECTO**



Comercializado en Argentina por: MSD Argentina S.R.L., Cazadores de Coquimbo 2841/57 piso 4, Munro (B1605AZE), Vicente López, Prov. de Buenos Aires. Tel.: 6090-7200. [www.msd.com.ar](http://www.msd.com.ar)

Directora Técnica: Cristina B. Wiege, Farmacéutica.


Importado y comercializado en Uruguay: Cia. Cibetes S.A. 12 de diciembre 767, Montevideo. D.T.Q.F. Carolina Harley. Reg MSP Elocon Crema N° 31610 y Reg MSP Elocon Loción N° 33211, Condición de venta: Control Médico Recomendado.


Última revisión ANMAT:

RP

S-CCDS-MK0887-MTL-082017

MK0887-ARG-2017-016415

  
José Nerone  
Apoderado  
MSD ARGENTINA S.R.L.

  
Alejandro Barchas  
IF-2018-29020489-APN-DERM#ANMAT  
MSD ARGENTINA S.R.L.





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2018-29020483-APN-DERM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Lunes 18 de Junio de 2018

**Referencia:** 16795-17-2 prospecto elocon

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117584  
Date: 2018.06.18 07:17:58 -03'00'

Federico Pastore  
Asistente técnico  
Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117584  
Date: 2018.06.18 07:17:58 -03'00'

**PROYECTO DE PROSPECTO**



INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

ELOCON®

Furoato de Mometasona 1 mg/g  
Crema, Loción y Ungüento –Vía Tópica

VENTA BAJO RECETA



Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, ya que contiene información importante para usted.

- Guarde este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.
- Si tiene más preguntas, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento ha sido recetado solo para usted. No se lo transmita a otros. Puede dañarlos, incluso si sus signos de enfermedad son los mismos que los suyos.
- Si tiene alguna reacción adversa, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto adverso no mencionado en este prospecto. Ver la sección 4.

Qué hay en este prospecto

1. Qué es ELOCON y para qué se utiliza
2. Qué debo saber antes de empezar a utilizar ELOCON
3. Cómo usar ELOCON
4. Posibles reacciones adversas.
5. Cómo conservar ELOCON
6. Contenido del paquete y otra información.

1. Qué es ELOCON y para qué se utiliza

ELOCON es una preparación a base de cortisona que se fabrica a partir de la hormona cortisol, destinada a aplicación sobre la piel. Pertenec a la clase de corticosteroides potentes.


ELOCON crema y ELOCON ungüento están indicados para el tratamiento tópico de inflamaciones de la piel que responden favorablemente como psoriasis, dermatitis atópica, dermatitis irritante y / o dermatitis de contacto alérgica.

ELOCON loción está indicado para aliviar la inflamación y la picazón de las zonas pilosas, como el cuero cabelludo, que ocurre en la dermatitis como la psoriasis.


2. Qué debo saber antes de empezar a utilizar ELOCON

No use ELOCON

- Si alguna vez tuvo alguna reacción alérgica inusual o grave al furoato de mometasona, a otros corticosteroides o a cualquier componente de ELOCON:

  
José Nerone  
Apoderado  
MSD ARGENTINA S.R.L.

FP

  
Alejandro Balonas  
IF-2018-09920486-APN-DERM#ANMAT  
MSD ARGENTINA S.R.L.



Si tiene acné vulgar, acné rosácea, adelgazamiento de la piel, inflamación alrededor de la boca, reacciones posteriores a la vacunación, prurito anal o genital, dermatitis del pañal, varicela, herpes y, en general, una dermatitis infectada. Consulte a su médico para asegurarse de que no tiene ninguna de estas condiciones. ELOCON no debe aplicarse sobre la piel ulcerada.

#### Advertencias y precauciones

A menos que su médico se lo indique, no aplique ELOCON debajo de los apósitos, por periodos prolongados, en áreas extensas de la piel, en la cara o en pliegues de la piel, por ejemplo, debajo de los brazos o en los pliegues de la ingle. Esta precaución es especialmente aplicable a los niños.

El tratamiento en la cara no puede exceder los 5 días.

Evite todo contacto con los ojos, pero también con heridas y membranas mucosas. ELOCON no puede usarse en oftalmología o en los párpados.

Si los síntomas no mejoran en unos pocos días o si empeoran, consulte a su médico. Esto es especialmente importante cuando se trata la psoriasis.

Es recomendable lavarse las manos después de usar ELOCON.

Póngase en contacto con su médico si experimenta visión borrosa u otras alteraciones visuales.

#### Niños y adolescentes

En niños, ELOCON solo puede usarse siguiendo el consejo de un médico.

En niños, evite aplicar ELOCON debajo de un vendaje.

Evite aplicar ELOCON durante periodos prolongados, en áreas grandes de la piel, en la cara o en pliegues de la piel, por ejemplo, debajo de los brazos o en los pliegues de la ingle. El tratamiento en la cara no puede exceder los 5 días.

Dado que los niños tienen una relación superficie / peso corporal más alta que los adultos, los niños pueden ser más sensibles que los adultos a la inhibición del eje hipotalámico-pituitario-adrenal y al síndrome de Cushing inducido por los glucocorticoides.

Se recomienda administrar la cantidad más baja de glucocorticoides requerida para la eficacia, particularmente en niños. El tratamiento crónico con glucocorticoides puede interferir con el crecimiento y desarrollo del niño.

#### Otras medicinas y ELOCON

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta.


#### Embarazo y lactancia

Su médico decidirá si puede usar ELOCON durante el embarazo o la lactancia.

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

#### Conducción y uso de máquinas


ELOCON no tiene influencia sobre la capacidad de conducir o usar máquinas.



José Nerone  
Apoderado  
MSD ARGENTINA S.R.L.



Alejandro Balónas  
IF-2018-09020486-4-APN-DERM#ANMAT  
MSD ARGENTINA S.R.L.



La loción tópica ELOCON contiene propilenglicol, que puede causar irritación de la piel.

La pomada de ELOCON contiene estearato de propilenglicol, que puede causar reacciones cutáneas locales (por ejemplo, eczema).

### 3. Cómo usar ELOCON

Aplicación tópica. Uso externo.

Aplice una capa delgada de ELOCON crema o ELOCON ungüento una vez al día en el área de la piel que se va a tratar. Masajear suavemente para frotar la crema o ungüento.

Aplice unas gotas de ELOCON loción una vez al día en las regiones pilosas, incluido el cuero cabelludo. Masajear suavemente para frotar la loción tópica.

Lávese las manos después de aplicar ELOCON.

A menos que su médico especifique lo contrario:

- Evitar suspender abruptamente el tratamiento a largo plazo;
- No le dé su medicamento a otra persona;
- No use el medicamento para otras indicaciones que no sean las recetadas.

Si usa más ELOCON del que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 - 0800-444-8694.

(Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 - 4658-7777.

Hasta la fecha, no se han informado casos de sobredosis de ELOCON. Sin embargo, en caso de sobredosis, ingestión accidental o absorción por la boca, consulte a su médico de inmediato.

Si olvidó usar ELOCON

No aplique una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si deja de usar ELOCON


No detenga el tratamiento abruptamente. Consulte a su médico para obtener más información.


Si tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento, consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.


### 4. Posibles reacciones adversas

Al igual que todos los medicamentos, ELOCON puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Se han observado las siguientes reacciones adversas: sequedad de la piel, hormigueo, picazón, forúnculos, decoloración de la piel, hipertrichosis (crecimiento excesivo de pelos y cabello), cambios en la forma en que se siente la piel (parestesia), inflamación, adelgazamiento de la piel.

  
José Nerone  
Apoderado  
MSD ARGENTINA S.R.L.

  
Alejandro Belones  
IF-2018-09020486-400-APN-DERM#ANMAT  
MSD ARGENTINA S.R.L.



aumento de la dilatación de los pequeños vasos sanguíneos de la piel, estrías, eritema (enrojecimiento), acné, púrpura (decoloración púrpura o café rojiza de la piel), dermatitis de contacto, dolor en el sitio de aplicación, visión borrosa.

Cuando se aplica ELOCON, especialmente ELOCON loción, pueden producirse sensaciones de ardor e irritación.

También pueden ocurrir otras reacciones adversas cuando el área tratada de la piel está cubierta con un vendaje o cuando se tratan áreas grandes. En ese caso, comuníquese con su médico.

Si siente cualquiera de las reacciones mencionadas o si nota alguna reacción adversa no mencionada en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

#### 5. Cómo conservar ELOCON

Mantener fuera del alcance de los niños.

ELOCON Crema: Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 25°C.

ELOCON Loción: Conservar a temperatura ambiente hasta 30°C.

ELOCON Ungüento: Conservar a temperatura ambiente hasta 30°C.

No utilice este medicamento después de la fecha que figura en el envase.

#### 6. Contenido del paquete y otra información

##### Qué contiene ELOCON

El principio activo es Furoato de Mometasona.

Los demás componentes son:

ELOCON crema: parafina blanca suave, cera de abejas blancas, fosfatidilcolina, hexilenglicol, dióxido de titanio, octenulsuccinato aluminico de almidón, agua purificada, ácido fosfórico diluido para ajustar pH c.s.

ELOCON Ungüento: hexileno glicol, propilenglicol estearato, cera blanca, vaselina blanca y agua purificada.

ELOCON loción: alcohol isopropílico, propilenglicol, hidroxipropilcelulosa, fosfato de sodio monobásico monohidrato y agua purificada.

##### Presentaciones de ELOCON

ELOCON Crema: Pomo conteniendo 5g, 15g, 30g o 500g.


ELOCON Loción: Frasco conteniendo 5ml, 15ml, 20ml, 30 ml, 60ml, 250ml o 500ml.


ELOCON Ungüento: 5g, 15g, 30g o 500g.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ESTE MEDICAMENTO DEBE SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA.**

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.

  
José Nerone  
Apoderado  
MSD ARGENTINA S.R.L.

  
Alejandro Balonias  
IF-2018-09020486-APN-DERM#ANMAT  
MSD ARGENTINA S.R.L.

**PROYECTO DE PROSPECTO**



Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud:

Certificado N° 40.204

Fabricado por:

ELOCON Crema: Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-Op-Den-Berg, Bélgica.

INDUSTRIA BELGA.

ELOCON Loción: Eurofarma Argentina S.A., Av. San Martín 4550, La Tablada, La Matanza, Provincia de Buenos Aires.

INDUSTRIA ARGENTINA

ELOCON Unguento: Sanofi Aventis Argentina S.A., Av. San Martín 4550, La Tablada, La Matanza, Provincia de Buenos Aires.

INDUSTRIA ARGENTINA

Comercializado en Argentina por: MSD Argentina S.R.L., Cazadores de Coquimbo 2841/57 piso 4, Munro (B1605AZE), Vicente López, Prov. de Buenos Aires. Tel.: 6090-7200. [www.msd.com.ar](http://www.msd.com.ar)

Directora Técnica: Cristina B. Wiese, Farmacéutica.

Representante en Uruguay: Cía. Cibeles S.A., 12 de diciembre 767, Montevideo. D.T.Q.F. Carolina Harley. Reg MSP Elocon Crema, N° 316T0 y Reg MSP Elocon Loción N° 33211, Condición de venta: Control Médico Recomendado.

¿Cuándo se revisó este prospecto por última vez?

Este prospecto se revisó por última vez:

S-CCPPI-MK0887-MTL-082017

MK0887-ARG-2017-016415

José Nerone  
Apoderado  
MSD ARGENTINA S.R.L.

Alejandro Balón  
IF-2018-20026486-APN-DERM#ANMAT  
MSD ARGENTINA S.R.L.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2018-29020486-APN-DERM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Lunes 18 de Junio de 2018

**Referencia:** 16795-17-2 inf paciente elocon.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117584  
Date: 2018.06.18 07:18:08 -03'00'

Federico Pastore  
Asistente técnico  
Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117584  
Date: 2018.06.18 07:18:08 -03'00'