



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Disposición

Número:

Referencia: 1-47-2002-000641-22-4

VISTO el expediente 1-47-2002-000641-22-4 del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. solicita la autorización de inclusión de una nueva concentración, con sus correspondientes datos característicos, rótulos, prospecto e información para el paciente para la Especialidad Medicinal denominada NUCALA / MEPOLIZUMAB, aprobada por Certificado N° 58.372.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos N° 16.463 y Decreto N° 150/92.

Que obra el informe técnico de evaluación favorable de la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos del Instituto Nacional de Medicamentos.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nro. 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorízase a la firma GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. la inclusión de una nueva concentración, con sus correspondientes datos característicos, para la Especialidad Medicinal denominada NUCALA / MEPOLIZUMAB, aprobada por Certificado N° 58.372: “NUCALA/MEPOLIZUMAB, Forma Farmacéutica: Solución inyectable, Concentración: 40 mg/0,4 ml, Fórmula Cualitativa-Cuantitativa: Mepolizumab 40 mg; Sacarosa 48,0 mg; Fosfato sódico dibásico heptahidratado 1,66 mg; Ácido cítrico monohidratado 0,38 mg; Polisorbato 80 0,08 mg; EDTA disódico dihidrato 0,0074 mg y Agua para inyectables c.s.p. 0,4 ml, Vía de administración: SUBCUTÁNEA, Envase: Jeringa de vidrio tipo I prellenada con aguja de acero inoxidable con protector de aguja, Presentación: Envases conteniendo 1 jeringa prellenada con protector de aguja, Período de Vida Útil: 36 meses, Condiciones de Conservación: Almacenar la jeringa prellenada en la heladera entre 2 °C y 8 °C. Conservar el producto en el envase original para protegerlo de la luz hasta el momento de usar. No congelar. No agitar. Evitar la exposición al calor. Si fuera necesario, se podrá almacenar en el envase cerrado fuera de la heladera a una temperatura de hasta 30 °C durante un período máximo de 7 días. En caso de dejar fuera de la heladera durante más de 7 días, se deberá descartar el producto de forma segura. La jeringa prellenada debe utilizarse dentro de las 8 horas de haberse extraído del envase. Si no lo hizo en ese lapso, deberá descartarla, Elaborador: Human Genome Sciences, Inc. 9911 Belward Campus Drive, Rockville, Estados Unidos. Elaborador de Ingrediente Farmacéutico Activo Glaxo Operations UK Ltd. (comercialmente Glaxo Welcome Operations). Harmire Road, Barnard Castle, County Durham, DL12 8DT; Reino Unido. Elaborador del producto terminado, Indicación: NUCALA 40 mg/0,4 ml está indicado como tratamiento de mantenimiento adicional en pacientes pediátricos de 6 años de edad y mayores, que sufren asma grave y que tienen un fenotipo eosinofílico. Limitaciones de uso: NUCALA no está indicado para aliviar broncoespasmos agudos o status asmático”; además de lo ya autorizado hasta la fecha de la presente Disposición”.

ARTICULO 2°.- Autorízase a la firma GSK BIOPHARMA ARGENTINA S.A. los nuevos rótulos, prospecto e información para el paciente para la Especialidad Medicinal denominada NUCALA / MEPOLIZUMAB, aprobada por Certificado N° 58.372 que constan como IF-2023-87252132-APN-DECBR#ANMAT, IF-2023-87252015-APN-DECBR#ANMAT e IF-2023-87251743-APN-DECBR#ANMAT.

ARTICULO 3°.- Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 58.372 cuando el mismo se presente acompañado de la presente Disposición.

ARTICULO 4°.- Regístrese. Notifíquese electrónicamente al interesado la presente Disposición, rótulos, prospecto e información para el paciente. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-2002-000641-22-4

mdg

Digitally signed by LIMERES Manuel Rodolfo
Date: 2023.08.16 13:06:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.08.16 13:07:02 -03:00

PROYECTO DE ROTULO DE ENVASE PRIMARIO

**NUCALA
MEPOLIZUMAB 40mg/0,4ml
Solución Inyectable
Subcutánea**

1 jeringa prellenada = 0,4ml (**40mg/0,4ml**)

Fecha de vencimiento

Número de lote

Nota: debido al reducido tamaño de la etiqueta algunos términos podrán ser abreviados en el arte del producto.



FLAMINI Lidia Cristina
CUIL 27316737124

PROYECTO DE RÓTULO SECUNDARIO
NUCALA
MEPOLIZUMAB 40 mg/0,4 ml
Solución inyectable
Administración subcutánea

Venta bajo receta

Industria Reino Unido

FÓRMULA

Cada jeringa prellenada de NUCALA contiene:

Mepolizumab 40 mg; Sacarosa 48,0 mg; Fosfato sódico dibásico heptahidratado 1,66 mg; Ácido cítrico monohidratado 0,38 mg; Polisorbato 80 0,08 mg; EDTA disódico dihidrato 0,0074 mg; Agua para inyectables csp 0,4 ml.

POSOLÓGIA: Ver prospecto adjunto.

CONSERVACIÓN: Almacenar entre 2 °C y 8 °C. Conservar en el envase original para proteger de la luz. No congelar. No agitar. Evitar la exposición al calor.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Establecimiento elaborador a granel, acondicionador primario y secundario: Glaxo Operations UK Ltd, Harmire Road, Barnard Castle, County Durham, DL12 8DT, Reino Unido.

Importado por: **GlaxoSmithKline Argentina S.A.** - Carlos Casares 3690, (B1644BCD) Victoria, Buenos Aires, Argentina.

Titular: GlaxoSmithKline Argentina S.A.

Directora Técnica: M. Fabiana Vitale – Farmacéutica

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 58.372

Las marcas son propiedad de o licenciadas al grupo de compañías GSK.

© 20XX Grupo de compañías GSK o sus licenciantes.

Envase conteniendo 1 jeringa prellenada.

Fecha de vencimiento

Número de Lote

Troquel:

NUCALA

40 mg/0,4 ml

Sol. Iny. x 1 jeringa

Número PAMI

Código EAN

Presionar para abrir

No aceptar si el sello está roto



FLAMINI Lidia Cristina
CUIL 27316737124



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Rotulo NUCALA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.07.28 10:54:49 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.07.28 10:54:50 -03:00

NUCALA
MEPOLIZUMAB 40 mg/0,4 ml
Solución inyectable
Vía subcutánea

Venta Bajo Receta

Industria Reino Unido

COMPOSICIÓN CUALI-CUANTITATIVA

Cada jeringa prellenada de NUCALA 40 mg/0,4 ml contiene:

Mepolizumab 40 mg; Sacarosa 48,0 mg; Fosfato sódico dibásico heptahidratado 1,66 mg; Ácido cítrico monohidratado 0,38 mg; Polisorbato 80 0,08 mg; EDTA disódico dihidrato 0,0074 mg; Agua para inyectables csp 0,4 ml.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Agentes para padecimientos obstructivos de las vías respiratorias, otros agentes sistémicos para padecimientos obstructivos de las vías respiratorias (código ATC: R03DX09).

INDICACIONES

NUCALA 40 mg/0,4 ml está indicado como tratamiento de mantenimiento adicional en pacientes pediátricos de 6 años de edad y mayores, que sufren asma grave y que tienen un fenotipo eosinofílico (ver **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES-Uso pediátrico**, y **PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS-Estudios Clínicos**).

Limitaciones de uso

NUCALA no está indicado para aliviar broncoespasmos agudos o status asmático.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Descripción

Mepolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado antagonista de la IL-5. Mepolizumab se produce mediante tecnología de ADN recombinante en células de ovario de hámster chino. Mepolizumab tiene un peso molecular de aproximadamente 149 kDa.

NUCALA es una solución para uso subcutáneo estéril, sin conservantes, de color claro a opalescente, incolora o amarillo claro a marrón claro. Se suministra en una jeringa prellenada de una única dosis de 0,4 ml con una aguja fija de calibre 29 de media pulgada con un protector de aguja. Cada 0,4 ml brinda 40 mg de mepolizumab, ácido cítrico monohidrato, EDTA disódico dihidrato, polisorbato 80, fosfato dibásico de sodio heptahidratado y sacarosa, con un pH de 6,3.

La jeringa prellenada no está fabricada con látex de goma natural.

Mecanismo de acción

Mepolizumab es un antagonista de la IL-5 (IgG1, kappa). La IL-5 es la principal citocina responsable del crecimiento y diferenciación, reclutamiento, activación y supervivencia de los eosinófilos. Mepolizumab inhibe la actividad biológica de la IL-5 mediante el bloqueo de la unión de la IL-5 con una disociación constante de 100 pM a la cadena alfa del complejo del receptor de la IL-5 que se expresa en la superficie celular de los eosinófilos. La inflamación es un componente importante en la patogénesis del asma. Múltiples tipos celulares (por ejemplo, mastocitos, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, linfocitos) y mediadores (por ejemplo, histamina, eicosanoides, leucotrienos, citoquinas) participan de la inflamación. Mepolizumab inhibe así la señalización de la IL-5 y disminuye la producción y la supervivencia de los eosinófilos. Sin embargo, el mecanismo de acción de mepolizumab en el asma no se ha establecido en forma definitiva.

Propiedades farmacodinámicas

Se evaluó la respuesta farmacodinámica (reducción de los eosinófilos en sangre) luego de dosis repetidas de mepolizumab administradas por vía subcutánea o intravenosa en pacientes adultos con asma y niveles de eosinófilos en sangre >200 células/μl. Los pacientes recibieron 1 de 4 tratamientos con mepolizumab (administrados cada 28 días en un total de 3 dosis): 12,5 mg administración subcutánea, 125 mg administración subcutánea, 250 mg administración subcutánea o 75 mg administración intravenosa. 77 de los 70 pacientes aleatorizados completaron el estudio.

En comparación con los niveles basales, los eosinófilos en sangre disminuyeron de manera dependiente de la dosis. Se observó una reducción de los niveles de eosinófilos en sangre en todos los grupos de tratamiento para el Día 3 (48 horas después de la dosis). En el Día 84 (4 semanas después de la última dosis), la reducción de la media geométrica observada respecto del valor basal de los eosinófilos en sangre fue del 64%, 78%, 84% y 90% en los grupos de tratamiento con 12,5 mg administración subcutánea, 75 mg administración intravenosa, 125 mg administración subcutánea y 250 mg administración subcutánea, respectivamente. Se calculó que las dosis de administración subcutánea previstas por el modelo que brindaron un 50% y 90% de reducción máxima de los eosinófilos en sangre el Día 84, fueron de 11 mg y 99 mg, respectivamente. Estos resultados, sumados a los datos sobre la eficacia clínica derivados del estudio de exacerbaciones y búsqueda del rango de dosis en pacientes adultos y adolescentes con asma grave (Estudio 1), avalaron la evaluación

de mepolizumab 75 mg administración intravenosa y 100 mg administración subcutánea en los estudios confirmatorios de asma grave (ver **PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS-Estudios clínicos**).

Después de la administración subcutánea de una dosis de 100 mg cada 4 semanas durante 32 semanas en pacientes adultos y adolescentes con asma grave (Estudio 2), los eosinófilos sanguíneos disminuyeron hasta una media geométrica del recuento de 40 células/ μ l. Esto se corresponde con una media geométrica de reducción del 84% en comparación con el placebo.

La respuesta farmacodinámica (reducción de los eosinófilos en sangre) también se evaluó en niños de entre 6 y 11 años de edad con asma grave. Luego de la administración subcutánea de 40 mg de mepolizumab cada 4 semanas durante 52 semanas, los eosinófilos en sangre se redujeron hasta alcanzar una media geométrica de recuento de 48 células/ μ l. Esto corresponde a una reducción de la media geométrica del 85% desde el período basal.

La magnitud de la disminución en adultos, adolescentes y niños se observó dentro de las 4 semanas del tratamiento y se mantuvo durante todo el período de tratamiento.

Propiedades farmacocinéticas

Después de la administración subcutánea en pacientes adultos con asma, mepolizumab exhibió una farmacocinética aproximadamente proporcional a la dosis en un rango de dosis de 12,5 mg a 250 mg.

La administración subcutánea de mepolizumab 300 mg tuvo aproximadamente 3 veces la exposición sistémica de mepolizumab 100 mg.

Absorción

Después de la administración subcutánea de 100 mg en el brazo de pacientes adultos y adolescentes con asma, la biodisponibilidad de mepolizumab fue de alrededor del 80%.

Luego de la administración subcutánea repetida una vez cada 4 semanas, hubo una acumulación de unas 2 veces en estado estacionario.

Distribución

Se calcula que el volumen central de distribución de mepolizumab en la población de pacientes adultos con asma es de 3,6 l para un individuo de 70 kg.

Metabolismo

Mepolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado IgG1 degradado por enzimas proteolíticas, que se distribuyen ampliamente en el cuerpo y no están limitadas al tejido hepático.

Eliminación

Después de la administración subcutánea de mepolizumab a pacientes adultos con asma, el promedio de la vida media de eliminación ($t_{1/2}$) varió entre 16 y 22 días. Se estima que el clearance sistémico aparente poblacional de mepolizumab en pacientes adultos y adolescentes con asma es de 0,28 l/día para un individuo de 70 kg.

Poblaciones especiales de pacientes

Grupos raciales y pacientes de género masculino y femenino

El análisis de farmacocinética poblacional indicó que no hubo un efecto significativo de la raza y del género en el clearance de mepolizumab.

Edad

El análisis de farmacocinética poblacional indicó que no hubo un efecto significativo de la edad sobre el clearance de mepolizumab.

Pacientes pediátricos

La farmacocinética de mepolizumab luego de la administración subcutánea a pacientes de entre 6 y 11 años de edad con asma grave fue investigada en la fase inicial del tratamiento de 12 semanas de un estudio clínico abierto. Las exposiciones (ABC) luego de la administración subcutánea ya sea de 40 mg (en niños con un peso <40 kg) o de 100 mg (en niños con un peso \geq 40 kg) fueron de 1,32 y 1,97 veces más altas, respectivamente, en comparación a aquellas observadas en adultos y adolescentes que recibieron 100 mg. Teniendo en cuenta estos resultados, la simulación de una dosis subcutánea de 40 mg cada 4 semanas en niños de entre 6 y 11 años de edad, independientemente del peso corporal, resultó en exposiciones predecibles similares a aquellas observadas en adultos y adolescentes.

Pacientes con insuficiencia renal

No se realizaron estudios clínicos para investigar el efecto de la insuficiencia renal sobre la farmacocinética de mepolizumab. Sobre la base de análisis de farmacocinética poblacional, el clearance de mepolizumab fue comparable entre los pacientes con valores de clearance de creatinina entre 50 y 80 ml/min y los pacientes con función renal normal. Se dispone de datos limitados en pacientes con valores de clearance de creatinina <50 ml/min. No obstante, mepolizumab no se depura por vía renal.

Pacientes con insuficiencia hepática

No se realizaron estudios clínicos para investigar el efecto de la insuficiencia hepática sobre la farmacocinética de mepolizumab. Debido a que mepolizumab es degradado por enzimas proteolíticas ampliamente distribuidas, no limitadas al tejido hepático, es improbable que los cambios en la función hepática tengan algún efecto sobre la eliminación de mepolizumab.

Estudios de Interacciones medicamentosas

No se han llevado a cabo estudios formales de interacción medicamentosa con mepolizumab. En los análisis de farmacocinética poblacional de los estudios de fase 3, no hubo evidencia del efecto de los fármacos de molécula pequeña comúnmente co-administrados en la exposición a mepolizumab.

Estudios clínicos

El programa de desarrollo de asma para NUCALA en pacientes de 12 años de edad y mayores incluyó tres estudios clínicos aleatorizados, doble ciego, controlados con placebo: un estudio de exacerbaciones y búsqueda del rango de dosis (Estudio 1, NCT01000506), y dos estudios confirmatorios (Estudio 2, NCT01691521 y Estudio 3, NCT01691508). Mepolizumab se administró cada 4 semanas en los tres estudios como tratamiento complementario a la terapia de base. Todos los pacientes continuaron con su terapia de base para el asma durante los estudios.

Estudio de exacerbaciones y búsqueda del rango de dosis

El Estudio 1 fue un estudio de 52 semanas de búsqueda del rango de dosis y reducción de las exacerbaciones en pacientes con asma grave y antecedentes de 2 exacerbaciones o más en el año anterior, a pesar del uso periódico de dosis altas de corticosteroides inhalados en combinación con otros fármacos para control, con o sin corticosteroides orales. Los pacientes enrolados en este estudio debían presentar al menos 1 de los siguientes 4 criterios predeterminados en los 12 meses anteriores: recuento de eosinófilos en sangre ≥ 300 células/ μ l, recuento de eosinófilos en esputo $\geq 3\%$, concentración de óxido nítrico exhalado ≥ 50 ppb, o deterioro en el control del asma luego de una reducción $\leq 25\%$ en los corticosteroides inhalados/corticosteroides orales para mantenimiento periódico. Se evaluaron tres dosis intravenosas de mepolizumab (75 mg, 250 mg y 750 mg) administradas una vez cada 4 semanas en comparación con placebo. Los resultados de este estudio y del estudio de farmacodinámica respaldaron la evaluación de mepolizumab 75 mg intravenosa y 100 mg subcutánea en los estudios subsiguientes (ver **PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS-Propiedades farmacodinámicas**). NUCALA no está indicado para uso intravenoso y debe administrarse solo por vía subcutánea.

Estudios confirmatorios

Se estudió a un total de 711 pacientes con asma grave en dos estudios confirmatorios (Estudios 2 y 3). En estos dos estudios, los pacientes debían tener eosinófilos en sangre ≥ 150 células/ μ l en la fase de selección (dentro de las 6 semanas de la dosis) o eosinófilos en sangre ≥ 300 células/ μ l en un lapso de 12 meses desde el enrolamiento. El criterio de eosinófilos en sangre ≥ 150 células/ μ l en la selección derivó de los análisis exploratorios de los datos provenientes del Estudio 1. El Estudio 2 fue un estudio de 32 semanas, controlado con placebo y con control activo, en pacientes con asma grave y antecedentes de 2 exacerbaciones o más en el año previo, a pesar del uso periódico de dosis altas de corticosteroides inhalados más otros controladores, con o sin corticosteroides orales. Los pacientes recibieron mepolizumab 75 mg intravenoso (n=191), NUCALA 100 mg (n=194) o placebo (n=191) una vez cada 4 semanas durante 32 semanas.

El Estudio 3 fue un estudio de 24 semanas con reducción de los corticosteroides orales en pacientes con asma grave que requerían uso diario de corticosteroides orales, además del uso periódico de dosis altas de corticosteroides inhalados en combinación con otros fármacos a fin de mantener el control del asma. Los pacientes del Estudio 3 no debían presentar antecedentes de exacerbaciones en el año anterior. Los pacientes recibieron NUCALA 100 mg (n=69) o placebo (n=66) una vez cada 4 semanas durante 24 semanas. La media del uso basal de corticosteroides orales fue similar en los dos grupos de tratamiento: 13,2 mg en el grupo que recibió placebo y 12,4 mg en el grupo que recibió NUCALA 100 mg.

La demografía y las características basales de estos tres estudios se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1. Demografía y características basales de los Estudios de asma grave

	Estudio 1 (n=616)	Estudio 2 (n=576)	Estudio 3 (n=135)
Media de edad (años)	49	50	50
Mujeres, n (%)	387 (63)	328 (57)	74 (55)
De raza blanca, n (%)	554 (90)	450 (78)	128 (95)
Duración del asma, años, media	19	20	19
Jamás fumó, n (%)	483 (78)	417 (72)	82 (61)

VEF ₁ basal, l	1,88	1,82	1,95
% del VEF ₁ basal previsto	60	61	59
% de reversibilidad basal	25	27	26
VEF ₁ /CVF basales luego de SABA	0,67	0,66	0,66
Media geométrica de recuento de eosinófilos en el período basal, células/ μ l	250	290	240
Media del número de exacerbaciones en el año anterior	3,6	3,6	3,1

VEF₁ = volumen espiratorio forzado en 1 segundo, SABA = agonista beta₂ de acción corta (del inglés *short-acting beta₂-agonist*), CVF = capacidad vital forzada

Exacerbaciones

Se evaluó la eficacia en los Estudios 1 y 2 utilizando un criterio de valoración de la frecuencia de exacerbaciones definidas como agravamiento del asma que requirió el uso de corticosteroides orales/sistémicos, y/o de hospitalización y/o visitas a la guardia. Para los pacientes con corticosteroides orales de mantenimiento, se definió como exacerbación que requirió de corticosteroides orales al uso de corticosteroides orales/sistémicos con al menos el doble de la dosis existente durante por lo menos 3 días. En comparación con placebo, los pacientes que recibieron NUCALA 100 mg o mepolizumab 75 mg intravenoso presentaron una cantidad significativamente menor de exacerbaciones. Asimismo, en comparación con placebo, hubo menos exacerbaciones que precisaron de hospitalización y/o visitas a la guardia, y exacerbaciones que solo requirieron una hospitalización con NUCALA 100 mg (Tabla 2).

Tabla 2. Tasa de exacerbaciones en asma grave en los Estudios 1 y 2 (población con intención de tratar)


Estudio	Tratamiento	Exacerbaciones por año		
		Tasa	Diferencia	Relación de tasa (IC 95 %)
Todas las exacerbaciones				
Estudio 1	Placebo (n=155)	2,40		
	Mepolizumab 75 mg IV (n=153)	1,24	1,16	0,52 (0,39; 0,69)
Estudio 2	Placebo (n=191)	1,74		
	Mepolizumab 75 mg IV (n=191)	0,93	0,81	0,53 (0,40; 0,72)
	NUCALA 100 mg SC (n=194)	0,83	0,91	0,47 (0,35; 0,64)
Exacerbaciones que requirieron de hospitalización/visita a la guardia				
Estudio 1	Placebo (n=155)	0,43		
	Mepolizumab 75 mg IV (n=153)	0,17	0,26	0,40 (0,19; 0,81)
Estudio 2	Placebo (n=191)	0,20		
	Mepolizumab 75 mg IV (n=191)	0,14	0,06	0,68 (0,33; 1,41)
	NUCALA 100 mg SC (n=194)	0,08	0,12	0,39 (0,18; 0,83)
Exacerbaciones que requirieron de hospitalización				
Estudio 1	Placebo (n=155)	0,18		
	Mepolizumab 75 mg IV (n=153)	0,11	0,07	0,61 (0,28; 1,33)

Estudio 2	Placebo (n=191)	0,10		
	Mepolizumab 75 mg IV (n=191)	0,06	0,04	0,61 (0,23; 1,66)
	NUCALA 100 mg SC (n=194)	0,03	0,07	0,31 (0,11; 0,91)

IV = intravenoso, SC = subcutáneo, IC = intervalo de confianza.

El tiempo hasta la primera exacerbación fue más prolongado en los grupos que recibieron NUCALA 100 mg y mepolizumab 75 mg intravenoso en comparación con placebo en el Estudio 2 (Figura 1).

Figura 1. Curva de incidencia acumulada de Kaplan-Meier para el tiempo hasta la primera exacerbación (Estudio 2 de asma grave)



*Las barras de error indican intervalos de confianza del 95 %.

IV = intravenoso, SC = subcutáneo

Se analizaron los datos del Estudio 1 para determinar los criterios que pudieran identificar a los pacientes con probabilidades de beneficiarse gracias al tratamiento con NUCALA. El análisis exploratorio sugirió que el recuento basal de eosinófilos en sangre ≥ 150 células/ μl fue un predictor potencial del beneficio del tratamiento. El análisis exploratorio de los datos del Estudio 2 sugirió además que el recuento basal de eosinófilos en sangre ≥ 150 células/ μl (obtenido dentro de las 6 semanas de la dosis) fue un predictor potencial de la eficacia y mostró una tendencia de mayor beneficio en reducir exacerbaciones con un mayor recuento de eosinófilos en sangre. En el Estudio 2, los pacientes enrolados únicamente según el recuento histórico de eosinófilos en sangre ≥ 300 células/ μl en los últimos 12 meses, pero que presentaban un recuento basal de eosinófilos en sangre < 150 células/ μl , casi no tuvieron beneficios en términos de exacerbaciones luego del tratamiento con NUCALA 100 mg en comparación con placebo.

El Cuestionario de Control del Asma-5 (ACQ-5, *Asthma Control Questionnaire-5*) se evaluó en los Estudios 1 y 2, y el Cuestionario Respiratorio de St. George (SGRQ, *Saint George's Respiratory Questionnaire*) se evaluó en el Estudio 2. En el Estudio 1, la tasa de pacientes con respuesta en el ACQ-5 (definida como una disminución en el puntaje de 0,5 o más como umbral) para el grupo de 75 mg intravenoso de mepolizumab fue del 47% en comparación con el 50% para placebo, con una relación de probabilidad de 1,1 (IC 95%: 0,7; 1,7). En el Estudio 2, la tasa de pacientes con respuesta en el ACQ-5 para el grupo de tratamiento con NUCALA 100 mg fue del 57% en comparación con el 45% para placebo, con una relación de probabilidad de 1,8 (IC 95%: 1,2; 2,8). En el Estudio 2, la tasa de pacientes con respuesta en el SGRQ (definida como una disminución en el puntaje de 4 o más como umbral) para el grupo de tratamiento con NUCALA 100 mg fue del 71% en comparación con el 55% para placebo, con una relación de probabilidad de 2,1 (IC 95%: 1,3; 3,2).

Reducción de los corticosteroides orales

El Estudio 3 evaluó el efecto de NUCALA 100 mg para reducir el uso de corticosteroides orales de mantenimiento. La eficacia se evaluó utilizando como criterio de valoración primario la reducción porcentual en la dosis de corticosteroides orales durante las Semanas 20 a 24 en comparación con la dosis basal, manteniendo el control del asma. Se clasificó a los pacientes de acuerdo con su cambio en el uso de corticosteroides orales durante el estudio con las siguientes categorías: disminución del 90% al 100%, disminución del 75% a $< 90\%$, disminución del 50% a $< 75\%$, disminución de $> 0\%$ a $< 50\%$ y sin mejora (es decir, sin cambios, o cualquier aumento o falta de control del asma, o interrupción del tratamiento). En

comparación con placebo, los pacientes que recibieron NUCALA 100 mg alcanzaron reducciones mayores en la dosis diaria de mantenimiento con corticosteroides orales, manteniendo el control del asma. 16 pacientes (23%) del grupo que recibió NUCALA 100 mg versus 7 pacientes (11%) del grupo de placebo tuvieron una reducción del 90% al 100% en su dosis de corticosteroides orales. 25 pacientes (36%) del grupo que recibió NUCALA 100 mg versus 37 pacientes (56%) del grupo de placebo fueron clasificados como pacientes sin mejora en la dosis de corticosteroides orales. Asimismo, el 54% de los pacientes tratados con NUCALA 100 mg lograron una reducción de por lo menos el 50% en la dosis diaria de prednisona en comparación con el 33% de los pacientes tratados con placebo (IC 95% para la diferencia: 4%, 37%). También se llevó a cabo un análisis exploratorio con el subgrupo de 29 pacientes del Estudio 3 que presentaron un recuento de eosinófilos en sangre promedio basal y en la selección de <150 células/ μ l. 5 pacientes (29%) del grupo que recibió NUCALA 100 mg versus 0 pacientes (0%) del grupo de placebo presentaron una reducción del 90% al 100% en la dosis. 4 pacientes (24%) del grupo que recibió NUCALA 100 mg versus 8 pacientes (67%) del grupo de placebo fueron clasificados como pacientes sin mejora para la dosis de corticosteroides orales. Además, se evaluaron el ACQ y el SGRQ en el Estudio 3, que mostró resultados similares a los del Estudio 2.

Función pulmonar

El cambio respecto del valor basal en la media del volumen espiratorio forzado en 1 segundo (VEF₁) se midió en los 3 estudios y se presenta en la Tabla 3. En comparación con placebo, NUCALA 100 mg no aportó mejoras de manera consistente en la media del cambio respecto del valor basal del VEF₁.

Tabla 3. Cambio respecto del valor basal en el VEF₁ (ml) en Estudios de asma grave

Estudio	Diferencia respecto de placebo en la media del cambio respecto del valor basal en el VEF ₁ , en ml (IC 95%)		
	Semana 12	Semana 24	Semanas 32/52
1 ^a	10 (-87; 108)	5 (-98; 108)	61 (-39; 161) ^b
2 ^c	52 (-30; 134)	76 (-6; 159)	98 (11; 184) ^d
3 ^c	56 (-91; 203)	114 (-42; 271)	NC

VEF₁ = volumen espiratorio forzado en 1 segundo, IC = intervalo de confianza.

^a Dosis = 75 mg intravenosa

^b Volumen espiratorio forzado en 1 segundo (VEF₁) en la Semana 52

^c Dosis = 100 mg por vía subcutánea

^d VEF₁ en la Semana 32

El efecto de mepolizumab en la función pulmonar también se evaluó en un estudio de 12 semanas, controlado con placebo, en el que se enrolaron a pacientes con asma que recibían una dosis moderada de corticosteroides inhalados con evidencia de síntomas y deterioro de la función pulmonar. El enrolamiento no dependía de los antecedentes de exacerbaciones o de un recuento de eosinófilos predeterminado. El cambio en el VEF₁ respecto del valor basal en la Semana 12 fue numéricamente inferior en los grupos de tratamiento con mepolizumab que en el grupo de placebo.

POSOLÓGIA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

NUCALA es para uso subcutáneo solamente.

La dosis recomendada de NUCALA 40 mg/0,4 ml para inyección en pacientes pediátricos de entre 6 y 11 años de edad es de 40 mg administrados una vez cada 4 semanas mediante una inyección subcutánea en el brazo, el muslo o el abdomen (ver **POSOLÓGIA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN-Preparación y administración de la jeringa prellenada de NUCALA**).

Preparación y administración de la jeringa prellenada de NUCALA

La jeringa prellenada de 40 mg/0,4 ml debe usarse solamente en niños de 6 a 11 años de edad y debe ser administrada por el profesional de la salud o el cuidador del paciente. Luego de que el profesional de la salud así lo determine, el cuidador del paciente puede administrar la inyección de NUCALA de 40 mg/0,4 ml por vía subcutánea.

Proveer un entrenamiento adecuado sobre la técnica de inyección subcutánea, el modo de preparación y administración de la inyección de NUCALA antes del uso (ver **INSTRUCCIONES DE USO PARA LA JERINGA PRELLENADA**).

- 1- Extraiga la jeringa prellenada de la heladera y dejar a temperatura ambiente durante 30 minutos antes de la inyección. No templar la inyección de NUCALA de ninguna otra manera.
- 2- Realice una inspección visual de la jeringa prellenada para detectar materia particulada o descoloración antes de la administración. La solución de NUCALA debe ser de clara a opalescente y de incolora o amarillo claro a marrón claro. No administre la inyección de NUCALA en caso de que el producto exhiba decoloración, turbiedad o contenga materia particulada. No use la jeringa prellenada de NUCALA si se cayó sobre una superficie rígida.

- 3- Administre la inyección subcutánea en el muslo, abdomen, a una distancia de 5 cm (aproximadamente 2 pulgadas) del ombligo. La inyección subcutánea también puede administrarse en el brazo.
- 4- Nunca administre inyecciones en áreas donde la piel se encuentre sensible, con moretones, enrojecida o con durezas.
- 5- En caso de omitir una dosis, adminístrela lo antes posible. Luego, el paciente podrá retomar el esquema de dosificación el día de administración habitual. Si ya se debe aplicar la siguiente dosis, adminístrela según lo planeado.

CONTRAINDICACIONES

NUCALA está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a mepolizumab o a los excipientes de la formulación (ver **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**, y **PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS-Descripción**).

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Reacciones de hipersensibilidad

Se produjeron reacciones de hipersensibilidad (por ejemplo, anafilaxia, angioedema, erupción, broncoespasmo, hipotensión, urticaria) después de la administración de NUCALA. Estas reacciones se producen generalmente unas horas después de la administración, pero en algunos casos tuvieron un comienzo tardío (es decir, días). Ante una reacción de hipersensibilidad, debe discontinuarse NUCALA (ver **CONTRAINDICACIONES**)

Síntomas agudos de asma o deterioro de la enfermedad

NUCALA no debe usarse para tratar síntomas agudos de asma o exacerbaciones agudas. No usar NUCALA para tratar un broncoespasmo agudo o status asmático. Los pacientes deben consultar a un médico si el asma continúa sin controlar o si se agrava luego de iniciar el tratamiento con NUCALA.

Infecciones oportunistas: Herpes Zóster

En estudios clínicos controlados, se han observado casos de herpes zóster en pacientes que recibieron 100 mg de NUCALA.

Reducción de la dosis de corticosteroides

No discontinuar abruptamente los corticosteroides sistémicos o inhalados al iniciar la terapia con NUCALA. Las reducciones en la dosis de corticosteroides, si corresponden, deben ser graduales y llevarse a cabo con la supervisión directa de un médico. La disminución de la dosis de corticosteroides puede asociarse con síntomas de abstinencia sistémicos y/o desenmascarar afecciones suprimidas antes por la terapia sistémica con corticosteroides.

Infecciones parasitarias (helmintos)

Los eosinófilos pueden participar en la respuesta inmunológica a algunas infecciones por helmintos. Los pacientes con infecciones preexistentes comprobadas fueron excluidos de la participación en el programa clínico. Se desconoce si NUCALA incide en la respuesta del paciente a las infecciones parasitarias. Los pacientes con infecciones preexistentes por helmintos, deben tratarse antes del tratamiento con NUCALA. Si los pacientes se infectan mientras reciben tratamiento con NUCALA y no responden al tratamiento antihelmíntico, se debe considerar la discontinuación hasta que la infección se resuelva.

Interacciones medicamentosas

No se realizaron estudios formales de interacciones medicamentosas con NUCALA.

Carcinogénesis, mutagénesis y trastornos de fertilidad

No se han llevado a cabo estudios a largo plazo en animales para evaluar el potencial carcinogénico de mepolizumab. La literatura publicada con modelos animales sugiere que la IL-5 y los eosinófilos forman parte de una reacción inflamatoria temprana en el lugar de la oncogénesis y pueden promover el rechazo del tumor. No obstante, otros informes indican que la infiltración de eosinófilos en los tumores puede promover el crecimiento tumoral. En consecuencia, se desconoce el riesgo de neoplasias malignas en los seres humanos a causa de un anticuerpo anti-IL-5 como mepolizumab.

La fertilidad masculina y femenina no se vio afectada, ya que no hubo hallazgos histopatológicos adversos en los órganos reproductores de monos cynomolgus que recibieron mepolizumab durante 6 meses en dosis intravenosa de hasta 100 mg/kg una vez cada 4 semanas (aproximadamente 20 veces la máxima dosis recomendada en seres humanos (MRHD, *máximum recommended human dose*) de 300 mg sobre una base de ABC). El desempeño en el apareamiento y en la reproducción no se vio afectado en ratones CD-1 machos y hembras que recibieron un anticuerpo análogo que inhibe la actividad de la IL-5 murina a una dosis intravenosa de 50 mg/kg una vez por semana.

Embarazo y lactancia

Embarazo

Resumen del riesgo

Los datos sobre la exposición durante el embarazo son insuficientes para informar el riesgo asociado con el fármaco. Los anticuerpos monoclonales, como mepolizumab, se transportan a través de la placenta de manera lineal a medida que avanza el embarazo; por lo tanto, es probable que los posibles efectos en el feto sean mayores durante el segundo y el tercer trimestre del embarazo. En un estudio de desarrollo prenatal y postnatal realizado en monos cynomolgus, no hubo evidencia de daño fetal con la administración intravenosa de mepolizumab durante todo el embarazo en dosis que dieron lugar a exposiciones hasta alrededor de 9 veces la exposición de la máxima dosis recomendada en seres humanos (MRHD) de 300 mg subcutánea (ver **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES-Embarazo-Datos**).

En la población general de los Estados Unidos, el riesgo de base calculado de presentar defectos congénitos importantes y de tener un aborto en embarazos clínicamente reconocidos es de entre 2% y 4% y de entre 15% y 20%, respectivamente.

Consideraciones clínicas

Riesgo materno y/o embriofetal asociado con la enfermedad

En mujeres con asma mal controlada o moderadamente controlada, hay evidencia de que existe un mayor riesgo de preeclampsia en la madre, y de nacimiento prematuro, bajo peso al nacer y tamaño pequeño para la edad gestacional en el neonato. El nivel de control del asma debe monitorearse exhaustivamente en las mujeres embarazadas, y el tratamiento debe ajustarse según sea necesario a fin de mantener un control óptimo.

Datos

Datos en animales

En un estudio de desarrollo prenatal y postnatal, monos cynomolgus hembra preñados recibieron mepolizumab desde el Día 20 hasta el Día 140 de gestación con dosis que produjeron exposiciones hasta alrededor de 9 veces mayores que las que se alcanzaron con la MRHD (sobre una base de ABC con dosis intravenosa maternas de hasta 100 mg/kg una vez cada 4 semanas). Mepolizumab no provocó efectos adversos en el crecimiento fetal o neonatal (incluida la función inmunológica) hasta 9 meses después del nacimiento. No se realizaron exámenes para detectar malformaciones internas o esqueléticas. Mepolizumab atravesó la placenta en monos cynomolgus. Las concentraciones de mepolizumab fueron unas 2,4 veces más altas en las crías que en las madres hasta el Día 178 después del parto. Los niveles de mepolizumab en la leche materna fueron $\leq 0,5\%$ de la concentración sérica materna.

En un estudio de fertilidad, desarrollo embrionario temprano y desarrollo embriofetal, ratones

CD-1 hembra preñados recibieron un anticuerpo análogo que inhibe la actividad de la interleuquina-5 (IL-5) murina con una dosis intravenosa de 50 mg/kg una vez por semana durante toda la gestación. El anticuerpo análogo no fue teratogénico en ratones.

En general, se informó que el desarrollo embriofetal de ratones con deficiencia de la IL-5 no se ve afectado en relación con los ratones sin dicha deficiencia.

Lactancia

Resumen del riesgo

No existe información sobre la presencia de mepolizumab en la leche materna humana, los efectos en el lactante o los efectos en la producción de leche. No obstante, mepolizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado (IgG1 kappa), y la inmunoglobulina G (IgG) se encuentra presente en la leche materna humana en cantidades pequeñas. Mepolizumab estuvo presente en la leche materna de monos cynomolgus después del parto luego de la dosificación durante el embarazo (ver **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES-Embarazo**). Deben tenerse en cuenta los beneficios de amamantar para el desarrollo y la salud, además de la necesidad clínica de la madre de recibir NUCALA y cualquier efecto adverso potencial para el lactante a causa de mepolizumab o de la afección subyacente de la madre.

Uso pediátrico

La seguridad y la eficacia de NUCALA se ha establecido en pacientes pediátricos de 6 años de edad y mayores con asma grave y que tienen un fenotipo eosinofílico.

El uso de NUCALA en pacientes pediátricos de entre 6 y 11 años de edad con asma grave y que tienen un fenotipo eosinofílico, está avalado mediante la evidencia proveniente de estudios adecuados y controlados en adultos y adolescentes con datos adicionales de seguridad, farmacocinética y farmacodinámica en niños de entre 6 y 11 años de edad. Se ha realizado un único estudio clínico abierto (NCT02377427) en 36 niños de entre 6 y 11 años de edad (media de edad de 8,6 años, 31% mujeres) con asma grave. Los criterios de enrolamiento fueron iguales al de los adolescentes en el estudio de exacerbación de 32 semanas (Estudio 2). En base a los datos de farmacocinética de este estudio, se determinó que la dosis de 40 mg administrada por vía subcutánea cada 4 semanas tiene una exposición similar a la dosis de 100 mg administrada por vía subcutánea en adultos y adolescentes (ver **PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS-Propiedades farmacocinéticas**).

La eficacia de NUCALA en pacientes pediátricos de entre 6 y 11 años de edad se extrapola de la eficacia en adultos y adolescentes y los datos de los análisis farmacocinéticos muestran niveles similares de exposición

al fármaco de 40 mg administrados por vía subcutánea cada 4 semanas en niños de entre 6 y 11 años de edad en comparación con adultos y adolescentes (ver **PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS-Propiedades farmacocinéticas**). El perfil de seguridad y la respuesta farmacodinámica observados en este estudio de niños de entre 6 y 11 años de edad fueron similares a aquellos observados en adultos y adolescentes (ver **REACCIONES ADVERSAS**, y **PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS-Propiedades farmacodinámicas**). No se ha establecido la seguridad y la eficacia en pacientes pediátricos menores a 6 años de edad, con asma grave.

Uso en pacientes de edad avanzada

Los estudios clínicos de NUCALA no incluyeron una cantidad suficiente de pacientes de 65 años de edad y mayores, que recibieran NUCALA (n=79) para determinar si responden de modo diferente a los pacientes más jóvenes. Otra experiencia clínica informada no identificó diferencias en la respuesta entre los pacientes mayores y los más jóvenes. En general, la selección de la dosis para un paciente de edad avanzada debe ser cautelosa y comenzar por el extremo bajo del rango de dosis, para reflejar la mayor frecuencia de disminución de la función hepática, renal o cardíaca y de enfermedad concomitante u otra terapia farmacológica. Según los datos disponibles, no se requiere ajustar la dosis de NUCALA en los pacientes de edad avanzada, pero no puede descartarse una mayor sensibilidad en algunos individuos de más edad.

REACCIONES ADVERSAS

Las siguientes reacciones adversas se describen con más detalle en otras secciones:

- Reacciones de hipersensibilidad (ver **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**).
- Infecciones oportunistas: herpes zóster (ver **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**).

Como los estudios clínicos se llevan a cabo en condiciones muy variadas, las tasas de reacciones adversas que se observan en los estudios clínicos de un fármaco no pueden compararse en forma directa con las tasas de los estudios clínicos de otro fármaco y no pueden reflejar las tasas que se observan en la práctica clínica.

Experiencia en estudios clínicos en asma grave

Pacientes adultos y adolescentes de 12 años de edad y mayores

Se evaluó a un total de 1.327 pacientes con asma grave en 3 estudios aleatorizados, controlados con placebo, multicéntricos, de entre 24 a 52 semanas de duración (Estudio 1, NCT01000506; Estudio 2, NCT01691521 y Estudio 3, NCT01691508). De ellos, 1.192 tenían antecedentes de 2 exacerbaciones o más correspondientes al año previo al enrolamiento, pese al uso periódico de dosis altas de corticosteroides inhalados en combinación con otros fármacos para control de la enfermedad (Estudios 1 y 2), y 135 pacientes requirieron de corticosteroides orales (OCS, *oral corticosteroids*) diarios además del uso periódico de dosis altas de corticosteroides inhalados en combinación con otros fármacos para mantener el control del asma (Estudio 3). Todos los pacientes tenían marcadores de inflamación eosinofílica de las vías aéreas (ver **PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS-Estudios Clínicos**). De los pacientes enrolados, el 59% eran mujeres, el 85% eran de raza blanca, y la edad de los pacientes oscilaba de 12 a 82 años. Mepolizumab se administró por vía subcutánea o intravenosa una vez cada 4 semanas; 263 pacientes recibieron NUCALA (mepolizumab 100 mg subcutáneo) durante al menos 24 semanas. Los eventos adversos serios que se presentaron en más de 1 paciente y en un mayor porcentaje de pacientes que recibieron NUCALA 100 mg (n=263) que placebo (n=257) incluyeron 1 evento: herpes zóster (2 pacientes versus 0 pacientes, respectivamente). Alrededor del 2% de los pacientes que recibieron NUCALA 100 mg se retiraron de los estudios clínicos debido a eventos adversos en comparación con el 3% de los pacientes que recibieron placebo.

La incidencia de reacciones adversas en las primeras 24 semanas de tratamiento en los 2 estudios confirmatorios de eficacia y de seguridad (Estudios 2 y 3) con NUCALA 100 mg se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Reacciones adversas con NUCALA con una incidencia $\geq 3\%$ y más frecuentes que con placebo en pacientes que sufren de asma grave (Estudios 2 y 3)

Reacción adversa	NUCALA (mepolizumab 100 mg subcutáneo) (n=263) %	Placebo (n=257) %
Dolor de cabeza	19	18
Reacción en la zona de inyección	8	3
Dolor de espalda	5	4
Fatiga	5	4
Gripe	3	2
Infección urinaria	3	2
Dolor en la parte alta del abdomen	3	2

Prurito	3	2
Eczema	3	<1
Espasmos musculares	3	<1

Estudio de 52 semanas

Las reacciones adversas del Estudio 1 de 52 semanas de tratamiento con mepolizumab 75 mg intravenoso (IV) (n=153) o placebo (n=155) y con una incidencia $\geq 3\%$ más frecuentes que con placebo y que no se muestran en la Tabla 4, fueron dolor abdominal, rinitis alérgica, astenia, bronquitis, cistitis, mareos, disnea, infección del oído, gastroenteritis, infección del tracto respiratorio inferior, dolor musculoesquelético, congestión nasal, nasofaringitis, náuseas, faringitis, pirexia, erupción, dolor de muelas, infección viral, infección viral del tracto respiratorio y vómitos. Asimismo, se produjeron 3 casos de herpes zóster en pacientes que recibieron mepolizumab 75 mg IV, en comparación con 2 pacientes del grupo del placebo.

Reacciones sistémicas, incluso reacciones de hipersensibilidad

En los Estudios 1, 2 y 3 que se describieron anteriormente, el porcentaje de pacientes que presentaron reacciones sistémicas (alérgicas y no alérgicas) fue del 3% en el grupo que recibió NUCALA 100 mg y del 5% en el grupo de placebo. Se informaron reacciones alérgicas sistémicas/de hipersensibilidad en el 1% de los pacientes del grupo que recibió NUCALA 100 mg y en el 2% de los pacientes del grupo de placebo. Las manifestaciones de reacciones alérgicas sistémicas/de hipersensibilidad informadas con más frecuencia en el grupo que recibió NUCALA 100 mg incluyeron erupción, prurito, dolor de cabeza y mialgia. Se informaron reacciones sistémicas no alérgicas en el 2% de los pacientes del grupo que recibió NUCALA 100 mg y en el 3% de los pacientes del grupo de placebo. Las manifestaciones de reacciones sistémicas no alérgicas informadas con más frecuencia en el grupo que recibió NUCALA 100 mg incluyeron erupción, rubefacción y mialgia. La mayoría de las reacciones sistémicas en los pacientes que recibieron NUCALA 100 mg (5/7) se presentaron el día de la dosis.

Reacciones en la zona de inyección

Se produjeron reacciones en la zona de inyección (por ejemplo, dolor, eritema, inflamación, picazón, sensación de ardor) en una tasa del 8% en los pacientes que recibieron NUCALA 100 mg, en comparación con el 3% de los pacientes que recibieron placebo.

Seguridad a largo plazo

998 pacientes recibieron NUCALA 100 mg en estudios de extensión abiertos en curso, durante los cuales se informaron casos adicionales de herpes zóster. El perfil general de eventos adversos ha sido similar al de los estudios de asma grave ya descritos.

Pacientes pediátricos de entre 6 y 11 años de edad

La información de seguridad de NUCALA se basa en un estudio clínico abierto en el cual se enrolaron 36 pacientes con asma grave de entre 6 y 11 años de edad. Los pacientes recibieron 40 mg (aquellos que pesaban <40 kg) o 100 mg (aquellos que pesaban ≥ 40 kg) de NUCALA administrados subcutáneos una vez cada cuatro semanas. Los pacientes recibieron NUCALA durante 12 semanas (durante la fase corta inicial). Luego de una interrupción del tratamiento de 8 semanas, 30 pacientes recibieron NUCALA durante 52 semanas más (fase prolongada). El perfil de reacciones adversas de los pacientes de entre 6 y 11 años de edad fue similar al observado en pacientes de 12 años de edad y mayores.

Inmunogenicidad

En pacientes adultos y adolescentes con asma grave que recibieron 100 mg de NUCALA, 15/260 (6%) desarrollaron anticuerpos anti-mepolizumab. Se detectaron anticuerpos neutralizantes en 1 paciente con asma que recibió NUCALA 100 mg. Los anticuerpos anti-mepolizumab incrementaron levemente (alrededor del 20%) el clearance de mepolizumab. No hubo evidencias de correlación entre las titulaciones de anticuerpos anti-mepolizumab y el cambio en el nivel de eosinófilos. Se desconoce la relevancia clínica de la presencia de anticuerpos anti-mepolizumab. En el estudio clínico de niños entre 6 y 11 años de edad con asma grave que recibieron 40 o 100 mg de NUCALA, 2/35 pacientes (6%) presentaron anticuerpos anti-mepolizumab detectables durante la fase corta inicial del estudio. Ningún niño presentó anticuerpos anti-mepolizumab detectables durante la fase prolongada del estudio.

La frecuencia informada de los anticuerpos anti-mepolizumab puede subestimar la frecuencia real debido a la menor sensibilidad del ensayo en presencia de una elevada concentración del fármaco.

Los datos reflejan el porcentaje de pacientes cuyos resultados dieron positivo para anticuerpos contra mepolizumab en ensayos específicos. La incidencia observada de positividad de anticuerpos en un ensayo depende en gran medida de varios factores, incluidas la sensibilidad y la especificidad del ensayo, la metodología del ensayo, la manipulación de las muestras, el momento de extracción de las muestras, los medicamentos concomitantes y la enfermedad subyacente.

Experiencia post-comercialización

Además de las reacciones adversas informadas a partir de los estudios clínicos, se identificaron las siguientes reacciones adversas durante el uso de NUCALA con posterioridad a la aprobación. Como estas reacciones se informaron de manera voluntaria en una población de tamaño incierto, no siempre es posible calcular de manera confiable la frecuencia o establecer una relación causal con la exposición al fármaco. Estos eventos se eligieron para la inclusión por su seriedad, frecuencia de notificación o relación causal con NUCALA, o una combinación de estos factores.

Trastornos del sistema inmunológico

Reacciones de hipersensibilidad, incluso anafilaxia.

Notificación de reacciones adversas sospechadas

Para reportar eventos adversos puede comunicarse con GlaxoSmithKline Argentina S.A. al 0800 220 4752.

Información de asesoramiento para el paciente

Aconsejar al paciente que lea la Información para el Paciente aprobada por ANMAT.

Reacciones de hipersensibilidad

Informar a los pacientes que se han producido reacciones de hipersensibilidad (por ejemplo, anafilaxia, angioedema, broncoespasmo, hipotensión, urticaria, erupción) luego de administrar NUCALA. Informar al paciente que se comunique con su médico si presenta dichas reacciones.

No utilizar para tratar síntomas agudos o deterioro de la enfermedad

Informar a los pacientes que NUCALA no se usa para tratar los síntomas agudos del asma o las exacerbaciones agudas. Informar a los pacientes que deben consultar al médico si su asma continúa sin ser controlada o se agrava luego de iniciar el tratamiento con NUCALA.

Infecciones oportunistas: Herpes Zóster

Informar a los pacientes que se han producido infecciones por herpes zóster en pacientes que recibieron NUCALA.

Reducción de la dosis de corticosteroides

Informar a los pacientes que no deben discontinuar los corticosteroides sistémicos o inhalados, excepto con la supervisión directa de un médico. Informar a los pacientes que la reducción de la dosis de corticosteroides puede asociarse con síntomas sistémicos de abstinencia y/o desenmascarar condiciones ya suprimidas con una terapia sistémica de corticosteroides.

SOBREDOSIFICACIÓN

No hay tratamiento específico para una sobredosis con mepolizumab. Si se produce una sobredosis, el paciente debe recibir tratamiento paliativo, con controles adecuados, según sea necesario.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666/2247 o al Hospital A. Posadas (011) 4654-6648/4658-7777. Optativamente a otros centros de Intoxicaciones.

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 1 jeringa de vidrio prellenada de 40 mg/0,4 ml para una única dosis con aguja fija de calibre 29 de media pulgada con protector de aguja.

CONSERVACIÓN

Almacenar la jeringa prellenada en la heladera entre 2 °C y 8 °C. Conservar el producto en el envase original para protegerlo de la luz hasta el momento de usar. No congelar. No agitar. Evitar la exposición al calor.

Si fuera necesario, se podrá almacenar en el envase cerrado fuera de la heladera a una temperatura de hasta 30 °C durante un período máximo de 7 días. En caso de dejar fuera de la heladera durante más de 7 días, se deberá descartar el producto de forma segura.

La jeringa prellenada debe utilizarse dentro de las 8 horas de haberse extraído del envase. Si no lo hizo en ese lapso, deberá descartarlo.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 58.372.

Directora Técnica: M. Fabiana Vitale - Farmacéutica.

Titular: GlaxoSmithKline Argentina S.A.

Establecimiento elaborador a granel, acondicionador primario y secundario: Glaxo Operations UK Ltd, Harmire Road, Barnard Castle, County Durham, DL12 8DT, Reino Unido.
Importado por: **GlaxoSmithKline Argentina S.A.** - Carlos Casares 3690, (B1644BCD) Victoria, Buenos Aires, Argentina.

INFORMACIÓN ADICIONAL PODRÁ SOLICITARSE A GlaxoSmithKline Argentina S.A. – 0800 220 4752.

FDA USPI 1/2022

Fecha de última revisión:/..../.... - Disp. N°

Las marcas son propiedad de o licenciadas al grupo de compañías GSK.

© 20XX Grupo de compañías GSK o sus licenciantes.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Prospecto NUCALA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.07.28 10:54:40 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.07.28 10:54:41 -03:00

NUCALA
MEPOLIZUMAB 40 mg/0,4 ml
Solución inyectable

Venta Bajo Receta

Lea la totalidad de este prospecto cuidadosamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, Usted puede necesitar leerlo nuevamente.
- Si tiene alguna otra pregunta, consulte a su médico.
- Este medicamento ha sido recetado solamente para usted. No debe dárselo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas de enfermedad sean los mismos que los suyos.
- Si experimenta algún efecto adverso, consulte a su médico. Esto incluye cualquier efecto adverso no listado en este prospecto (Ver Contenido del prospecto, punto 3 – **Cuales son los posibles efectos adversos**).

Contenido del prospecto:

1. ¿Qué es NUCALA y para que se usa?
2. Como se administra NUCALA
3. Cuáles son los posibles efectos adversos
4. Como conservar NUCALA
5. Contenido del envase y otra información
6. Leyendas finales

1. ¿Qué es NUCALA y para que se usa?

- NUCALA es un medicamento recetado que se utiliza para:
 - El mantenimiento complementario del asma grave en personas de 6 años de edad y mayores cuyo asma no está controlado con sus medicamentos actuales. NUCALA ayuda a prevenir ataques graves de asma (exacerbaciones). NUCALA no se usa para tratar los problemas respiratorios repentinos que ocurren con el asma.
- Los medicamentos como NUCALA reducen los eosinófilos en sangre. Los eosinófilos son un tipo de glóbulo blanco que puede contribuir a su enfermedad.

Se desconoce si NUCALA es seguro y efectivo en niños menores de 6 años de edad con asma grave.

No use NUCALA si es alérgico a mepolizumab o a cualquiera de los ingredientes de NUCALA. Ver la lista completa de los ingredientes de NUCALA al final de la Información para el Paciente.

Antes de recibir NUCALA, informe a su médico acerca de todas sus afecciones clínicas, incluso si:

- Presenta una infección parasitaria (helminto).
- Está tomando corticosteroides orales o inhalados. **No** deje de tomar los corticosteroides, a menos que su médico lo indique. Esto puede hacer que regresen otros síntomas que estaban controlados por los corticosteroides.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si NUCALA puede dañar al feto. Se solicita a las mujeres que queden embarazadas durante el tratamiento con NUCALA comunicarse con GlaxoSmithKline Argentina S.A. al teléfono 0800 220 4752.
- Está amamantando o planea amamantar. Usted y su médico deben decidir si usted utilizará NUCALA mientras amamanta. Consulte primero a su médico antes de utilizar este medicamento. Se solicita a las mujeres que estén en período de lactancia durante el tratamiento con NUCALA comunicarse con GlaxoSmithKline Argentina S.A. al teléfono 0800 220 4752.

Informe a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

No deje de tomar los demás medicamentos, a menos que su médico lo indique.

2. Cómo se administra NUCALA

Su médico le indicará la dosis adecuada según el motivo por el que necesite el tratamiento.

En el caso de que la inyección sea administrada por un profesional de la salud:

Un profesional de la salud le administrará NUCALA mediante una inyección justo bajo su piel (inyección subcutánea) cada 4 semanas.

En el caso de que la inyección sea administrada por su cuidador con la jeringa prellenada:

- Administre NUCALA cada 4 semanas tal como se lo indique su médico.
- Antes de usar NUCALA, su médico le mostrará a usted o a su cuidador cómo administrar las inyecciones.
- Lea las Instrucciones de Uso que vienen con NUCALA para obtener instrucciones acerca de la correcta administración de las inyecciones en su casa.

- Deberá inyectar NUCALA debajo de la piel (de manera subcutánea) en el muslo o estómago (abdomen). También, un cuidador podrá administrarle la inyección en su brazo.
- Si omite una dosis, aplíquela lo antes posible. Luego continúe con las inyecciones según el esquema de dosificación habitual. Si no se da cuenta de que omitió dosis hasta el momento de la siguiente dosis programada, aplíquese la siguiente dosis programada según lo planeado. Si no está seguro cuándo debe aplicarse NUCALA, consulte a su médico.

3. Cuáles son los posibles efectos adversos

NUCALA puede provocar efectos adversos serios, incluidos los siguientes:

- **Reacciones alérgicas (hipersensibilidad), incluso anafilaxia.**

Pueden producirse reacciones alérgicas serias luego de que usted reciba la inyección de NUCALA. En algunos casos las reacciones alérgicas pueden manifestarse horas o días después de recibir una dosis de NUCALA. Informe a su médico o solicite ayuda de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas de una reacción alérgica:

- Inflamación del rostro, la boca y la lengua.
- Problemas para respirar.
- Desmayos, mareos, desvanecimiento (presión arterial baja).
- Erupción.
- Urticaria

- **Infecciones por Herpes Zóster**

Han ocurrido casos de Herpes Zóster en personas que recibieron NUCALA.

Los efectos adversos más frecuentes de NUCALA incluyen: dolor de cabeza, reacciones en la zona de inyección (dolor, enrojecimiento, inflamación, picazón o sensación de ardor en la zona de inyección), dolor de espada y cansancio (fatiga).

Estos no son todos los posibles efectos adversos de NUCALA.

Consulte a su médico para solicitar asesoramiento

Informe de efectos adversos

Si usted padece efectos adversos, consulte a su médico. Esto incluye posibles efectos adversos no listados en este prospecto. Al informar efectos adversos usted puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

Para reportar efectos adversos puede comunicarse con GlaxoSmithKline Argentina S.A. al 0800 220 4752.

4. Cómo conservar NUCALA

Mantener NUCALA y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Almacenar la jeringa prellenada en heladera a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C. Conservar en el envase original para proteger de la luz. No congelar. No agitar. Evitar la exposición al calor.

Si fuera necesario, se podrá almacenar la caja sin abrir fuera de la heladera a una temperatura de hasta 30°C durante un período máximo de 7 días. En caso de dejar la caja sin abrir fuera de la heladera durante más de 7 días, deberá descartar el producto de forma segura.

La jeringa prellenada debe administrarse dentro de las 8 horas de haberse extraído del envase. Si no lo hizo en ese lapso, deberá descartarlo de manera segura.

Descarte cualquier medicamento que esté vencido o que no utilice más.

5. Contenido del envase y otra información

Composición de NUCALA

El principio activo es mepolizumab.

Los demás componentes son: ácido cítrico monohidrato, EDTA disódico dihidratado, polisorbato 80, fosfato dibásico de sodio heptahidratado y sacarosa.

Contenido del envase

Envases conteniendo 1 jeringa de vidrio prellenada de 40 mg/0,4 ml para una única dosis con aguja fija de calibre 29 de media pulgada.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de NUCALA.

En ocasiones, se recetan medicamentos para fines que no son los que se mencionan en esta Información para el Paciente. No le de NUCALA a otras personas, incluso si éstas tuviesen los mismos síntomas que usted. Puede causarles daño. Puede consultar a su farmacéutico o a su médico si desea obtener información sobre NUCALA detallada en el prospecto destinado para los profesionales de la salud.

6. Leyendas finales

Este folleto resume la información más importante de NUCALA, para mayor información y ante cualquier duda CONSULTE A SU MÉDICO. Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

No use este medicamento si la etiqueta o el envase está dañado.

Usted puede usar NUCALA hasta el último día del mes indicado en el envase. No use NUCALA luego de la fecha de vencimiento.

Ante cualquier inconveniente con el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 58.372.

Directora Técnica: M. Fabiana Vitale - Farmacéutica.

Elaborado por: Glaxo Operations UK Ltd, Harmire Road, Barnard Castle, County Durham, DL12 8DT, Reino Unido.

Importado por: **GlaxoSmithKline Argentina S.A.** - Carlos Casares 3690, (B1644BCD) Victoria, Buenos Aires, Argentina.

INFORMACIÓN ADICIONAL PODRÁ SOLICITARSE A GlaxoSmithKline Argentina S.A. – 0800 220 4752.

FDA USPI 1/2022

Fecha de última revisión:/..../..... - Disp. N°

Las marcas son propiedad de o licenciadas al grupo de compañías GSK.

© 20XX Grupo de compañías GSK o sus licenciantes.



FLAMINI Lidia Cristina
CUIL 27316737124

INSTRUCCIONES DE USO PARA LA JERINGA PRELLENADA

NUCALA MEPOLIZUMAB 40 mg/0,4 ml Solución inyectable Vía subcutánea Jeringa prellenada

Información importante

NUCALA es un medicamento recetado que se inyecta debajo de la piel (de manera subcutánea) con una jeringa prellenada de una única dosis. El cuidador deberá recibir entrenamiento sobre cómo preparar y administrar la inyección antes de hacerlo.

Las siguientes instrucciones le brindarán la información necesaria para el uso correcto de la jeringa prellenada con el protector automático de la aguja.

Antes de comenzar con la administración de la inyección, es importante que lea y comprenda estas instrucciones y luego las cumpla cuidadosamente de manera que pueda completar cada paso exitosamente.


Información de almacenamiento

- Conserve en la heladera a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C.
- Mantenga en la caja original hasta el momento de usar para protegerla de la luz.
- **No congele. No agite.** Mantenga alejado del calor.
- Si fuera necesario, podrá conservar la caja sin abrir fuera de la heladera una temperatura de hasta 30 °C durante un período máximo de 7 días.
- En caso de haberla dejado fuera de la heladera en la caja sin abrir durante más de 7 días, deberá descartar de manera segura la jeringa prellenada.
- Deberá usar la jeringa prellenada dentro de las 8 horas de haberla sacado de la caja. Deberá descartarla de manera segura si no la usó dentro de las 8 horas.
- Deberá descartar de manera segura todo medicamento vencido o que ya no se use.

Mantener NUCALA y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Advertencias

- **No** use la jeringa prellenada más de una vez. Descarte la jeringa en el recipiente para descarte de objetos cortopunzantes luego de administrar la inyección.
- **No** comparta la jeringa prellenada con otras personas. Podría transmitir una infección seria a otras personas o podría contraerla usted.
- **No** use la jeringa prellenada si se cayó o parece estar dañada.



Contenido de la caja

1 jeringa prellenada.


Elementos no incluidos en la caja

- Toallita con alcohol
- Algodón o gasa
- Banda adhesiva
- Recipiente para descarte de objetos cortopunzantes

(Ver el paso 8 **Descarte la jeringa utilizada** al final de las Instrucciones de Uso para seguir correctamente las instrucciones de descarte).

Preparación

1. Retire la jeringa prellenada




Asegúrese de que los **precintos de seguridad** no estén rotos

Retire la jeringa de la bandeja

- Retire la caja de la heladera y asegúrese de que los precintos de seguridad no estén rotos.
- Retire la bandeja de la caja.
- Retire la cubierta plástica transparente desde la esquina de la bandeja.
- Sostenga la jeringa prellenada por la mitad (cerca de la ventana de inspección) y retire con cuidado la jeringa prellenada de la bandeja.
- Coloque la jeringa prellenada en una superficie limpia y lisa, a temperatura ambiente lejos de la luz directa del sol y fuera del alcance de los niños.
 - **No** use la jeringa prellenada si el precinto de seguridad la caja está roto. Contacte a GlaxoSmithKline Argentina S.A. al teléfono 0800 220 4752 para obtener más información.
 - **No** quite la tapa gris de la aguja en este paso


2. Inspeccione y espere 30 minutos antes de usar



- Verifique que la fecha de vencimiento en la etiqueta de la jeringa prellenada no haya pasado.
- Observe el medicamento a través de la ventana de inspección. Debe observar una solución de color claro o amarillo claro a marrón claro sin partículas ni turbiedad.
- Es normal ver una o más burbujas de aire.
- Espere 30 minutos (pero no más de 8 horas) antes de usar.
 - **No** use el producto si la fecha de vencimiento ha pasado.


- **No** caliente la jeringa prellenada en el microondas, con agua caliente o a luz solar directa.
- **No lo** use si observa que el medicamento está turbio o descolorido, o contiene partículas. Contacte a GlaxoSmithKline Argentina S.A. al teléfono 0800 220 4752 para obtener más información.
- **No** use la jeringa prellenada si se deja fuera de la caja durante más de 8 horas.

3. Elija la zona de inyección



- Podrá aplicarse la inyección en los muslos, el abdomen o el brazo.
 - **No** administre la inyección donde la piel presenta moretones, esté sensible, roja o dura.
 - **No** administre la inyección a una distancia inferior a 5 cm (2 pulgadas) del ombligo.


4. Limpie la zona de inyección



- Lávese las manos con agua y jabón.
- Limpie la zona de inyección con la toallita con alcohol y deje secar la piel al aire.
 - **No** vuelva a tocar la zona de inyección limpia hasta que haya finalizado con la inyección.

Aplicación


5. Retire la tapa gris de la aguja



- Retire la tapa gris de la aguja de la jeringa prellenada tirando de ella firmemente hacia afuera de la aguja (como se muestra en la figura). Es posible que tenga que hacer un poco de fuerza para retirar la tapa gris de la aguja.
- Es posible que observe algunas gotas del medicamento en el extremo de la aguja. Esto es normal.
- Asegúrese de administrar la inyección dentro de los 5 minutos luego de retirar la tapa gris de la aguja.

- **No** permita que la aguja entre en contacto con alguna superficie.
- **No** toque la aguja.
- **No** toque el émbolo blanco en este paso. Esto podría causar que comience a salir el medicamento accidentalmente y no reciba la dosis completa.
- **No** trate de sacar las burbujas de aire de la jeringa prellenada.
- **No** vuelva a colocar la tapa gris de la aguja en la jeringa prellenada. Podría pincharse con la aguja.

6. Comience con la administración de la inyección



- Con la mano que tenga libre pellizque la piel alrededor de la zona de inyección. Siga pellizcando la piel durante la inyección.
- Inserte la aguja por completo en la piel pellizcada en un ángulo de 45°, como se indica en la figura.
- Mueva el pulgar hacia el émbolo blanco y coloque los otros dedos en la empuñadura blanca para presionar el mango blanco.
- Presione lentamente el émbolo blanco para inyectar la dosis completa.

7. Complete la administración de la inyección



- Asegúrese de presionar el émbolo blanco hasta el fondo, hasta que el tapón llegue a la parte inferior de la jeringa prellenada y que se inyecte todo el medicamento.
- Lentamente levante el pulgar. Esto permitirá que el émbolo blanco se levante y que la aguja se retraiga (suba) automáticamente hacia el cuerpo de la jeringa.
- Luego de completar la inyección, suelte la piel pellizcada.
- Puede aparecer una pequeña gota de sangre en la zona de inyección. Esto es normal. Presione el área con un algodón o gasa y coloque una banda adhesiva si fuera necesario.
 - **No** frote la zona de inyección.
 - **No** vuelva a poner la tapa gris de la aguja en la jeringa prellenada.

Descarte

8. Descarte la jeringa utilizada



Coloque la jeringa utilizada y la tapa gris de la aguja en el recipiente de descarte de objetos cortopunzantes inmediatamente después de usarlos.

Si usted no tiene un recipiente de descarte de objetos cortopunzantes, puede usar un recipiente doméstico que tenga las siguientes características:

- plástico resistente;
- cierre hermético, con tapa resistente a la perforación, sin posibilidad de que salgan las agujas;
- vertical y estable durante el uso;
- anti-goteo; y
- rotulado de manera adecuada para prevenir sobre el contenido peligroso del recipiente.

Cuando el recipiente de descarte de objetos cortopunzantes esté casi lleno, deberá guiarse por las normas de su comunidad para descartarlo. Es posible que existan leyes nacionales o locales acerca de cómo descartar las jeringas prellenadas utilizadas.

- **No** arroje el recipiente de descarte de objetos cortopunzantes en el tacho de basura de su casa a menos que las normas de su comunidad así lo permitan.
- **No** recicle los recipientes de descarte de objetos cortopunzantes.

Mantenga el recipiente de descarte de objetos cortopunzantes fuera del alcance de los niños

Preguntas frecuentes

1. **¿Qué sucede si el medicamento tiene un aspecto turbio, está vencido o la jeringa prellenada parece dañada?**
Contacte a GlaxoSmithKline Argentina S.A. al teléfono 0800 220 4752 para obtener más información.
2. **¿Se puede cambiar (rotar) la zona de inyección para la jeringa prellenada?**
Usted puede cambiar (rotar) la zona (muslo, abdomen, o brazo) siempre y cuando no haya comenzado a inyectar el medicamento.
3. **¿Por qué es necesario administrar la inyección dentro de los 5 minutos de extraer la tapa gris de la aguja?**
Esta acción evita que el medicamento se seque en la aguja. Esto podría afectar la cantidad de medicamento que usted reciba.
4. **¿Qué sucede si la aguja no se retrae (levanta) dentro del protector de la aguja?**
Coloque cuidadosa e inmediatamente la jeringa y la tapa de la jeringa en el recipiente de descarte y contacte a GlaxoSmithKline Argentina S.A. al teléfono 0800 220 4752 para obtener más información.
5. **¿A quién debo contactar si necesito ayuda con la inyección?**
Su médico podrá ayudarlo con cualquier duda que usted tenga.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 58.372.

Directora Técnica: M. Fabiana Vitale - Farmacéutica.

Elaborado por: Glaxo Operations UK Ltd, Harmire Road, Barnard Castle, County Durham, DL12 8DT, Reino Unido.

Importado por: **GlaxoSmithKline Argentina S.A.** - Carlos Casares 3690, (B1644BCD) Victoria, Buenos Aires, Argentina.

INFORMACIÓN ADICIONAL PODRÁ SOLICITARSE A GlaxoSmithKline Argentina S.A. – 0800 220-

FDA USPI 1/2022

Fecha de última revisión: .../.../..... - Disp. N°

Las marcas son propiedad de o licenciadas al grupo de compañías GSK.
© 20XX Grupo de compañías GSK o sus licenciantes.



FLAMINI Lidia Cristina
CUIL 27316737124



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Info paciente NUCALA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.07.28 10:54:22 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.07.28 10:54:22 -03:00