



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Disposición**

**Número:** DI-2018-836-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Lunes 29 de Enero de 2018

**Referencia:** 1-47-1110-1528-17-3

---

VISTO el Expediente N° 1-47-1110-1528-17-3 del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones la firma INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C., solicita el cambio de cepas y la autorización de nuevos rótulos y prospecto para la Especialidad Medicinal denominada NILGRIP / VACUNA ANTIGRIPIAL INACTIVADA (SPLIT VIRION), Forma farmacéutica: SUSPENSIÓN PARA INYECCIÓN, aprobada por Certificado N° 48.405.

Que los proyectos presentados se encuentran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos N° 16.463, Decreto N° 150/92 y la Disposición N° 5904/96.

Que como surge de la documentación aportada, se han satisfecho los requisitos exigidos por la normativa aplicable en el cambio de cepa y cumplimenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la formulación de las vacunas antigripales del Hemisferio Sur para la temporada 2018 también confirmado por el Comité Australiano de Vacunas (AIVC) de la Autoridad Reguladora de Medicamentos de Australia (Therapeutics Goods Administration- TGA).

Que los procedimientos para las modificaciones y/o rectificaciones de los datos característicos correspondientes a un certificado de Especialidad Medicinal otorgado en los términos de la Disposición ANMAT N° 5755/96, se encuentran establecidos en la Disposición ANMAT N° 6077/97.

Que a fojas 140 y 141 obra el informe técnico favorable de la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 1490/92 y 101 de fecha 16 de diciembre del 2015.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º. - Autorízase a la firma INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C., el cambio de cepas, nuevos rótulos y prospecto presentados para la Especialidad Medicinal denominada NILGRIP / VACUNA ANTIGRIPIAL INACTIVADA (SPLIT VIRION), cuyas cepas quedarán integradas por recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la temporada 2018 en el Hemisferio Sur por las consignadas en el Anexo de Autorización de Modificaciones.

ARTÍCULO 2º.- Acéptese el texto del Anexo de Autorización de Modificaciones que figura como documento IF-2017-35509144-APN-DECBR#ANMAT; el que deberá ser anexado al certificado de autorización correspondiente.

ARTÍCULO 3º.- Acéptese el texto de rótulos y prospecto que consta en el Anexo IF-2017-35221768-APN-DECBR#ANMAT.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese; por la Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente disposición y Anexos; gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE Nº 1-47-1110-1528-17-3

mdg

Digitally signed by LEDE Roberto Luis  
Date: 2018.01.29 08:02:37 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Lede  
SubAdministrador  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2018.01.29 08:02:38 -0300

## ANEXO DE AUTORIZACION DE MODIFICACIONES

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autoriza a la firma INSTITUTO BIOLOGICO ARGENTINO S.A.I.C. la modificación de los datos característicos correspondientes al Certificado de Autorización de Especialidad Medicinal N° 48.405 de acuerdo con los datos que figuran en tabla al pie, del producto:

Nombre comercial/ Genérico/s: NILGRIP / VACUNA ANTIGRI PAL INACTIVADA (SPLIT VIRION)

Forma Farmacéutica: Suspensión para inyección

DATO IDENTIFICATORIO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION AUTORIZADA
Cepas	<p>Cepa Virus Influenza Tipo A: A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09 (cepa análoga: A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180), 15 microgramos de HA; A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2) (cepa análoga: A/Hong Kong/4801/2014, NYMC X-263B), 15 microgramos de HA.</p>	<p>Cepa Virus Influenza Tipo A: A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09 (cepa análoga: A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180), 15 microgramos de HA; A/Singapore/INFIMH-16-0019 (H3N2) (cepa análoga: A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, IVR-186), 15</p>

IF-2017-35509144-APN-DECBR#ANMAT

	<p>Cepa Virus Influenza Tipo  B: B/Brisbane/60/2008  (cepa análoga:  B/Brisbane/46/2015), 15  microgramos de HA.</p> <p><b>Temporada 2017</b></p>	<p>microgramos de HA.  Cepa Virus Influenza Tipo  B: B/Phuket/3073/2013  (cepa análoga:  B/Phuket/3073/2013 (BVR-  1B), 15 microgramos de  HA.</p> <p><b>Temporada 2018</b></p>
--	---	---

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al Certificado de Autorización antes mencionado.

Expediente N° 1-47-1110-1528-17-3



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2017-35509144-APN-DECBR#ANMAT

**CIUDAD DE BUENOS AIRES**  
**Jueves 28 de Diciembre de 2017**

**Referencia:** 1110-1528-17-3 ANEXO

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2017.12.28 16:30:32 -03'00'

Patricia Ines Aprea  
Jefe I  
Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2017.12.28 16:30:33 -03'00'



## NILGRIP®

VACUNA ANTIGRIPIAL INACTIVADA (SPLIT VIRION)  
Suspensión para inyección subcutánea profunda o intramuscular

Industria Australiana

Venta bajo receta

**ADVERTENCIA:** En esta temporada la vacuna está indicada para su uso sólo en personas a partir de 5 años de edad y mayores. No debe usarse en niños menores de 5 años (Ver Contraindicaciones). Debe solamente ser utilizada en niños de 5 a menores de 9 años, basándose en una cuidadosa consideración de los riesgos potenciales y beneficios en el individuo (Ver Precauciones).

### FÓRMULA

Cada dosis de 0.5 ml contiene los antígenos representativos de las siguientes cepas de virus de influenza:

Hemaglutinina A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09	15 µg
- cepa análoga A/Singapore/GP1908/2015 (IVR-180A)	
Hemaglutinina A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)	15 µg
- cepa análoga A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (IVR-186)	
Hemaglutinina B/Phuket/3073/2013	15 µg
- cepa análoga B/Phuket/3073/2013(BVR-1B)	

Excipientes: Cloruro de sodio 4,1 mg, Fosfato de sodio dibásico anhidro 0.3 mg, Fosfato de sodio monobásico 0.08 mg, Cloruro de Potasio 0.02 mg, Fosfato de Potasio monobásico 0.02 mg, Cloruro de Calcio 0.0015 mg, Agua para inyectables c.s.p. 0,5 ml.

### Fórmula recomendada para el Hemisferio Sur – Temporada 2018

### ACCIÓN FARMACOLÓGICA

La vacuna está indicada para la inmunización activa contra la infección por virus de influenza Tipos A & B.

### DESCRIPCIÓN

NILGRIP® es una vacuna purificada, inactivada, split virion (virus fragmentado).

La vacuna es preparada por crecimiento viral en la cavidad alantoica de huevos embrionados, purificada por centrifugación zonal e inactivada por propiolactona y escindida por taurodeoxicolato de sodio.

NILGRIP® cumple con los requisitos de seguridad y esterilidad de la Farmacopea Británica.

Los siguientes componentes pueden encontrarse en forma de trazas en cada dosis de 0,5 ml: Taurodeoxicolato de sodio, Ovoalbúmina (< 1 µg), Sucrosa, Neomicina, Sulfato de Polimixina B y propiolactona .

El tipo y la cantidad de antígenos virales en NILGRIP® cumplen con los requerimientos para el Hemisferio Sur y las autoridades nacionales en la Argentina para la temporada 2018.

La vacuna Nilgrip® es un líquido claro aligeramente opaco con algún sedimento que se resuspende al agitar. Ver Administración.

### FARMACOLOGÍA

NILGRIP® ha demostrado inducir anticuerpos antiglicoproteínas de la superficie viral Hemaglutinina y Neuraminidasa. Estos anticuerpos son importantes en la prevención de la infección natural.

La seroprotección es generalmente obtenida dentro de las 2 a 3 semanas. La duración de la inmunidad post vacunación a cepas

SR. ALBERTO A. BRITOS  
APODERADO

IF-2017-35221768-APN-DECBR#ANMAT  
FARM. ANABELA M. MARTINEZ  
DIRECTORA TÉCNICA

página 1 de 14

homólogas o estrechamente relacionadas a las cepas vacunales varia, pero usualmente es de 6 a 12 meses.

### **INDICACIONES**

NILGRIP® está indicada para la prevención de la gripe causada por los virus de Influenza Tipos A & B.

Para la temporada del Hemisferio Sur 2018 esta vacuna está indicada para el uso sólo en personas a partir de los 5 años. Ver

Precauciones. Posología y Forma de Administración.

#### **1. Grupo de alto riesgo de complicaciones causadas por la gripe:**

I) Adultos mayores de 65 años de edad.

II) Personas con condiciones predisponentes a contraer gripe severa:

- *Enfermedades cardiacas*, incluyendo cardiopatía congénita cianótica, enfermedad coronaria y enfermedad cardiaca congestiva.

- *Condiciones respiratorias crónicas*, incluyendo enfermedad pulmonar supurativa, bronquioectasias, fibrosis quística, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema crónico y asma severo.

- *Otras enfermedades crónicas que hayan requerido seguimiento médico u hospitalización en el año anterior*, incluyendo: diabetes mellitus, enfermedades crónicas metabólicas, insuficiencia renal crónica, Hemoglobinopatías o inmunosupresión (incluyendo la inmunosupresión inducida por agentes farmacológicos).

- *Enfermedades neurológicas crónicas*, por ejemplo: esclerosis múltiple, lesión en la médula espinal, epilepsia u otros trastornos neuromusculares que puedan comprometer la función respiratoria o la expulsión de secreciones respiratorias o que puedan complicar la aspiración.

- *Personas con inmunodeficiencia*, incluyendo la infección con el virus de inmunodeficiencia humana, malignidad y uso crónico de esteroides.

- *Tratamientos prolongados con aspirina en niños.*

III) Embarazo. Se recomienda ofrecer la Vacuna antigripal con la suficiente anticipación a mujeres que planifican quedar embarazadas y a mujeres que estarán cursando su segundo o tercer trimestre de embarazo durante la temporada de gripe, incluyendo las mujeres que cursan el primer trimestre en el momento de la vacunación.

IV) Personas que residan en geriátricos u otros centros de cuidados prolongados.

V) Personas sin hogar y toda persona que esté en contacto con ellas.

● **Personas susceptibles de transmitir la gripe a individuos de alto riesgo**, incluyendo al personal de geriátricos, trabajadores de la salud (en especial a aquellos a cargo de pacientes con inmunodeficiencia), personal de centros de cuidados prolongados y contactos hogareños de personas que integran grupos de alto riesgo.

**3. Personas que trabajan en granjas avícolas o están expuestas a aves de corral durante la actividad confirmada de la gripe aviar**

**4. Personas que suministren servicios esenciales**

**5. Trabajadores de otras industrias**

**6. Viajeros**

### **POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN**

La inmunización debe ser llevada a cabo anualmente, con anticipación a las epidemias estacionales de gripe.

**Posología:**

Ver Indicaciones y Precauciones.

Adultos y niños a partir de los 5 años: 0.5 ml

Una dosis de NILGRIP® es suficiente en personas expuestas previamente a virus de composición antigénica similar a las cepas

SR. ALBERTO A. BRITOS  
APODERADO

IE-2017-35221768-APN-DECBR#ANMAT  
FARM. ANABELA M. MARTINEZ  
DIRECTORA TÉCNICA

página 2 de 14

presentes en la vacuna.

En niños mayores de 5 a menores de 9 años de edad que no han sido previamente vacunados, una segunda dosis debe ser administrada luego de un intervalo de al menos 4 semanas.

#### Administración:

Agitar antes de usar. Después de la agitación, la vacuna debe verse como una suspensión homogénea. Previo a la administración, la vacuna tiene que ser inspeccionada visualmente y no debe ser usada si hay cualquier variación en la apariencia física. Ver Descripción.

La vacuna debe administrarse por inyección intramuscular o subcutánea profunda. La vacuna Nilgrip® se presenta en una jeringa prellenada de uso único y cualquier contenido remanente debe ser descartado.

Puede ser administrada concurrentemente con otras vacunas, sin embargo se deben utilizar jeringas separadas y aplicar en diferentes brazos.

#### **CONTRAINDICACIONES**

La vacuna Nilgrip® no debe usarse en niños menores de 5 años.

Hipersensibilidad a vacunación antigripal previa, a proteínas de huevo, neomicina, polimixina B sulfato o cualquiera de los componentes de la vacuna (ver Descripción) incluyendo aquellos en forma de trazas.

La inmunización debe ser pospuesta en personas padeciendo enfermedad febril ó infección aguda.

#### **ADVERTENCIAS**

LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS VARIAN ANUALMENTE, POR LO QUE NO DEBEN UTILIZARSE SOBANTES DE VACUNAS DE UN AÑO ANTERIOR.

EN ESTA TEMPORADA LA VACUNA ESTA INDICADA PARA EL USO EN PERSONAS A PARTIR DE LOS 5 AÑOS DE EDAD Y MAYORES. Ver Indicaciones y Precauciones.

#### **PRECAUCIONES**

Durante la temporada de gripe del año 2010 en el Hemisferio Sur hubo un inesperado aumento de reportes de fiebre y convulsiones febriles en niños menores de 5 años luego de la vacunación estacional antigripal. Las convulsiones febriles se reportaron poco frecuentes (es decir, el reporte de frecuencia estimada está en el rango de  $\geq 1/1000$  a  $<1/100$ ).\*

Esta vacuna sólo está indicada para el uso en la Temporada 2018 del Hemisferio Sur en personas a partir de los 5 años de edad y mayores.


(\*estimado a partir de investigaciones epidemiológicas)

Ver Indicaciones, Posología y Forma de Administración


Eventos febriles fueron también observados en niños de 5 a menores de 9 años. Por tanto, en este grupo de edad la decisión de vacunar con NILGRIP® fórmula para el Hemisferio Sur 2018 debe basarse en una consideración cuidadosa de los beneficios y riesgos potenciales en el individuo.

Al igual que con otras vacunas inyectables, se debe disponer de supervisión y tratamiento médico adecuados en caso de que se produzcan reacciones anafilácticas. Adrenalina (1:1000) debe estar siempre lista para uso inmediato, cada vez que cualquier inyectable es administrado.

Puede ser administrada concurrentemente con otras vacunas, sin embargo deben utilizarse jeringas separadas y diferentes sitios de inyección.



SR. ALBERTO A. BRITOS  
APODERADO



FARM. ANABELA M. MARTINEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
pagina 3 de 14

IF-2019-35221768-APN-DECBR#ANMAT

Enfermedades menores con o sin fiebre no deben ser una contraindicación para el uso de la vacuna antigripal.

En pacientes inmunocomprometidos (incluyendo aquellos bajo tratamiento con corticosteroides e inmunosupresores) la respuesta de los anticuerpos puede ser menor.

Si luego de una vacunación antigripal previa se ha desarrollado síndrome de Guillain-Barré (GBS) dentro de las seis semanas siguientes la decisión de administrar Nilgrip® debe ser evaluada cuidadosamente considerando los potenciales beneficios y riesgos.

### INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS

La vacuna Nilgrip® puede ser administrada concurrentemente con otras vacunas, sin embargo se deben utilizar jeringas separadas y aplicar en diferentes brazos.

#### **Embarazo (Categoría B2):**

Es recomendable ofrecer la inmunización antigripal a mujeres que están planeando un embarazo y a las embarazadas que se encuentran en el segundo y tercer trimestre de embarazo durante la temporada de gripe, incluyendo aquellas que se encuentran en el primer trimestre al momento de la vacunación. La vacuna no ha sido evaluada en mujeres embarazadas.

Un estudio de reproducción en animales ha sido realizado con la vacuna antigripal de CSL. Dicho estudio no ha demostrado ninguna toxicidad materna o de desarrollo.

#### **Lactancia:**

**Uso durante lactancia:** La vacuna no ha sido evaluada en madres lactantes.

### REACCIONES ADVERSAS

#### **Estudios clínicos:**


Dado que los estudios clínicos se llevan a cabo en condiciones muy variables, las tasas de reacciones adversas observadas en los estudios clínicos de una vacuna no se pueden comparar directamente con las tasas en los estudios clínicos de otra vacuna y pueden no reflejar las tasas de eventos observados en la práctica clínica.


#### **Estudios pediátricos**

En los estudios clínicos, la vacuna contra la influenza de CSL se ha administrado a 3.009 niños de 6 meses a < 18 años de edad y se ha recopilado la información de seguridad de los mismos. Los datos de seguridad clínica para la vacuna contra la influenza de CSL en niños se presenta a partir de 3 estudios clínicos que incluyen un estudio aleatorizado, controlado con comparador (CSLCT-USF-07-36; formulación de la vacuna del hemisferio norte para la temporada 2009 / 2010) y 2 estudios abiertos, no controlados (CSLCT-USF-06-29; formulación de la vacuna del hemisferio sur para la temporada 2009 y CSLCT-FLU-04-05; la primera vacunación con la formulación de la vacuna del hemisferio sur para la temporada 2005 y el seguimiento a los 12 meses con la formulación de la vacuna del hemisferio sur para la temporada 2006). Los participantes de 6 meses a < 9 años de edad recibieron una o dos vacunas según lo determinado por los antecedentes de vacunaciones anteriores, con una dosis para cada vacunación de 0,25 ml para los participantes de edades comprendidas entre los 6 meses y < 3 años y una dosis de 0,5 ml para los participantes  $\geq$  3 años a < 9 años de edad.

La evaluación de la seguridad fue similar en los estudios pediátricos con reacciones adversas locales (en el sitio de inyección) y eventos adversos sistémicos solicitados durante 7 días después de la vacunación y eventos adversos no solicitados recolectados durante 30 días después de la vacunación. Todos los eventos adversos se presentan independientemente de cualquier causalidad con el tratamiento asignada por los investigadores del estudio.

En el estudio controlado con comparador (CSLCT-USF-07-36), la incidencia de fiebre en los niños de 6 meses a < 3 años de edad después de la primera y la segunda dosis de la vacuna contra la influenza de CSL fue del 37% y del 15%, respectivamente, en comparación con el 14% después de cada dosis en el grupo del comparador. La incidencia de fiebre moderada o severa ( $\geq 39^\circ \text{C}$ ) en niños de 6 meses a < 3 años de edad después de la primera y la segunda dosis de la vacuna contra la influenza de CSL fue del 16% y del 3%, respectivamente, en comparación con el 4% y el 4% después de cada dosis en el grupo del comparador. Entre los niños de 3 años a < 5 años de edad, la incidencia

  
SR. ALBERTO A. BRITOS  
APODERADO

  
FARM. ANABELA M. MARTINEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
página 4 de 14


IF-2017-35221768-APN-DECBR#ANMAT



de fiebre después de la primera y la segunda dosis de la vacuna contra la influenza de CSL fueron del 32% y del 14%, respectivamente, en comparación con el 11% y el 16% con el comparador. La incidencia de fiebre moderada o severa ( $\geq 39^\circ\text{C}$ ) en niños de 3 a < 5 años de edad después de la primera y la segunda dosis de la vacuna contra la influenza de CSL fue del 15% y del 3%, respectivamente, en comparación con el 1% y el 0% después de cada dosis en el grupo del comparador.

En un estudio abierto (CSLCT-USF-06-29) fiebre, irritabilidad, pérdida de apetito y vómitos / diarrea se produjeron más frecuentemente en los niños de 6 meses a < 3 años de edad en comparación con niños mayores. En los tres estudios pediátricos (CSLCT-USF-07-36, CSLCT-USF-06-29 y CSLCT-FLU-04-05), el 1,2% de los niños elegibles ( $n = 1.764$ ) fueron discontinuados de la segunda vacunación a causa de fiebre severa ( $\geq 40^\circ\text{C}$ ) dentro de las 48 horas de la primera vacunación. En los tres estudios pediátricos, dos niños, uno de 7 meses de edad y uno de 3 años de edad, presentaron convulsiones febriles relacionadas con la vacuna (tasa de 0,07% entre los estudios), uno de los cuales fue serio.

Los datos de estos estudios se presentan en las Tablas 1 y 2 para niños de 5 años de edad y mayores, de forma consistente con la indicación actualmente aprobada para la edad. Consulte Precauciones para los riesgos de la vacuna contra la influenza de CSL en niños menores de 5 años de edad. En los estudios pediátricos, no se produjeron muertes relacionadas con la vacuna ni se reportaron eventos adversos serios relacionados con la vacuna en niños de 5 años de edad y mayores. Después de una dosis única del seguimiento de 12 meses de la vacuna contra la influenza de CSL (formulación de la vacuna del hemisferio sur para la temporada 2006 del estudio CSLCT-FLU-04-05), en los participantes de 5 a < 9 años de edad, la incidencia de dolor fue del 77%, de enrojecimiento del 53%, de hinchazón del 32%, de fiebre del 13% y de vómitos / diarrea del 6%.



SR. ALBERTO A. BRITOS  
APODERADO



IF92017-35221768-APN-DECBR#ANMAT  
FARM. ANABELA M. MARTINEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
página 5 de 14

**Tabla 1:** Proporción de Sujetos Pediátricos de 5 a < 18 Años de Edad con Reacciones Adversas Locales o Eventos Adversos Sistémicos Solicitados dentro de los 7 Días después de la Administración de la Primera o la Segunda Dosis de la Vacuna contra la Influenza de CSL, Independientemente de la Causalidad (CSLCT-USF-07-36)

	Porcentaje <sup>a</sup> de Sujetos en cada Grupo de Edad que Informó Eventos			
	≥ 5 a < 9 años		≥ 9 a < 18 años	
	Vacuna contra la Influenza de CSL N = 161 <sup>b</sup>	Comparador N = 165 <sup>b</sup>	Vacuna contra la Influenza de CSL N = 254 <sup>b</sup>	Comparador N = 250 <sup>b</sup>
<b>Después de la dosis 1</b>				
<b>Reacciones Adversas Locales</b>				
Dolor	63	60	66	60
Enrojecimiento	23	27	17	17
Induración	17	17	15	16
<b>Eventos Adversos Sistémicos</b>				
Mialgia	34	30	40	37
Malestar general	24	13	22	20
Dolor de cabeza	21	19	27	26
Cualquier Fiebre	16	8	6	4
Fiebre ≥ 39° C	5	1	3	1
Náuseas / Vómitos	12	8	9	10
Diarrea	7	7	8	10
	Vacuna contra la Influenza de CSL N = 39 <sup>b</sup>	Comparador N = 53 <sup>b</sup>		
<b>Después de la dosis 2</b>				
<b>Reacciones Adversas Locales</b>				
Dolor	36	38	-	-
Enrojecimiento	10	19	-	-
Induración	8	17	-	-
<b>Eventos Adversos Sistémicos</b>				
Diarrea	13	6	-	-
Dolor de cabeza	13	13	-	-
Mialgia	13	17	-	-
Malestar general	5	8	-	-
Náuseas / Vómitos	3	8	-	-
Cualquier Fiebre	0	2	-	-
Fiebre ≥ 39° C	0	0	-	-

<sup>a</sup> Proporción de sujetos que informaron cada reacción adversa local o evento adverso sistémico solicitado por grupo de tratamiento en base al número de sujetos que contribuyen con por lo menos un valor de datos para un signo / síntoma individual (denominadores de eventos individuales).

<sup>b</sup> N = número de sujetos en la Población de Seguridad para cada grupo de tratamiento.

SR. ALBERTO A. BRITOS  
APODERADO

IF-2017-35221768-APN-DECBR#ANMAT  
FARM. ANABELA M. MARTÍNEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
página 6 de 14

**Tabla 2:** Proporción de Sujetos Pediátricos de 5 a < 18 Años de Edad con Reacciones Adversas Locales o Eventos Adversos Sistémicos Solicitados dentro de los 7 Días después de la Administración de la Vacuna contra la Influenza de CSL, Independientemente de la Causalidad (Estudios CSLCT-USF-06-29 y CSLCT-FLU-04-05)

	Porcentaje <sup>a</sup> de Sujetos en cada Grupo de Edad que Informó Eventos		
	CSLCT-USF-06-29 y CSLCT-FLU-04-05 ≥ 5 a < 9 años		CSLCT-USF-06-29 ≥ 9 a < 18 años
	Dosis 1 N = 82 - 595 <sup>b</sup>	Dosis 2 N = 82 - 426 <sup>b</sup>	Dosis 1 N = 397 <sup>b</sup>
<b>Reacciones Adversas Locales</b>			
Dolor	61	56	68
Eritema	24	23	17
Hinchazón	17	17	13
<b>Eventos Adversos Sistémicos</b>			
Irritabilidad <sup>d</sup>	18	16	-
Dolor de cabeza	16	10	27
Malestar general o sensación general de sentirse mal <sup>c</sup>	16	8	17
Cualquier Fiebre	13	6	5
Fiebre ≥ 39° C	3	2	1
Dolor muscular general (Mialgia)	12	8	20
Náuseas / Vómitos <sup>c</sup>	7	3	5
Vómitos / Diarrea <sup>d</sup>	5	6	-
Pérdida del apetito <sup>d</sup>	5	4	-
Diarrea <sup>c</sup>	4	2	5

<sup>a</sup> Proporción de sujetos que informaron cada reacción adversa local o evento adverso sistémico solicitado por grupo de tratamiento en base al número de sujetos que contribuyen con por lo menos un valor de datos para un signo / síntoma individuo (denominadores eventos individuales).

<sup>b</sup> N = número de sujetos en la Población de Seguridad para cada grupo de tratamiento. Para el grupo de edad ≥ 5 a < 9 años de edad, los denominadores para la Dosis 1 fueron: N = 82 para Vómitos / Diarrea, Irritabilidad, Pérdida de apetito, N = 513 para Malestar general, Diarrea, Náuseas / Vómitos y N = 593 - 595 para todos los demás parámetros. Los denominadores para la Dosis 2 fueron: N = 82 para Vómitos / Diarrea, Irritabilidad, Pérdida de apetito, N = 344 para Malestar general, Diarrea y Náuseas / Vómitos y N = 421 - 426 para todos los demás parámetros.

<sup>c</sup> Estos términos preferidos se utilizaron para describir los Eventos Adversos Solicitados en el Estudio CSLCT-USF-06-29

<sup>d</sup> Estos términos preferidos se utilizaron para describir los Eventos Adversos Solicitados en el Estudio CSLCT-FLU-04-05.

En el Estudio CSLCT-USF-07-36, los eventos adversos no solicitados que se produjeron en ≥ 5% de los participantes de 5 a < 9 años de edad que recibieron la vacuna contra la influenza de CSL después de la primera o la segunda dosis incluyeron tos (15%) y pirexia (9%). Los eventos adversos no solicitados que se produjeron en ≥ 5% de los participantes de 9 a < 18 años que recibieron la vacuna contra la influenza de CSL después de la primera dosis incluyeron tos (7%), dolor orofaríngeo (7%), dolor de cabeza (7%) y congestión nasal (6%).

En los Estudios CSLCT-USF-06-29 y CSLCT-FLU-04-05, los eventos adversos no solicitados que se produjeron en ≥ 5% de los participantes de 5 a < 9 años de edad después de la primera o la segunda dosis fueron los siguientes: infección de las vías respiratorias superiores (13%), tos (10%), rinorrea (7%), dolor de cabeza (5%), rinofaringitis (5%)

SR. ALBERTO A. BRITOS  
APODERADO

IE-2017-05221768-APN-DECBR#ANMAT  
FARM. ANABELA M. MARTINEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
página 7 de 14

y pirexia (5%). Los eventos adversos no solicitados que se produjeron en  $\geq 5\%$  de los participantes de 9 a < 18 años de edad que recibieron la vacuna contra la influenza de CSL después de la primera dosis incluyeron infección de las vías respiratorias superiores (9%) y dolor de cabeza (8%).

### Estudios en adultos

En estudios clínicos, a 11.104 adultos ( $\geq 18$  a < 65 años) y 630 adultos mayores ( $\geq 65$  años) se les administró una dosis única de la vacuna contra la influenza de CSL y se recolectó la información de seguridad de los mismos. Los datos clínicos en adultos se presentan de 3 estudios clínicos que incluyen dos aleatorizados, ciegos para el observador, controlados con placebo en adultos (CSLCT-FLU-05-09 con la formulación de la vacuna del hemisferio sur para la temporada 2006 y CSLCT-USF-06-28, con las formulaciones de la vacuna del hemisferio sur para la temporada 2008 y 2009) y uno aleatorizado, ciego para el observador, controlado con comparador en adultos mayores (CSLCT-USF-07-41, formulación de la vacuna del hemisferio norte para la temporada 2008 / 2009). En todos los estudios en adultos, no se produjeron muertes relacionadas con la vacuna ni se reportaron eventos adversos serios relacionados con la vacuna.

La evaluación de seguridad fue idéntica en los tres estudios en adultos, con reacciones adversas locales (en el sitio de inyección) y eventos adversos sistémicos solicitados durante 5 días después de la vacunación (Tabla 3). Los eventos adversos no solicitados se recolectaron durante 21 días después de la vacunación. Todos los eventos adversos se presentan independientemente de cualquier causalidad con el tratamiento asignado por los investigadores del estudio

**Tabla 3: Proporción de Sujetos Adultos y Adultos Mayores de 18 Años de Edad y Mayores con Reacciones Adversas Locales o Eventos Adversos Sistémicos Solicitados dentro de los 5 Días después de la Administración de la Vacuna contra la Influenza de CSL o Placebo, Independientemente de la Causalidad (Estudios CSLCT-FLU-05-09, CSLCT-USF -06-28 y CSLCT-USF-07-41)**

	Porcentaje <sup>a</sup> de Sujetos en cada Grupo de Edad que Informó Eventos					
	CSLCT-FLU-05-09 <sup>c</sup> $\geq 18$ a < 65 años		CSLCT-USF-06-28 $\geq 18$ a < 65 años		CSLCT-USF-07-41 $\geq 65$ años	
	Vacuna contra la Influenza de CSL N = 1087- 1088 <sup>b</sup>	Placebo N = 266 <sup>b</sup>	Vacuna contra la Influenza de CSL N = 10.015 <sup>b</sup>	Placebo N = 5005 <sup>b</sup>	Vacuna contra la Influenza de CSL N = 630 <sup>b</sup>	Comparador N = 636 <sup>b</sup>
<b>Reacciones Adversas Locales</b>						
Sensibilidad (Dolor a la tacto)	60	18	69	17	36	31
Dolor (sin tocar)	40	9	48	11	15	14
Enrojecimiento	16	8	4	< 1	3	1
Hinchazón	9	1	4	< 1	7	8
Moretones	5	1	1	1	< 1	1
<b>Eventos Adversos Sistémicos</b>						
Dolor de cabeza	26	26	25	23	9	11
Malestar general	19	19	29	26	7	6
Dolores musculares	13	9	21	12	9	8
Náuseas	6	9	7	6	2	1
Escalofríos / Escalofríos súbitos e intensos	3	2	5	4	2	2
Fiebre	1	1	3	2	< 1	1

SR. ALBERTO A. BRITOS  
APODERADO

IE-2017-35221768-APN-DECBR#ANMAT  
FARM. ANABELA M. MARTINEZ  
DIRECTORA TÉCNICA

página 8 de 14

<sup>a</sup> Proporción de sujetos que informaron cada reacción adversa local o evento adverso sistémico solicitado por grupo de tratamiento en base al número de sujetos que contribuyen con por lo menos un valor de datos para un signo / síntoma individuo (denominadores de eventos individuales).

<sup>b</sup> N = número de sujetos en la Población de Seguridad para cada grupo de tratamiento. Para el estudio CSLCT-FLU-05-09, los denominadores fueron: N = 1087 para Sensibilidad (Dolor al tocar), Dolor (sin tocar), Enrojecimiento, Hinchazón y N = 1.088 para los demás parámetros.

<sup>c</sup> Los participantes que recibieron la vacuna contra la influenza de CSL fueron vacunados, ya sea con una presentación sin conservantes o que contienen conservantes (tiomersal). La presentación que contiene conservantes no se comercializa en Australia.

En el Estudio CSLCT-FLU-05-09, el dolor de cabeza fue el único evento adverso no solicitado que se produjo en  $\geq 5\%$  de los participantes que recibieron la vacuna contra la influenza de CSL o placebo (8% frente al 6%, respectivamente). En el Estudio CSLCT-USF-06-28, los eventos adversos no solicitado ocurridos en  $\geq 5\%$  de los participantes que recibieron la vacuna contra la influenza de CSL o placebo incluye dolor de cabeza (12% frente al 11%, respectivamente) y dolor orofaríngeo (5% por Vacuna contra la influenza CSL y 5% por placebo). En el Estudio CSLCT-USF-07-41, el dolor de cabeza (5%) fue el único evento adverso no solicitado que ocurrió en  $\geq 5\%$  de los participantes que recibieron la vacuna contra la influenza de CSL.

#### **Vigilancia Post-comercialización:**

Los siguientes eventos adversos han sido notificados espontáneamente durante el uso post-aprobación de la vacuna de Influenza de CSL y se agregan a los eventos observados durante los estudios clínicos.

Los eventos adversos reportados se presentan a continuación de acuerdo a órganos y sistemas.

#### *Trastornos del sistema linfático y sanguíneo:*

Trombocitopenia.

#### *Trastornos del sistema inmunitario:*

Reacciones alérgicas o hipersensibilidad inmediata, incluyendo shock anafiláctico.

#### *Trastornos del sistema nervioso*

Neuralgia, parestesias y convulsiones (incluyendo convulsiones febriles). Encefalopatía, encefalomiелitis, neuritis o neuropatía, mielitis transversa y síndrome de Guillain-Barré.

#### *Trastornos vasculares:*

Vasculitis que debe ser asociada con compromiso renal transitorio.

#### *Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:*

Prurito, urticaria y erupción cutánea.

#### *Trastornos generales y afecciones en el sitio de administración*

Celulitis y gran inflamación en el sitio de la inyección

Enfermedad de tipo gripal.

#### **SOBREDOSIFICACIÓN**

No existe información específica en relación a sobredosis con Vacuna Antigripal de CSL.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital A Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

SR. ALBERTO A. BRITOS  
APODERADO

IE-2017-35221768-APN-DECBR#ANMAT  
FARM. ANABELA M. MARTINEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
página 9 de 14



INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C.

16

**CONSERVACIÓN**

Conservar en la heladera entre 2° y 8°C, dentro de su estuche original.  
NO CONGELAR. Proteger de la luz.  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**PRESENTACIONES**

Envase individual conteniendo 1 jeringa prellenada descartable x 0,5 ml.  
Envase conteniendo 10 jeringas prellenadas descartable x 0,5 ml.

La jeringa de la vacuna NILGRIP® se presenta recubierta por una película protectora transparente que garantiza que el producto no ha sido abierto. No usar si falta la película protectora o está dañada.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 48.405

NILGRIP® es la marca registrada en la República Argentina del producto FLUVAX® elaborado por SeqirusPty Ltd.-39-79Poplar Road, Parkville, Victoria 3052 Australia.


Importado y Distribuido por su representante exclusivo en la República Argentina:  
INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C.

Dirección y Administración: Pte. José Evaristo Uriburu 153 (C1027AAC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: (011) 4953-7215


Laboratorios: Calle 606 Dr. Dessy 351 (B1867DWE) Florencio Varela, Pcia. de Buenos Aires.

Director Técnico: Dra. Anabela Marisa Martínez – Farmacéutica

Ultima revision Noviembre 2017



SR. ALBERTO A. BRITOS  
APODERADO



IF-2017/35221768-APN-DECBR#ANMAT  
FARM. ANABELA M. MARTINEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
pagina 10 de 14



INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C.



## PROYECTO DE ROTULO

**NILGRIP®**

VACUNA ANTIGRIPIAL INACTIVADA (SPLIT VIRION)

Temporada 2018

Suspensión para inyección subcutánea profunda o intramuscular

1 jeringa prellenada de 0,5 ml.

NO USAR EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

Industria Australiana

Venta bajo receta

### **FORMULA**

Cada dosis de 0,5 ml contiene subunidades de las siguientes cepas de virus de influenza:

Hemaglutinina A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09- - cepa análoga A/Singapore/GP1908/2015 (IVR-180A) -15 µg

Hemaglutinina A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)- cepa análoga A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (IVR-186)-15 µg

Hemaglutinina B/Phuket/3073/2013- - cepa análoga B/Phuket/3073/2013(BVR-1B) -15 µg

Excipientes: Cloruro de sodio 4,1 mg, Fosfato de sodio dibásico anhidro 0.3 mg, Fosfato de sodio monobásico 0.08 mg, Cloruro de Potasio 0.02 mg, Fosfato de Potasio monobásico 0.02 mg, Cloruro de Calcio 0.0015 mg, Agua para inyectables c.s.p. 0,5 ml.

Suspensión para inyección subcutánea profunda o intramuscular.

Usar en un paciente una sola vez. No contiene preservativos antimicrobianos. No usar si falta la película protectora o está dañada.

Los siguientes componentes pueden encontrarse en forma de trazas en cada dosis de 0,5 ml: Taurodeoxicolato de sodio, Ovoalbúmina (< 1 µg), Sucrosa, Neomicina, Sulfato de Polimixina B y propiolactona

### **DOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN**

Leer atentamente el prospecto adjunto.

### **CONTENIDO**

Envase conteniendo 1 jeringa prellenada de 0,5 ml.

### **VENCIMIENTO**

(va fecha)

### **LOTE**

(va fecha)


Conservar en la heladera entre 2° y 8°C, dentro de su estuche original.

NO CONGELAR. Proteger de la luz. Agitar vigorosamente antes de su uso.

Esta vacuna es preparada por crecimiento viral en embriones de pollo y no debe administrarse NILGRIP® a individuos con hipersensibilidad (alergia) o reacciones anafilácticas a los huevos, Neomicina, Sulfato de Polimixina B o cualquier otro componente de la vacuna.

SR. ALBERTO A. BRITOS  
APODERADO

FARM. ANABELA M. MARTINEZ  
DIRECTORA TÉCNICA



PROYECTO DE ROTULO

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 48.405

NILGRIP® es la marca registrada en la República Argentina del producto FLUVAX® elaborado por Seqirus Pty Ltd.-39-79 Poplar Road, Parkville, Victoria 3052 Australia.

Importado y Distribuido por su representante exclusivo en la República Argentina:  
INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C.

Dirección y Administración: Pte. José Evaristo Uriburu 153 (C1027AAC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: (011) 4953-7215

Laboratorios: Calle 606 Dr. Dessy 351 (B1867DWE) Florencio Varela, Pcia. de Buenos Aires.

Director Técnico: Dra. Anabela Marisa Martinez – Farmacéutica

*Ultima revision Noviembre 2017*

  
SR. ALBERTO A. BRITOS  
APODERADO

  
FARM. ANABELA M. MARTINEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
15-2017-521168-APN-DECBR#ANMAT



INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C.



## PROYECTO DE ROTULO

### NILGRIP®

VACUNA ANTIGRIPIAL INACTIVADA (SPLIT VIRION)

Temporada 2018

Suspensión para inyección subcutánea profunda o intramuscular

10 jeringas prellenadas de 0.5 ml.

NO USAR EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

Industria Australiana

Venta bajo receta

#### FÓRMULA

Cada dosis de 0,5 ml contiene subunidades de las siguientes cepas de virus de influenza:

Hemaglutinina A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09- - cepa análoga A/Singapore/GP1908/2015 (IVR-180A) -15 µg

Hemaglutinina A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016(H3N2)- cepa análoga A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (IVR-186)-15 µg

Hemaglutinina B/Phuket/3073/2013- - cepa análoga B/Phuket/3073/2013(BVR-1B) -15 µg

Excipientes: Cloruro de sodio 4,1 mg, Fosfato de sodio dibásico anhidro 0.3 mg, Fosfato de sodio monobásico 0.08 mg, Cloruro de Potasio 0.02 mg, Fosfato de Potasio monobásico 0.02 mg, Cloruro de Calcio 0.0015 mg, Agua para inyectables c.s.p. 0,5 ml.

Suspensión para inyección subcutánea profunda o intramuscular

Usar en un paciente una sola vez. No contiene preservativos antimicrobianos. No usar si falta la película protectora o está dañada.

Los siguientes componentes pueden encontrarse en forma de trazas en cada dosis de 0,5 ml: Taurodeoxicolato de sodio, Ovoalbúmina (< 1 µg), Sucrosa, Neomicina, Sulfato de Polimixina B y propiolactona.

#### POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Ver atentamente el prospecto adjunto.

#### CONTENIDO

Envase conteniendo 10 jeringas prellenadas de 0,5 ml.

#### VENCIMIENTO

(va fecha)

#### LOTE

(va fecha)

Conservar en la heladera entre 2° y 8°C, dentro de su estuche original.

NO CONGELAR. Proteger de la luz. Agitar vigorosamente antes de su uso.

Esta vacuna es preparada por crecimiento viral en embriones de pollo y no debe administrarse NILGRIP a individuos con hipersensibilidad (alergia) o reacciones anafilácticas a los huevos, Neomicina, Sulfato de Polimixina B o cualquier otro componente de la vacuna.

SR. ALBERTO A. BRITOS  
APODERADO

FARM. ANABELA M. MARTINEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
1659-11-34221768-APN-DECBR#ANMAT



PROYECTO DE ROTULO

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 48 405

NILGRIP® es la marca registrada en la República Argentina del producto FLUVAX® elaborado por Seqirus Pty Ltd.-39-79 Poplar Road, Parkville, Victoria 3052 Australia.

Importado y Distribuido por su representante exclusivo en la República Argentina:  
INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C.


Dirección y Administración: Pte. José Evaristo Urriburu 153 (C1027AAC) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: (011) 4953-7215

Laboratorios: Calle 606 Dr. Dessy 351 (B1867DWE) Florencio Varela, Pcia. de Buenos Aires.

Director Técnico: Dra. Anabela Marisa Martinez – Farmacéutica

*Ultima revision Noviembre 2017*

  
SR. ALBERTO A. BRITOS  
APODERADO  
NV

  
FARM. ANABELA M. MARTINEZ  
DIRECTORA TÉCNICA  
1768-APN-DECBR#ANMAT  
página 14 de 14



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2017-35221768-APN-DECBR#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Miércoles 27 de Diciembre de 2017

**Referencia:** 1110-1528-17-3 ROT Y PROSP

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2017.12.27 16:54:32 -0300'

Patricia Ines Aprea  
Jefe I

Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2017.12.27 16:54:33 -0300'