



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2019 - Año de la Exportación

**Disposición**

**Número:** DI-2019-112-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 4 de Enero de 2019

**Referencia:** 1-0047-0000-005070-18-0

---

VISTO el Expediente N° 1-0047-0000-005070-18-0 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones la firma JANSSEN CILAG FARMACEUTICA S.A., solicita la aprobación de nuevos proyectos de prospectos e información para el paciente para la Especialidad Medicinal denominada INVOKANA / CANAGLIFLOZINA Forma farmacéutica y concentración: - COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, CANAGLIFLOZINA 100 mg (correspondiente a 102 mg de Canagliflozina hemihidrato); CANAGLIFLOZINA 300 mg (correspondiente a 306 mg de Canagliflozina hemihidrato); aprobada por Certificado N° 57.690.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición N°: 5904/96 y Circular N° 4/13.

Que la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. – Autorízase a la firma JANSSEN CILAG FARMACEUTICA S.A., propietaria de la Especialidad Medicinal denominada INVOKANA / CANAGLIFLOZINA Forma

farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, CANAGLIFLOZINA 100 mg (correspondiente a 102 mg de Canagliflozina hemihidrato); CANAGLIFLOZINA 300 mg (correspondiente a 306 mg de Canagliflozina hemihidrato); el nuevo proyecto de prospecto obrante en el documento IF-2018-45036893-APN-DERM#ANMAT; e información para el paciente obrante en el documento IF-2018-45036975-APN-DERM#ANMAT.

ARTICULO 2º. – Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 57.690, cuando el mismo se presente acompañado de la presente Disposición.

ARTICULO 3º. - Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición y prospectos e información para el paciente. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-0047-0000-005070-18-0

Jfs

Digitally signed by BELLOSO Waldo Horacio  
Date: 2019.01.04 09:56:37 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires


Waldo HORACIO BELLOSO  
SubAdministrador  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2019.01.04 09:56:45 -03'00'

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690

Janssen

PHARMACEUTICAL COMPANIES  
Johnson & Johnson



**INVOKANA®**  
**CANAGLIFLOZINA 100 y 300 mg**  
Comprimidos recubiertos

Industria Estadounidense

Venta Bajo Receta

**COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA**

Cada comprimido recubierto de 100 mg contiene:

**Canagliflozina 100 mg**

(correspondiente a 102 mg de Canagliflozina hemihidrato)

Excipientes:

Celulosa microcristalina, lactosa anhidra, croscarmelosa sódica, hidroxipropil celulosa, Estearato de magnesio, Opadry II 85F92209 amarillo (Polivinil alcohol - parcialmente hidrolizado, Macrogol 3350, Talco, Dióxido de titanio E171, Óxido de hierro amarillo E172).

Cada comprimido recubierto de 300 mg contiene:

**Canagliflozina 300 mg**

(correspondiente a 306 mg de Canagliflozina hemihidrato)

Excipientes:

Celulosa microcristalina, lactosa anhidra, croscarmelosa sódica, hidroxipropil celulosa, Estearato de magnesio, Opadry II 85F18422 blanco (Polivinil alcohol - parcialmente hidrolizado, Macrogol 3350, Talco, Dióxido de titanio E171).

**ACCIÓN TERAPÉUTICA**

Grupo farmacoterapéutico: Fármacos usados en diabetes, otros fármacos hipoglucemiantes, excluidas las insulinas. Código ATC: A10BX11.

**INDICACIONES**

INVOKANA® está indicado en adultos de 18 años de edad o mayores con diabetes mellitus tipo 2 para mejorar el control glucémico en:

Monoterapia

Cuando la dieta y el ejercicio por sí solos no logran un control suficiente de la glucemia en pacientes en quienes el uso de metformina se considera inadecuado por presentar intolerancia o contraindicaciones.

Specialist: CPB

MAF revision: GK

QC: YK

HA approval date:

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D\_es

Farm. HUEL PING TSANG  
CO-DIRECTORA TÉCNICA  
APODERADA

IF-2018-4503689

#ANMAT

página 1 de 28

Página 1 de 28

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690

Janssen

PHARMACEUTICAL COMPANY  
Johnson & Johnson



### Tratamiento complementario

Tratamiento complementario administrado con otros medicamentos hipoglucemiantes como la insulina, cuando estos, junto con dieta y ejercicio, no logren un control glucémico adecuado (ver datos disponibles sobre los diferentes tratamientos complementarios en las secciones “Advertencias y Precauciones especiales de empleo”, “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción” y “Propiedades farmacodinámicas”).

## PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

### Propiedades farmacodinámicas

#### Mecanismo de acción

El transportador SGLT2, expresado en los túbulos renales proximales, es responsable de la mayor parte de la reabsorción de la glucosa filtrada desde la luz de los túbulos. Se ha demostrado que los pacientes con diabetes presentan una mayor reabsorción renal de glucosa que puede contribuir a una elevación persistente de las concentraciones de glucosa en sangre. Canagliflozina es un inhibidor del SGLT2 activo por vía oral. Al inhibir al SGLT2, canagliflozina hace que disminuya la reabsorción de la glucosa filtrada y reduce el umbral renal para la glucosa ( $UR_G$ ), con lo que aumenta la excreción de glucosa en la orina (EUG) y disminuye las concentraciones plasmáticas de glucosa anteriormente elevadas por este mecanismo independiente de la insulina en pacientes con diabetes tipo 2. El aumento de la EUG con la inhibición del SGLT2, se traduce también en diuresis osmótica, de forma que el efecto diurético hace que descienda la presión arterial sistólica; además, el aumento de la EUG produce pérdida calórica y, por consiguiente, una reducción del peso, como se ha demostrado en estudios de pacientes con diabetes tipo 2.

El efecto de canagliflozina al aumentar la EUG reduciendo directamente la glucosa plasmática es independiente de la insulina. En estudios clínicos con canagliflozina se ha observado una mejoría en la evaluación del modelo de homeostasis para la función de las células beta (HOMA en células beta) y en la respuesta de la secreción de insulina por las células beta ante una provocación con una comida variada.

En estudios de fase 3, la administración preprandial de canagliflozina 300 mg consiguió una mayor reducción en las variaciones de glucosa posprandial que la observada con la dosis de 100 mg. Este efecto observado con la dosis de 300 mg de canagliflozina se puede deber, en parte, a la inhibición local del SGLT1 intestinal (un importante transportador de glucosa en el intestino) que se asocia a concentraciones elevadas transitorias de canagliflozina en la luz del intestino antes de la absorción del medicamento (canagliflozina es un inhibidor de baja potencia del transportador SGLT1). Los estudios han demostrado que canagliflozina no se asocia a malabsorción de la glucosa.

#### Efectos farmacodinámicos

Se observaron reducciones del  $UR_G$  y aumentos de la EUG dependientes de la dosis tras la administración de dosis únicas y múltiples de canagliflozina a pacientes con diabetes tipo 2. Con un valor inicial del  $UR_G$  de aproximadamente 13 mmol/l, se observó una supresión máxima del  $UR_G$  medio durante 24 horas con la dosis diaria de 300 mg de hasta aproximadamente 4 mmol/l a 5 mmol/l en pacientes con diabetes tipo 2 en estudios de fase 1, lo que sugiere un bajo riesgo de hipoglucemia inducida por el tratamiento. Las reducciones en el  $UR_G$  causaron un aumento de la EUG en sujetos con diabetes tipo 2 tratados con 100 mg o con 300 mg de

Specialist: CPB

MAF revision: GK

IF-2018-45076898-APN-DERM#ANMIAT  
PAIN-ARDELINO TSANG

QC: YK

CO-DIRECTORA TECNICA

HA approval date:


AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D\_es

APODERADA

página 2 de 28

Página 2 de 28

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690



canagliflozina de 77 g/día a 119 g/día en los estudios de fase I; la EUG observada se traduce en una pérdida de 308 kcal/día a 476 kcal/día. Las reducciones en el UR<sub>G</sub> y los incrementos de la EUG se mantuvieron durante las 26 semanas del período de tratamiento en pacientes con diabetes tipo 2. Se observaron incrementos moderados (generalmente < 400 ml a 500 ml) en el volumen diario de orina que se atenuaron después de varios días de administración. La excreción urinaria de ácido úrico aumentó de forma transitoria por efecto de canagliflozina (incremento del 19% en comparación con el valor basal del día 1 y posterior atenuación hasta el 6% el día 2 y hasta el 1% el día 13). Este efecto se acompañó de una reducción sostenida en las concentraciones de ácido úrico de aproximadamente el 20%.

En un estudio de dosis única realizado en pacientes con diabetes tipo 2, el tratamiento con 300 mg antes de una comida variada retrasó la absorción intestinal de glucosa y redujo la glucosa posprandial a través de un mecanismo tanto renal como no renal.

#### Eficacia clínica y seguridad

Un total de 10.501 pacientes con diabetes tipo 2 que participaron en diez estudios doble ciego y controlados de seguridad y eficacia para evaluar los efectos de INVOKANA® en el control glucémico. La distribución por razas fue: 72% caucásicos, 16% asiáticos, 5% negros y 8% otros grupos. El 17% de los pacientes eran hispanos. El 58% de los pacientes eran varones. Los pacientes tenían una edad media global de 59,5 años (intervalo de 21 años a 96 años), con 3.135 pacientes ≥ 65 años de edad y 513 pacientes ≥ 75 años de edad. El 58% de los pacientes tenían un índice de masa corporal (IMC) ≥ 30 kg/m<sup>2</sup>. En el programa de desarrollo clínico se evaluó a 1.085 pacientes con una tasa de filtración glomerular (TFGe) basal de 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> a < 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>.

#### Estudios controlados con placebo

Se estudió canagliflozina administrado en monoterapia, tratamiento doble con metformina, tratamiento doble con sulfonilurea, tratamiento triple con metformina y sulfonilurea, tratamiento triple con metformina y pioglitazona y tratamiento complementario con insulina (Tabla 1). En general, canagliflozina obtuvo resultados clínica y estadísticamente significativos (p<0,001) frente a placebo en el control glucémico, incluidos HbA<sub>1c</sub>, el porcentaje de pacientes que logran una HbA<sub>1c</sub> <7%, variación respecto al valor basal en la glucosa plasmática en ayunas (GPA), y glucosa posprandial (GPP) a las 2 horas. Además, se observaron reducciones del peso corporal y de la presión arterial sistólica en comparación con placebo.

Además, canagliflozina fue estudiada como una triple terapia con metformina y sitagliptina, y dosificada con un régimen de ajuste de dosis, usando 100mg como dosis inicial y titulando hasta 300mg tan temprano como la semana 6 en pacientes que requieren un control glucémico adicional, que han tenido un eGFR (por sus siglas en inglés, índice de filtración glomerular estimado) apropiado y que toleraban canagliflozina 100mg (Tabla 1). Canagliflozina dosificada con un régimen de ajuste de dosis produjo resultados clínica y estadísticamente significativos (p<0,001) relativos al placebo en el control glucémico, incluyendo HbA<sub>1c</sub> y cambios basales en la glucosa plasmática en ayunas (GPA), y una mejora estadísticamente significativa (p<0,01) en el porcentaje de pacientes que lograron HbA<sub>1c</sub> <7%. Adicionalmente, se observaron reducciones en el peso corporal y la presión sistólica relativa al placebo.

#### **Tabla 1: Resultados de eficacia procedentes de estudios clínicos controlados con placebo<sup>a</sup>**

Specialist: CPB

MAF revision: GK

IF-2018-45036895-APNDERMATANMAT

QC: YK

CO-DIRECTORA TÉCNICA

HA approval date:

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D\_es

APODERADA

página 3 de 28

Página 3 de 28

Producto: Invokana®  
 Nro de registro: 57.690



<b>Monoterapia (26 semanas)</b>			
	<b>Canagliflozina</b>		<b>Placebo (N=192)</b>
	<b>100 mg (N=195)</b>	<b>300 mg (N=197)</b>	
<b>HbA<sub>1c</sub> (%)</b>			
Valor basal (media)	8,06	8,01	7,97
Variación respecto al valor basal (media ajustada)	-0,77	-1,03	0,14
Diferencia respecto al placebo (media ajustada) (IC del 95%)	-0,91 <sup>b</sup> (-1,09; -0,73)	-1,16 <sup>b</sup> (-1,34; -0,98)	N/A <sup>c</sup>
<b>Pacientes (%) que logran una HbA<sub>1c</sub> &lt;7%</b>	44,5 <sup>b</sup>	62,4 <sup>b</sup>	20,6
<b>Peso corporal</b>			
Valor basal (media) en kg	85,9	86,9	87,5
% Variación respecto al valor basal (media ajustada)	-2,8	-3,9	-0,6
Diferencia respecto al placebo (media ajustada) (IC del 95%)	-2,2 <sup>b</sup> (-2,9; -1,6)	-3,3 <sup>b</sup> (-4,0; -2,6)	N/A <sup>c</sup>

<b>Tratamiento doble con metformina (26 semanas)</b>			
	<b>Canagliflozina + metformina</b>		<b>Placebo + metformina (N=183)</b>
	<b>100 mg (N=368)</b>	<b>300 mg (N=367)</b>	
<b>HbA<sub>1c</sub> (%)</b>			
Valor basal (media)	7,94	7,95	7,96
Variación respecto al valor basal (media ajustada)	-0,79	-0,94	-0,17
Diferencia respecto al placebo (media ajustada) (IC del 95%)	-0,62 <sup>b</sup> (-0,76; -0,48)	-0,77 <sup>b</sup> (-0,91; -0,64)	N/A <sup>c</sup>
<b>Pacientes (%) que logran una HbA<sub>1c</sub> &lt;7%</b>	45,5 <sup>b</sup>	57,8 <sup>b</sup>	29,8
<b>Peso corporal</b>			
Valor basal (media) en kg	88,7	85,4	86,7
%Variación respecto al valor basal (media ajustada)	-3,7	-4,2	-1,2
Diferencia respecto al placebo (media ajustada) (IC del 95%)	-2,5 <sup>b</sup> (-3,1; -1,9)	-2,9 <sup>b</sup> (-3,5; -2,3)	N/A <sup>c</sup>

Specialist: CPB

MAF revision: GK

Farm. HUEL PING TSANG  
 CO-DIRECTORA TECNICA  
 APODERADA  
 IF-2018-45036893

QC: YK

HA approval date:

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D\_es  
 página 4 de 28

Página 4 de 28

Producto: Invokana®  
 Nro de registro: 57.690



<b>Tratamiento triple con metformina y sulfonilurea (26 semanas)</b>			
	<b>Canagliflozina + metformina y sulfonilurea</b>		<b>Placebo + metformina y sulfonilurea (N=156)</b>
	<b>100 mg (N=157)</b>	<b>300 mg (N=156)</b>	
<b>HbA<sub>1c</sub> (%)</b>			
Valor basal (media)	8,13	8,13	8,12
Variación respecto al valor basal (media ajustada)	-0,85	-1,06	-0,13
Diferencia respecto al placebo (media ajustada) (IC del 95%)	-0,71 <sup>b</sup> (-0,90; -0,52)	-0,92 <sup>b</sup> (-1,11; -0,73)	N/A <sup>c</sup>
<b>Pacientes (%) que logran una HbA<sub>1c</sub> &lt;7%</b>	43,2 <sup>b</sup>	56,6 <sup>b</sup>	18,0
<b>Peso corporal</b>			
Valor basal (media) en kg	93,5	93,5	90,8
%Variación respecto al valor basal (media ajustada)	-2,1	-2,6	-0,7
Diferencia respecto al placebo (media ajustada) (IC del 95%)	-1,4 <sup>b</sup> (-2,1; -0,7)	-2,0 <sup>b</sup> (-2,7; -1,3)	N/A <sup>c</sup>

<b>Tratamiento añadido a insulina<sup>d</sup> (18 semanas)</b>			
	<b>Canagliflozina + insulina</b>		<b>Placebo + insulina (N=565)</b>
	<b>100 mg (N=566)</b>	<b>300 mg (N=587)</b>	
<b>HbA<sub>1c</sub> (%)</b>			
Valor basal (media)	8,33	8,27	8,20
Variación respecto al valor basal (media ajustada)	-0,63	-0,72	0,01
Variación respecto al placebo (media ajustada) (IC del 95%)	-0,65 <sup>b</sup> (-0,73; -0,56)	-0,73 <sup>b</sup> (-0,82; -0,65)	N/A <sup>c</sup>
<b>Pacientes (%) que logran una HbA<sub>1c</sub> &lt;7%</b>	19,8 <sup>b</sup>	24,7 <sup>b</sup>	7,7

Specialist: CPB

MAF revision: GK

IF-2018-45036893-APN-DERM#ANMAT

QC: YK

Farm. HUEI PING TSANG

HA approval date:

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUP

CO-DIRECTORA TECNICA APODERADA


Mar-18\_v1.2+D\_es  
 página 5 de 28

página 5 de 28

Producto: Invokana®  
 Nro de registro: 57.690



PHARMACEUTICAL COMPANIES OF  
 Johnson & Johnson



<b>Peso corporal</b>			
Valor basal (media) en kg	96,9	96,7	97,7
%Variación respecto al valor basal (media ajustada)	-1,8	-2,3	0,1
Diferencia respecto al placebo (media ajustada) (IC del 95%)	-1,9 <sup>b</sup> (-2,2; -1,5)	-2,4 <sup>b</sup> (-2,8; -2,0)	N/A <sup>c</sup>
<b>Triple terapia con metformina y sitagliptina<sup>c</sup> (26 semanas)</b>			
	Canaglifozina + metformina y sitagliptina <sup>a</sup> (N=107)	Placebo + metformina y sitagliptina (N=106)	
<b>HbA<sub>1c</sub> (%)</b>			
Valor basal (media)	8,53	8,38	
Variación respecto al valor basal (media ajustada)	-0,91	-0,01	
Variación respecto al placebo (media ajustada) (IC del 95%)	-0,89 <sup>b</sup> (-1,19; -0,59)		
<b>Pacientes (%) que logran una HbA<sub>1c</sub> &lt;7%</b>	32 <sup>f</sup>	12	
<b>Glucosa plasmática en ayunas (mg/dl)</b>			
Valor basal (media)	186	180	
Variación respecto al valor basal (media ajustada)	-30	-3	
Variación respecto al placebo (media ajustada) (IC del 95%)	-27 <sup>b</sup> (-40; -14)		
<b>Peso corporal</b>			
Valor basal (media)	93,8	89,9	
% de cambio respecto al valor basal (media ajustada)	-3,4	-1,6	
Variación respecto al placebo (media ajustada) (IC del 95%)	-1,8 <sup>b</sup> (-2,7; -0,9)		

Specialist: CPB

HA approval date:

MAF revision: GK

QC: YK

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D\_es

Farm. HUEI PING TSANG  
 CO-DIRECTORA TECNICA  
 APODERADA  
 IF-2018-45038895-APP-  
 DERM#ANMAT



Producto: Invokana®  
 Nro de registro: 57.690



PHARMACEUTICAL COMPANY OF  
 Johnson & Johnson



<sup>a</sup> Población por intención de tratar utilizando la última observación en el estudio antes del tratamiento de rescate glucémico.

<sup>b</sup>  $p < 0,001$  frente a placebo.

<sup>c</sup> No aplica.

<sup>d</sup> Canagliflozina como tratamiento complementario a insulina (con o sin otros medicamentos hipoglucemiantes).

<sup>e</sup> Canagliflozina 100mg titulada a 300mg

<sup>f</sup>  $p < 0,01$  comparado con placebo

<sup>g</sup> 90,7% de los sujetos en el grupo de canagliflozina aumentaron la dosis a 300mg

Además de los estudios presentados antes, los resultados de eficacia glucémica obtenidos en un subestudio de un tratamiento doble durante 18 semanas con sulfonilurea y un estudio de tratamiento triple durante 26 semanas con metformina y pioglitazona fueron generalmente comparables a los obtenidos en otros estudios.

Estudios controlados con tratamiento activo

Se comparó canagliflozina con glimepirida como tratamiento doble con metformina y con sitagliptina como tratamiento triple con metformina y sulfonilurea (tabla 2). Canagliflozina 100 mg como tratamiento doble con metformina produjo reducciones similares de la HbA<sub>1c</sub> respecto al valor basal y canagliflozina 300 mg produjo reducciones mayores ( $p < 0,05$ ) de la HbA<sub>1c</sub> en comparación con glimepirida, demostrando la no inferioridad. Una menor proporción de pacientes tratados con canagliflozina 100 mg (5,6%) y canagliflozina 300 mg (4,9%) experimentó al menos un episodio de hipoglucemia durante las 52 semanas de tratamiento en comparación con el grupo tratado con glimepirida (34,2%). En un estudio en el que se comparó canagliflozina 300 mg con sitagliptina 100 mg en un tratamiento triple con metformina y sulfonilurea, canagliflozina demostró una reducción no inferior ( $p < 0,05$ ) y superior ( $p < 0,05$ ) de la HbA<sub>1c</sub> en comparación con sitagliptina. La incidencia de episodios de hipoglucemia con canagliflozina 300 mg y sitagliptina 100 mg fue del 40,7% y del 43,2%, respectivamente. Se observaron también mejorías significativas en el peso corporal y reducciones de la presión arterial sistólica en comparación tanto con glimepirida como con sitagliptina.

**Tabla 2: Resultados de eficacia obtenidos de los estudios controlados con tratamiento activo<sup>a</sup>**

Comparación con glimepirida como tratamiento doble con metformina (52 semanas)			
	Canagliflozina + metformina		Glimepirida (ajustada) + metformina (N=482)
	100 mg (N=483)	300 mg (N=485)	
<b>HbA<sub>1c</sub> (%)</b>			
Valor basal (media)	7,78	7,79	7,83
Variación respecto al valor basal (media ajustada)	-0,82	-0,93	-0,81
Diferencia respecto a glimepirida (media ajustada) (IC del 95%)	-0,01 <sup>b</sup> (-0,11; 0,09)	-0,12 <sup>b</sup> (-0,22; -0,02)	N/A <sup>c</sup>

Specialist: CPB

HA approval date:

MAF revision: GK

QC: YK

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+PEP

IF-2018-45056893-APN-DERM#ANMAT

Farm. HUEIPING ISANG

CO-DIRECTORA TECNICA

APROBADA

página 7 de 28

Página 7 de 28

Producto: Invokana®  
 Nro de registro: 57.690



PHARMACEUTICAL COMPANY  
 Johnson & Johnson



Comparación con glimepirida como tratamiento doble con metformina (52 semanas)			
	Canagliflozina + metformina		Glimepirida (ajustada) + metformina (N=482)
	100 mg (N=483)	300 mg (N=485)	
<b>Pacientes (%) que logran una HbA<sub>1c</sub> &lt;7%</b>	53,6	60,1	55,8
<b>Peso corporal</b>			
Valor basal (media) en kg	86,8	86,6	86,6
%Variación respecto al valor basal (media ajustada)	-4,2	-4,7	1,0
Diferencia respecto a glimepirida (media ajustada) (IC del 95%)	-5,2 <sup>b</sup> (-5,7; -4,7)	-5,7 <sup>b</sup> (-6,2; -5,1)	N/A <sup>c</sup>

Comparación con sitagliptina como tratamiento triple con metformina y sulfonilurea (52 semanas)		
	Canagliflozina 300 mg + metformina y sulfonilurea (N=377)	Sitagliptina 100 mg + metformina y sulfonilurea (N=378)
<b>HbA<sub>1c</sub> (%)</b>		
Valor basal (media)	8,12	8,13
Variación respecto al valor basal (media ajustada)	-1,03	-0,66
Diferencia respecto a sitagliptina (media ajustada) (IC del 95%)	-0,37 <sup>b</sup> (-0,50; -0,25)	N/A <sup>c</sup>
<b>Pacientes (%) que logran una HbA<sub>1c</sub> &lt;7%</b>	47,6	35,3
<b>Peso corporal</b>		
Valor basal (media) en kg	87,6	89,6
Variación respecto al valor basal (media ajustada)	-2,5	0,3
Diferencia respecto a sitagliptina (media ajustada) (IC del 95%)	-2,8 <sup>d</sup> (-3,3; -2,2)	N/A <sup>c</sup>

<sup>a</sup> Población por intención de tratar en la que se utiliza la última observación antes del tratamiento de rescate glucémico.

<sup>b</sup> p<0,05

<sup>c</sup> No aplica.

<sup>d</sup> p<0,001.

Specialist: CPB

MAF revision: GK

QC: YK

HA approval date:

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D\_es

Farm. HUEIPING TSANG  
 CO-DIRECTORA TÉCNICA  
 APODERADA

IF-2018-45036893-APN-DERM#ANMAT

Producto: Invokana®  
 Nro de registro: 57.690



PHARMACEUTICAL COMPANIES OF  
 Johnson & Johnson



Canaglifozina como terapia inicial combinada con metformina

Canaglifozina fue evaluada en combinación con metformina como terapia inicial combinada en pacientes con diabetes tipo 2 con falla en la dieta y ejercicio. Canaglifozina 100mg y canaglifozina 300mg en combinación con metformina XR resultaron en una mejora estadísticamente significativa en HbA<sub>1c</sub> comparado con las respectivas dosis de canaglifozina sola (100mg y 300mg) o metformina XR sola (Tabla 3).

**Tabla 3: Resultados del Estudios Clínico de 26semanas activo controlado de canaglifozina en terapia inicial combinada con metformina\***

Parámetro de eficacia	Metformina XR (N= 237)	Canaglifozina 100mg (N= 237)	Canaglifozina 300mg (N= 238)	Canaglifozina 100mg + Metformina XR (N= 237)	Canaglifozina 300mg + Metformina XR (N= 237)
<b>HbA<sub>1c</sub> (%)</b>					
Basal (media)	8,81	8.78	8.77	8,83	8,90
Variación respecto al valor basal (media ajustada)	-1,30	-1,37	-1,42	-1,77	-1,78
Diferencia respecto a canaglifozina 100mg (media ajustada) (IC del 95%) <sup>†</sup>				-0,40 <sup>‡</sup> (-0,59; -0,21)	
Diferencia respecto a canaglifozina 300mg (media ajustada) (IC del 95%) <sup>†</sup>					-0,36 <sup>‡</sup> (-0,56; -0,17)
Diferencia respecto a metformina XR (media ajustada) (IC del 95%) <sup>†</sup>		-0,06 <sup>‡</sup> (-0,26; 0,13)	-0,11 <sup>‡</sup> (-0,31; 0,08)	-0,46 <sup>‡</sup> (-0,66; -0,27)	-0,48 <sup>‡</sup> (-0,67; -0,28)
<b>Porcentaje de pacientes con HbA<sub>1c</sub> &lt;7%</b>	43	39	43	50 <sup>§§</sup>	57 <sup>§§</sup>
<b>Peso corporal</b>					

Specialist: CPB

HA approval date:

MAF revision: GK

QC: YK

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI

IF-2018-45036893-APN-DERM#ANMAT

HUIEIPING TSANG

CO-DIRECTORA TECNICA

APC DERADA

Mar-18\_v1.2

página 9 de 28

Producto: Invokana®  
 Nro de registro: 57.690



PHARMACEUTICAL COMPANIES OF  
 Johnson & Johnson



Basal (media) en kg	92,1	90,3	93,0	88,3	91,5
% de cambio desde el valor basal (media ajustada)	-2,1	-3,0	-3,9	-3,5	-4,2
Diferencia con respecto a metformina XR (media ajustada) (CI 95%)		-0,9 <sup>§§</sup> (-1,6; -0,2)	-1,8 <sup>§</sup> (-2,6; -1,1)	-1,4 <sup>‡</sup> (-2,1; -0,6)	-2,1 <sup>‡</sup> (-2,9; -1,4)

\* Población con intención de tratamiento

† media cuadrada mínima ajustada para covariedades incluyendo el valor basal y el factor de estratificación

‡ p =0,001 ajustado

§ p <0,01 ajustado

§§ p <0,05 ajustado

Poblaciones especiales

En tres estudios realizados en poblaciones especiales (pacientes de edad más avanzada, pacientes con una TFGe de 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> a < 50 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> y pacientes con o en situación de alto riesgo de enfermedad cardiovascular), se añadió canagliflozina a los tratamientos estables para la diabetes que ya estaban recibiendo los pacientes (dieta, monoterapia o tratamiento combinado).

Pacientes de edad avanzada

Un total de 714 pacientes de ≥ 55 años de edad a ≤ 80 años de edad (227 pacientes de 65 años de edad a < 75 años de edad y 46 pacientes de 75 años de edad a ≤ 80 años de edad) con control glucémico inadecuado que estaban recibiendo tratamiento para la diabetes (medicamentos antihiper glucémicos y/o dieta y ejercicio) participaron en un estudio doble ciego y controlado con placebo de 26 semanas de duración. Se observaron variaciones estadísticamente significativas (p<0,001) respecto al HbA<sub>1c</sub> basal en comparación con placebo de -0,57% y -0,70% con 100 mg y 300 mg, respectivamente (ver “Posología y forma de administración” y “Reacciones adversas”).

Pacientes con TFGe de 45 a < 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>

En un análisis conjunto de pacientes (N= 721) con una TFGe basal de 45 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> a < 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>, canagliflozina consiguió una reducción clínicamente significativa de la HbA<sub>1c</sub> respecto a placebo de -0,47% con canagliflozina 100 mg y de -0,52% con canagliflozina 300 mg. Los pacientes con una TFGe basal de 45 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> a < 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> tratados con canagliflozina 100 mg y 300 mg exhibieron mejorías medias en la variación porcentual del peso corporal frente a placebo de -1,8% y -2,0%, respectivamente.

La mayoría de los pacientes con una TFGe basal de 45 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> a < 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> estaban recibiendo insulina y/o una sulfonilurea (85% [614/721]). En concordancia con el aumento esperado de la hipoglucemia cuando se añade un medicamento no hipoglucemiante a insulina y/o a una sulfonilurea, se

Specialist: CPB

MAF revision: GK

QC: YK

HA approval date:


AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D\_es

Farm. HUIEI RING TERNING  
 IF-2018-45026893-APN DE SANJOSE  
 APODERADA

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690

Janssen

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF  
Johnson & Johnson



observó un aumento de episodios de hipoglucemia cuando se añadió canagliflozina a insulina y/o a una sulfonilurea (ver sección "Reacciones adversas").

#### Glucemia en ayunas

En cuatro estudios controlados con placebo, la administración de canagliflozina en monoterapia y como tratamiento añadido a uno o dos medicamentos antihiper glucémicos por vía oral, produjo variaciones medias respecto al valor basal en comparación con placebo en la GPA de -1,2 mmol/l a -1,9 mmol/l con canagliflozina 100 mg y de -1,9 mmol/l a -2,4 mmol/l con canagliflozina 300 mg, respectivamente. Estas reducciones se mantuvieron durante el período de tratamiento y cerca del máximo durante el primer día de tratamiento.

#### Glucemia posprandial

Utilizando como provocación una comida variada, canagliflozina en monoterapia o como tratamiento añadido a uno o dos medicamentos antihiper glucémicos por vía oral redujo la glucosa posprandial respecto al valor basal en comparación con placebo de -1,5 mmol/l a -2,7 mmol/l con canagliflozina 100 mg y de -2,1 mmol/l a -3,5 mmol/l con canagliflozina 300 mg, respectivamente, debido a reducciones en la concentración preprandial de glucosa y a unas desviaciones menores de la glucosa posprandial.

#### Peso corporal

Canagliflozina 100 mg y 300 mg en monoterapia y como tratamiento doble o triple añadido lograron reducciones estadísticamente significativas en el porcentaje del peso corporal a las 26 semanas en comparación con placebo. En dos estudios controlados con tratamiento activo de 52 semanas de duración que compararon canagliflozina con glimepirida y sitagliptina, las reducciones medias sostenidas y estadísticamente significativas en el porcentaje del peso corporal con canagliflozina como tratamiento añadido a metformina fueron de -4,2% y -4,7% con canagliflozina 100 mg y 300 mg, respectivamente, en comparación con la combinación de glimepirida y metformina (1,0%) y -2,5% con canagliflozina 300 mg en la combinación con metformina y sulfonilurea en comparación con sitagliptina en combinación con metformina y sulfonilurea (0,3%).

Un subgrupo de pacientes (N=208) en el estudio del tratamiento doble controlado mediante fármaco activo con metformina que se sometieron a densitometría de rayos X de energía dual (DXA) y tomografía computarizada (TC) abdominal para la evaluación de la composición corporal, demostraron que aproximadamente dos tercios de la pérdida de peso con canagliflozina se debía a la pérdida de masa grasa con la pérdida de cantidades similares de grasa subcutánea abdominal y visceral. Doscientos once (211) pacientes del estudio clínico realizado en pacientes de más edad participaron en un subestudio de la composición corporal en el que se realizó un análisis de la composición corporal utilizando DXA. Se demostró que aproximadamente dos tercios de la pérdida de peso corporal asociada con canagliflozina se debía a la pérdida de materia grasa en comparación con placebo. No se observaron cambios significativos de la densidad ósea en regiones trabeculares y corticales.

#### Seguridad cardiovascular

Se realizó un metaanálisis intermedio especificado de antemano de los acontecimientos cardiovasculares principales adjudicados en estudios clínicos de fase 2 y 3 en 9.632 pacientes con diabetes tipo 2, entre ellos 4.327 pacientes (44,9%) con enfermedad cardiovascular o con alto riesgo de enfermedad cardiovascular que

Specialist: CPB

MAF revision: GK

IF-2018-45036893-APN-DERM#ANMAT

QC: YK

Dr. HUETTING TSANG  
CO-DIRECTOR TÉCNICA

HA approval date:


AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D\_es APODERADA

página 11 de 28

página 11 de 28

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690

Janssen  PHARMACEUTICAL COMPANIES OF  
Johnson & Johnson



están participando en un estudio cardiovascular actualmente en curso. La razón de riesgos para la variable compuesta principal (tiempo hasta el acontecimiento de muerte cardiovascular, accidente cerebro vascular no mortal, infarto de miocardio no mortal y angina inestable con hospitalización) con canagliflozina (datos conjuntos de las dos dosis) frente a los grupos combinados de tratamiento activo y placebo fue del 0,91% (IC del 95%: 0,68; 1,22); por consiguiente, no se pudo demostrar un aumento del riesgo cardiovascular con canagliflozina frente a los tratamientos de comparación. La razón de riesgos con las dosis de 100 mg y 300 mg fue similar.

#### Presión arterial

En estudios controlados con placebo, el tratamiento con canagliflozina 100 mg y 300 mg produjo reducciones medias en la presión arterial sistólica de -3,9 mmHg y -5,3 mmHg, respectivamente, en comparación con placebo (-0,1 mmHg), y un efecto menor en la presión arterial diastólica con cambios medios cuando se administró canagliflozina 100 mg y 300 mg de -2,1 mmHg y -2,5 mmHg, respectivamente, en comparación con placebo (-0,3 mmHg). No se observó ningún cambio notable en la frecuencia cardíaca.

#### Pacientes con HbA<sub>1c</sub> basal de > 10% a ≤ 12%

En un subestudio de pacientes con HbA<sub>1c</sub> basal > 10% a ≤ 12% que recibieron canagliflozina en monoterapia se lograron reducciones respecto al valor basal de la HbA<sub>1c</sub> (no ajustadas por placebo) de -2,13% y -2,56% con canagliflozina 100 mg y 300 mg, respectivamente.

#### **Propiedades Farmacocinéticas**

La farmacocinética de canagliflozina es esencialmente similar en sujetos sanos y en pacientes con diabetes tipo 2. Después de la administración de una dosis oral única de 100 mg y 300 mg en sujetos sanos, canagliflozina se absorbió rápidamente, alcanzándose las concentraciones plasmáticas máximas (mediana de la T<sub>max</sub>) entre 1 y 2 horas después de la dosis. La concentración máxima (C<sub>max</sub>) plasmática y la exposición sistémica (AUC) de canagliflozina aumentaron de manera proporcional a la dosis de 50 mg a 300 mg. La vida media de eliminación (t<sub>1/2</sub>) (expresada como media ± desviación estándar) fue de 10,6 ± 2,13 horas y de 13,1 ± 3,28 horas con las dosis de 100 mg y 300 mg, respectivamente. El estado estacionario se alcanzó después de 4 días a 5 días de administración de una dosis diaria de canagliflozina 100 mg a 300 mg. Canagliflozina no exhibe una farmacocinética dependiente del tiempo y se acumula en el plasma hasta el 36% después de administrar dosis múltiples de 100 mg y 300 mg.

#### Absorción

La biodisponibilidad oral absoluta media de canagliflozina es de aproximadamente el 65%. La coadministración de una comida rica en grasas con canagliflozina no afectó a la farmacocinética de canagliflozina; por consiguiente, INVOKANA® se puede tomar con o sin alimentos. No obstante, teniendo en cuenta la posibilidad de que se reduzcan las desviaciones posprandiales de la glucosa plasmática como consecuencia de la absorción intestinal diferida de glucosa, se recomienda tomar INVOKANA® antes de la primera comida del día (véase “Posología y forma de administración” y “Propiedades farmacodinámicas”)

#### Distribución

Specialist: CPB

MAF revision: GK  
QC: YK

HA approval date:

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D\_es  
página 12 de 28

Farm. HUEIPING TSANG  
CO-DIRECTORA TÉCNICA  
IF-2018-43036893-APP-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100  
APODERADA

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690



El volumen medio de distribución de canagliflozina en estado estacionario tras una infusión intravenosa única en sujetos sanos fue de 83,5 litros. lo que sugiere una extensa distribución en los tejidos. Canagliflozina se une extensamente a las proteínas del plasma (99%), sobre todo a la albúmina. La unión a las proteínas es independiente de las concentraciones plasmáticas de canagliflozina. La unión a proteínas plasmáticas no se ve alterada significativamente en pacientes con insuficiencia renal o hepática.

#### Biotransformación

La *O*-glucuronidación es la principal vía metabólica de eliminación de canagliflozina, que es glucuronizada en su mayor parte por UGT1A9 y UGT2B4 para dar dos metabolitos inactivos *O*-glucurónidos. El metabolismo (oxidativo) de canagliflozina mediado por la CYP3A4 es mínimo (aproximadamente el 7%) en seres humanos.

En estudios *in vitro*, canagliflozina, a concentraciones más altas que las concentraciones terapéuticas, no inhibió el citocromo P450 CYP1A2, CYP2A6, CYP2C19, CYP2D6, o CYP2E1, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, ni indujo CYP1A2, CYP2C19, CYP2B6, CYP3A4. No se observó efecto clínico relevante en el citocromo CYP3A4 *in vivo* (ver "Interacción con medicamentos y otras formas de interacción").

#### Eliminación

Tras la administración de una dosis oral única de [<sup>14</sup>C] canagliflozina a sujetos sanos, el 41,5%, el 7,0% y el 3,2% de la dosis radiactiva administrada se recuperó en las heces en forma de canagliflozina, un metabolito hidroxilado, y un metabolito *O*-glucurónido, respectivamente. La circulación enterohepática de canagliflozina fue irrelevante.

Aproximadamente el 33% de la dosis radiactiva administrada se excretó en la orina, principalmente en forma de metabolitos *O*-glucurónidos (30,5%). Menos del 1% de la dosis se excretó como canagliflozina intacta en la orina. El aclaramiento renal de las dosis de canagliflozina 100 mg y 300 mg se situó entre 1,30 ml/min y 1,55 ml/min.

Canagliflozina es una sustancia con un aclaramiento bajo, siendo su aclaramiento sistémico medio de aproximadamente 192 ml/min en sujetos sanos tras su administración intravenosa.

#### Poblaciones especiales

##### Insuficiencia renal

En un estudio abierto de una dosis única se evaluó la farmacocinética de canagliflozina 200 mg en sujetos con distintos grados de insuficiencia renal (clasificados en función del aclaramiento de la creatinina [CrCl] utilizando la fórmula de Cockcroft-Gault) en comparación con sujetos sanos. En el estudio participaron 8 sujetos con función renal normal (CrCl  $\geq$  80 ml/min), 8 sujetos con insuficiencia renal leve (CrCl de 50 ml/min a  $<$  80 ml/min), 8 sujetos con insuficiencia renal moderada (CrCl de 30 ml/min a  $<$  50 ml/min) y 8 sujetos con insuficiencia renal grave (CrCl  $<$  30 ml/min), así como 8 sujetos con ERT en hemodiálisis

La C<sub>max</sub> de canagliflozina registró un aumento moderado del 13%, el 29% y el 29% en los sujetos con insuficiencia renal leve, moderada y grave, respectivamente, pero no en los sujetos en hemodiálisis. En comparación con los sujetos sanos, el valor plasmático del AUC de canagliflozina aumentó aproximadamente

Specialist: CPB

HA approval date:

MAF revision: GK

QC: YK

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D\_es

IF-2018-4503689-APN-DERM#ANMAT

CO-DIRECTORA TECNICA

APODERADA


página 13 de 28

Página 13 de 28

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690

Janssen

PHARMACEUTICAL COMPANIES  
Johnson & Johnson



un 17%, un 63% y un 50% en sujetos con insuficiencia renal leve, moderada y grave, respectivamente, pero fue similar en los sujetos con enfermedad renal terminal (ERT) y sujetos sanos.

La eliminación de canagliflozina mediante hemodiálisis fue irrelevante.

#### Insuficiencia hepática

En comparación con los sujetos que presentaban una función hepática normal, los cocientes de las medias geométricas de  $C_{m\acute{a}x}$  y  $AUC_{\infty}$  de canagliflozina fueron del 107% y el 110%, respectivamente, en sujetos con insuficiencia hepática de Child-Pugh clase A (leve) y del 96% y el 111%, respectivamente, en sujetos con insuficiencia hepática de Child-Pugh clase B (moderada) tras la administración de una dosis única de 300 mg de canagliflozina.

No se consideró que estas diferencias fueran clínicamente significativas. No existe experiencia clínica en pacientes con insuficiencia hepática de Child-Pugh clase C (grave).

#### Pacientes de edad avanzada ( $\geq 65$ años de edad)

La edad no tiene ningún efecto clínicamente significativo en la farmacocinética de canagliflozina según un análisis de farmacocinética poblacional (véase “Posología”, “Advertencias y precauciones especiales de empleo” y “Reacciones adversas”).

#### Población pediátrica

Un estudio Fase 1 analizó la farmacocinética y la farmacodinamia de canagliflozina en niños y adolescentes de  $\geq 10$  a  $< 18$  años de edad con diabetes mellitus tipo 2. Las respuestas farmacocinéticas y farmacodinámicas observadas fueron consistentes con las observadas en adultos.

#### Otras poblaciones especiales

##### Farmacogenética

Tanto UGT1A9 como UGT2B4 están sujetos a polimorfismos genéticos. En un análisis conjunto de datos clínicos se observaron incrementos en la AUC de canagliflozina del 26% en portadores UGT1A9\*1/\*3 y del 18% en portadores UGT2B4\*2/\*2. No se espera que estos incrementos de la exposición a canagliflozina sean clínicamente relevantes. Probablemente el efecto siendo homocigoto (UGT1A9\*3/\*3, frecuencia  $< 0,1\%$ ) es más marcado pero no ha sido investigado.

El género, la raza/origen étnico o el índice de masa corporal no tienen ningún efecto clínicamente significativo en la farmacocinética de canagliflozina según un análisis de la farmacocinética poblacional.

#### **Datos preclínicos sobre seguridad**

Los datos de los estudios no clínicos no muestran riesgos especiales para los seres humanos según los estudios convencionales de farmacología de seguridad, toxicidad a dosis repetidas y genotoxicidad.

Canagliflozina no ha mostrado efectos sobre la fertilidad y el desarrollo embrionario temprano en rata, a exposiciones de hasta 19 veces la exposición humana a la máxima dosis humana recomendada (MRHD).

En un estudio de desarrollo embrionario fetal en ratas, se observó retraso en la osificación de los huesos metatarsianos a exposiciones sistémicas 73 veces y 19 veces mayores que la exposición clínica con la dosis de 100 mg y 300 mg. Se desconoce si el retraso en la osificación se puede atribuir a los efectos de

Specialist: CPB

HA approval date:

MAF revision: GK

QC: YK

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.24

IF-2018-45036893-APN-DERM#ANMAT

Farm. HUIE PING TSANG

CO-DIRECTORA TECNICA

APROBADA  
página 14 de 28      Página 14 de 28



Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690

Janssen

Pharmaceutical Company  
Johnson & Johnson



canagliflozina en la homeostasis del calcio observada en ratas adultas. También se observaron retrasos de la osificación para la combinación de canagliflozina y metformina, que fueron más prominentes que con la metformina sola a exposiciones de canagliflozina 43 veces y 12 veces más altas que la exposición clínica a dosis de 100 mg y 300 mg.

En un estudio del desarrollo antes y después del parto se administró canagliflozina a ratas hembras desde el día 6 de la gestación hasta el día 20 de lactancia resultando en un descenso del peso corporal en machos y hembras de la descendencia, a dosis materno tóxicas > 30 mg/kg/día (exposición ≥ 5,9 veces la exposición en humanos a canagliflozina, a la MHRD). La toxicidad materna se limitó a descenso en el aumento de peso.

Un estudio realizado en ratas jóvenes a las que se les administró canagliflozina desde el día 1 hasta el día 90 después del parto, no mostró aumento de sensibilidad comparado con los efectos observados en ratas adultas. Sin embargo, se observó dilatación de la pelvis renal con un Nivel de Exposición sin Efectos Observados (NOEL), a exposiciones 2,4 veces y 0,6 veces la exposición clínica a la dosis de 100 mg y 300 mg, respectivamente, y no revertió totalmente dentro del periodo de recuperación de aproximadamente un mes.

Los hallazgos renales persistentes en ratas jóvenes pueden ser muy probablemente atribuidos a la reducción de la capacidad del riñón de rata en desarrollo para manejar el aumento de volumen de orina causado por canagliflozina, ya que la maduración funcional del riñón de rata continua hasta las 6 semanas de edad.

Canagliflozina no aumentó la incidencia de tumores en ratones macho y hembra en un estudio de 2 años de duración con dosis de 10, 30 y 100 mg/kg. La dosis más alta de 100 mg/kg equivalía a casi 14 veces la dosis clínica de 300 mg sobre la base de la exposición AUC. Canagliflozina aumentó la incidencia de tumores testiculares de células de Leydig en ratas macho con todas las dosis estudiadas (10, 30 y 100 mg/kg); la dosis más baja de 10 mg/kg es aproximadamente 1,5 veces la dosis clínica de 300 mg sobre la base de la exposición AUC. Las dosis más altas de canagliflozina (100 mg/kg) en ratas macho y hembra aumentaron la incidencia de feocromocitomas y tumores de los túbulos renales. Teniendo en cuenta la exposición AUC, el NOEL de 30 mg/kg/día para los feocromocitomas y los tumores de túbulos renales es aproximadamente 4,5 veces la exposición con la dosis clínica diaria de 300 mg. Teniendo en cuenta la mecánica de los estudios preclínicos y clínicos, los tumores de células de Leydig, los tumores de túbulos renales y los feocromocitomas se consideran específicos de las ratas. Los tumores de túbulos renales y los feocromocitomas inducidos por canagliflozina en ratas parecen estar causados por una malabsorción de hidratos de carbono como consecuencia de la actividad inhibitoria de canagliflozina en el SGLT1 intestinal de la rata; la mecánica de los estudios clínicos no han demostrado una malabsorción de los hidratos de carbono en seres humanos con dosis de canagliflozina de hasta 2 veces la dosis clínica máxima recomendada. Los tumores de células de Leydig se asocian a un aumento de la hormona luteinizante (LH), que es un mecanismo conocido de formación de tumores de células de Leydig en las ratas. En un estudio clínico de 12 semanas de duración, no se observó un aumento de la LH sin estímulos en pacientes varones tratados con canagliflozina.

## POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

### Posología

La dosis de inicio recomendada de canagliflozina es de 100 mg una vez al día. En pacientes que toleran bien canagliflozina 100 mg una vez al día, que tienen una tasa de filtración glomerular (TGF<sub>e</sub>) ≥ 60 ml/min/1,73

Specialist: CPB

MAF revision: GK

IF-2018-215036895-APNDERMMA-CO-DIRECTORA TECNICA APODERADA

QC: YK

HA approval date:

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D\_es

página 15 de 28

Página 15 de 28

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690

Janssen

PHARMACEUTICAL COMPANY  
Johnson & Johnson



m<sup>2</sup> o un CrCl  $\geq$  60 ml/min y que necesitan un control glucémico más estricto, la dosis puede ser aumentada a 300 mg una vez al día por vía oral (ver abajo y “Advertencias y precauciones especiales de empleo”).

Se debe tener cuidado cuando se aumenta la dosis en pacientes  $\geq$  75 años de edad, pacientes con enfermedad cardiovascular conocida u otros pacientes para quienes la diuresis inicial inducida por canagliflozina suponga un riesgo (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). En pacientes con signos de depleción del volumen, se recomienda corregir esta alteración antes de iniciar el tratamiento con canagliflozina (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”).

Cuando canagliflozina se usa como tratamiento complementario con insulina o un secretagogo de la insulina (p.ej. sulfonilurea), se puede considerar una dosis menor de insulina o del secretagogo de la insulina para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción” y “Reacciones adversas”).

#### Pacientes de edad avanzada (> 65 años de edad)

Se deben tener en cuenta la función renal y el riesgo de depleción del volumen (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”).

#### Insuficiencia renal

En pacientes con una TFGe de 60 a <90 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> o un CrCl de 60 a < 90 ml/min no es necesario un ajuste de dosis.

Canagliflozina no se debe iniciar en pacientes con una TFGe < 45 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> o CrCl < 45 ml/min. En pacientes que toleran bien canagliflozina con TFGe constantemente por debajo de 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> o CrCl 60 ml/min, la dosis de canagliflozina se debe ajustar o mantenerse en 100 mg una vez al día. La administración de canagliflozina se debe interrumpir cuando la TFGe se mantenga constantemente por debajo de 45 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> o el CrCl constantemente por debajo de 45 ml/min, (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”, “Reacciones adversas” y “Propiedades Farmacodinámicas” y “Propiedades Farmacocinéticas”).

Canagliflozina tampoco debe ser administrada a pacientes con ERT ni a pacientes en diálisis, puesto que en estas poblaciones no se espera que sea eficaz (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo” y “Propiedades Farmacocinéticas”).

#### Insuficiencia hepática

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada.

Canagliflozina no se ha estudiado en pacientes con insuficiencia hepática grave y no se recomienda su uso en estos pacientes (ver “Propiedades Farmacocinéticas”).

#### Población pediátrica

No se han establecido todavía la seguridad y eficacia de canagliflozina en niños menores de 18 años. No se dispone de datos.

#### Forma de administración

Por vía oral.

INVOKANA® se debe tomar por vía oral una vez al día, preferiblemente antes de la primera comida del día. Los comprimidos se deben tragar enteros.

Specialist: CPB

MAF revision: GK

IF-2018-45036893-APN-DERM-FANMAT

QC: YK

Pam. HUETTING TSANG  
CO-DIRECTORA TECNICA

HA approval date:

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D.A. APODERADA

página 16 de 28

Página 16 de 28

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690

Janssen

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF  
Johnson & Johnson



Si el paciente se olvida de tomar una dosis, debe tomarla tan pronto como se acuerde; sin embargo, no debe tomar una dosis doble en el mismo día.

## CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en “Composición Cualitativa y Cuantitativa”.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO

### Insuficiencia renal

La eficacia de canagliflozina depende de la función renal y la eficacia es reducida en los pacientes con insuficiencia renal moderada y probablemente ausente en pacientes con insuficiencia renal grave (ver “Posología y forma de administración”).

En pacientes con una TFG<sub>e</sub> <60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> o un CrCl <60 ml/min, se notificó una mayor incidencia de reacciones adversas asociadas a una depleción del volumen (por ejemplo, mareo postural, hipotensión ortostática, hipotensión); particularmente con la dosis de 300 mg. Además, en estos pacientes se notificaron más reacciones adversas de hiperpotasemia y mayores incrementos de la creatinina sérica y nitrógeno uréico en sangre (BUN) (ver “Reacciones adversas”).

Por tanto, la dosis de canagliflozina se debe limitar a 100 mg una vez al día en pacientes con TFG<sub>e</sub> < 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> o CrCl < 60 ml/min y canagliflozina no se debe usar en pacientes con TFG<sub>e</sub> < 45 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> o CrCl < 45 ml/min (ver sección “Posología y forma de administración”). Canagliflozina no se ha estudiado en insuficiencia renal grave (TFG<sub>e</sub> < 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> o CrCl < 30 ml/min) o en enfermedad renal terminal (ERT).

Se recomienda monitorear la función renal como sigue:

- Antes de iniciar la administración de canagliflozina y, en adelante, al menos una vez al año (ver “Posología y forma de administración”, “Reacciones adversas”, “Propiedades Farmacodinámicas” y “Propiedades Farmacocinéticas”)
- Antes de iniciar el tratamiento concomitante con medicamentos que puedan reducir la función renal y, en adelante, de forma periódica
- Para función renal próxima a insuficiencia renal moderada, por lo menos de 2 a 4 veces al año. Si la función renal disminuye constantemente por debajo de TFG<sub>e</sub> 45 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> o CrCl < 45 ml/min el tratamiento con canagliflozina debe ser interrumpido.

### Uso en pacientes con riesgo de reacciones adversas relacionadas con la depleción del volumen

Debido a su mecanismo de acción, canagliflozina aumenta la diuresis osmótica al aumentar la EUG, con lo que puede reducir el volumen intravascular y disminuir la presión arterial (ver “Propiedades Farmacodinámicas”). En estudios clínicos controlados de canagliflozina, se han observado aumentos de reacciones adversas relacionadas con la depleción del volumen (por ejemplo, mareo postural, hipotensión ortostática o hipotensión), sobre todo con la dosis de 300 mg y más frecuentemente en los tres primeros

Specialist: CPB

MAF revision: GK

IF-2018-45036896-APN-DERM#ANMAT

QC: YK

Fam. HUEI PING-TSANG

HA approval date:

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D

CC-DIRECTORA TECNICA  
APODERADA


página 17 de 28

Página 17 de 28

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690

Janssen

PHARMACEUTICAL COMPONENTS  
Johnson & Johnson



meses (ver “Reacciones adversas”).

Se debe tener precaución en pacientes en los que una bajada en la presión sanguínea inducida por canagliflozina pueda suponer un riesgo, como pacientes con enfermedad cardiovascular conocida, pacientes con TFG<sub>e</sub> < 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>, pacientes con terapia antihipertensiva con antecedentes de hipotensión, pacientes con diuréticos o pacientes de edad avanzada (≥ 65 años de edad) (ver “Posología y forma de administración” y “Reacciones adversas”).

Debido a la depleción del volumen, se observaron descensos medios generalmente pequeños de la TFG<sub>e</sub> a las 6 semanas de iniciar el tratamiento con canagliflozina. En pacientes con propensión a una mayor depleción del volumen intravascular según lo descrito antes, se observaron a veces mayores reducciones de la TFG<sub>e</sub> (> 30%), que posteriormente mejoraron y rara vez obligaron a interrumpir el tratamiento con canagliflozina (ver “Reacciones adversas”).

Se debe indicar a los pacientes que informen si presentan síntomas de depleción del volumen. Canagliflozina no está recomendada para su uso en pacientes que reciben diuréticos del asa (ver “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”) o con volumen deplecionado, p.ej., debido a enfermedad aguda (como enfermedad gastrointestinal).

Para los pacientes que estén recibiendo canagliflozina, en caso de enfermedades intercurrentes que puedan conducir a una depleción del volumen (como una enfermedad gastrointestinal), se recomienda una cuidadosa monitorización del estado del volumen (por ejemplo, examen físico, medición de la tensión arterial, análisis de laboratorio incluidas pruebas de la función renal) y de los electrolitos séricos. Se puede considerar la interrupción temporal del tratamiento con canagliflozina en pacientes que desarrollen depleción del volumen durante el tratamiento hasta que se corrija la alteración. Si se interrumpe el tratamiento, se debe considerar una monitorización más frecuente de la glucosa.

#### Cetoacidosis diabética

Se han notificado casos raros de cetoacidosis diabética (CAD), incluyendo casos mortales y potencialmente mortales, en pacientes tratados con inhibidores de SGLT2, incluyendo canagliflozina. En un número de casos la presentación de la enfermedad fue atípica con un aumento moderado de los niveles de glucosa en sangre, por debajo de 14 mmol/l (250 mg/dl). Se desconoce si la CAD es más probable que ocurra con dosis más altas de canagliflozina.

El riesgo de cetoacidosis diabética se debe considerar en el caso de síntomas inespecíficos como náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, sed excesiva, dificultad para respirar, confusión, fatiga o somnolencia inusuales. Los pacientes deben ser evaluados para cetoacidosis inmediatamente si tienen lugar estos síntomas, independientemente de los niveles de glucosa en sangre.

En pacientes en los que se sospecha o se ha diagnosticado CAD, se debe interrumpir el tratamiento con canagliflozina inmediatamente.

El tratamiento se debe interrumpir en pacientes que son hospitalizados para una cirugía mayor o por enfermedad médica aguda grave. En ambos casos, el tratamiento con canagliflozina puede ser restablecido una vez que la enfermedad del paciente se haya estabilizado.

Antes de administrar canagliflozina, se deben considerar antecedentes del paciente que puedan predisponer a la cetoacidosis.

Los pacientes que puedan estar en más alto riesgo de CAD son aquellos pacientes con baja reserva de células beta funcionales (p.ej. pacientes con diabetes tipo 2 con bajo péptido C o diabetes autoinmune latente del adulto (LADA, por sus siglas en inglés) o pacientes con antecedentes de pancreatitis), pacientes con síntomas

Specialist: CPB

MAF revision: GK

IF-2018-450368-5-APN-DERM-BANSANG

QC: YK

CO-DIRECTORA TÉCNICA

HA approval date:


AR\_CANANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D\_es

APODERADA

página 18 de 28

Página 18 de 28

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690



que indican restricción de ingesta de alimentos o deshidratación grave, pacientes para quienes las dosis de insulina se han reducido y pacientes con aumento de la necesidad de insulina debido a enfermedades agudas, cirugía o abuso del alcohol. Los inhibidores de SGLT2 se deben usar con precaución en estos pacientes. No se recomienda el restablecimiento del tratamiento con un inhibidor de SGLT2 en pacientes con CAD a menos que se identifique y resuelva otro factor desencadenante claro.

La seguridad y eficacia de canagliflozina en pacientes con diabetes tipo 1 no han sido establecidas y canagliflozina no debe ser usada para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 1. Los datos limitados de ensayos clínicos sugieren que la CAD ocurre con frecuencia cuando pacientes con diabetes tipo 1 son tratados con inhibidores de SGLT2.

#### Hematocrito elevado

Se ha observado aumento del hematocrito con el tratamiento de canagliflozina (ver “Reacciones adversas”); por tanto se debe tener precaución en pacientes que ya tengan el hematocrito elevado.

#### Pacientes de edad avanzada (> 65 años de edad)

Los pacientes de edad avanzada pueden presentar mayor riesgo de depleción del volumen y es más probable que sean tratados con diuréticos y presenten un deterioro de la función renal. En pacientes de  $\geq 75$  años de edad, se notificó una mayor incidencia de reacciones adversas relacionadas con depleción del volumen (por ejemplo, mareo postural, hipotensión ortostática, hipotensión). Además, en estos pacientes se notificaron descensos más acusados de la TFGe (ver “Posología y forma de administración” y “Reacciones adversas”).

#### Infecciones micóticas genitales

Debido al mecanismo de inhibición del co-transportador sodio-glucosa tipo 2 (SGLT2) que se asocia a un aumento de la excreción urinaria de glucosa, se han notificado casos de candidiasis vulvovaginal en mujeres y casos de balanitis o balanopostitis en varones que participaron en ensayos clínicos (ver “Reacciones adversas”). Los pacientes, tanto varones como mujeres, con antecedentes de infecciones micóticas genitales tuvieron una mayor probabilidad de contraer una infección. La balanitis o la balanopostitis afectó principalmente a pacientes no circuncidados. Rara vez se refirió fimosis y en algunos casos se practicó una circuncisión. La mayoría de las infecciones micóticas genitales se trataron con antifúngicos tópicos, tanto por prescripción de un profesional sanitario como por automedicación durante el tratamiento con INVOKANA®.

#### Amputaciones en miembros inferiores

Se ha observado un incremento de casos de amputación en miembros inferiores (principalmente los dedos de los pies) en pacientes tratados con canagliflozina en estudios clínicos de larga duración, actualmente en curso con canagliflozina en pacientes con diabetes tipo 2 con enfermedad cardiovascular (ECV) o con riesgo elevado de enfermedad cardiovascular.

Como no se ha establecido un mecanismo subyacente, se desconocen los factores de riesgo, aparte de los factores de riesgo generales, para amputación. Sin embargo, como medidas de prevención, se debe considerar monitorear cuidadosamente a los pacientes con un alto riesgo de amputaciones y aconsejar a los pacientes sobre la importancia del cuidado rutinario preventivo del pie y del mantenimiento de una adecuada hidratación. Se podría también considerar interrumpir el tratamiento con canagliflozina en aquellos pacientes

Specialist: CPB

HA approval date:

MAF revision: GK

QC: YK

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D\_es

IF-2018-45086893-AR-DE-DM#ANMAT

CO-DIRECTORA TECNICA

APODERADA


página 19 de 28

página 19 de 28

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690

Janssen

PHARMACEUTICAL COMPANY  
Johnson & Johnson



que desarrollen eventos que preceden a la amputación tales como úlceras en la piel de extremidades inferiores, infección, osteomielitis o gangrena.

#### Insuficiencia cardiaca

La experiencia en la clase III de la New York Heart Association (NYHA) es limitada y no existe experiencia en estudios clínicos con canagliflozina en la clase IV de la NYHA.

#### Análisis de orina

Debido a su mecanismo de acción, los pacientes que estén tomando canagliflozina darán positivo a glucosa en el análisis de orina.

#### Intolerancia a la lactosa

Los comprimidos contienen lactosa. Pacientes con un raro problema hereditario de intolerancia a la galactosa, con insuficiencia total de lactasa o malabsorción de glucosa-galactosa no deben tomar este medicamento.

#### Excipiente(s) con efecto conocido

Cada comprimido contiene menos de 1 mmol (23 mg) de sodio, esto es, esencialmente "exento de sodio".

### **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

#### Interacciones farmacodinámicas

##### Diuréticos

Canagliflozina puede potenciar el efecto de los diuréticos y aumentar el riesgo de deshidratación e hipotensión (Advertencias y precauciones especiales de empleo).

##### Insulina y secretagogos de la insulina

La insulina y los secretagogos de la insulina, como las sulfonilureas, pueden causar hipoglucemia. En consecuencia, cuando estos medicamentos se usan en combinación con canagliflozina, puede que sea necesario utilizar una dosis menor de insulina o del secretagogo de la insulina para disminuir el riesgo de hipoglucemia (ver "Posología y forma de administración" y "Reacciones adversas").

#### Interacciones farmacocinéticas

##### Efectos de otros medicamentos en canagliflozina

Canagliflozina se metaboliza principalmente vía glucuronidación mediada por la UDP glucuronosil transferasa 1A9 (UGT1A9) y 2B4 (UGT2B4). Canagliflozina es transportada por la glucoproteína P (P-gp) y la proteína de resistencia del cáncer de mama (BCRP).

Los inductores enzimáticos (como la hierba de San Juan [*Hypericum perforatum*], rifampicina, barbitúricos, fenitoína, carbamazepina, ritonavir, efavirenz) pueden hacer que se reduzca la exposición a canagliflozina.

Specialist: CPB

MAF revision: GK

IF-2018-45036893-APN-DERM#ANMAT

QC: YK

Farm. PUEI-PING TSANG

HA approval date:

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D\_4

CO-DIRECTORA TECNICA  
APODERADA


página 20 de 28

página 20 de 28

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690

Janssen

PHARMACEUTICAL COMPANY  
Johnson & Johnson



Tras la coadministración de canagliflozina con rifampicina (un inductor de diversos transportadores activos y enzimas metabolizadoras de fármacos), se observó una disminución del 51% y el 28% en la exposición sistémica (AUC) y la concentración máxima (C<sub>max</sub>) de canagliflozina. Esta menor exposición a canagliflozina puede reducir la eficacia.

Cuando se tenga que administrar un inductor combinado de estas enzimas UGT y proteínas transportadoras conjuntamente con canagliflozina, se deberán vigilar los niveles de glucemia para evaluar si la respuesta a canagliflozina es apropiada. Si un inductor de estas enzimas UGT debe ser combinado con canagliflozina, se puede considerar aumentar la dosis a 300 mg una vez al día si los pacientes están tolerando canagliflozina 100 mg una vez al día, tienen TFG<sub>e</sub> ≥ 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> o CrC ≥ 60 ml/min y requieren control glucémico adicional. En pacientes con TFG<sub>e</sub> de 45 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> a < de 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> o CrC de 45 ml/min a < de 60 ml/min tomando canagliflozina 100 mg que están recibiendo terapia concomitante con un inductor de la enzima UGT y que requiere control glucémico adicional, se deben considerar otras terapias hipoglucemiantes (ver "Posología y forma de administración" y "Advertencias y precauciones especiales de empleo").

La colestiramina puede potencialmente reducir la exposición a canagliflozina. La dosificación de canagliflozina debe tener lugar al menos 1 hora antes o 4-6 horas después de la administración de secuestradores del ácido biliar para minimizar posibles interferencias con su absorción.

Los estudios de interacción sugieren que la farmacocinética de canagliflozina no se ve alterada por metformina, hidroclorotiazida, anticonceptivos orales (etinilestradiol y levonorgestrel), ciclosporina y/o probenecid.

#### Efectos de canagliflozina sobre otros medicamentos

**Digoxina:** La combinación de canagliflozina 300 mg una vez al día durante 7 días con una dosis única de digoxina 0,5 mg, seguida de 0,25 mg diarios durante 6 días, produjo un aumento del 20% en el AUC y un aumento del 36% en la C<sub>max</sub> de la digoxina, probablemente debido a inhibición de la P-gp. Se ha observado que canagliflozina inhibe la P-gp in vitro. Se debe vigilar adecuadamente a los pacientes que tomen digoxina u otros glucósidos cardiacos (p. ej., digitoxina).

**Dabigatran:** El efecto de la administración concomitante de canagliflozina (un inhibidor débil de la P-gp) con dabigatran etexilato (sustrato de la P-gp) no se ha estudiado. Dado que las concentraciones de dabigatran pueden aumentar en presencia de canagliflozina, se debe vigilar (signos de sangrado o anemia) cuando dabigatran se combina con canagliflozina.

**Simvastatina:** La combinación de canagliflozina 300 mg una vez al día durante 6 días con una dosis única de simvastatina (sustrato de CYP3A4) 40 mg produjo un aumento del 12% en la AUC y del 9% en la C<sub>max</sub> de la simvastatina, y un aumento del 18% en la AUC y del 26% en la C<sub>max</sub> del ácido de simvastatina. El aumento en las exposiciones a simvastatina y ácido de simvastatina no se consideran clínicamente relevantes.

No se puede excluir la inhibición de la BCRP por canagliflozina a nivel intestinal, por consiguiente puede ocurrir un aumento de exposición para medicamentos transportados por la BCRP, e.j. ciertas estatinas como rosuvastatina y algunos medicamentos anticancerosos.

En estudios de interacción, canagliflozina en estado estacionario no tuvo un efecto clínicamente relevante en la farmacocinética de metformina, anticonceptivos orales (etinilestradiol y levonorgestrel), gliburida, paracetamol, hidroclorotiazida o warfarina.

Specialist: CPB

MAF revision: GK

QC: YK

HA approval date:


AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D\_es

IF-2018-46036893-APN-DEMANMAT  
Farm. HUET-PING TSANG  
CO-DIRECTORA TECNICA  
APODERADA

página 21 de 28

Página 21 de 28

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690



## Fármacos/ Interferencias con análisis de laboratorio

### Ensayo 1,5-AG

Aumentos en la excreción urinaria de glucosa con INVOKANA® pueden disminuir falsamente los niveles de 1,5-anhidroglucitol (1,5-AG) y hacer medidas de 1,5-AG no fiables en la evaluación del control glucémico. Por tanto, el análisis 1,5-AG no se debe usar para evaluar el control glucémico en pacientes tratados con canagliflozina. Para más información, puede ser aconsejable contactar con el fabricante específico del ensayo 1,5-AG.

## **Fertilidad, embarazo y lactancia**

### Embarazo

No hay datos relativos al uso de canagliflozina en mujeres embarazadas. Estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva (ver “Datos preclínicos sobre seguridad”).

No se debe usar canagliflozina durante el embarazo. En caso de embarazo el tratamiento con canagliflozina debe ser interrumpido.

### Lactancia

Se desconoce si canagliflozina y/o sus metabolitos se excretan en la leche materna. Los datos farmacodinámicos y toxicológicos disponibles en animales han demostrado excreción de canagliflozina y/o de sus metabolitos en la leche, así como los efectos farmacológicamente mediados en la descendencia lactante y ratas jóvenes expuestas a canagliflozina (ver “Datos preclínicos sobre seguridad”). No se puede excluir el riesgo en recién nacidos/niños. Canagliflozina no se debe usar durante la lactancia.

### Fertilidad

No se ha estudiado el efecto de canagliflozina sobre la fertilidad en seres humanos. No se han observado efectos perjudiciales para la fertilidad en los estudios en animales (ver “Datos preclínicos sobre seguridad”).

## **Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas**

La influencia de canagliflozina sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante. No obstante, se debe alertar a los pacientes sobre el riesgo de hipoglucemia cuando se utiliza canagliflozina en combinación con insulina o un secretato de la insulina, y sobre el riesgo elevado de reacciones adversas relacionadas con una depleción del volumen, como mareo postural (véase “Posología”, “Advertencias y precauciones especiales de empleo” y “Reacciones adversas”).

## **REACCIONES ADVERSAS**

### Resumen del perfil de seguridad

La seguridad de canagliflozina se evaluó en 10.285 pacientes con diabetes tipo 2, incluidos 3.139 pacientes tratados con canagliflozina 100 mg y 3.506 pacientes tratados con canagliflozina 300 mg, que recibieron medicación en nueve estudios clínicos de fase 3, doble ciego y controlados.

Specialist: CPB

MAF revision: GK

IF-2018-4563895-APN-DEMSANGAT

QC: YK

CO-DIRECTORA TECNICA

HA approval date:

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D\_es

APODERADA

página 22 de 28

Página 22 de 28



Producto: Invokana®  
 Nro de registro: 57.690



La evaluación principal de la seguridad y la tolerabilidad se basa en el análisis conjunto (n=2.313) de cuatro estudios clínicos controlados con placebo de 26 semanas de duración (monoterapia y tratamiento añadido a metformina, metformina y sulfonilurea, y a metformina y pioglitazona). Las reacciones adversas notificadas con más frecuencia durante el tratamiento fueron hipoglucemia en combinación con insulina o sulfonilurea, candidiasis vulvovaginal, infección del tracto urinario, y poliuria o polaquiuria (es decir, frecuencia de micción). Las reacciones adversas que obligaron a interrumpir el tratamiento en  $\geq 0,5\%$  de todos los pacientes tratados con canagliflozina en estos estudios fueron candidiasis vulvovaginal (0,7% de las mujeres) y balanitis o balanopostitis (0,5% de los varones). Se realizaron otros análisis de la seguridad (incluidos datos a largo plazo) a partir de los datos obtenidos durante todo el programa de desarrollo de canagliflozina (estudios controlados con placebo y con control activo) para evaluar las reacciones adversas notificadas e identificar reacciones adversas (ver tabla 1) (ver “Posología y forma de administración” y “Advertencias y precauciones especiales de empleo”).

Tabla de reacciones adversas

Las reacciones adversas indicadas en la tabla 1 se basan en el análisis conjunto de los cuatro estudios controlados con placebo de 26 semanas de duración (n=2.313) descritos antes. Las reacciones adversas notificadas tras la experiencia poscomercialización a nivel mundial de canagliflozina también se incluyen en esta tabla. Las reacciones adversas enumeradas se clasifican según la frecuencia y la clase de sistema y órgano (SOC). La frecuencia de las reacciones adversas se define mediante la siguiente convención: muy frecuentes ( $\geq 1/10$ ), frecuentes ( $\geq 1/100$  a  $< 1/10$ ), poco frecuentes ( $\geq 1/1.000$  a  $< 1/100$ ), raras ( $\geq 1/10.000$  a  $< 1/1.000$ ), muy raras ( $< 1/10.000$ ) y frecuencia no conocida (no se puede estimar a partir de los datos disponibles).

**Tabla 3: Tabla de reacciones adversas (MedDRA) de estudios controlados con placebo<sup>a</sup> y de la experiencia poscomercialización**

Sistema de clasificación de órganos Frecuencia	Reacción adversa
<b>Trastornos del sistema inmunológico</b>	
raras	Reacción anafiláctica
<b>Trastornos del metabolismo y de la nutrición</b>	
muy frecuentes	Hipoglucemia en combinación con insulina o sulfonilurea
poco frecuentes	Deshidratación*
raras	Cetoacidosis diabética**
<b>Trastornos del sistema nervioso</b>	
poco frecuentes	Mareo postural*, Síncope*
<b>Trastornos vasculares</b>	
poco frecuentes	Hipotensión*, Hipotensión ortostática*
<b>Trastornos gastrointestinales</b>	
frecuentes	Constipación, Sed <sup>b</sup> , Náuseas
<b>Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo</b>	
poco frecuentes	Exantema <sup>c</sup> , Urticaria
raras	Angioedema <sup>d</sup>

Specialist: CPB

MAF revision: GK

IF-2018-45036893-APN-DERMA-ANMAT

QC: YK


Fam. QUETTING TSANG

HA approval date:

AR\_CANAFCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D

CO-DIRECTORA TECNICA  
 es PODERADA

Producto: Invokana®  
 Nro de registro: 57.690



<b>Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo</b>	
poco frecuentes	Fractura ósea <sup>c</sup>
<b>Trastornos renales y urinarios</b>	
frecuentes	Poliuria o Polaquiuria <sup>f</sup> , Infección del tracto urinario (pielonefritis y urosepsis han sido notificadas tras su comercialización)
poco frecuentes	Fallo renal (mayoritariamente en el caso de depleción de volumen)
<b>Trastornos del aparato reproductor y de la mama</b>	
muy frecuentes	Candidiasis vulvovaginal <sup>**</sup> , <sup>g</sup>
frecuentes	Balanitis o balanopostitis <sup>**</sup> , <sup>h</sup>
<b>Exploraciones complementarias</b>	
frecuentes	Dislipemia <sup>i</sup> , Aumento del hematocrito <sup>**</sup> , <sup>j</sup>
poco frecuentes	Aumento de la creatinina en sangre <sup>**</sup> , <sup>k</sup> , Aumento de la urea en sangre <sup>**</sup> , <sup>l</sup> , Hiperpotasemia <sup>**</sup> , <sup>m</sup> , Hiperfosfatemia <sup>n</sup>
<b>Procedimientos médicos y quirúrgicos</b>	
poco frecuentes	Amputaciones en miembros inferiores (principalmente dedos de los pies) especialmente en pacientes con riesgo elevado de enfermedad cardíaca

- \* Asociado a depleción del volumen; ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”.
- \*\* Ver sección “Advertencias y precauciones especiales de empleo”.
- <sup>a</sup> Los perfiles de datos de seguridad obtenidos en estudios pivotaes independientes (incluidos estudios en pacientes con insuficiencia renal moderada, pacientes de edad más avanzada [de ≥ 55 años de edad a ≤ 80 años de edad], pacientes con un mayor riesgo CV) fueron en general consistentes con las reacciones adversas que se indican en esta tabla.
- <sup>b</sup> La sed incluye los términos de sed, sequedad de boca y polidipsia.
- <sup>c</sup> El exantema incluye los términos de exantema eritematoso, exantema generalizado, exantema macular, exantema maculopapular, exantema papular, exantema prurítico, exantema pustular y exantema vesicular.
- <sup>d</sup> En base a la experiencia poscomercialización con canagliflozina.
- <sup>e</sup> La fractura ósea fue notificada un 0,7% y un 0,6% para canagliflozina 100 mg y 300 mg, respectivamente, comparado con 0,3% para placebo. Ver más abajo sección fractura ósea para más información.
- <sup>f</sup> La poliuria o polaquiuria incluye los términos de poliuria, polaquiuria, urgencia en la micción, nocturia y aumento de la producción de orina.
- <sup>g</sup> La candidiasis vulvovaginal incluye los términos de candidiasis vulvovaginal, infección micótica vulvovaginal, vulvovaginitis, infección vaginal, vulvitis e infección fúngica genital.
- <sup>h</sup> La balanitis o balanopostitis incluye los términos de balanitis, balanopostitis, balanitis por Candida e infección fúngica genital.
- <sup>i</sup> El porcentaje medio de aumento desde el valor basal para canagliflozina 100 mg y 300 mg *versus* placebo, respectivamente, fueron colesterol total 3,4% y 5,2% *versus* 0,9%, colesterol HDL 9,4% y 10,3% *versus* 4,0%, colesterol LDL 5,7% y 9,3% *versus* 1,3%, colesterol no HDL 2,2% y 4,4% *versus* 0,7%, triglicéridos 2,4% y 0,0% *versus* 7,6%.
- <sup>j</sup> La variación media respecto al valor basal del hematocrito fue 2,4% y 2,5% para canagliflozina 100 mg y 300 mg, respectivamente, comparado con el 0,0% para placebo.
- <sup>k</sup> El porcentaje de la variación media respecto al valor basal de la creatinina fue 2,8% y 4,0% para canagliflozina 100 mg y 300 mg, respectivamente, comparado con 1,5% para placebo.

Specialist: CPB

MAF revision: GK

IF-2018-45036893-APN-DEMA#ANMAT

QC: YK

Farm. HUET PING TSANG  
 CO. DIRECTORA TÉCNICA

HA approval date:

AR\_CANAFCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D

APROBADA

página 24 de 28

Página 24 de 28

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690

Janssen



- <sup>l</sup> El porcentaje de la variación media respecto al valor basal del nitrógeno uréico en sangre fue 17,1% y 18% para canagliflozina 100 mg y 300 mg, respectivamente, comparado con 2,7% para placebo.
- <sup>m</sup> El porcentaje de la variación media respecto al valor basal del potasio en sangre fue 0,5% y 1,0% para canagliflozina 100 mg y 300 mg, respectivamente, comparado con 0,6% para placebo.
- <sup>n</sup> El porcentaje de la variación media respecto al valor basal del fosfato en sangre fue 3,6% y 5,1% para canagliflozina 100 mg y 300 mg, respectivamente, comparado con 1,5% para placebo.

#### Descripción de reacciones adversas seleccionadas

##### Reacciones adversas relacionadas con depleción del volumen

En el análisis conjunto de cuatro estudios controlados con placebo de 26 semanas de duración, la incidencia de todas las reacciones adversas relacionadas con depleción del volumen (p. ej., mareo postural, hipotensión ortostática, hipotensión, deshidratación y síncope) fue del 1,2% con canagliflozina 100 mg, del 1,3% con canagliflozina 300 mg y del 1,1% con placebo. En los dos estudios controlados con tratamiento activo, la incidencia con el tratamiento de canagliflozina fue similar a la observada con los tratamientos de comparación.

En el estudio cardiovascular específico, realizado en pacientes generalmente de mayor edad y con una tasa más alta de complicaciones de la diabetes, las incidencias de reacciones adversas relacionadas con la depleción del volumen fueron del 2,8% con canagliflozina 100 mg, del 4,6% con canagliflozina 300 mg y del 1,9% con placebo.

Para evaluar los factores de riesgo asociados a estas reacciones adversas, se realizó un análisis conjunto más grande (N=9.439) de los pacientes de ocho estudios controlados de fase 3, incluidas las dos dosis de canagliflozina. En este análisis conjunto, los pacientes que estaban recibiendo diuréticos del asa, los pacientes con una TFGe de 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> a < 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>, y los pacientes ≥ 75 años de edad tuvieron generalmente incidencias más elevadas de esas reacciones adversas. En los pacientes que estaban recibiendo diuréticos del asa, las incidencias fueron del 3,2% con canagliflozina 100 mg y del 8,8% con canagliflozina 300 mg, en comparación con un 4,7% en el grupo control. En los pacientes con una TFGe basal de 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> a < 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>, las incidencias fueron del 4,8% con canagliflozina 100 mg y del 8,1% con canagliflozina 300 mg, en comparación con el 2,6% en el grupo control. En pacientes ≥ 75 años de edad, las incidencias fueron del 4,9% con canagliflozina 100 mg y del 8,7% con canagliflozina 300 mg en comparación con el 2,6% en el grupo de control (ver “Posología y forma de administración” y “Advertencias y precauciones especiales de empleo”).

En el estudio cardiovascular específico y el análisis conjunto más grande, no aumentó con canagliflozina el número de pacientes que tuvieron que interrumpir el tratamiento debido a reacciones adversas relacionadas con la depleción del volumen y reacciones adversas graves relacionadas con la depleción del volumen.

##### Tratamiento hipoglucémico complementario con insulina o secretagogos de la insulina

La frecuencia de hipoglucemia fue baja (aproximadamente del 4%) en los distintos grupos de tratamiento, incluido el grupo placebo, cuando se utilizó en monoterapia o como tratamiento complementario a metformina. Cuando se añadió canagliflozina a la insulino terapia, se observó hipoglucemia en el 49,3%, 48,2%, y 36,8% de los pacientes tratados con canagliflozina 100 mg, canagliflozina 300 mg, y placebo, respectivamente, y se produjo hipoglucemia grave en el 1,8%, 2,7%, y 2,5% de los pacientes tratados con canagliflozina 100 mg, canagliflozina 300 mg, y placebo, respectivamente. Cuando se añadió canagliflozina al tratamiento con sulfonilurea, se observó hipoglucemia en el 4,1%, 12,5%, y 5,8% de los pacientes tratados


Specialist: CPB  
HA approval date:

MAF revision: GK  
QC: YK

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI

IF-2018-45036893-APN-DERM#ANMAT  
Farin HUEI PING TSANG  
CO-DIRECTORA TECNICA  
página 25 de 28 es APODERADA  
Página 25 de 28

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690



con canagliflozina 100 mg, canagliflozina 300 mg, y placebo, respectivamente (véase “Posología y forma de administración” e “Interacciones”).

#### Infecciones micóticas genitales

Se notificó candidiasis vulvovaginal (incluida vulvovaginitis e infección vulvovaginal micótica) en el 10,4% y el 11,4% de las pacientes tratadas con canagliflozina 100 mg y canagliflozina 300 mg, respectivamente, en comparación con el 3,2% en las pacientes tratadas con placebo. La mayoría de los casos referidos de candidiasis vulvovaginal ocurrieron durante los primeros cuatro meses de tratamiento con canagliflozina. Entre las pacientes que recibieron canagliflozina, el 2,3% presentaron más de una infección. En total, el 0,7% de las pacientes interrumpieron el tratamiento con canagliflozina debido a candidiasis vulvovaginal (véase “Advertencias y precauciones especiales de empleo”),

Se notificó balanitis o balanopostitis candidiásica en el 4,2% y el 3,7% de los varones tratados con canagliflozina 100 mg y canagliflozina 300 mg, respectivamente, en comparación con el 0,6% en los varones tratados con placebo. Entre los varones que recibieron canagliflozina, el 0,9% presentaron más de una infección. En total, el 0,5% de los varones interrumpieron el tratamiento con canagliflozina debido a balanitis o balanopostitis candidiásica. Rara vez se notificó fimosis y en algunos casos se realizó una circuncisión (véase “Advertencias y precauciones especiales de empleo”).

#### Infecciones del tracto urinario

Las infecciones del tracto urinario fueron reportadas más frecuentemente con canagliflozina 100 mg y 300 mg (5,9% frente a 4,3%, respectivamente) en comparación con el 4,0% con placebo. La mayoría de las infecciones fueron leves o moderadas, sin que aumentara la frecuencia de reacciones adversas graves. Los pacientes respondieron a los tratamientos habituales y continuaron el tratamiento con canagliflozina.

#### Fractura ósea

En un estudio cardiovascular de 4.327 pacientes con enfermedad cardiovascular conocida o riesgo elevado de enfermedad cardiovascular, las tasas de incidencia de fractura ósea fueron 1,6; 1,6 y 1,1 por cada 100 pacientes/año de exposición a canagliflozina 100 mg, canagliflozina 300 mg y placebo, respectivamente, teniendo lugar el desequilibrio en la incidencia de fractura dentro de las primeras 26 semanas de terapia. En otros estudios de diabetes tipo 2 con canagliflozina, que incluyeron una población general con diabetes de aproximadamente 5.800 pacientes, no se observó diferencia en el riesgo de fractura respecto al control. Después de 104 semanas de tratamiento, canagliflozina no afectó negativamente la densidad mineral ósea.

#### Poblaciones especiales

##### Pacientes de edad avanzada (≥ 65 años)

En un análisis de ocho estudios controlados con placebo y con control activo, el perfil de seguridad en pacientes de edad avanzada fue generalmente similar al de los pacientes más jóvenes. Los pacientes ≥ 75 años de edad tuvieron una incidencia mayor de reacciones adversas relacionadas con la depleción del volumen (como mareo postural, hipotensión ortostática, hipotensión) con incidencias del 4,9%, el 8,7% y el 2,6% con canagliflozina 100 mg, canagliflozina 300 mg y el grupo control, respectivamente. Se notificaron reducciones de la TFGe (-3,6% y -5,2%) con canagliflozina 100 mg y 300 mg, respectivamente, en comparación con el

Specialist: CPB

MAF revision: GK

QC: YK

HA approval date:

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D\_es

Farm. HUEI PING TSANG  
CO-DIRECTORA TECNICA  
APODERADA  
IF-2018-45036893-APN-108-18-ANMAT

página 26 de 28

Página 26 de 28

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690

Janssen

Johnson & Johnson



grupo control (-3,0%) (ver secciones “Posología y forma de administración” y “Advertencias y precauciones especiales de empleo”).

#### Insuficiencia renal (TFGe <60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> o CrCl <60 ml/min)

Los pacientes con una TFGe basal < 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> o un CrCl < 60 ml/min presentaron una mayor incidencia de reacciones adversas asociadas a depleción del volumen (por ejemplo, mareo postural, hipotensión ortostática, hipotensión) con incidencias del 4,7%, 8,1% y 1,5% con canagliflozina 100 mg, canagliflozina 300 mg, y placebo, respectivamente (véase “Posología y forma de administración” y “Advertencias y precauciones especiales de empleo”).

La incidencia global de elevación del potasio sérico fue mayor en los pacientes con insuficiencia renal moderada con incidencias del 7,5%, 12,3% y 8,1% con canagliflozina 100 mg, canagliflozina 300 mg y placebo, respectivamente. En general, las elevaciones fueron transitorias y no precisaron ningún tratamiento específico.

Se observaron elevaciones de la creatinina sérica del 10-11% y del BUN de aproximadamente el 12% con las dos dosis de canagliflozina. El porcentaje de pacientes con mayores reducciones de la TFGe (> 30%) respecto al valor basal a lo largo del tratamiento fue del 9,3%, el 12,2% y el 4,9% con canagliflozina 100 mg, canagliflozina 300 mg y placebo, respectivamente. Al final del estudio, el 3,0% de los pacientes tratados con canagliflozina 100 mg, el 4,0% de los tratados con canagliflozina 300 mg y el 3,3% de los que recibieron placebo presentaron ese tipo de reducciones (véase “Advertencias y precauciones especiales de empleo”).

#### Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas.

## **SOBREDOSIFICACIÓN**

Dosis únicas de hasta 1.600 mg de canagliflozina administradas a sujetos sanos y de canagliflozina 300 mg administradas dos veces al día durante 12 semanas a pacientes con diabetes tipo 2 fueron generalmente bien toleradas.

#### Tratamiento

En caso de sobredosis, se deben adoptar las medidas de soporte habituales como, por ejemplo, eliminar del tubo digestivo el producto no absorbido, proceder a la vigilancia clínica e instaurar el tratamiento de soporte, en su caso. La eliminación de canagliflozina durante una sesión de hemodiálisis de 4 horas fue insignificante. No se espera que canagliflozina se elimine mediante diálisis peritoneal.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología de:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez – Tel: (011) 4962-6666 / 2247

Hospital A. Posadas – Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777

Specialist: CPB

MAF revision: GK

QC: YK

HA approval date:

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D\_es

página 27 de 28


Farm. HUEI PING TSANG  
CO-DIRECTORA TÉCNICA  
AFIDERADA

Página 27 de 28

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690

Janssen

PRIMERA FARMACIA COMPLETA  
Johnson & Johnson



## PRESENTACIÓN

INVOKANA®, comprimidos recubiertos de 100 mg: 10, 30, 90 y 100 comprimidos recubiertos.  
INVOKANA®, comprimidos recubiertos de 300 mg: 10, 30, 90 y 100 comprimidos recubiertos.

## ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura ambiente hasta 30°C.

## MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 57.690  
Directora Técnica: Georgina Rodriguez, Farmacéutica-Bioquímica.

Elaborado por Janssen Ortho LLC,  
State Road 933 KM 0.1,  
00778 Mamey Ward, Gurabo,  
Puerto Rico, Estados Unidos

Acondicionado por: Janssen Cilag SPA,  
Via C. Janssen, Borgo San Michele,  
04010 Latina,  
Italia

Importado por JANSSEN CILAG Farmacéutica S.A.,  
Mendoza 1259, (1428) Buenos Aires  
ARGENTINA

### Centro de Atención al Cliente:

Por correo electrónico: [infojanssen@janar.jnj.com](mailto:infojanssen@janar.jnj.com)

Por teléfono: 0800 122 0238

Con licencia de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation  
® Marca Registrada

### Fecha de última revisión:

  
Farm. HUELPING TSANG  
CO-DIRECTORA TECNICA  
APODERADA

Specialist: CPB

MAF revision: GK

IF-2018-45036893-APN-DERM#ANMAT

QC: YK

HA approval date:

AR\_CANA\_FCT\_PI\_EUPI Mar-18\_v1.2+D\_es

página 28 de 28

Página 28 de 28



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2018-45036893-APN-DERM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Miércoles 12 de Septiembre de 2018

**Referencia:** prospectos 5070-18-0 Certificado N°57690

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 28 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2018.09.12 15:55:13 -03'00'


Pablo Marcelo Lopez Schimpf  
Técnico Profesional  
Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2018 09 12 15:55:17 -03'00'

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690

Janssen

Johnson & Johnson



## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

### INVOKANA® CANAGLIFLOZINA 100 y 300 mg Comprimidos recubiertos

Industria Estadounidense

Venta Bajo Receta

Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Puede contribuir comunicando los efectos adversos que pudiera usted tener. La parte final de este prospecto incluye información sobre cómo comunicar estos efectos adversos.

#### **Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.

Si tiene alguna duda, consulte a su médico.

Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.

#### **Contenido del prospecto**

1. Qué es INVOKANA® y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar INVOKANA®
3. Cómo tomar INVOKANA®
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de INVOKANA®
6. Contenido del envase e información adicional

#### **1. ¿Qué es INVOKANA® y para qué se utiliza?**

INVOKANA® contiene el principio activo canagliflozina, que pertenece a un grupo de medicamentos que se denominan “hipoglucemiantes”. Los hipoglucemiantes son medicamentos que se utilizan en pacientes adultos para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2.

Este medicamento actúa eliminando una mayor cantidad de azúcar de su cuerpo a través de la orina. De esta forma disminuye la cantidad de azúcar en su sangre.

INVOKANA® se administra en monoterapia o combinado con otros medicamentos que ya puede estar tomando para tratar su diabetes tipo 2 (como metformina, insulina, un inhibidor de DPP-4 [como sitagliptina, saxagliptina o linagliptina], una sulfonilurea [como glibeprida o glicizida], o pioglitazona) que reducen los

Specialist: CPB

MAF revision: GK

IF-2018-45036975

QC: YK

AR\_CANA\_FCT\_PIL\_EUPI Mar-18\_v2.0+D\_es

página 1 de 9

HA approval date:

Farm. HUELING ASAWA  
DIRECTORA TÉCNICA  
APODERADA

Página 1 de 9



Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690

Janssen

PHARMACEUTICAL COMPANY  
Johnson & Johnson



niveles de azúcar en sangre. Es posible que ya esté tomando uno o más de estos medicamentos para tratar su diabetes tipo 2.

Es importante que no deje de seguir las recomendaciones sobre dieta y ejercicio que le facilite su médico.

### ¿Qué es la diabetes tipo 2?

La diabetes tipo 2 es un trastorno en el cual el organismo no produce suficiente insulina y la insulina que produce no funciona bien. También puede ser que su organismo produzca demasiado azúcar.

Cuando esto ocurre, el azúcar (glucosa) se acumula en la sangre. Esto puede producir condiciones médicas graves como enfermedad cardíaca, enfermedad renal, ceguera y amputaciones.

## 2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar INVOKANA®

### No tome INVOKANA®:

- si es alérgico a canagliflozina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

### Advertencias y precauciones

Consulte a su médico antes de empezar a tomar este medicamento y durante el tratamiento:

- para saber que puede hacer para prevenir la deshidratación
- si tiene diabetes tipo 1 (su organismo no produce nada de insulina). INVOKANA® no se debe usar para tratar esta enfermedad
- si experimenta pérdida rápida de peso, náuseas o vómitos, dolor de estómago, sed excesiva, respiración rápida y profunda, confusión, somnolencia o cansancio poco habituales, olor dulce en su aliento, sabor dulce o metálico en su boca u olor diferente de su orina o sudor, contacte con su médico o acuda al hospital más cercano inmediatamente. Estos síntomas pueden ser señales de una “cetoacidosis diabética” – un problema raro pero grave, algunas veces potencialmente mortal que puede tener con la diabetes debido al aumento de los niveles de “cuerpos cetónicos” en su orina o sangre, detectados en los análisis. El riesgo de desarrollar “cetoacidosis diabética” puede aumentar con el ayuno prolongado, consumo excesivo de alcohol, deshidratación, reducción repentina de la dosis de insulina o mayor necesidad de insulina debido a cirugía mayor o enfermedad grave.
- si tiene cetoacidosis diabética (una complicación de la diabetes con niveles altos de azúcar, pérdida rápida de peso, náuseas o vómitos). INVOKANA® no se debe usar para tratar esta enfermedad
- si tiene problemas renales graves o necesita diálisis
- si tiene problemas hepáticos graves
- si ha tenido alguna vez enfermedad cardíaca grave o si ha tenido un accidente cerebro vascular

Specialist: CPB

MAF revision: GK

IF-2018-4909  
Farm. HUELPIPING TSA  
DIRECTORA TECNICA  
APODERADA

QC: YK


HA approval date:

AR\_CANA\_FCT\_PIL\_EUPI Mar-18\_v2.0+D\_es

página 2 de 9

Página 2 de 9

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690



- si está tomando medicamentos para disminuir su presión arterial (antihipertensivos) o ha tenido alguna baja presión arterial (hipotensión). Puede encontrar más información en la sección “Toma de INVOKANA® con otros medicamentos”.
- Es importante que vigile sus pies de forma regular y cumpla con cualquier otro consejo acerca del cuidado del pie, además de la adecuada hidratación que le haya indicado su médico. Debe informar inmediatamente a su médico si nota cualquier herida o decoloración, o si experimenta cualquier sensibilidad o dolor en sus pies. Algunos estudios indican que tomar canagliflozina puede haber contribuido al riesgo de amputación en miembros inferiores (principalmente amputaciones de los dedos de los pies).

Si alguna de las situaciones anteriores se aplica en su caso (o si tiene dudas), hable con su médico antes de tomar este medicamento.

### Funcionamiento de los riñones

Se le realizará una evaluación de los riñones mediante un análisis de sangre antes de empezar a tomar y mientras esté tomando este medicamento.

### Glucosa en orina

Debido a cómo actúa este medicamento, su orina dará positivo en azúcar (glucosa) mientras esté tomando este medicamento.

### Niños y adolescentes

INVOKANA® no está recomendado en niños ni adolescentes menores de 18 años.

### Toma de INVOKANA® con otros medicamentos

Informe a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar otros medicamentos. Este medicamento puede afectar al mecanismo de acción de otros medicamentos. Además, otros medicamentos pueden afectar al mecanismo de acción de este medicamento.

En particular informe a su médico si está tomando alguno de los medicamentos siguientes:

- otros antidiabéticos, ya sea insulina o una sulfonilurea (como glimepirida o glipizida), puede que su médico decida reducir su dosis para evitar una bajada excesiva de los niveles de azúcar en sangre (hipoglucemia)
- medicamentos para bajar la presión sanguínea (antihipertensivos), incluyendo diuréticos (medicamentos utilizados para eliminar el exceso de líquidos en su organismo) ya que este medicamento también puede bajar su presión sanguínea por eliminación de líquidos en el organismo. Al principio de la sección 4 “Posibles efectos adversos” se enumeran posibles síntomas de excesiva pérdida de líquidos en su organismo.
- Hierba de San Juan o hipérico (un medicamento a base de plantas utilizado para tratar la depresión)
- carbamazepina, fenitoína o fenobarbital (medicamentos utilizados para controlar las convulsiones)
- efavirenz o ritonavir (medicamento utilizado para tratar la infección por el VIH)
- rifampicina (antibiótico utilizado para tratar la tuberculosis)
- colestiramina (medicamento utilizado para reducir los niveles de colesterol en sangre). Ver sección 3, “Cuando esté tomando este medicamento”.

Specialist: CPB

MAF revision: GK

IF-2018-05036975-APN-DE-SS-ANMAT

QC: YK

Farm. HUEI...  
CO-DIRECTORA TÉCNICA  
APODERADA

HA approval date:

AR\_CANA\_FCT\_PIL\_EUPI Mar-18\_v2.0+D\_es

página 3 de 9

Página 3 de 9

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690



- digoxina o digitoxina (medicamentos utilizados para ciertos problemas cardiacos). Si toma INVOKANA es posible que haya que medir los niveles de digoxina o digitoxina en su sangre.
- dabigatran (medicamento anticoagulante que disminuye el riesgo de formación de coágulos de sangre)

### Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

INVOKANA® no se debe utilizar durante el embarazo. Consulte a su médico la mejor forma de interrumpir INVOKANA® y controlar su glucosa sanguínea tan pronto como sepa que está embarazada.

No debe tomar este medicamento si está amamantando. Consulte a su médico si debe interrumpir la toma de este medicamento o si debe interrumpir la lactancia.

### Conducción y uso de máquinas

La influencia de INVOKANA® sobre la capacidad para conducir, andar en bicicleta y utilizar herramientas o máquinas es nula o insignificante. No obstante, algunos pacientes pueden sentir mareo o aturdimiento, lo que puede afectar a su capacidad para conducir, andar en bicicleta o utilizar herramientas o máquinas.

La toma de INVOKANA® con otros medicamentos para la diabetes llamados sulfonilureas (como glicemiprida o glipizida) o insulina puede aumentar el riesgo de bajada de los niveles de azúcar en sangre (hipoglucemia). Los síntomas incluyen visión borrosa, hormigueo en los labios, temblor, sudoración, palidez, cambio del estado de ánimo, ansiedad o confusión. Todo ello puede afectar a su capacidad para conducir, andar en bicicleta y utilizar herramientas o máquinas. Informe a su médico tan pronto como sea posible si usted tiene algún síntoma de azúcar bajo en sangre.

### INVOKANA® contiene lactosa

Si el médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con su médico antes de tomar este medicamento.

### Invokana contiene sodio

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por comprimido, esto es esencialmente "libre de sodio".

## 3. Cómo tomar INVOKANA®

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, pregunte a su médico.

### Cuánto debe tomar

- La dosis de inicio recomendada de INVOKANA® es de un comprimido de 100 mg al día. Su médico decidirá si debe aumentar la dosis a 300 mg.
- Su médico puede limitar la dosis a 100 mg si usted tiene problemas de riñón.

Specialist: CPB

MAF revision: GK

IF-2018-45056975-APN-DERM#AKMAT

QC: YK

AR\_CANA\_FCT\_PIL\_EUPI

Mar-18\_v2.0+D\_es  
APODERADA

HA approval date:

página 4 de 9

Página 4 de 9

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690

Janssen

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF  
Johnson & Johnson



- Su médico le recetará la dosis adecuada para usted.

#### Cuando esté tomando este medicamento

- Trague el comprimido entero con medio vaso de agua.
- Puede tomar el comprimido con o sin comida. Lo mejor es tomar el comprimido antes de la primera comida del día.
- Intente tomarlo siempre a la misma hora del día. Esto le ayudará a recordar tomarlo.
- Si su médico le ha recetado canagliflozina junto con un secuestrador del ácido biliar como colestiramina (medicamento para disminuir el colesterol) debe tomar canagliflozina al menos 1 hora antes o de 4 a 6 horas después de tomar el secuestrador de ácido biliar.

Su médico puede recetarle INVOKANA® con algún otro medicamento hipoglucemiante. Recuerde tomar todos los medicamentos siguiendo las instrucciones de su médico para conseguir los mejores resultados para su salud.

#### Dieta y ejercicio

Para controlar su diabetes, usted todavía necesita seguir el consejo de su médico, sobre dieta y ejercicio. En particular, si usted sigue una dieta de control de peso, debe continuarla mientras toma este medicamento.

#### Si toma más INVOKANA® del que debe

Si toma más medicamento del que debe, consulte a su médico inmediatamente.

#### Si olvidó tomar INVOKANA®

- Si olvida tomar una dosis, tómela en cuanto se acuerde. Sin embargo, si ya es casi la hora de la dosis siguiente, omita la dosis olvidada.
- No tome una dosis doble (dos dosis el mismo día) para compensar la dosis olvidada.

#### Si interrumpe el tratamiento con INVOKANA®

Su concentración de azúcar en sangre puede aumentar si deja de tomar este medicamento. No deje de usar este medicamento sin hablar antes con su médico.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico.

#### 4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no s todas las personas los sufran.

Specialist: CPB

HA approval date:

MAF revision: GK

QC: YK

AR\_CANA\_FCT\_PIL\_EUPI Mar-18\_v2.0+D\_es

Farm. HUEI PING TSANG  
CO-DIRECTORA TECNICA  
APODERADA  
IF-2018-45036975-APN-DERM#ANMAT

página 5 de 9

Página 5 de 9

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690



**Deje de tomar INVOKANA® y consulte a un médico lo antes posible si advierte alguno de los siguientes efectos adversos graves:**

**Deshidratación (poco frecuente, puede afectar hasta 1 de cada 100 personas)**

- pérdida excesiva de líquidos de su organismo (deshidratación). Este efecto se observa con más frecuencia en personas de edad avanzada ( $\geq 75$  años), personas con problemas de riñón y personas que toman diuréticos.

Posibles síntomas de deshidratación son:

- sensación de mareo o vértigo
- pérdida del conocimiento (desmayo), mareo o desvanecimiento al ponerse de pie
- boca muy seca o pegajosa, sensación de sed intensa
- sensación de mucho cansancio o debilidad
- micciones escasas o nulas
- latido cardíaco rápido.

**Contacte con su médico o acuda al hospital más cercano inmediatamente si experimenta alguno de los siguientes efectos adversos:**

**Cetoacidosis diabética (rara, puede afectar hasta 1 de cada 1.000 personas)**

Estos son los síntomas de la cetoacidosis diabética (ver también sección 2 Advertencias y precauciones):

- aumento de los niveles de "cuerpos cetónicos" en su orina o sangre
- pérdida rápida de peso
- náuseas o vómitos
- dolor de estómago
- sed excesiva
- respiración rápida y profunda
- confusión
- somnolencia o cansancio poco habituales
- olor dulce en su aliento, sabor dulce o metálico en su boca u olor diferente de su orina o sudor.

Esto puede ocurrir independientemente de los niveles de glucosa en sangre. Su médico puede decidir interrumpir el tratamiento con INVOKANA® de forma temporal o permanente.

**Informe a su médico lo antes posible si presenta alguno de los siguientes efectos adversos:**

**Hipoglucemia (muy frecuente, puede afectar a más de 1 de cada 10 personas)**

- bajos niveles de azúcar en sangre (hipoglucemia) – cuando tome este medicamento junto con insulina o con una sulfonilurea (como glimepirida o glipizida).

Posibles síntomas de bajos niveles de azúcar en sangre son:

- visión borrosa
- hormigueo en los labios
- temblor, sudoración, palidez
- cambios del estado de ánimo o sensación de ansiedad o confusión.

Specialist: CPB

MAF revision: GK

QC: YK

HA approval date:

AR\_CANA\_FCT\_PIL\_EUPI Mar-18\_v2.0+D\_es

página 6 de 9

Farm. HUEI PING TSANG  
CO-DIRECTORA TECNICA  
APODERADA  
IF-2018-45036975-APN-DERM#ANMAT

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690

Janssen



Su médico le explicará cómo tratar los bajos niveles de azúcar en sangre y qué hacer si tiene alguno de los síntomas anteriores.

**Otros efectos adversos:**

**Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)**

- infecciones vaginales por hongos

**Frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)**

- erupción cutánea o enrojecimiento del pene o el prepucio (infección micótica)
- infecciones del tracto urinario
- cambios en la orina (como necesidad más frecuente de orinar o mayor producción de orina, necesidad urgente de orinar, necesidad de orinar por la noche)
- constipación
- sensación de sed
- náuseas
- los análisis de sangre pueden mostrar alteraciones en los niveles de lípidos (colesterol) y aumento en el recuento de glóbulos rojos en sangre (hematocrito).

**Poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)**

- erupción cutánea o enrojecimiento de la piel, esto puede causar picor e incluir bultos protuberantes, erupción con exudación o ampollas.
- urticaria
- los análisis de sangre pueden mostrar alteraciones relacionadas con la función renal (creatinina o urea) o potasio
- los análisis de sangre pueden mostrar aumento de los niveles de fosfato en sangre
- fractura ósea
- fallo del riñón (principalmente como consecuencia de la pérdida de gran cantidad de líquido de su organismo).
- amputaciones en miembros inferiores (principalmente los dedos de los pies) especialmente si tiene alto riesgo de enfermedad cardíaca.

**Rara (puede afectar hasta 1 de cada 1000 personas)**

- reacción alérgica grave (puede incluir hinchazón de la cara, labios, boca, lengua, o garganta que puede provocar dificultad para respirar o tragar).

**Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del sistema nacional de notificación. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

Specialist: CPB

MAF revision: GK

QC: YK

HA approval date:

AR\_CANA\_FCT\_PIL\_EUPI Mar-18\_v2.0+D\_es

Farm. HUEI PING TSANG  
CO-DIRECTOR DE FARMACIA  
IF-2018-45036975-APNEDERM#ANMAT  
APODERADA

página 7 de 9

Página 7 de 9

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690

Janssen

PHARMACEUTICAL COMPANIES OF  
Johnson & Johnson



## 5. Conservación de INVOKANA®

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento indicada que aparece en la caja y en el blíster. La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica.

Este medicamento no requiere condiciones especiales de conservación.

No utilice este medicamento si observa indicios visibles de deterioro o manipulación.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

Almacenar a no más de 30°C en el envase original.

## 6. Contenido del envase e información adicional

### Composición de INVOKANA®

- El principio activo es canagliflozina.
  - Cada comprimido contiene 100 mg o 300 mg de canagliflozina.
- Los demás componentes son:
  - núcleo del comprimido: croscarmelosa sódica, hidroxipropil celulosa, lactosa anhidra, estearato de magnesio y celulosa microcristalina
  - cubierta pelicular: macrogol (3350), alcohol polivinílico, talco y dióxido de titanio (E171). El comprimido de 100 mg contiene también óxido de hierro amarillo (E172).

### Aspecto del producto y contenido del envase

- INVOKANA® 100 mg comprimidos recubiertos con película (comprimidos) es de color amarillo, con forma de cápsula, de 11 mm de longitud, con "CFZ" grabado en una cara y "100" en la otra.
- INVOKANA® 300 mg comprimidos recubiertos con película (comprimidos) es de color blanco, con forma de cápsula, de 17 mm de longitud, con "CFZ" grabado en una cara y "300" en la otra.

Los envases se presentan en cajas de: 10, 30, 90 y 100 comprimidos recubiertos.

*Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234*

Specialist: CPB

MAF revision: GK

IF-2018-45036975-APN-DE

QC: YK

HA approval date:


AR\_CANA\_FCT\_PIL\_EUPI Mar-18\_v2.0+D\_es

página 8 de 9

Página 8 de 9

Farm. HUEI-PING-TSAN  
CO-DIRECTORA TÉCNICA  
APODERADO

Producto: Invokana®  
Nro de registro: 57.690



“Este medicamento se encuentra bajo un programa médico Plan de Gestión de Riesgos, cuya finalidad es garantizar la seguridad y protección de pacientes”

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 57.690

Elaborado por Janssen Ortho LLC,  
State Road 933 KM 0.1,  
00778 Mamey Ward, Gurabo,  
Puerto Rico, Estados Unidos

Acondicionado por: Janssen Cilag SPA,  
Via C. Janssen, Borgo San Michele,  
04010 Latina,  
Italia

Importado por JANSSEN CILAG Farmacéutica S.A.,  
Mendoza 1259, (1428) Buenos Aires, ARGENTINA  
Directora Técnica: Georgina Rodríguez, Farmacéutica y Bioquímica

**Centro de Atención al Cliente:**

Por correo electrónico: [infojanssen@janar.jnj.com](mailto:infojanssen@janar.jnj.com)

Por teléfono: 0800 122 0238

Con licencia de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation  
® Marca Registrada

**Fecha de última revisión:**

Farm. HUEI PING TSANG  
CO-DIRECTORA TECNICA  
APODERADA

Specialist: CPB

MAF revision: GK

IF-2018-45036975-APN-DERM#ANMAT

QC: YK

HA approval date:

AR\_CANA\_FCT\_PIL\_EUPI Mar-18\_v2.0+D\_es  
página 9 de 9

Página 9 de 9





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2018-45036975-APN-DERM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Miércoles 12 de Septiembre de 2018

**Referencia:** inf. pacientes 5070-18-0 Certificado N°57690

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2018.09.12 15:55:27 -03'00'

Pablo Marcelo Lopez Schimpf  
Técnico Profesional  
Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117564  
Date: 2018.09.12 15:55:31 -03'00'