



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**

2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-36623218-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el Expediente EX-2020-36623218-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

**CONSIDERANDO:**

Que por las presentes actuaciones la firma PFIZER S.A. solicita la aprobación de nuevos proyectos de prospectos e información para el paciente para la Especialidad Medicinal denominada INLYTA / AXITINIB, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDO RECUBIERTO / AXITINIB 1 mg y 5 mg; aprobada por Certificado N° 56.990.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición N°: 5904/96 y Circular N° 4/13.

Que la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. – Autorízase a la firma PFIZER S.A. propietaria de la Especialidad Medicinal denominada INLYTA / AXITINIB, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDO RECUBIERTO / AXITINIB 1 mg y 5 mg; el nuevo proyecto de prospecto obrante en el documento IF-2020-76413994-APN-DERM#ANMAT; e información para el paciente obrante en el documento IF-2020-76414211-APN-DERM#ANMAT.

ARTICULO 2º. – Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 56.990, cuando el mismo se presente acompañado de la presente Disposición.

ARTICULO 3º. - Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición y prospectos e información para el paciente. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2020-36623218-APN-DGA#ANMAT

**INLYTA**  
**AXITINIB**  
Comprimidos

Venta bajo receta archivada

Industria alemana

**COMPOSICIÓN**

Cada comprimido de **INLYTA 1 mg** contiene:

Axitinib	1,000 mg
Celulosa microcristalina	63,250 mg
Lactosa monohidrato	32,000 mg
Croscarmelosa sódica	3,000 mg
Estearato de magnesio	0,750 mg
Opadry II rojo	4,000 mg

Cada comprimido de **INLYTA 5 mg** contiene:

Axitinib	5,000 mg
Celulosa microcristalina	107,430 mg
Lactosa monohidrato	56,000 mg
Croscarmelosa sódica	5,250 mg
Estearato de magnesio	1,320 mg
Opadry II rojo	7,000 mg

**ACCIÓN TERAPÉUTICA**

Agente antineoplásico, código ATC: L01XE17.


**INDICACIONES**

INLYTA está indicado para el tratamiento del carcinoma de células renales (CCR) avanzado luego del fracaso de un tratamiento sistémico previo.

**CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS**

**DESCRIPCIÓN**

INLYTA (axitinib) es un inhibidor de quinasas. El nombre químico de axitinib es N-Metil-2-[3-((E)-2-piridin-2-il-vinil)-1H-indazol-6-ilsulfanil]-benzamida. La fórmula molecular es  $C_{22}H_{18}N_4OS$  y el peso molecular es de 386,47 daltons. La estructura química está representada por la siguiente figura:



LLD\_Arg\_USPIv4&v5\_16Aug2018&28Ene2020\_v1

Axitinib es un polvo de color blanco a amarillo pálido, con un pKa de 4,8. La solubilidad de axitinib en medios acuosos con un pH que oscila entre 1,1 y 7,8 está por encima de los 0,2 µg/ml. El coeficiente de partición (n-octanol/agua) es de 3,5.

INLYTA se suministra como comprimidos recubiertos de color rojo que contienen 1 mg o 5 mg de axitinib junto con celulosa microcristalina, lactosa monohidrato, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio y Opadry II rojo 32K15441 como principios inactivos. La cubierta Opadry II 32K15441 roja contiene lactosa monohidrato, HPMC 2910/Hipromelosa 15cP, dióxido de titanio, triacetina (glicerol triacetato) y óxido de hierro rojo.

#### **PROPIEDADES FARMACODINÁMICAS**

##### ***Mecanismo de acción***

Se ha demostrado que axitinib inhibe los receptores de las tirosinas quinasas, incluidos los receptores del factor de crecimiento del endotelio vascular VEGFR-1, VEGFR-2 y VEGFR-3 a concentraciones plasmáticas terapéuticas. Estos receptores están implicados en la angiogénesis patológica, el crecimiento tumoral y la progresión del cáncer. Axitinib *in vitro* y en modelos de ratón inhibió la supervivencia y proliferación celular del endotelio inducidas por el VEGF. Se demostró que axitinib inhibe el crecimiento tumoral y la fosforilación del VEGFR-2 en modelos de xenoinjerto de tumor en ratones.

##### ***Farmacodinamia***

El efecto de una dosis oral única de INLYTA (5 mg) sobre el intervalo QTc en ausencia y presencia de 400 mg de ketoconazol se evaluó en un estudio cruzado de dos vías, aleatorizado y simple ciego, del que participaron 35 sujetos sanos. No se detectaron cambios importantes en el intervalo QTc medio (es decir, >20 ms) respecto del placebo hasta 3 horas después de la dosis. No obstante, no pueden descartarse incrementos menores en el intervalo QTc medio (es decir, <10 ms).

#### **PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS**

En el análisis farmacocinético de la población, se recopilaron datos de 17 ensayos realizados en sujetos sanos y en pacientes con cáncer. Un modelo de distribución bicompartimental con absorción de primer orden y latencias describe de forma adecuada el perfil del axitinib en cuanto a concentración-tiempo.

##### **Absorción**

Después de la administración de una dosis oral única de 5 mg, la mediana de T<sub>máx</sub> varió entre 2,5 y 4,1 horas. Basado en la vida media plasmática, el estado de equilibrio se espera dentro de los 2 a 3 días de administración de la dosis. La administración de 5 mg de axitinib dos veces al día produjo una acumulación aproximada de 1,4 veces en comparación con la administración de una dosis única. En estado de equilibrio, axitinib exhibe farmacocinética aproximadamente lineal dentro de un rango de dosis de 1 mg a 20 mg. La biodisponibilidad absoluta media de axitinib después de una dosis oral de 5 mg es de 58%. Comparado con un ayuno de toda la noche, la administración de INLYTA junto con una comida de contenido graso moderado produjo un descenso de 10% en el AUC mientras que, con una comida de alto contenido graso y calórico, el aumento del AUC fue de 19%. INLYTA puede administrarse junto con las comidas o lejos de ellas [*ver Posología y administración*].

##### **Distribución**

Axitinib muestra una fuerte unión (>99%) a las proteínas plasmáticas humanas, con preferencia a la albúmina, y una unión moderada a la alfa-1 glucoproteína ácida. En pacientes con CCR avanzado (n=20), para una dosis de 5 mg dos veces al día con las comidas, la media geométrica (CV%) para C<sub>máx</sub> y AUC<sub>0-24</sub> fue de 27,8 (79%) ng/ml y 265 (77%) ng.h/ml, respectivamente. La media geométrica (CV%) para la depuración y el volumen aparente de distribución fue de 38 (80%) l/h y 160 (105%) l, respectivamente.

##### **Metabolismo**

La vida media plasmática de INLYTA varía entre 2,5 y 6,1 horas. Axitinib se metaboliza principalmente en el hígado a través del CYP3A4/5 y, en menor medida, de CYP1A2, CYP2C19 y UGT1A1.

LLD\_Arg\_USPIv4&v5\_16Aug2018&28Ene2020\_v1

### Eliminación


Después de la administración oral de una dosis radiactiva de 5 mg de axitinib, el 41% de la radiactividad se recuperó en las heces y el 23% en la orina. El principal componente identificado en las heces fue el axitinib no modificado, que representó un 12% de la dosis. En orina, no se detectó axitinib no modificado y la mayor parte de la radiactividad recuperada consistió en ácido carboxílico y metabolitos sulfóxidos. En plasma, el componente radiactivo predominante (50% de la radiactividad circulante) fue el metabolito N-glucurónido, mientras que el axitinib no modificado y el metabolito sulfóxido representaron cada uno alrededor del 20% de la radiactividad circulante.

Los metabolitos sulfóxidos y N-glucurónidos muestran una potencia *in vitro* aproximadamente  $\geq 400$  veces más baja contra el VEGFR-2 en comparación con axitinib.

### Interacciones medicamentosas

**Efectos de otros medicamentos sobre INLYTA:** Axitinib se metaboliza principalmente en el hígado mediante el CYP3A4/5. Además, la solubilidad acuosa de axitinib depende del pH: a mayor pH, menor solubilidad. La figura 1 describe los efectos de un potente inhibidor del CYP3A4/5, un potente inductor del CYP3A4/5 y un antiácido sobre la farmacocinética de axitinib [ver Posología y administración e Interacciones medicamentosas].

**Figura 1. Impacto de la administración concomitante de medicamentos y del deterioro de la función hepática sobre la farmacocinética de axitinib**



AUC: área debajo de la curva; Cmáx: concentración máxima. \*Véase Posología y administración

**Efectos de INLYTA sobre otros medicamentos:** Los estudios *in vitro* demostraron que axitinib tiene el potencial de inhibir el CYP1A2 y el CYP2C8. Sin embargo, la coadministración de axitinib con paclitaxel, un sustrato del CYP2C8, no incrementó las concentraciones plasmáticas del paclitaxel en los pacientes.

LLD\_Arg\_USPIv4&v5\_16Aug2018&28Ene2020\_v1

Los estudios *in vitro* indicaron que, a concentraciones plasmáticas terapéuticas, axitinib no inhibe el CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4/5 o UGT1A1. Los estudios *in vitro* en hepatocitos humanos indicaron que axitinib no induce al CYP1A1, CYP1A2 o CYP3A4/5.

Axitinib es un inhibidor del transportador de eflujo P-glicoproteína (P-gp) *in vitro*. Sin embargo, esta inhibición no es esperable a concentraciones plasmáticas terapéuticas.

#### **Poblaciones especiales**

##### *Deterioro de la función hepática*

Los efectos del deterioro de la función hepática sobre la farmacocinética de axitinib se describen en la figura 1 [ver *Posología y administración, Advertencias y precauciones y Uso en poblaciones específicas*].

##### *Deterioro de la función renal*

El análisis farmacocinético poblacional (basado en la función renal preexistente) se llevó a cabo en 590 voluntarios sanos y pacientes, incluidos cinco pacientes con deterioro de la función renal severo ( $15 \text{ ml/min} \leq \text{CLcr} < 29 \text{ ml/min}$ ), 64 pacientes con deterioro de la función renal moderado ( $30 \text{ ml/min} \leq \text{CLcr} < 59 \text{ ml/min}$ ), y 139 pacientes con deterioro de la función renal leve ( $60 \text{ ml/min} \leq \text{CLcr} < 89 \text{ ml/min}$ ). El deterioro de la función renal leve a severo no tuvo efectos significativos sobre la farmacocinética de axitinib. Sólo se dispone de los datos de un paciente con enfermedad renal en etapa terminal [ver *Uso en poblaciones específicas*].

##### *Otros factores intrínsecos*

Los análisis farmacocinéticos poblacionales indicaron que la edad, el sexo, la raza, el peso corporal, la superficie corporal, el genotipo UGT1A1 y el genotipo CYP2C19 no producen efectos clínicamente relevantes sobre la depuración de axitinib.

#### **TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA**

##### **Carcinogénesis, mutagénesis, trastornos de fertilidad**

No se han realizado estudios de carcinogenicidad con axitinib.

Axitinib no mostró respuesta mutagénica en un ensayo (Ames) de mutación inversa bacteriana *in vitro* ni respuesta clastogénica en un ensayo de aberración cromosómica *in vitro* con linfocitos humanos. Axitinib tuvo efectos genotóxicos en un ensayo de micronúcleos *in vivo* con médula ósea de ratón.

INLYTA tiene el potencial de deteriorar la función reproductiva y la fertilidad en humanos. En estudios toxicológicos de dosis repetidas, el deterioro del aparato reproductor masculino se observó en los testículos y el epidídimo (disminución del peso del órgano, atrofia o degeneración, disminución de la cantidad de células germinativas, hipospermia o espermatozoides con formas anormales, disminución en la densidad y el recuento de espermatozoides) a dosis  $\geq 15 \text{ mg/kg}$  administradas dos veces al día en ratones (aproximadamente 7 veces la exposición sistémica (AUC) de los pacientes a la dosis inicial recomendada) y dosis  $\geq 1,5 \text{ mg/kg}$  administradas dos veces al día en perros (aproximadamente 0,1 veces el AUC de los pacientes a la dosis inicial recomendada). Los hallazgos del sistema reproductor femenino en ratones y perros incluyeron signos de retraso de la maduración sexual, reducción o ausencia del cuerpo lúteo, disminución de los pesos uterinos y atrofia uterina a  $\geq 5 \text{ mg/kg/dosis}$  (aproximadamente 1,5 o 0,3 veces el AUC de los pacientes a la dosis inicial recomendada en comparación con ratones y perros, respectivamente).

En un estudio de fertilidad con ratones, axitinib no afectó ni el apareamiento ni la tasa de fertilidad en los machos cuando se lo administró por vía oral dos veces al día en cualquiera de las dosis evaluadas hasta  $50 \text{ mg/kg/dosis}$  después de al menos 70 días de administración (aproximadamente 57 veces el AUC de los pacientes a la dosis inicial recomendada). En ratones hembra, se observó disminución de la fertilidad y la viabilidad embrionaria a todas las dosis evaluadas ( $\geq 15 \text{ mg/kg/dosis}$  administrados por vía oral dos veces al día) después de al menos 15 días de tratamiento con axitinib (aproximadamente 10 veces el AUC de los pacientes a la dosis inicial recomendada).

LLD\_Arg\_USPIv4&v5\_16Aug2018&28Ene2020\_v1

### Ensayos clínicos

En un estudio de fase 3, aleatorizado, abierto y multicéntrico, se evaluó la seguridad y eficacia de INLYTA. Los pacientes (N=723) con CCR avanzado cuya enfermedad había progresado durante o después de 1 tratamiento previo con terapias sistémicas (como regímenes que contenían sunitinib, bevacizumab, temsirolimus o citoquinas) fueron aleatorizados (1:1) para recibir INLYTA (N=361) o sorafenib (N=362). La sobrevida libre de progresión (SLP) fue evaluada por un comité de revisión central, independiente y en ciego. Otras variables estudiadas fueron las tasas de respuesta objetiva (ORR, *por sus siglas en inglés*) y la sobrevida global (SG).

Del total de inscriptos en este estudio, 389 pacientes (54%) habían recibido un tratamiento previo basado en sunitinib; 251 pacientes (35%), un tratamiento previo basado en citoquinas (interleucina-2 o interferón-alfa); 59 pacientes (8%), un tratamiento previo basado en bevacizumab y 24 pacientes (3%), un tratamiento previo basado en temsirolimus. Las características demográficas y patológicas iniciales fueron similares entre los grupos tratados con INLYTA y sorafenib respecto de la edad (mediana de 61 años), el sexo (72% masculinos), la raza (75% blancos, 21% asiáticos), el estado funcional del Grupo Oncológico Cooperativo del Este (ECOG performance status, *por sus siglas en inglés*) (ECOG 0, 55%; ECOG 1, 45%) y la histología (99% de células claras).

Se observó una ventaja estadísticamente significativa de INLYTA respecto de sorafenib para la SLP (véase la tabla 1 y la figura 2), sin ninguna diferencia estadísticamente significativa para la SG.

**Tabla 1. Resultados de eficacia**

criterio de valoración/población del estudio	INLYTA	Sorafenib	HR (IC 95%)	Valor de p
<b>ITT global</b>	N=361	N=362		
Mediana de SLP <sup>a,b</sup> en meses (IC 95%)	6,7 (6,3; 8,6)	4,7 (4,6; 5,6)	0,67 (0,54; 0,81)	<0,0001 <sup>c</sup>
Mediana de SG en meses (IC 95%)	20,1 (16,7; 23,4)	19,2 (17,5; 22,3)	0,97 (0,80; 1,17)	NS
% ORR (IC 95%)	19,4 (15,4; 23,9)	9,4 (6,6; 12,9)	2,06 <sup>d</sup> (1,41; 3,00)	– <sup>e</sup>
<b>SLP según tratamiento anterior</b>				
Subgrupo refractario a sunitinib	N=194	N=195		
Mediana, meses (IC 95%)	4,8 (4,5; 6,4)	3,4 (2,8; 4,7)	0,74 (0,57; 0,96)	– <sup>e</sup>
Subgrupo refractario a citoquinas	N=126	N=125		
Mediana, meses (IC 95%)	12,1 (10,1; 13,9)	6,5 (6,3; 8,3)	0,46 (0,32; 0,68)	– <sup>e</sup>

IC: intervalo de confianza; HR: cociente de riesgos instantáneos (INLYTA/sorafenib); ITT: intención de tratar; ORR: tasa de respuesta objetiva; NS: no significativo; SG: sobrevida global; SLP: sobrevida libre de progresión.

<sup>a</sup> Tiempo desde la aleatorización hasta la progresión de la enfermedad o la muerte (lo que ocurra primero) debido a cualquier causa.


<sup>b</sup> Evaluados mediante una revisión radiológica independiente de acuerdo con los criterios RECIST.

<sup>c</sup> Valor de p unilateral de la prueba del rango logarítmico de un tratamiento estratificado por estado funcional según el ECOG y tratamiento previo (la comparación se considera estadísticamente significativa si el valor de p unilateral es <0,023).

<sup>d</sup> El cociente de riesgo se usa para la ORR. Un cociente de riesgo >1 indicó una mayor probabilidad de respuesta en el grupo axitinib; un cociente de riesgo <1 indicó una mayor probabilidad de respuesta en el grupo sorafenib.

<sup>e</sup> El valor de p no está incluido dado que no fue ajustado para pruebas múltiples.

**Figura 2. Curva de Kaplan-Meier para la sobrevida libre de progresión según una evaluación independiente (población por intención de tratar)**



## POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

### Posología recomendada

La dosis oral inicial recomendada de INLYTA es de 5 mg dos veces al día. Administrar las dosis de INLYTA con una separación de aproximadamente 12 horas con o sin alimentos [ver *Farmacología clínica*]. INLYTA debe ingerirse entero con un vaso de agua.

No se debe administrar una dosis adicional si el paciente vomita u omite una dosis. La siguiente dosis indicada se debe tomar en el horario habitual.

### Lineamientos para la modificación de la dosis

El aumento o la reducción de la dosis se recomienda en función de la seguridad y la tolerabilidad individuales.

Durante el curso del tratamiento, pueden aumentar la dosis los pacientes que toleran INLYTA durante por lo menos dos semanas consecutivas sin reacciones adversas >grado 2 [según los Criterios Comunes de Toxicidad para Eventos Adversos (CTCAE, *por sus siglas en inglés*)] son normotensos y no reciben medicación antihipertensiva. Cuando se recomienda un aumento de la dosis de 5 mg dos veces al día, la dosis de INLYTA puede aumentarse a 7 mg dos veces al día y posteriormente a 10 mg dos veces al día usando el mismo criterio.

Durante el curso del tratamiento, el abordaje de algunas reacciones adversas puede requerir una interrupción temporaria o una discontinuación permanente o una reducción de la dosis de INLYTA [ver *Advertencias y precauciones*]. Si se requiere una reducción de la dosis de 5 mg dos veces al día, la dosis recomendada es de 3 mg dos veces al día. Si se requiere otra reducción de la dosis, la dosis recomendada es de 2 mg dos veces al día.

**Inhibidores potentes del CYP3A4/5:** debe evitarse el uso concomitante de inhibidores potentes del CYP3A4/5 (por ej. ketoconazol, itraconazol, claritromicina, atazanavir, indinavir, nefazodona, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telitromicina y voriconazol). Se recomienda la selección de un medicamento concomitante alternativo que no tenga o que tenga un potencial mínimo de inhibición del CYP3A4/5. Aunque el ajuste de dosis de INLYTA no se ha estudiado en pacientes que reciben inhibidores potentes del CYP3A4/5, si se debe administrar concomitantemente un inhibidor

LLD\_Arg\_USPIv4&v5\_16Aug2018&28Ene2020\_v1



potente del CYP3A4/5, se recomienda una disminución de la dosis de INLYTA en aproximadamente la mitad, ya que se prevé que esta reducción ajustará el área bajo la curva de la concentración plasmática de axitinib versus tiempo (AUC) al rango observado sin inhibidores. Las dosis posteriores pueden aumentarse o disminuirse según la seguridad y tolerabilidad individual. Si se suspende la administración concomitante del inhibidor potente, la dosis de INLYTA debe retornar (luego de 3–5 vidas medias del inhibidor) a la utilizada antes de comenzar con el inhibidor potente del CYP3A4/5 [ver *Interacciones medicamentosas y Farmacología clínica*].

*Deterioro de la función hepática:* no se requiere ningún ajuste de la dosis inicial cuando se administra INLYTA a pacientes con deterioro de la función hepática leve (Child-Pugh clase A). Con base en los datos farmacocinéticos, la dosis inicial de INLYTA debe reducirse en aproximadamente la mitad en pacientes con deterioro de la función hepática moderado inicial (Child-Pugh clase B). Las dosis posteriores pueden aumentarse o disminuirse con base en la seguridad y tolerabilidad individual. No se ha estudiado INLYTA en pacientes con deterioro de la función hepática severo (Child-Pugh clase C) [ver *Advertencias y precauciones, Uso en poblaciones específicas y Farmacología clínica*].

## CONTRAINDICACIONES

El uso de INLYTA está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al axitinib o a algún otro componente de INLYTA.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

### Hipertensión y crisis hipertensiva

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de pacientes con carcinoma de células renales (CCR), se informó hipertensión en 145 de 359 pacientes (40%) tratados con INLYTA y 103 de 355 pacientes (29%) tratados con sorafenib. La hipertensión de grado 3/4 se observó en 56 de 359 pacientes (16%) tratados con INLYTA y 39 de 355 pacientes (11%) tratados con sorafenib, mientras que se informaron crisis hipertensivas en 2 de los 359 pacientes (<1%) tratados con INLYTA y en ninguno de los pacientes tratados con sorafenib. El tiempo medio de aparición de la hipertensión (tensión arterial sistólica >150 mmHg o tensión arterial diastólica >100 mmHg) se observó dentro del primer mes del inicio del tratamiento con INLYTA y fueron informados aumentos de la tensión arterial apenas 4 días después de iniciado el tratamiento. La hipertensión fue tratada con un tratamiento antihipertensivo estándar. La interrupción del tratamiento con INLYTA debido a hipertensión se produjo en 1 de los 359 pacientes (<1%) que recibieron INLYTA y ninguno de los pacientes que recibieron sorafenib [ver *Reacciones adversas*].

Los niveles de tensión arterial deben estar controlados adecuadamente antes de iniciar el tratamiento con INLYTA. Los pacientes deben ser monitoreados en búsqueda de hipertensión y recibir tratamiento antihipertensivo estándar según se requiera. Si la hipertensión persiste, a pesar del tratamiento antihipertensivo, reducir la dosis de INLYTA. Si, pese al tratamiento antihipertensivo y la reducción de la dosis, la hipertensión continúa siendo severa y persistente, discontinuar la administración de INLYTA. La discontinuación del tratamiento con INLYTA debe considerarse también en caso de crisis hipertensiva. Si se interrumpe el tratamiento con INLYTA, debe controlarse la aparición de hipotensión en los pacientes que reciben medicación antihipertensiva [ver *Posología y administración*].

### Eventos tromboembólicos arteriales

En los estudios clínicos, se han informado eventos tromboembólicos arteriales, en algunos casos seguidos de muerte. En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de pacientes con CCR, se informaron eventos tromboembólicos arteriales de grado 3/4 en 4 de 359 pacientes (1%) tratados con INLYTA y 4 de 355 pacientes (1%) tratados con sorafenib. Se informó un caso de accidente cerebrovascular fatal en 1 de 359 pacientes (<1%) tratados con INLYTA y ningún caso entre los pacientes tratados con sorafenib [ver *Reacciones adversas*].

En los estudios clínicos con INLYTA, los eventos tromboembólicos arteriales (incluidos accidente isquémico transitorio, accidente cerebrovascular, infarto de miocardio y oclusión arterial retiniana) fueron informados en 17 de 715 pacientes (2%), con dos casos de muerte secundaria a accidente cerebrovascular.

LLD\_Arg\_USPIv4&v5\_16Aug2018&28Ene2020\_v1

INLYTA debe usarse con precaución en pacientes con riesgo o antecedentes de cualquiera de estos eventos. INLYTA no se estudió en pacientes que presentaron un evento tromboembólico arterial dentro de los 12 meses anteriores al estudio.

#### **Eventos tromboembólicos venosos**

En los estudios clínicos, se han informado eventos tromboembólicos venosos, en algunos casos seguidos de muerte. En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de pacientes con CCR, se informaron eventos tromboembólicos venosos en 11 de 359 pacientes (3%) tratados con INLYTA y 2 de 355 pacientes (1%) tratados con sorafenib. Se informaron eventos tromboembólicos venosos de grado 3/4 en 9 de 359 pacientes (3%) tratados con INLYTA (incluidos embolia pulmonar, trombosis venosa profunda, oclusión venosa retiniana y trombosis venosa retiniana) y 2 de 355 pacientes (1%) tratados con sorafenib. Se informó un caso de embolia pulmonar fatal entre los 359 pacientes (<1%) tratados con INLYTA y ningún caso entre los pacientes tratados con sorafenib. En los estudios clínicos con INLYTA, se informaron eventos tromboembólicos venosos en 22 de 715 pacientes (3%) y dos casos de muerte secundaria a embolia pulmonar.

INLYTA debe usarse con precaución en pacientes con riesgo o antecedentes de cualquiera de estos eventos. INLYTA no se estudió en pacientes que presentaron un evento tromboembólico venoso dentro de los 6 meses anteriores al estudio.

#### **Hemorragia**

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de pacientes con CCR, se informaron eventos hemorrágicos en 58 de 359 pacientes (16%) tratados con INLYTA y 64 de 355 pacientes (18%) tratados con sorafenib. Se observaron eventos hemorrágicos de grado 3/4 en 5 de 359 pacientes (1%) tratados con INLYTA (incluidos hemorragia cerebral, hematuria, hemoptisis, hemorragia digestiva baja y melena) y 11 de 355 pacientes (3%) tratados con sorafenib. Se informó 1 caso de hemorragia con desenlace fatal entre los 359 pacientes (<1%) que recibieron INLYTA (hemorragia gástrica) y 3 casos entre los 355 pacientes (1%) que recibieron sorafenib.

INLYTA no se estudió en pacientes con evidencia de metástasis cerebral no tratada o de hemorragia digestiva activa reciente y, por lo tanto, no debería administrarse a dichos pacientes. Si la hemorragia requiere intervención médica, la administración de INLYTA debe interrumpirse temporalmente.

#### **Insuficiencia cardíaca**

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de pacientes con CCR, se informó insuficiencia cardíaca en 6 de 359 pacientes (2%) tratados con INLYTA y 3 de 355 pacientes (1%) tratados con sorafenib. Se observó insuficiencia cardíaca de grado 3/4 en 2 de 359 pacientes (1%) tratados con INLYTA y 1 de 355 pacientes (<1%) tratados con sorafenib. Se informó insuficiencia cardíaca fatal en 2 de 359 pacientes (1%) tratados con INLYTA y 1 de 355 pacientes (<1%) tratados con sorafenib. Los signos o síntomas de insuficiencia cardíaca deben controlarse a lo largo del tratamiento con INLYTA. El manejo de la insuficiencia cardíaca puede requerir la discontinuación de forma permanente del tratamiento con INLYTA.

#### **Perforación gastrointestinal y formación de fístulas**

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de pacientes con CCR, se informó perforación gastrointestinal en 1 de 359 pacientes (<1%) tratados con INLYTA y ninguno de los pacientes tratados con sorafenib. En los estudios clínicos con INLYTA, se informó perforación gastrointestinal en 5 de 715 pacientes (1%), con un caso de desenlace fatal. Además de los casos de perforación gastrointestinal, se informó formación de fístulas en 4 de los 715 pacientes (1%).

La aparición de síntomas de perforación gastrointestinal o fístulas debe controlarse periódicamente a lo largo del tratamiento con INLYTA.

#### **Disfunción tiroidea**

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de pacientes con CCR, se informó hipotiroidismo en 69 de 359 pacientes (19%) tratados con INLYTA y 29 de 355 pacientes (8%) tratados con sorafenib e hipertiroidismo en 4 de 359 pacientes (1%) tratados con INLYTA y 4 de 355 pacientes (1%) tratados con sorafenib. En pacientes que

LLD\_Arg\_USPIv4&v5\_16Aug2018&28Ene2020\_v1

presentaron niveles de TSH (hormona estimulante de la tiroides)  $<5 \mu\text{U/ml}$  antes del tratamiento, se informaron elevaciones de la TSH a  $\geq 10 \mu\text{U/ml}$  en 79 de 245 pacientes (32%) que recibieron INLYTA y 25 de 232 pacientes (11%) que recibieron sorafenib [ver *Reacciones adversas*].

La función tiroidea debe controlarse antes de la iniciación y durante el transcurso del tratamiento con INLYTA. El hipotiroidismo y el hipertiroidismo deben tratarse según la práctica médica estándar de conservación del estado eutiroideo.

#### **Riesgo de deterioro de cicatrización de heridas**

La cicatrización de la herida puede ocurrir en pacientes que reciben medicamentos que inhiben la vía de señalización del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF). Por lo tanto, INLYTA tiene el potencial de afectar negativamente la cicatrización de heridas.

No use INLYTA durante al menos 2 días antes de la cirugía electiva. No administrar durante al menos 2 semanas después de una cirugía mayor y hasta una curación adecuada de la herida. No se ha establecido la seguridad para retomar INLYTA después de la resolución de las complicaciones de cicatrización de heridas.

#### **Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible**

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de pacientes con CCR, se informó síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible (SLPR) en 1 de 359 pacientes ( $<1\%$ ) tratados con INLYTA y ninguno de los pacientes tratados con sorafenib [ver *Reacciones adversas*]. Se informaron dos casos adicionales de SLPR en otros estudios clínicos con INLYTA.

El SLPR es un trastorno neurológico que puede presentarse con cefalea, convulsiones, letargo, confusión, ceguera y otros trastornos visuales y neurológicos. También puede presentarse hipertensión leve a severa. El diagnóstico de SLPR se confirma mediante resonancia magnética. Debe discontinuarse la administración de INLYTA en pacientes que desarrollan SLPR. Se desconoce la seguridad de reiniciar el tratamiento con INLYTA en pacientes que han experimentado SLPR con anterioridad.

#### **Proteinuria**

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de pacientes con CCR, se informó proteinuria en 39 de los 359 pacientes (11%) tratados con INLYTA y 26 de los 355 pacientes (7%) tratados con sorafenib. Se informó proteinuria de grado 3 en 11 de los 359 pacientes (3%) que recibieron INLYTA y 6 de los 355 pacientes (2%) que recibieron sorafenib [ver *Reacciones adversas*].

Se recomienda monitorear la presencia de proteinuria antes de la iniciación y durante el transcurso del tratamiento con INLYTA en forma periódica. En pacientes que desarrollan proteinuria moderada a severa, reducir la dosis o interrumpir temporalmente el tratamiento con INLYTA.

#### **Elevación de las enzimas hepáticas**

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de pacientes con CCR, se informaron elevaciones de la alanina aminotransferasa (ALT) de todos los grados en el 22% de los pacientes para ambos grupos de tratamiento, con eventos de grado 3/4 en  $<1\%$  de los pacientes tratados con INLYTA y 2% de los pacientes tratados con sorafenib.

Los niveles de alanina aminotransferasa (ALT), de aspartato aminotransferasa (AST) y de bilirrubina deben monitorearse antes de comenzar el tratamiento con INLYTA y periódicamente durante su transcurso.

#### **Deterioro de la función hepática**

La exposición sistémica a axitinib fue superior en individuos con deterioro moderado de la función hepática (clase B de la escala Child-Pugh) en comparación con los individuos cuya función hepática era normal. Se recomienda disminuir la dosis de INLYTA en pacientes con deterioro moderado de la función hepática (clase B de la escala Child-Pugh). INLYTA no se estudió en pacientes con deterioro de la función hepática severo (clase C de la escala Child-Pugh) [ver *Posología y administración, Uso en poblaciones específicas y Farmacología clínica*].

#### **Toxicidad Embrío-fetal**

LLD\_Arg\_USPIv4&v5\_16Aug2018&28Ene2020\_v1

En base a su mecanismo de acción y los hallazgos de estudios en animales INLYTA puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada. No se cuenta con datos en humanos para informar un riesgo asociado al medicamento. En estudios de toxicidad del desarrollo en ratones, axitinib mostró efectos teratogénicos, embriotóxicos y fetotóxicos a exposiciones maternas inferiores a las exposiciones humanas a las dosis clínicas recomendadas.

Informe a las mujeres en edad fértil del riesgo potencial para el feto y que utilicen métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con INLYTA y durante 1 semana después de la última dosis. Aconseje a los hombres con parejas femeninas en edad fértil que usen métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con INLYTA y durante 1 semana después de la última dosis. [ver *Uso en poblaciones específicas y Características Farmacológicas*].

## **INTERACCION CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCION**

### **Inhibidores del CYP3A4/5**

La coadministración de ketoconazol, un potente inhibidor del CYP3A4/5, incrementó la exposición plasmática de axitinib en voluntarios sanos. Debe evitarse la coadministración de INLYTA con inhibidores potentes del CYP3A4/5. El pomelo o el jugo de pomelo también pueden incrementar las concentraciones plasmáticas de axitinib, por lo que deben evitarse. Se recomienda seleccionar una medicación concomitante cuyo potencial de inhibir el CYP3A4/5 sea mínimo o nulo. Si la coadministración de un inhibidor potente del CYP3A4/5 es imprescindible, debe reducirse la dosis de INLYTA [ver *Posología y administración y Farmacología clínica*].

### **Inductores del CYP3A4/5**

La coadministración de rifampina, un potente inductor del CYP3A4/5, redujo la exposición plasmática de axitinib en voluntarios sanos. Debe evitarse la coadministración de INLYTA con potentes inductores del CYP3A4/5 (por ej., rifampina, dexametasona, fenitoína, carbamazepina, rifabutina, rifapentina, fenobarbital e hipérico). Se recomienda seleccionar una medicación concomitante cuyo potencial de inducir el CYP3A4/5 sea mínimo o nulo [ver *Posología y administración y Farmacología clínica*]. Los inductores moderados del CYP3A4/5 (por ej., bosentan, efavirenz, etravirina, modafinilo y nafcilina) también pueden reducir la exposición plasmática de axitinib, por lo que debe evitarse, de ser posible.

## **USO EN POBLACIONES ESPECIFICAS**

### ***Embarazo***

#### Resumen de Riesgos

En base a los hallazgos en estudios con animales y su mecanismo de acción, INLYTA puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada. No hay datos en humanos disponibles para informar el riesgo asociado con el medicamento. En estudios de toxicidad del desarrollo, axitinib fue teratogénico, embriotóxico y fetotóxico en ratones con exposiciones inferiores a la dosis inicial recomendada en humanos (ver Datos). Informe a las mujeres en edad fértil sobre el riesgo potencial para el feto.

Se desconoce el riesgo de fondo de defectos congénitos importantes y aborto espontáneo para las poblaciones indicadas.

#### Datos

##### *Datos de animales*

Axitinib oral administrado dos veces al día a ratones hembra antes del apareamiento y durante la primera semana de embarazo causó un aumento en la pérdida post-implantación a todos los niveles de dosis evaluados ( $\geq 15$  mg/kg/dosis, aproximadamente 10 veces la exposición sistémica (AUC) de los pacientes a la dosis inicial recomendada). En un estudio de toxicidad en el desarrollo embrionario-fetal, las hembras preñadas de ratón recibieron dosis orales de 0,15, 0,5 y 1,5 mg/kg/dosis de axitinib dos veces al día durante el período de organogénesis. Las toxicidades embrio-fetales observadas en ausencia de toxicidad materna incluyeron malformaciones (paladar hendido) a dosis de 1,5 mg/kg (aproximadamente 0,5 veces el AUC de los pacientes a la dosis inicial recomendada) y variaciones en la osificación de los huesos a una dosis  $\geq 0,5$  mg/kg (aproximadamente 0,15 veces el AUC de las pacientes a la dosis inicial recomendada).

### **Lactancia**

LLD\_Arg\_USPIv4&v5\_16Aug2018&28Ene2020\_v1

#### Resumen de Riesgos

No hay datos sobre la presencia de axitinib en la leche humana, o sus efectos en el niño amamantado o en la producción de leche. Debido al potencial de reacciones adversas graves de INLYTA en un niño amamantado, aconseje a las mujeres lactantes que no amamenten durante el tratamiento y durante 2 semanas después de la dosis final.

#### **Mujeres y hombres en edad fértil**

##### Prueba de embarazo

En base a los hallazgos en estudios con animales, INLYTA puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada (ver Uso en Poblaciones Específicas). Las mujeres en edad fértil deben hacerse una prueba de embarazo antes de comenzar el tratamiento con INLYTA.

##### Anticoncepción

###### *Mujeres*

INLYTA puede causar daño fetal cuando se administra a una mujer embarazada (ver Uso en Poblaciones Específicas). Aconseje a las mujeres en edad fértil que usen métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con INLYTA y durante 1 semana después de la última dosis.

###### *Hombres*

En base a los hallazgos en estudios con animales, aconseje a los hombres con parejas femeninas en edad fértil que usen métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento y durante 1 semana después de la última dosis.

##### Esterilidad

###### *Hombres y mujeres*

En base a los hallazgos en animales, INLYTA puede perjudicar la fertilidad en hombres y mujeres en edad fértil (ver Toxicología no clínica).

#### **Uso pediátrico**

No se han llevado a cabo estudios sobre la seguridad y la eficacia de INLYTA en pacientes pediátricos.

##### Datos de toxicidad en animales jóvenes

Se observaron toxicidades en los huesos y los dientes de ratones y perros inmaduros que recibieron axitinib oral dos veces al día durante 1 mes o más. En ratones y perros, los efectos óseos consistieron en engrosamiento de la placa de crecimiento a dosis  $\geq 15$  mg/kg (aproximadamente 6 y 15 veces, respectivamente, la exposición sistémica (AUC) de los pacientes a la dosis inicial recomendada). Se observaron anomalías de crecimiento en los incisivos (como caries dentales, maloclusiones y roturas o faltas dentarias) de ratones a los que se administró axitinib oral dos veces al día en dosis  $\geq 5$  mg/kg (aproximadamente 1,5 veces el AUC de los pacientes a la dosis inicial recomendada). No se estudiaron otras toxicidades de importancia potencial para los pacientes pediátricos en animales jóvenes.

#### **Uso geriátrico**

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de pacientes con CCR, 123 de los 359 pacientes (34%) tratados con INLYTA tenían 65 años o más. Aunque no se puede descartar una mayor sensibilidad en algunos individuos mayores, la seguridad y eficacia de INLYTA no mostró diferencias generales entre los pacientes  $\geq 65$  años y los pacientes más jóvenes.

No se requieren ajustes de dosis en los pacientes ancianos [ver *Posología y administración y Farmacología clínica*].

#### **Deterioro de la función hepática**

En un estudio especializado de deterioro de la función hepática comparada a sujetos con función hepática normal, la exposición sistémica posterior a una dosis única de INLYTA resultó similar en individuos con deterioro de la función hepática basal leve (clase A de la escala Child-Pugh) y más elevada en individuos con deterioro de la función hepática basal moderado (clase B de la escala Child-Pugh).

No se requiere ajuste de la dosis inicial cuando se administra INLYTA a pacientes con deterioro de la función hepática leve (clase A de la escala Child-Pugh). Se recomienda disminuir la dosis inicial cuando se administra INLYTA a pacientes

LLD\_Arg\_USPIv4&v5\_16Aug2018&28Ene2020\_v1

con deterioro de la función hepática moderado (clase B de la escala Child-Pugh) [ver *Posología y administración, Advertencias y precauciones y Farmacología clínica*].

No se realizaron estudios con INLYTA en pacientes con deterioro de la función hepática severo (clase C de la escala Child-Pugh).

#### **Deterioro de la función renal**

No se realizaron estudios especializados sobre deterioro de la función renal con axitinib. Basado en los análisis farmacocinéticos poblacionales, la depuración de axitinib no mostró diferencias significativas en pacientes con deterioro de la función renal leve a severo preexistente (15 ml/min  $\leq$  depuración de creatinina [Clcr] <89 ml/min) [ver *Farmacología clínica*]. No se necesita ajuste de la dosis inicial en pacientes con deterioro de la función renal leve a severo preexistente. Debe administrarse con cuidado en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal (Clcr <15 ml/min).

#### **REACCIONES ADVERSAS**

Las siguientes reacciones adversas clínicamente significativas se analizan en otra parte del prospecto (ver Advertencias y Precauciones)

- Hipertensión y crisis hipertensivas (ver Advertencias y Precauciones)
- Eventos tromboembólicos arteriales (ver Advertencias y Precauciones)
- Eventos tromboembólicos venosos (ver Advertencias y Precauciones)
- Hemorragia (ver Advertencias y Precauciones)
- Insuficiencia cardíaca (ver Advertencias y Precauciones)
- Perforación gastrointestinal y formación de fístulas (ver Advertencias y Precauciones)
- Disfunción tiroidea (ver Advertencias y Precauciones)
- Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible (ver Advertencias y Precauciones)
- Proteinuria (ver Advertencias y Precauciones)
- Elevación de las enzimas hepáticas (ver Advertencias y Precauciones)
- Insuficiencia hepática (ver Advertencias y Precauciones)

#### **Experiencia en Estudios Clínicos**

Dado que los estudios clínicos se llevan a cabo bajo condiciones ampliamente variables, las tasas de reacciones adversas observadas en los estudios clínicos de un medicamento no pueden compararse directamente con las tasas observadas en los estudios clínicos de otro medicamento y no siempre reflejan las tasas observadas en la práctica clínica. Se evaluó la seguridad de INLYTA en 715 pacientes que participaron en estudios con monoterapia, de los cuales 537 presentaban un CCR avanzado. Los datos descriptos [ver *Reacciones adversas*] reflejan exposición a INLYTA en 359 pacientes con CCR avanzado que participaron en un estudio clínico aleatorizado de comparación con sorafenib [ver *Estudios clínicos*].

La mediana de la duración del tratamiento fue de 6,4 meses (rango: 0,03 a 22,0) para los pacientes que recibieron INLYTA y de 5,0 meses (rango: 0,03 a 20,1) para los pacientes que recibieron sorafenib. Se indicaron modificaciones de dosis o retraso temporal del tratamiento debido a una reacción adversa en 199 de los 359 pacientes (55%) que recibieron INLYTA y 220 de los 355 pacientes (62%) que recibieron sorafenib. Se informó discontinuación permanente debido a reacción adversa en 34 de los 359 pacientes (9%) tratados con INLYTA y 46 de los 355 pacientes (13%) tratados con sorafenib.

Las reacciones adversas más frecuentes ( $\geq 20\%$ ) observadas después del tratamiento con INLYTA fueron diarrea, hipertensión, fatiga, disminución del apetito, náuseas, disfonía, síndrome de eritrodisestesia palmo-plantar (mano-pie), pérdida de peso, vómitos, astenia y constipación. La tabla 2 detalla las reacciones adversas informadas en  $\geq 10\%$  de los pacientes que recibieron INLYTA o sorafenib.

**Tabla 2. Reacciones adversas informadas en  $\geq 10\%$  de los pacientes tratados con INLYTA o sorafenib**

Reacción adversa <sup>a</sup>	INLYTA	Sorafenib
-------------------------------	--------	-----------

LLD\_Arg\_USPIv4&v5\_16Aug2018&28Ene2020\_v1

	(N=359)		(N=355)	
	Todos los grados <sup>b</sup>	Grado 3/4	Todos los grados <sup>b</sup>	Grado 3/4
	%	%	%	%
Diarrea	55	11	53	7
Hipertensión	40	16	29	11
Fatiga	39	11	32	5
Disminución del apetito	34	5	29	4
Náuseas	32	3	22	1
Disfonía	31	0	14	0
Síndrome de eritrodisestesia palmo-plantar	27	5	51	16
Pérdida de peso	25	2	21	1
Vómitos	24	3	17	1
Astenia	21	5	14	3
Constipación	20	1	20	1
Hipotiroidismo	19	<1	8	0
Tos	15	1	17	1
Inflamación de las mucosas	15	1	12	1
Artralgia	15	2	11	1
Estomatitis	15	1	12	<1
Disnea	15	3	12	3
Dolor abdominal	14	2	11	1
Cefalea	14	1	11	0
Dolor en las extremidades	13	1	14	1
Erupción cutánea	13	<1	32	4
Proteinuria	11	3	7	2
Disgeusia	11	0	8	0
Sequedad de piel	10	0	11	0
Dispepsia	10	0	2	0
Prurito	7	0	12	0
Alopecia	4	0	32	0
Eritema	2	0	10	<1

<sup>a</sup>Los porcentajes corresponden a eventos de toda causa, emergentes del tratamiento.

<sup>b</sup>Criterios Terminológicos Comunes del Instituto Nacional del Cáncer para los Eventos Adversos, Versión 3.0

Las reacciones adversas específicas (de todos los grados) que fueron informadas en <10% de los pacientes tratados con INLYTA incluyeron mareos (9%), dolor abdominal superior (8%), mialgia (7%), deshidratación (6%), epistaxis (6%), anemia (4%), hemorroides (4%), hematuria (3%), acúfenos (3%), elevación de la lipasa (3%), glosodinia (3%), embolia pulmonar (2%), hemorragia rectal (2%), hemoptisis (2%), trombosis venosa profunda (1%), trombosis/oclusión venosa-retiniana (1%), policitemia (1%), y accidente isquémico transitorio (1%).

La tabla 3 presenta las alteraciones de laboratorio más frecuentes informadas en ≥10% de los pacientes que recibieron INLYTA o sorafenib.

**Tabla 3. Alteraciones de laboratorio informadas en ≥10% de los pacientes que recibieron INLYTA o sorafenib**

Alteraciones de laboratorio	N	INLYTA		N	Sorafenib	
		Todos los grados <sup>a</sup> %	Grado 3/4 %		Todos los grados <sup>a</sup> %	Grado 3/4 %
<b>Hematológicas</b>						

LLD\_Arg\_USPIv4&v5\_16Aug2018&28Ene2020\_v1

Disminución de la hemoglobina	320	35	<1	316	52	4
Disminución (absoluta) de los linfocitos	317	33	3	309	36	4
Disminución de las plaquetas	312	15	<1	310	14	0
Disminución de los glóbulos blancos	320	11	0	315	16	<1
<b>Químicas</b>						
Aumento de la creatinina	336	55	0	318	41	<1
Disminución del bicarbonato	314	44	<1	291	43	0
Hipocalcemia	336	39	1	319	59	2
Elevación de la FAL	336	30	1	319	34	1
Hiperglucemia	336	28	2	319	23	2
Elevación de la lipasa	338	27	5	319	46	15
Elevación de la amilasa	338	25	2	319	33	2
Elevación de la ALT	331	22	<1	313	22	2
Elevación de la AST	331	20	<1	311	25	1
Hipernatremia	338	17	1	319	13	1
Hipoalbuminemia	337	15	<1	319	18	1
Hipercalcemia	333	15	3	314	10	3
Hipoglucemia	336	11	<1	319	8	<1
Hiponatremia	338	13	4	319	11	2
Hipofosfatemia	336	13	2	318	49	16

\*Criterios Terminológicos Comunes del Instituto Nacional del Cáncer para los Eventos Adversos, Versión 3.0

FAL: fosfatasa alcalina; ALT: alanina aminotransferasa; AST: aspartato aminotransferasa

Las alteraciones de laboratorio específicas (de todos los grados) informadas en <10% de los pacientes tratados con INLYTA incluyeron elevación de la hemoglobina (por encima del límite superior de la normalidad) (9% para INLYTA versus 1% para sorafenib) e hipercalcemia (6% para INLYTA frente al 2% para sorafenib).

### **SOBREDOSIS**

No existe tratamiento específico para la sobredosis de INLYTA.

En un estudio clínico controlado con INLYTA para el tratamiento de pacientes con CCR, se informaron mareos (grado 1) en un paciente que recibió una dosis de 20 mg dos veces al día durante 4 días por error.

En un estudio clínico de determinación de dosis con INLYTA, los individuos que recibieron dosis iniciales de 10 mg dos veces al día o de 20 mg dos veces al día experimentaron reacciones adversas que incluyeron hipertensión, convulsiones asociadas a hipertensión y hemoptisis fatal.

Ante la sospecha de sobredosis, suspender INLYTA e instituir medidas de soporte.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
- Hospital A. Posadas: (011) 4658-7777 / 4654-6648

### **PRESENTACIONES**

**INLYTA 1 mg:** envase con 56 comprimidos.

**INLYTA 5 mg:** envase con 56 comprimidos.

### **CONSERVACIÓN**

Conservar a temperatura entre 20-25 °C; con excursiones permitidas entre 15 °C a 30 °C. Almacenar en su envase original.

### **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**No utilizar después de la fecha de vencimiento.**

LLD\_Arg\_USPIv4&v5\_16Aug2018&28Ene2020\_v1



**Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción médica y no puede repetirse sin una nueva receta médica.**

E.M.A.M.S. Certificado N°56990

Elaborado y acondicionado por: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Freiburg, Alemania.

Importado por: Pfizer SRL, Carlos Berg 3669, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Directora Técnica: Sandra B. Maza, Farmacéutica.

Para mayor información con respecto al producto, comunicarse al teléfono (011) 4788-7000

Fecha última revisión: \_\_\_\_\_

LPD: 28 de Enero de 2020

**PARA URUGUAY:**

Importa y representa Warner Lambert del Uruguay S.A. - DT: QF Laura Conti – Dr. Luis Bonavita 1266 Of. 504, WT – Torre IV, Montevideo

Venta bajo receta profesional

LLD\_Arg\_USPIv4&v5\_16Aug2018&28Ene2020\_v1



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-36623218 PROSP

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2020.11.09 10:23:24 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2020.11.09 10:23:24 -03:00

**INLYTA**  
**Axitinib**  
**Comprimidos recubiertos**

“CONSULTE A SU MÉDICO”

**QUÉ ES INLYTA Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

Inlyta es un medicamento de venta bajo receta, utilizado para el tratamiento de pacientes con cáncer de riñón avanzado [carcinoma de células renales (CCR) avanzado] cuando un tratamiento previo con otro medicamento para dicha enfermedad no funcionó. Se desconoce si INLYTA es seguro o efectivo en niños.

**ANTES DE USAR INLYTA**

Antes de usar INLYTA debería informarle a su médico si:

- tiene hipertensión arterial
- tiene problemas de tiroides
- tiene problemas de hígado
- tiene antecedentes de coágulos en sus venas o arterias (tipos de vasos sanguíneos), incluyendo accidente cerebrovascular, ataque cardíaco, o cambios en la visión
- tiene cualquier problema de sangrado
- tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca
- tiene una herida no cicatrizada
- tiene una cirugía programada o ha tenido una cirugía reciente. Debería dejar de tomar INLYTA por lo menos 2 días antes de la cirugía planificada ver “Efectos Indeseables”.
- tiene alguna otra condición médica

En el caso de las mujeres, debería informarle a su médico si:

- está embarazada o planea estarlo. Tomar INLYTA durante su embarazo puede dañar a su bebe. No debería quedar embarazada mientras esté bajo tratamiento con INLYTA. Informe a su médico si está embarazada o planea estarlo.
- está en condiciones de quedar embarazada. Usted debería hacerse una prueba de embarazo antes de iniciar INLYTA. Debería usar un método anticonceptivo efectivo durante su tratamiento con INLYTA y durante al menos una semana después de la última dosis de INLYTA. Hable con su médico acerca de los métodos anticonceptivos que puede utilizar para prevenir quedar embarazada durante su tratamiento con INLYTA.
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si INLYTA pasa a la leche materna. No dé de amamantar durante el tratamiento y durante al menos dos semanas luego de tomar la última dosis de INLYTA.

En el caso de los hombres en pareja con mujeres en condiciones de quedar embarazadas:

- Utilice un método anticonceptivo efectivo durante su tratamiento con INLYTA y durante al menos una semana después de la última dosis de INLYTA.
- Si su pareja queda embarazada durante su tratamiento con INLYTA, informe inmediatamente a su médico.

**Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma**, incluyendo medicamentos de venta bajo receta y de venta libre, vitaminas y suplementos herbarios. Utilizar INLYTA con ciertos medicamentos puede causar efectos adversos serios.

Hable con su proveedor de atención médica antes de comenzar a tomar cualquier medicamento nuevo. Conozca los medicamentos que toma. Mantenga una lista de ellos para mostrarle a su proveedor de atención médica y farmacéutico cuando obtenga un medicamento nuevo.

### CÓMO USAR INLYTA

- Tome INLYTA exactamente como se lo indicó su médico
- Su médico puede cambiarle la dosis si fuera necesario
- INLYTA puede ser ingerido con o sin alimentos
- Tome INLYTA dos veces por día aproximadamente cada 12 horas
- Tome el comprimido de INLYTA entero con un vaso de agua
- Su médico debería tomarle la presión sanguínea regularmente durante su tratamiento con INLYTA
- Si vomita u omite una dosis de INLYTA tome su próxima dosis en el horario regular. No tome dos dosis de INLYTA a la vez.
- Si tomó demasiado INLYTA, llame a su médico inmediatamente o vaya a la emergencia del hospital más cercano.

### QUÉ DEBERÍA EVITAR MIENTRAS USA INLYTA

No tome jugo de pomelo ni consuma pomelo. El pomelo puede incrementar la concentración de INLYTA en su sangre.

### EFECTOS INDESEABLES

INLYTA puede causar efectos indeseables serios, incluyendo:

- **Hipertensión arterial:** Su médico debería controlar su presión sanguínea regularmente durante el tratamiento con INLYTA. Si usted presentara problemas de hipertensión arterial, su médico puede prescribirle un medicamento para tratar la hipertensión, disminuir la dosis o interrumpir su tratamiento con INLYTA.
- **Problemas de coágulos sanguíneos en sus venas o arterias:** INLYTA puede provocar coágulos sanguíneos que pueden ser serios y en algunos casos provocar la muerte. Solicite ayuda de emergencia y llame a su médico si presenta alguno de los siguientes síntomas:
  - Dolor o sensación de presión en el pecho
  - Dolor en sus brazos, espalda, cuello o mandíbula
  - Falta de aire
  - Falta de sensibilidad, o debilidad en alguna parte de su cuerpo
  - Dificultad para hablar
  - Dolor de cabeza
  - Cambios en la visión
- **Sangrado:** INLYTA puede causar sangrado que puede ser serio, y algunas veces llevar a muerte. Llame a su médico inmediatamente o busque ayuda médica si desarrolla alguno de los siguientes signos o síntomas:
  - Sangrado inesperado o sangrado que dura mucho tiempo, tales como:
    - Sangrado inusual de las encías
    - Sangrado menstrual o vaginal que es mayor a lo normal
    - Sangrado que es severo o no puede controlar
    - Orina rosada o marrón
    - Depositiones rojas o negras (similares al alquitrán)
    - Moretones/contusiones que ocurren sin causa conocida o que aumentan de tamaño
    - Presenta tos con sangre o coágulos sanguíneos
    - Vomita con sangre o presenta vómitos que parecen “borra de café”
  - Dolor inesperado, hinchazón/tumefacción o dolor de articulaciones
  - Dolor de cabeza, sensación de mareo o debilidad
- **Insuficiencia cardíaca:** Su médico debería controlarlo regularmente por signos o síntomas de insuficiencia cardíaca durante su tratamiento con INLYTA. La insuficiencia cardíaca puede ser seria y en algunos casos provocar la muerte. Avise a su médico si tiene alguno de los siguientes síntomas durante el tratamiento con INLYTA:
  - Cansancio
  - Hinchazón del área del estómago (abdomen), piernas o tobillos

- Falta de aire
- Venas del cuello que sobresalen (protruyen)
- **Desgarro en la pared del estómago o intestino (perforación):** Un desgarro o perforación en la pared del estómago o intestino puede ser serio o en algunos casos provocar la muerte. Solicite ayuda médica de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas:
  - Dolor de estómago (abdominal) severo o que no resuelve
  - Vómito con sangre
  - Deposiciones rojas o negras
- **Problemas en la glándula tiroides:** Su médico debería realizarle pruebas sanguíneas para controlar la función de su glándula tiroides antes y durante el tratamiento con INLYTA. Informe a su médico si presenta alguno de los siguientes síntomas durante el tratamiento con INLYTA:
  - Cansancio que empeora o no resuelve
  - Sensación de calor o frío
  - Voz ronca
  - Aumento o pérdida de peso
  - Caída del cabello
  - Calambres o dolores musculares
- **Riesgo de problemas de cicatrización de heridas:** Las heridas pueden no sanar adecuadamente durante el tratamiento con INLYTA. Informe a su proveedor de atención médica si planea someterse a una cirugía antes de comenzar o durante el tratamiento con INLYTA.
  - Debe dejar de tomar INLYTA al menos 2 días antes de la cirugía planificada.
  - Su proveedor de atención médica debe informarle cuándo puede comenzar a tomar INLYTA nuevamente después de la cirugía.
- **Síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible (SLPR):** Una condición llamada síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible (SLPR) puede aparecer mientras toma INLYTA. Informe a su médico inmediatamente si presenta:
  - Dolor de cabeza
  - Convulsiones
  - Debilidad
  - Confusión
  - Hipertensión arterial
  - Ceguera o cambios en la visión
  - Dificultad para pensar
- **Incremento de proteínas en la orina:** Su médico debería controlar las proteínas en su orina antes y durante su tratamiento con INLYTA. Si desarrolla proteínas en la orina, su médico puede disminuir la dosis de INLYTA o interrumpir el tratamiento.
- **Cambios en la función del hígado:** Su médico debería realizarle análisis de sangre para controlar la función de su hígado antes y durante el tratamiento con INLYTA.

Los efectos indeseables más comunes del tratamiento con INLYTA incluyen:

- Diarrea (deposiciones frecuentes o blandas)
- Cansancio o debilidad
- Disminución del apetito
- Náuseas
- Ronquera
- Erupciones, enrojecimiento, picazón o descamación de la piel de sus manos o pies
- Descenso de peso

- Vómitos
- Constipación

INLYTA puede causar problemas de fertilidad en hombres y mujeres, lo que puede afectar su capacidad de tener un hijo. Hable con su proveedor de atención médica si esto le preocupa.

Estos no son todos los posibles efectos indeseables de INLYTA.

Informe a su médico si tiene algún efecto indeseable que lo molesta o no resuelve.

***“Este medicamento ha sido prescrito sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas”.***

#### **PRESENTACIONES**

**INLYTA 1 mg:** envase con 56 comprimidos.

**INLYTA 5 mg:** envase con 56 comprimidos.

#### **CONSERVACIÓN**

Conservar a temperatura entre 20-25 °C; con excursiones permitidas entre 15 °C a 30 °C. Almacenar en su envase original.

#### **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**No utilizar después de la fecha de vencimiento.**

**Este medicamento debe ser usado exclusivamente bajo prescripción médica y no puede repetirse sin una nueva receta médica.**

E.M.A.M.S. Certificado N°56990

Elaborado y acondicionado por: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Freiburg, Alemania.

Importado por: Pfizer SRL, Carlos Berg 3669, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Directora Técnica: Sandra B. Maza, Farmacéutica.

Para mayor información respecto del producto comunicarse al teléfono (011) 4788-7000

Fecha última revisión: .../.../...

LPD: 28 de Enero de 2020

***“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT:***

***[http:// www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp](http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp) o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234”***



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2020-36623218 INF PAC

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2020.11.09 10:23:43 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2020.11.09 10:23:44 -03:00