



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Disposición

Número: DI-2024-433-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 12 de Enero de 2024

Referencia: 1-0047-2000-000361-18-1

VISTO el Expediente N° 1-0047-2000-000361-18-1 del Registro de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA y

CONSIDERANDO:

Que por las referidas actuaciones la firma BAYER S.A. solicita se autorice la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de esta ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA de una nueva especialidad medicinal que será elaborada en la República Argentina.

Que de la mencionada especialidad medicinal existe un producto similar autorizado para su consumo público en al menos un país incluido en el Anexo I del Decreto N° 150/92 (t.o. 1993).

Que las actividades de elaboración y comercialización de especialidades medicinales se encuentran contempladas en la Ley 16.463 y en los Decretos Nros. 9.763/64 y 150/92 (t.o. 1993) y sus normas complementarias.

Que la solicitud efectuada encuadra en el Artículo 3° del Decreto N° 150/92 (t.o. 1993).

Que el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICAMENTOS (INAME) emitió los informes técnicos pertinentes en los que constan los Datos Identificatorios Característicos aprobados por cada una de las referidas áreas para la especialidad medicinal cuya inscripción se solicita, los que se encuentran transcritos en el certificado que obra en el Anexo de la presente disposición.

Que asimismo, de acuerdo con lo informado por el INAME, el/los establecimiento/s que realizará/n la elaboración y el control de calidad de la especialidad medicinal en cuestión demuestran aptitud a esos efectos.

Que se aprobaron los proyectos de rótulos y prospectos correspondientes.

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS ha tomado la intervención de su competencia.

Que por lo expuesto corresponde autorizar la inscripción en el REM de la especialidad medicinal solicitada.

Que se actúa en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto Nro. 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la firma BAYER S.A. la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM) de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA de la especialidad medicinal de nombre comercial SUPRADYN FORTE NF y nombre/s genérico/s ACIDO PANTOTENICO - FILOQUINONA - TIAMINA - TOCOFEROL - MAGNESIO - MANGANESO - PIRIDOXINA - ACIDO ASCORBICO - ACIDO FOLICO - BIOTINA - CALCIO - CIANOCOBALAMINA - COBRE - COLECALCIFEROL - HIERRO - IODO - NICOTINAMIDA - RETINOL - RIBOFLAVINA - SELENIO - ZINC - FLUOR - FOSFORO , la que será elaborada en la República Argentina de acuerdo con los datos identificatorios característicos incluidos en el Certificado de Inscripción, según lo solicitado por la firma BAYER S.A. .

ARTÍCULO 2º.-Autorízanse los textos de los proyectos de rótulo/s y de prospecto/s que obran en los documentos denominados: INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE_VERSION03.PDF / 0 - 21/12/2022 19:37:31, PROYECTO DE PROSPECTO_VERSION03.PDF / 0 - 21/12/2022 19:37:31, PROYECTO DE RÓTULO DE ENVASE PRIMARIO_VERSION02.PDF / 0 - 14/05/2021 14:40:48, PROYECTO DE RÓTULO DE ENVASE SECUNDARIO_VERSION02.PDF / 0 - 14/05/2021 14:40:48 .

ARTÍCULO 3º.- En los rótulos y prospectos autorizados deberá figurar la leyenda: “ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD CERTIFICADO N°”, con exclusión de toda otra leyenda no contemplada en la norma legal vigente.

ARTÍCULO 4º.- Con carácter previo a la comercialización de la especialidad medicinal cuya inscripción se autoriza por la presente disposición, el titular deberá notificar a esta Administración Nacional la fecha de inicio de la elaboración del primer lote a comercializar a los fines de realizar la verificación técnica consistente en la constatación de la capacidad de producción y de control correspondiente.

ARTÍCULO 5º.- La vigencia del Certificado mencionado en el Artículo 1º de la presente disposición será de cinco (5) años 5 años contados a partir de la fecha impresa en él.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Inscríbese el nuevo producto en el Registro de Especialidades Medicinales. Notifíquese electrónicamente al interesado la presente disposición y los proyectos de rótulos y prospectos aprobados. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-0047-2000-000361-18-1

rp

Digitally signed by BISIO Nelida Agustina
Date: 2024.01.12 19:37:54 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Nelida Agustina Bisio
Administradora Nacional
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRÓNICA - GDE
Date: 2024.01.12 19:37:55 -03:00

PROYECTO DE RÓTULO SECUNDARIO

SUPRADYN® FORTE NF

VITAMINAS: A, B₁, B₂, B₃, B₅, B₆, B₉, B₁₂, C, D₃, E, K₁ y H

MINERALES: Ca, Fe y Cu

OLIGOELEMENTOS: Mg, Mn, P, F, I, Se y Zn

Comprimidos efervescentes

Venta bajo receta

Industria Argentina

COMPOSICIÓN

Cada comprimido efervescente de **SUPRADYN® FORTE NF** contiene 13 vitaminas: vitamina A (en forma de Vitamina A palmitato) 2.666 UI, vitamina B1 (en forma de Cloruro de Tiamina Esterfosfórico) 4,2 mg, vitamina B2 (en forma de Riboflavina Fosfato Sódico) 4,8 mg, vitamina B6 (en forma de Clorhidrato de Piridoxina) 6,0 mg, vitamina B12 (en forma de Cianocobalamina) 0,003 mg, vitamina C 180 mg, vitamina D3 (en forma de Colecalciferol) 200 UI, vitamina E (como DL- α tocoferol acetato) 10 mg, Vitamina K1 0,03 mg, biotina 0,45 mg, ácido fólico 0,6 mg, nicotinamida 54 mg, ácido pantoténico (en forma de pantotenato de calcio) 18 mg; 10 minerales y oligoelementos: calcio (en forma de Fosfato ácido de calcio, Glicerofosfato de calcio, Pantotenato de calcio y Carbonato de calcio) 120 mg, magnesio (en forma de Fosfato ácido de Magnesio) 45 mg, fósforo (en forma de Fosfato ácido de calcio, Glicerofosfato de calcio y Fosfato ácido de Magnesio) 126,3 mg, hierro (en forma de Lactato Ferroso) 8,0 mg, manganeso (en forma de Sulfato de Manganeso) 1,8 mg, cobre (en forma de Gluconato de cobre) 0,9 mg, flúor (en forma de Fluoruro de Sodio) 1,5 mg, iodo (en forma de Ioduro de Potasio) 0,075 mg, selenio (en forma de Selenito de sodio) 0,055 mg, zinc (en forma de Citrato de zinc) 8,0 mg.

Excipientes: c.s.

Contiene aspartamo: Contraindicado para fenilcetonúricos.

POSOLOGÍA Y FORMAS DE ADMINISTRACIÓN

Ver prospecto adjunto.

Los comprimidos efervescentes se disuelven en un vaso con 200 ml de agua.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente hasta 25°C. Proteger de la humedad.

Este medicamento no debe ser utilizado después de la fecha de vencimiento señalada en el envase.

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Envases con 10, 30 y 60 comprimidos efervescentes.

Lote:

Vencimiento:

® Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Fabricado en Calle 3 y del Canal, Parque Industrial Pilar, por BAYER S.A.,

Ricardo Gutiérrez 3652 - (B1605EHD)

Munro, Buenos Aires, Argentina.

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° XXXX



FABRIZIO Silvia Marta
CUIL 23185977854

Supradyn Forte NF comp eff – CCDS 04



ROLE Jose Luis
CUIL 20165574789

Página 2 de 2



BISIO Nelida
Agustina
CUIL 27117706090

Página 2 de 2

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

SUPRADYN® FORTE NF **VITAMINAS, MINERALES Y OLIGOELEMENTOS** **Comprimidos Efervescentes**

Industria Argentina

Venta bajo receta.

Lea todo el prospecto detenidamente antes de tomar este medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna otra duda, pregunte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted. No debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, incluso si sus signos de enfermedad son los mismos que los suyos.
- Si considera que cualquiera de los eventos adversos que sufre es serio o si aprecia cualquier evento adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

Contenido del prospecto

1. ¿QUÉ ES SUPRADYN® FORTE NF Y CUANDO SE UTILIZA?
2. ¿QUÉ DEBE SABER ANTES DE TOMAR SUPRADYN® FORTE NF?
3. ¿CÓMO TOMAR SUPRADYN® FORTE NF?
4. POSIBLES EVENTOS ADVERSOS
5. CONSERVACIÓN DE SUPRADYN® FORTE NF
6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

Cada comprimido efervescente de **SUPRADYN® FORTE NF** contiene 13 vitaminas: vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, Vitamina K1, biotina, ácido fólico, nicotinamida, ácido pantoténico; 10 minerales y oligoelementos: calcio, magnesio, fósforo, hierro, manganeso, cobre, flúor, iodo, selenio, zinc.

1. ¿QUÉ ES SUPRADYN® FORTE NF Y CUANDO SE UTILIZA?

SUPRADYN® FORTE NF contiene 13 vitaminas en dosis equilibradas, así como minerales y oligoelementos esenciales. Las vitaminas son principios activos de

importancia vital que le son suministradas al organismo con la alimentación. Las sales minerales son indispensables para el metabolismo y como elementos constitutivos del organismo (por ejemplo, para los huesos y la sangre). Los oligoelementos son sustancias imprescindibles que nuestro cuerpo requiere apenas en cantidades mínimas. La alimentación cotidiana no siempre llega a cubrir las necesidades diarias de estas sustancias.

SUPRADYN® FORTE NF se utiliza para solucionar rápidamente los estados generales de carencia vitamínica y prevenir su aparición. Cubre la demanda incrementada de vitaminas y minerales, especialmente en caso de enfermedad, en momentos de mayor estrés, cansancio y en períodos de alta exigencia física.

Se recomienda el uso de SUPRADYN® FORTE NF cuando existe un riesgo de carencia de vitaminas o de sales minerales: durante la recuperación después de una enfermedad o una intervención quirúrgica, durante tratamientos para adelgazar o dietas especiales de larga duración, cuando se deben ingerir antibióticos, y en casos de consumo crónico de alcohol.

2. ¿QUÉ DEBE SABER ANTES DE TOMAR SUPRADYN® FORTE NF?

No debe utilizarse SUPRADYN® FORTE NF:

- Si ya existe un aumento de vitamina A y/o D (lo que se denomina hipervitaminosis)
- Si ingiere simultáneamente otros preparados que contienen vitamina A y/o D
- Si recibe un tratamiento con retinoides (por ejemplo para combatir el acné)
- Es alérgico a una o varias sustancias de la composición
- En caso de un nivel demasiado elevado de calcio en sangre (hipercalcemia)
- Con una función renal disminuida
- Tiene trastornos metabólicos de hierro y/o cobre
- Existe aumento de calcio en orina (hipercalciuria severa)
- Existe un aumento de magnesio y/o fosfato en sangre (hipermagnesemia, hiperfosfatemia)
- En pacientes con fenilcetonuria.

Se observó que un elevado suministro diario de SUPRADYN® FORTE NF, puede aumentar el riesgo de malformaciones en el feto (al contener vitamina A).

La sobredosificación continua de **vitamina D** puede provocar daño al feto y al recién nacido. SUPRADYN® FORTE NF no debe ser administrado con algún otro suplemento vitamínico, otro vitamínico/multivitamínico.

Interacciones

Interacciones con medicamentos

Cuando se utiliza de acuerdo a lo indicado no se esperan interacciones. De acuerdo a la información actualmente disponible existen interacciones potenciales para los componentes individuales de la fórmula.

El paciente debe informar al médico si recibe otra medicación o si está bajo tratamiento médico.

SUPRADYN® FORTE NF puede generar interacción con:

- Antibióticos orales y antivirales, antiácidos, levodopa, levotiroxina, tiroxina, bifosfonatos, penicilamina, trientina, digital y diuréticos tiazidicos: el calcio, magnesio, hierro, cobre y zinc afectan la absorción de estos medicamentos. Separar por lo menos 2 horas la administración entre las dos medicaciones.
- Levodopa: la vitamina B6, incluso en dosis bajas, acelera la metabolización de la levodopa provocando un efecto antagónico en el tratamiento de la Enfermedad de Parkinson. Este antagonismo es contrarrestado al combinar un inhibidor de la descarboxilasa.
- Anticoagulantes o drogas que afectan a la agregación plaquetaria: se ha reportado que la vitamina K debe ser utilizada con precaución en pacientes que reciben un tratamiento con anticoagulantes o drogas que afectan a la agregación plaquetaria.

Interacciones con alimentos

Se recomienda no consumir SUPRADYN® FORTE NF dos horas antes o 2 horas después de consumidos alimentos como la espinaca, el ruibarbo o los cereales integrales. El ácido oxálico y el ácido fítico contenido en estos alimentos pueden disminuir la absorción del calcio.

Empleo por pacientes con fenilcetonuria:

SUPRADYN® FORTE NF no debe ser administrado a pacientes con fenilcetonuria ya que

contiene una fuente de fenilalanina (Aspartame).

Empleo por pacientes con dieta Hiposódica:

SUPRADYN® FORTE NF contiene 301 mg de sodio por comprimido. Por consiguiente, se recomienda tener en cuenta para los pacientes que sigan una dieta hiposódica.

Efectos sobre la capacidad de conducir y la operación de maquinas

SUPRADYN® FORTE NF no afecta la capacidad de conducir, ni en el tránsito vial ni de operar maquinarias.

3. ¿CÓMO TOMAR SUPRADYN® FORTE NF?

Adultos y adolescentes a partir de los 12 años: 1 comprimido efervescente diario.

Los comprimidos efervescentes se disuelven en un vaso con 200 ml de agua. La dosis de 1 comprimido efervescente diario no debe ser excedida.

SUPRADYN® FORTE no debe utilizarse en niños menores a 12 años.

Sobredosis

Con la dosis recomendada, no existe ningún riesgo de sobredosificación.

Los síntomas iniciales de sobredosificación son inespecíficos como ser el inicio abrupto de dolor de cabeza, confusión, y molestias gastrointestinales como constipación, diarrea, náuseas y vómitos.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez – Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas – Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel.: (0221) 451-5555.

4. POSIBLES EVENTOS ADVERSOS

En la dosis recomendada, no se observaron efectos adversos importantes, incluso después de un periodo de administración de varios meses. Los efectos secundarios que se pueden producir son: trastornos leves de digestión (molestias abdominales, constipación, vómitos, diarreas y náuseas).

Y ocasionalmente puede darse una coloración amarillenta en la orina que carece de importancia y se debe al contenido de vitamina B2 (riboflavina).

Dosis muy altas de ciertos nutrientes, en particular la vitamina A, vitamina D, hierro y cobre pueden ser perjudiciales.

En casos muy raros ha habido reacción alérgica. Se incluye entre los síntomas: urticaria, edema facial, respiración sibilante, enrojecimiento de la piel, erupción, ampollas y shock.

Dolor de cabeza, mareos, insomnio, nerviosismo y aumento de calcio en orina (Hipercalciuria).

Si ocurrieran reacciones alérgicas el paciente deberá suspender la medicación y consultar al médico.

5. CONSERVACIÓN DE SUPRADYN® FORTE NF

Conservar a temperatura ambiente hasta 25°C. Proteger de la humedad.

6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL

Este medicamento no debe ser utilizado después de la fecha de vencimiento señalada en el envase.

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Contenido del producto:

Cada comprimido efervescente de **SUPRADYN® FORTE NF** contiene 13 vitaminas: vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, Vitamina K1, biotina, ácido fólico, nicotinamida, ácido pantoténico; 10 minerales y oligoelementos: calcio, magnesio, fósforo, hierro, manganeso, cobre, flúor, iodo, selenio, zinc.

Los demás componentes son: Ácido cítrico anhidro, Bicarbonato de sodio, Carbonato de sodio anhidro, Manitol, Povidona, Crospovidona, Ésteres de sacarosa de ácidos grasos, Cloruro de sodio, Aspartamo, Acesulfame de potasio, Betacaroteno 1%, Aroma naranja, Aroma limón, Sorbitol.

Presentación

Envases con 10, 30 y 60 comprimidos efervescentes.

® Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Bajo licencia de Bayer AG, Alemania

Fabricado en Calle 3 y del Canal, Parque Industrial Pilar por BAYER S.A.
Ricardo Gutiérrez 3652 (B1605HD), Munro, prov. de Buenos Aires, Argentina.
Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.
Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N° XXX

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234



ZUNINI BOURDÍN María Rafaela
CUIL 27316950537

Supradyn Forte NF comp eff – CCDS 04



BISIO Nelida
Agustina
CUIL 27117706090

Página 6 de 6

PROYECTO DE PROSPECTO

SUPRADYN® FORTE NF

VITAMINAS + MINERALES Y OLIGOELEMENTOS

Comprimidos efervescentes

Venta bajo receta

Industria Argentina

COMPOSICIÓN

Cada comprimido efervescente de **SUPRADYN® FORTE NF** contiene 13 vitaminas: vitamina A (en forma de Vitamina A palmitato) 2.666 UI, vitamina B1 (en forma de Cloruro de Tiamina Esterfosfórico) 4,2 mg, vitamina B2 (en forma de Riboflavina Fosfato Sódico) 4,8 mg, vitamina B6 (en forma de Clorhidrato de Piridoxina) 6,0 mg, vitamina B12 (en forma de Cianocobalamina) 0,003 mg, vitamina C 180 mg, vitamina D3 (en forma de Colecalciferol) 200 UI, vitamina E (como DL- α tocoferol acetato) 10 mg, Vitamina K1 0,03 mg, biotina 0,45 mg, ácido fólico 0,6 mg, nicotinamida 54 mg, ácido pantoténico (en forma de pantotenato de calcio) 18 mg; 10 minerales y oligoelementos: calcio (en forma de Fosfato ácido de calcio, Glicerofosfato de calcio, Pantotenato de calcio y Carbonato de calcio) 120 mg, magnesio (en forma de Fosfato ácido de Magnesio) 45 mg, fósforo (en forma de Fosfato ácido de calcio, Glicerofosfato de calcio y Fosfato ácido de Magnesio) 126,3 mg, hierro (en forma de Lactato Ferroso) 8,0 mg, manganeso (en forma de Sulfato de Manganeso) 1,8 mg, cobre (en forma de Gluconato de cobre) 0,9 mg, flúor (en forma de Fluoruro de Sodio) 1,5 mg, iodo (en forma de Ioduro de Potasio) 0,075 mg, selenio (en forma de Selenito de sodio) 0,055 mg, zinc (en forma de Citrato de zinc) 8,0 mg.

Excipientes: Ácido cítrico anhidro 1800 mg, Bicarbonato de sodio 950 mg, Carbonato de sodio anhidro 65 mg, Manitol 84,80 mg, Povidona 30 mg, Crospovidona 7 mg, Ésteres de sacarosa de ácidos grasos 0,15 mg, Cloruro de sodio 30 mg, Aspartamo 40 mg, Acesulfame de potasio 20 mg, Betacaroteno 1% 30 mg, Aroma naranja 100 mg, Aroma limón 20 mg, Sorbitol 255 mg (c.s.p. 4700 mg).

Contiene aspartamo: Contraindicado para fenilcetonúricos.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Aporte de vitaminas, minerales y oligoelementos.

Grupo farmacoterapéutico: Multivitamínicos y minerales/oligoelementos

Código ATC: A11AA03

INDICACIONES

SUPRADYN® FORTE NF contiene 13 vitaminas en dosis equilibradas, así como minerales y oligoelementos esenciales. Las vitaminas son principios activos de importancia vital que le son suministradas al organismo con la alimentación. Las sales minerales son indispensables para el metabolismo y como elementos constitutivos del organismo (por ejemplo, para los huesos y la sangre). Los oligoelementos son sustancias imprescindibles que nuestro cuerpo requiere apenas en cantidades mínimas. La alimentación cotidiana no siempre llega a cubrir las necesidades diarias de estas sustancias.

SUPRADYN® FORTE NF se utiliza para solucionar rápidamente los estados generales de carencia vitamínica y prevenir su aparición. Cubre la demanda incrementada de vitaminas y minerales, especialmente en caso de enfermedad, en momentos de mayor estrés, cansancio y en períodos de alta exigencia física.

Se recomienda el uso de SUPRADYN® FORTE NF cuando existe un riesgo de carencia de vitaminas o de sales minerales: durante la recuperación después de una enfermedad o una intervención quirúrgica, durante tratamientos para adelgazar o dietas especiales de larga duración, cuando se deben ingerir antibióticos, y en casos de consumo crónico de alcohol.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Propiedades farmacodinámicas:

SUPRADYN® FORTE NF comprimidos efervescentes es un preparado multivitamínico / multimineral que contiene vitaminas, en combinación con minerales y oligoelementos diseñado para asegurar el aporte adecuado de micronutrientes en pacientes con riesgo aumentado de deficiencia o con aumento de sus requerimientos.

Las cantidades de vitaminas, minerales y trazas de oligoelementos de SUPRADYN® FORTE NF comprimidos efervescentes se basan en la Cantidad Diaria Recomendada (CDR) propuesta por el Consejo Europeo y el Instituto de Medicina de USA.

Las vitaminas son nutrientes esenciales. Son indispensables en el metabolismo de los hidratos de carbono, energético, de los lípidos, de los ácidos nucleicos y de las proteínas, así como también en la síntesis de los aminoácidos, del colágeno, de los neurotransmisores, etc.

Además de su participación en las reacciones metabólicas básicas, las vitaminas están involucradas en la regulación y coordinación de los procesos metabólicos. Las vitaminas son esenciales en el desarrollo óseo, en la cicatrización, la integridad vascular, en el metabolismo microsomal de drogas y de desintoxicación, en la función inmunitaria, en el desarrollo y diferenciación celular, etc.

Además de las conocidas consecuencias provocadas por deficiencias vitamínicas, existe información creciente que evidencia la importancia del balance de vitaminas en la prevención de enfermedades y en el mantenimiento de la salud y el rendimiento físico y mental.

Los minerales y los oligoelementos son nutrientes esenciales. Intervienen en diferentes funciones: *catalíticas* (numerosas reacciones enzimáticas); *estructurales* (enzimas, hormonas, neuropéptidos, receptores hormonales, huesos y dientes) y *funcionales* (metabolismo, transmisión nerviosa).

Una carencia de vitaminas y minerales puede originarse en las siguientes situaciones:

- Requerimientos aumentados debido a causas fisiológicas (crecimiento, embarazo, lactancia, senilidad, convalecencia, fatiga, tratamiento con antibióticos o debido a deficiencias causadas por medicación), factores socio-económicos o estilos de vida (ejercicio físico, consumo de alcohol o de drogas, exposición al humo de tabaco o a otros contaminantes).
- Ingesta disminuida (reducción de peso y dietas no balanceadas, desórdenes alimenticios, senilidad, enfermedad, trastornos gastrointestinales).

En estas situaciones, las deficiencias raramente afectan a una sola vitamina. Sumado a esto, frecuentemente se encuentran también comprometidos minerales y oligoelementos que a su vez son esenciales para muchos procesos metabólicos y estructuras dependientes de vitaminas. SUPRADYN® FORTE NF comprimidos efervescentes ha sido designado como un multivitamínico completo que ayuda a prevenir y tratar las deficiencias generales de vitaminas. La combinación de dosis de 3 CDR (Cantidad Diaria Recomendada) de vitaminas solubles en agua, con dosis de 1 CDR de vitaminas solubles en grasa permiten una mayor flexibilidad, eficacia y seguridad para enfrentar situaciones de mayor riesgo o deficiencia de las mismas, incorporando el consiguiente riesgo de una sobredosis de vitaminas liposolubles.

Propiedades farmacocinéticas

La salud y el bienestar humano dependen naturalmente de la absorción, de la distribución, del metabolismo y de la eliminación de las vitaminas que se mantienen por mecanismos fisiológicos específicos. Como SUPRADYN® FORTE NF comprimidos efervescentes se disuelve en forma completa o casi completa en el tracto gastrointestinal se asegura una buena disponibilidad de estos compuestos. No se han efectuado estudios farmacocinéticos específicos con SUPRADYN® FORTE NF comprimidos efervescentes, pero las propiedades farmacocinéticas de los componentes individuales se hallan ampliamente documentados en la bibliografía.

POSOLOGÍA Y FORMAS DE ADMINISTRACIÓN

Adultos y mayores de 12 años: 1 comprimido efervescente por día. Los comprimidos efervescentes se disuelven en un vaso con 200 ml de agua.

SUPRADYN® FORTE NF comprimidos efervescentes no debe utilizarse en niños menores a 12 años.

CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad a una o varias sustancias activas y/o a sus excipientes.
- Trastornos metabólicos de hierro y/o cobre.
- Hipervitaminosis A y/o D.
- Tratamiento con otros preparados que contienen vitamina A y/o D.
- Tratamiento sistémico con retinoides
- Hipercalcemia, hipercalcemia severa.
- Hiper magnesemia, hiperfosfatemia.
- Nefrolitiasis, urolitiasis o insuficiencia renal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

La dosis de 1 comprimido diario no debe ser excedida. Dosis muy altas de ciertos nutrientes, en particular la vitamina A, vitamina D, hierro y cobre pueden ser perjudiciales. En general no se observan reacciones adversas a las dosis recomendadas.

Debe prestarse atención cuando el paciente deba tomar algún suplemento vitamínico, otro vitamínico / multivitamínico o medicación que contenga vitamina D y/o A y calcio o deba recibir un tratamiento médico, p.ej. antagonistas de Vit. K y/u otro tratamiento

anticoagulante.

Interacciones con medicamentos

Cuando se utiliza de acuerdo a lo indicado no se esperan interacciones. De acuerdo a la información actualmente disponible existen interacciones potenciales para los componentes individuales de la fórmula.

El paciente debe informar al médico si recibe otra medicación o si está bajo tratamiento médico.

SUPRADYN® FORTE NF comprimidos efervescentes puede afectar la biodisponibilidad de las siguientes drogas:

- **Anticoagulantes** o drogas que afectan a la agregación plaquetaria: se ha reportado que la vitamina K debe ser utilizada con precaución en pacientes que reciben un tratamiento con anticoagulantes o drogas que afectan a la agregación plaquetaria.
- **Antibióticos orales y antivirales, antiácidos, levodopa, levotiroxina, tiroxina, bifosfonatos, penicilamina, trientina, digital y diuréticos tiazídicos:** el calcio, magnesio, hierro, cobre y zinc afectan la absorción de esos medicamentos. Separar por lo menos 2 horas la administración entre las dos medicaciones.
- **Levodopa:** la vitamina B6, incluso en dosis bajas, acelera la metabolización de la levodopa provocando un efecto antagónico en el tratamiento de la Enfermedad de Parkinson. Este antagonismo es contrarrestado al combinar un inhibidor de la descarboxilasa.

Interacciones con alimentos

Se recomienda no consumir SUPRADYN® FORTE NF comprimidos efervescentes dos horas antes o 2 horas después de consumidos alimentos como la espinaca, el ruibarbo o los cereales integrales. El ácido oxálico y el ácido fítico contenido en estos alimentos pueden disminuir la absorción del calcio.

Empleo por pacientes con fenilcetonuria:

SUPRADYN® FORTE NF comprimidos efervescentes no debe ser administrado a pacientes con fenilcetonuria ya que contiene una fuente de fenilalanina (Aspartame).

Empleo por pacientes con dieta Hiposódica:

SUPRADYN® FORTE NF comprimidos efervescentes contiene 301 mg de sodio por comprimido. Por consiguiente, se recomienda tener en cuenta para los pacientes que sigan una dieta hiposódica.

Embarazo, lactancia

SUPRADYN® FORTE NF comprimidos efervescentes puede ser utilizado durante el embarazo y la lactancia previa consulta médica. Las vitaminas y los minerales pueden ser tomados en las cantidades correspondientes a los requerimientos cotidianos pero no deben excederse las cantidades indicadas en "Posología y forma de administración".

Se ha demostrado el efecto teratogénico de la **vitamina A** cuando se administra en dosis mayores de 10.000 UI /día durante el primer trimestre de embarazo. La sobredosificación continua de **vitamina D** puede provocar daño al feto y al recién nacido. SUPRADYN® FORTE NF comprimidos efervescentes no debe ser administrado con algún otro suplemento vitamínico, otro vitamínico / multivitamínico o medicación que contenga isotretinoína, etretinato, beta caroteno o vitamina D debido a que altas dosis de los mismos son considerados dañinos para el feto.

Efectos en la capacidad para conducir y usar máquinas

No se han observado con este producto efectos sobre la habilidad para manejar y usar máquinas.

REACCIONES ADVERSAS

En general, el producto es bien tolerado. En casos raros se han informado síntomas gastrointestinales (molestias abdominales, constipación, vómitos, diarreas y náuseas).

En casos muy raros ha habido reacción alérgica. Se incluye entre los síntomas: urticaria, edema facial, respiración sibilante, enrojecimiento de la piel, erupción, ampollas y shock.

Si ocurrieran reacciones alérgicas el paciente deberá suspender la medicación y consultar al médico.

Desordenes del sistema nervioso:

Dolor de cabeza, mareos, insomnio, nerviosismo.

Desordenes nutricionales y de metabolismo:

Hipercalciuria.

Tras la ingestión de SUPRADYN® FORTE NF comprimidos efervescentes se presenta a veces una ligera coloración amarilla de la orina. Esta coloración es inofensiva y se debe exclusivamente a la eliminación de la vitamina B2, contenido en la preparación que es de color amarillo.

SOBREDOSIFICACIÓN

Con la dosis recomendada, no existe ningún riesgo de sobredosificación.

La mayoría, si no todos los reportes relacionados con sobredosificación se asocian con la toma concomitante de preparaciones vitamínicas conteniendo grandes cantidades de vitamina. Sobredosis aguda o durante un tiempo prolongado puede causar hipervitaminosis A y D, e hipercalcemia, así como toxicidad por hierro y cobre. Los síntomas iniciales de sobredosificación son inespecíficos como ser el inicio abrupto de dolor de cabeza, confusión, y molestias gastrointestinales como constipación, diarrea, náuseas y vómitos.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez – Tel.: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas – Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata – Tel.: (0221) 451-5555.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente hasta 25°C. Proteger de la humedad.

Este medicamento no debe ser utilizado después de la fecha de vencimiento señalada en el envase.

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Envases con 10, 30 y 60 comprimidos efervescentes.

® Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Fabricado en Calle 3 y del Canal, Parque Industrial Pilar, por BAYER S.A.,
Ricardo Gutiérrez 3652 - (B1605EHD)
Munro, Buenos Aires, Argentina.

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° XXXX

Versión: CCDS 04

Fecha última revisión:



ZUNINI BOURDÍN María Rafaela
CUIL 27316950537

Supradyn Forte NF comp eff – CCDS 04

Página 8 de 8



BISIO Nelida
Agustina
CUIL 27117706090

Página 8 de 8

PROYECTO DE RÓTULO PRIMARIO

SUPRADYN® FORTE NF

13 VITAMINAS + 10 MINERALES Y OLIGOELEMENTOS

Comprimidos efervescentes

Venta bajo receta

Industria Argentina

COMPOSICIÓN

Cada comprimido efervescente de **SUPRADYN® FORTE NF** contiene 13 vitaminas: vitamina A (en forma de Vitamina A palmitato) 2.666 UI, vitamina B1 (en forma de Cloruro de Tiamina Esterfosfórico) 4,2 mg, vitamina B2 (en forma de Riboflavina Fosfato Sódico) 4,8 mg, vitamina B6 (en forma de Clorhidrato de Piridoxina) 6,0 mg, vitamina B12 (en forma de Cianocobalamina) 0,003 mg, vitamina C 180 mg, vitamina D3 (en forma de Colecalciferol) 200 UI, vitamina E (como DL- α tocoferol acetato) 10 mg, Vitamina K1 0,03 mg, biotina 0,45 mg, ácido fólico 0,6 mg, nicotinamida 54 mg, ácido pantoténico (en forma de pantotenato de calcio) 18 mg; 10 minerales y oligoelementos: calcio (en forma de Fosfato ácido de calcio, Glicerofosfato de calcio, Pantotenato de calcio y Carbonato de calcio) 120 mg, magnesio (en forma de Fosfato ácido de Magnesio) 45 mg, fósforo (en forma de Fosfato ácido de calcio, Glicerofosfato de calcio y Fosfato ácido de Magnesio) 126,3 mg, hierro (en forma de Lactato Ferroso) 8,0 mg, manganeso (en forma de Sulfato de Manganeso) 1,8 mg, cobre (en forma de Gluconato de cobre) 0,9 mg, flúor (en forma de Fluoruro de Sodio) 1,5 mg, iodo (en forma de Ioduro de Potasio) 0,075 mg, selenio (en forma de Selenito de sodio) 0,055 mg, zinc (en forma de Citrato de zinc) 8,0 mg.

Excipientes: c.s.

Contiene aspartamo: Contraindicado para fenilcetonúricos.

POSOLOGÍA Y FORMAS DE ADMINISTRACIÓN

Los comprimidos efervescentes se disuelven en un vaso con 200 ml de agua. Ver prospecto adjunto.

CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente hasta 25°C. Proteger de la humedad.

Este medicamento no debe ser utilizado después de la fecha de vencimiento señalada en el envase.

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

® Marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Fabricado en Calle 3 y del Canal, Parque Industrial Pilar, por BAYER S.A.,

Ricardo Gutiérrez 3652 - (B1605EHD)

Munro, Buenos Aires, Argentina.

Director Técnico: José Luis Role, Farmacéutico.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° XXXX



FABRIZIO Silvia Marta
CUIL 23185977854

Supradyn Forte NF comp eff – CCDS 04



ROLE Jose Luis
CUIL 20165574789

Página 2 de 2



BISIO Nelida
Agustina
CUIL 27117706090

Página 2 de 2

5 de febrero de 2024

DISPOSICIÓN N° 433

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (REM)

CERTIFICADO N° 60053

TROQUELES

EXPEDIENTE N° 1-0047-2000-000361-18-1

Datos Identificatorios Característicos de la Forma Farmacéutica

Troquel

ACIDO PANTOTENICO 18 mg COMO PANTOTENATO DE CALCIONF - FILOQUINONA 0,03 mg -
 TIAMINA 4,2 mg COMO TIAMINA ESTER FOSFORICO CLORURONF - TOCOFEROL 10 mg
 COMO TOCOFEROL ACETATONF - MAGNESIO 45 mg COMO FOSFATO ACIDO DE
 MAGNESIONF - MANGANESO 1,8 mg COMO MANGANESO SULFATONF - PIRIDOXINA 6 mg
 COMO PIRIDOXINA CLORHIDRATONF - ACIDO ASCORBICO 180 mg - ACIDO FOLICO 0,6 mg -
 BIOTINA 0,45 mg - CALCIO 120 mg - CIANOCOBALAMINA 3 mg - COBRE 0,9 mg -
 COLECALCIFEROL 200 UI - HIERRO 8 mg COMO HIERRO LACTATONF - IODO 0,075 mg
 COMO IODURO DE POTASIONF - NICOTINAMIDA 54 mg - RETINOL 2666 UI COMO RETINOL
 PALMITATONF - RIBOFLAVINA 4,8 mg COMO RIBOFLAVINA FOSFATO SODICONF -
 SELENIO 0,055 mg COMO SELENITO DE SODIO ANHIDRONF - ZINC 8 mg COMO ZINC
 CITRATONF - FLUOR 1,5 mg COMO FLUORURO DE SODIONF - FOSFORO 126,3 mg -
 COMPRIMIDO EFERVESCENTE

676539



SIERRAS Roberto
Daniel
CUIL 20182858685

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Productos Médicos
Av. Belgrano 1480
(C1093AAP), CABA

INAME
Av. Caseros 2161
(C1264AAD), CABA

INAL
Estados Unidos 25
(C1087AAI), CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671
(C1087AAI), CABA

Sede Central
Av. de Mayo 869
(C1084AAD), CABA

Buenos Aires, 5 DE FEBRERO DE 2024.-

DISPOSICIÓN N° 433

ANEXO

**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (REM)****CERTIFICADO N° 60053**

La Administradora Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autorizó la inscripción en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), de un nuevo producto con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. DATOS DE LA EMPRESA TITULAR DEL CERTIFICADO

Razón Social: BAYER S.A.

N° de Legajo de la empresa: 6640

2. DATOS DE LA ESPECIALIDAD MEDICINAL

Nombre comercial: SUPRADYN FORTE NF

Nombre Genérico (IFA/s): ACIDO PANTOTENICO - FILOQUINONA - TIAMINA
- TOCOFEROL - MAGNESIO - MANGANESO - PIRIDOXINA - ACIDO
ASCORBICO - ACIDO FOLICO - BIOTINA - CALCIO - CIANOCOBALAMINA -
COBRE - COLECALCIFEROL - HIERRO - IODO - NICOTINAMIDA - RETINOL -
RIBOFLAVINA - SELENIO - ZINC - FLUOR - FOSFORO

Concentración: 18 mg - 0,03 mg - 4,2 mg - 10 mg - 45 mg - 1,8 mg - 6 mg

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina**Productos Médicos**
Av. Belgrano 1480
(C1093AAP), CABA**INAME**
Av. Caseros 2161
(C1264AAD), CABA**INAL**
Estados Unidos 25
(C1101AAA), CABA**Sede Alsina**
Alsina 665/671
(C1087AAI), CABA**Sede Central**
Av. de Mayo 869
(C1084AAD), CABA

- 180 mg - 0,6 mg - 0,45 mg - 120 mg - 3 mg - 0,9 mg - 200 UI - 8 mg - 0,075 mg - 54 mg - 2666 UI - 4,8 mg - 0,055 mg - 8 mg - 1,5 mg - 126,3 mg

Forma farmacéutica: COMPRIMIDO EFERVESCENTE

Fórmula Cualitativa y Cuantitativa por unidad de forma farmacéutica o porcentual

Ingrediente (s) Farmacéutico (s) Activo (s) (IFA)
ACIDO PANTOTENICO 18 mg - FILOQUINONA 0,03 mg - TIAMINA 4,2 mg - TOCOFEROL 10 mg - MAGNESIO 45 mg - MANGANESO 1,8 mg - PIRIDOXINA 6 mg - ACIDO ASCORBICO 180 mg - ACIDO FOLICO 0,6 mg - BIOTINA 0,45 mg - CALCIO 120 mg - CIANOCOBALAMINA 3 mg - COBRE 0,9 mg - COLECALCIFEROL 200 UI - HIERRO 8 mg - IODO 0,075 mg - NICOTINAMIDA 54 mg - RETINOL 2666 UI - RIBOFLAVINA 4,8 mg - SELENIO 0,055 mg - ZINC 8 mg - FLUOR 1,5 mg

Excipiente (s)
CARBONATO DE SODIO ANHIDRO 65 mg CROSPVIDONA 7 mg ACESULFAME POTASICO 20 mg ACIDO CITRICO ANHIDRO 1800 mg SORBITOL 265,5 mg CLORURO DE SODIO 30 mg AROMA DE NARANJA 100 mg BICARBONATO DE SODIO 950 mg POVIDONA 30 mg ASPARTAMO 40 mg AROMA DE LIMON 20 mg MANITOL 84,8 mg ESTERES DE SACAROSA DE ACIDOS GRASOS 0,15 mg BETA CAROTENO 1 % P/P 30 mg

Origen y fuente del/de los Ingrediente/s Farmacéutico/s Activo/s: SINTÉTICO O SEMISINTÉTICO

Envase Primario: TUBO ALU CON TAPA Y DESECANTE

Contenido por envase primario: 10 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES.

Accesorios: No corresponde

Contenido por envase secundario: 1, 3 O 6 TUBOS CON 10 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES.

Presentaciones: 10, 30, 60

Período de vida útil: 24 MESES

Conservación a temperatura ambiente: Hasta 25° C

Otras condiciones de conservación: PROTEGER DE LA HUMEDAD.

FORMA RECONSTITUIDA

Tiempo de conservación: No corresponde

Forma de conservación, desde: No corresponde Hasta: No corresponde

Otras condiciones de conservación: No corresponde

Condición de expendio: BAJO RECETA

Código ATC: A11AA03

Acción terapéutica: Aporte de vitaminas, minerales y oligoelementos.

Grupo farmacoterapéutico: Multivitamínicos y minerales/oligoelementos

Vía/s de administración: ORAL

Indicaciones: SUPRADYN® FORTE NF contiene 13 vitaminas en dosis equilibradas, así como minerales y oligoelementos esenciales. Las vitaminas son principios activos de importancia vital que le son suministradas al organismo con la alimentación. Las sales minerales son indispensables para el metabolismo y como elementos constitutivos del organismo (por ejemplo, para los huesos y la sangre). Los oligoelementos son sustancias imprescindibles que nuestro cuerpo requiere apenas en cantidades mínimas. La alimentación cotidiana no siempre llega a cubrir las necesidades diarias de estas sustancias. SUPRADYN® FORTE NF se utiliza para solucionar rápidamente los estados generales de carencia vitamínica y prevenir su aparición. Cubre la demanda incrementada de vitaminas y minerales, especialmente en caso de enfermedad, en momentos de mayor estrés, cansancio y en períodos de alta exigencia física. Se recomienda el uso de SUPRADYN® FORTE NF cuando existe un riesgo de carencia de vitaminas o de sales minerales: durante la recuperación después de una enfermedad o una intervención quirúrgica, durante tratamientos para adelgazar o dietas especiales de larga duración, cuando se deben ingerir antibióticos, y en casos de consumo crónico de alcohol.

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Productos Médicos
Av. Belgrano 1480
(C1093AAP), CABA

INAME
Av. Caseros 2161
(C1264AAD), CABA

INAL
Estados Unidos 25
(C1101AAA), CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671
(C1087AAI), CABA

Sede Central
Av. de Mayo 869
(C1084AAD), CABA

3. DATOS DEL ELABORADOR/ES AUTORIZADO/S

Etapas de elaboración de la Especialidad Medicinal:

a) Elaboración hasta el granel y/o semielaborado:

Razón Social	Número de Disposición autorizante y/o BPF	Domicilio de la planta	Localidad	País
BAYER S.A.	DI-2021-668	EDIFICIO 1 (CALLE 8 ENTRE 3 Y 5) Y EDIFICIO 2 (CALLE 3 Y DEL CANAL), PARQUE INDUSTRIAL PILAR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES	PILAR - BUENOS AIRES	REPÚBLICA ARGENTINA

b) Acondicionamiento primario:

Razón Social	Número de Disposición autorizante y/o BPF	Domicilio de la planta	Localidad	País
BAYER S.A.	DI-2021-668	EDIFICIO 1 (CALLE 8 ENTRE 3 Y 5) Y EDIFICIO 2 (CALLE 3 Y DEL CANAL), PARQUE INDUSTRIAL PILAR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES	PILAR - BUENOS AIRES	REPÚBLICA ARGENTINA

c) Acondicionamiento secundario:

Razón Social	Número de Disposición autorizante y/o BPF	Domicilio de la planta	Localidad	País
BAYER S.A.	DI-2021-668	EDIFICIO 1 (CALLE 8 ENTRE 3 Y 5) Y EDIFICIO 2 (CALLE 3 Y DEL CANAL), PARQUE INDUSTRIAL PILAR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES	PILAR - BUENOS AIRES	REPÚBLICA ARGENTINA

El presente Certificado tendrá una validez de 5 años a partir de la fecha del mismo.

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Productos Médicos
Av. Belgrano 1480
(C1093AAP), CABA

INAME
Av. Caseros 2161
(C1264AAD), CABA

INAL
Estados Unidos 25
(C1101AAA), CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671
(C1087AAI), CABA

Sede Central
Av. de Mayo 869
(C1084AAD), CABA

Expediente Nº: 1-0047-2000-000361-18-1



BISIO Nelida
Agustina
CUIL 27117706090

Tel. (+54-11) 4340-0800 - <http://www.anmat.gov.ar> - República Argentina

Productos Médicos
Av. Belgrano 1480
(C1093AAP), CABA

INAME
Av. Caseros 2161
(C1264AAD), CABA

INAL
Estados Unidos 25
(C1101AAA), CABA

Sede Alsina
Alsina 665/671
(C1087AAI), CABA

Sede Central
Av. de Mayo 869
(C1084AAD), CABA