



2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° **0959**

BUENOS AIRES, **04 FEB 2014**

VISTO el Expediente N° 1-47-1648-13-4 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma LABORATORIO DOMINGUEZ S.A. solicita se autorice la inscripción del producto *PERIO-KIN GEL*, (*GEL DE CLORHEXIDINA 0,2%*) como producto de Higiene Oral de Uso Odontológico.

Que consta la evaluación técnica producida por la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud en la que informa que el producto reúne los requisitos técnicos que contempla la norma legal vigente, y que el establecimiento declarado demuestra aptitud para la importación y el control de calidad del producto cuya autorización de inscripción se solicita.

Que se ha dado cumplimiento a los requisitos formales y legales que contempla la normativa vigente en la materia.

Que corresponde autorizar la inscripción del producto de Higiene Oral de Uso Odontológico objeto de la solicitud.

Sub

H. M.



"2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº 0959

Que la dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud y el Departamento de Registro han tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 1490/92 y el Decreto Nº 1271/13.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Autorízase la inscripción del Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico de la ANMAT, de acuerdo a lo solicitado por la firma LABORATORIO DOMINGUEZ S.A, con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre: PERIO-KIN GEL (GEL DE CLORHEXIDINA 0,2%).

Marca: PERIO-KIN GEL.

Presentación: Tubo con 30 ml.

Forma farmacéutica: Semisólido.

Origen: España.

Datos del Elaborador: LABORATORIOS KIN S.A. – Ciutat de Granada -123,
Barcelona, España.



"2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº 0 9 5 9

Fórmula porcentual cuali - cuantitativa de los ingredientes: Clorhexidina digluconato 0.20 %, Metilparaben sodico 0.10 %, Aroma (Optamint 266165) 0.37 %, Mentol 0.05 %, Eugenol 0.01 %, Salicilato de metilo 0.07 %, Sorbitol 70 % 74.00 %, Aceite de ricino hidrogenado PEG-60 2.75 %, Hidroxietilcelulosa 250 M 2.00 %, Acido cítrico 0.04 %, Agua purificada c.s.p 100 %.

Período de vida útil: 3 años (36 meses).

Indicaciones de uso: para uso periodontal y periimplantario. Adyuvante en la prevención de la gingivitis. En casos de formación excesiva de placa bacteriana. Como antiséptico oral antes y después de intervenciones dentales.

ARTICULO 2º.- Autorízase los textos de los proyectos de rótulos que obran a fojas 97-102.

ARTICULO 3º.- Extiéndase, sobre la base de los dispuesto en los artículos precedentes, la Constancia de Inscripción del Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico.

ARTICULO 4º. - La vigencia de la constancia de inscripción será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha impresa en la misma.

ARTICULO 5º. - Regístrese. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente



"2014- Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 0959

Disposición, la Constancia de Inscripción y los proyectos de rótulos autorizados. Gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-1648-13-4

DISPOSICION N° 0959

Dr. CARLOS CHIALE
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.

Constancia de Inscripción de Productos de Higiene Oral de Uso Odontológico

Expediente: 1-47-1648-13-4

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, deja constancia que mediante la Disposición (ANMAT) N° **0959** y de acuerdo a lo solicitado por Laboratorio Dominguez S.A., se autoriza la Inscripción del Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre: Perio-Kin Gel – Gel de clorhexidina 0.2%

Marca: Perio-Kin Gel.

Presentación: Tubo con 30 Ml.

Forma farmacéutica: Semisólido.

Origen: España.

Datos del Elaborador: Laboratorios Kin S.A. Ciutat de Granada 123 – Barcelona España.

Datos del Titular: Importador Laboratorio Domínguez, Avda. La Plata 2548/52/54/56/58/82/84 y Avda. La Plata 2567/69, CABA, Argentina.

Fórmula Porcentual Cuanti – cualitativa de los ingredientes activos: Clorhexidina digluconato 0.20 %.

Período de vida útil: 36 meses.

Indicaciones de uso: para uso periodontal y periimplantario. Adyuvante en la prevención de gingivitis. En casos de formación excesiva de placa bacteriana. Como antiséptico oral antes y después de intervenciones dentales.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ANMAT tendrá la facultad de dejar sin efecto la mencionada inscripción por incumplimiento de la Disposición ANMAT N° 692/12.

Se extiende a la firma Laboratorios Dominguez S.A, la Constancia de Inscripción N° 0051, siendo su vigencia de 5 (cinco) años a partir de la fecha de su emisión.

Buenos Aires, **04 FEB 2014**



DR. CARLOS CHIALE
Administrador Nacional
A.N.M.A.T.



ANMAT

Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica



Ministerio de
Salud
Presidencia de la Nación

Constancia de Inscripción de Productos de Higiene Oral de Uso Odontológico

Expediente: 1-47-1648-13-4

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, deja constancia que mediante la Disposición (ANMAT) N°.....**0959** de acuerdo a lo solicitado por Laboratorio Dominguez S.A., se autoriza la Inscripción del Producto de Higiene Oral de Uso Odontológico con los siguientes datos identificatorios característicos:

Nombre: Perio-Kin Gel - Gel de clorhexidina 0.2%

Marca: Perio-Kin Gel.

Presentación: Tubo con 30 ML.

Forma farmacéutica: Semisólido.

Origen: España.

Datos del Elaborador: Laboratorios Kin S.A. Ciutat de Granada 123 - Barcelona España.

Datos del Titular: Importador Laboratorio Domínguez, Avda. La Plata 2548/52/54/56/58/82/84 y Avda. La Plata 2567/69, CABA, Argentina.

Fórmula Porcentual Cuanti - cualitativa de los ingredientes activos: Clorhexidina digluconato 0.20 %.

Período de vida útil: 36 meses.

Indicaciones de uso: para uso periodontal y periimplantario. Adyuvante en la prevención de gingivitis. En casos de formación excesiva de placa bacteriana. Como antiséptico oral antes y después de intervenciones dentales.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ANMAT tendrá la facultad de dejar sin efecto la mencionada inscripción por incumplimiento de la Disposición ANMAT N° 692/12.

Se extiende a la firma Laboratorios Dominguez S.A, la Constancia de Inscripción N° 0051, siendo su vigencia de 5 (cinco) años a partir de la fecha de su emisión.

Buenos Aires,

04 FEB 2014

Handwritten initials

Dr. CARLOS CHIALE
Administrador Nacional
AN.M.A.T.



Proyecto de Sobrerótulo
PERIOKIN GEL

Producto de Higiene Oral de uso Odontológico. Inscripción ANMAT N°
Ver prospecto adjunto.

Importación y comercialización: Laboratorio Dominguez S.A Av. La Plata 2552
(CABA)-Bs.As. Legajo N°: 6899 y 2.826
Según Disposición 0692/2012




Sandra S.

Farm. Sandra S.
A/C Servicio de Inspección
Productos Cosméticos -

V/a

Dra. Solange CADEMARTORI
Prod. de Higiene Oral de Uso Odontológico
Instituto Nacional de Medicamentos

Sandra C. Rismondo
LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
SANDRA C. RISMONDO
Farmacéutica - Directora Técnica
M.N. N° 12.720 - C.I. 12.595.464



Truquel de 30 ml ALCAN

PANTONE 3282
PANTONE 281
PANTONE 943

AUTORIZADO
A/C Servicio de Inspección
Farmacia S.A.
Productos Cosméticos

Dra. Sabina CADEMARTORI
Prod. de Higiene Oral de Uso Dentalológico
Hospital Nacional de Medicamentos

LABORATORIO KIN S.A.
SANTO DOMINGO, D.R.
CALLE 119 # 11901170
SANTO DOMINGO, D.R.
Farmacia - Dirección: 100000
M.N. N° 12.120 - C.I. 12.845.374

Perio·KIN®

Gel de Clorhexidina 0.20 %

KIN
30 mL

- Control de la placa bacteriana
- Control of bacterial plaque
- Uso periodontal y periimplantario
- Periodontal and peri-implant use

Aplicar dos o tres veces al día, según los consejos de su dentista. En topiaciones puntuales, aplicar una cantidad pequeña del gel sobre la zona afectada. Para topiaciones más amplias, extender una cantidad apropiada sobre la zona a tratar. La aplicación será más efectiva por la noche. No enjuagar. No ingerir ningún líquido ni alimento hasta pasada media hora de su utilización.

Apply two or three times a day, following the advice of your dentist. For precise use, place a small amount of gel on the affected area. For broader use, spread the appropriate amount over the target area. The application will be most effective at night. Do not rinse after use. Do not ingest food or beverages until at least half an hour after use.

Consultar a su dentista / Consult your dentist

8 436026 211632

Perio·KIN®
Gel de Clorhexidina
0.20%
Lata / Case:

Perio·KIN®
Gel de Clorhexidina
0.20%

Perio·KIN®

Gel de Clorhexidina 0.20 %

KIN
30 mL

- Control de la placa bacteriana
- Control of bacterial plaque
- Uso periodontal y periimplantario
- Periodontal and peri-implant use

VÍA TÓPICA BUCAL
TOPICAL ORAL APPLICATION
DO NOT SWALLOW

COMPOSICIÓN / COMPOSITION:
Clorhexidina digluconato 0.2 g
Excipientes c.s.p. 100 g
Excipients q.s.p.

INGREDIENTES / INGREDIENTS:
SORBITOL, ARIA, PEG-40 HYDROGENATED
CASTOR OIL, HYDROXYETHYLCELLULOSE,
AROMA, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE,
SODIUM METHYL PABA BEN, METHYL
SALICYLATE, MENTHOL, CITRIC ACID,
EUGENOL, LIMONENE, CINNAMAL.

Dr. Tec. Farm. / Pharm. Tech.
Director: E. Saicho

Hecho de uso, Advertencias y restricciones de uso:
ver prospecto adjunto
All other forces and precautions see enclosed leaflet

Mantener a temperatura inferior a 30° C
Store product below 30° C
Fabricado por / Manufactured by:
KIN
LABORATORIOS KIN S.A.
Clutet de Granada, 123
E-01018 Baza (Jaén) - España
www.kin.es - e-mail: kin@kin.es

0 9 5 9



AUTORIZADO

SARA
A/C Servicio de Inspección de
Medicamentos

Solange CADEMARTORI
Prod. de Higiene Oral de Uso Cotidiano
Instituto Nacional de Medicamentos

Fecha: 27/08/2012

Código: KIN


Producto: Pack PK Gel 30 ml/38g

Comentarios:

P.346 C 17% P. 245 C P. 281 C P. 3262 C

Orange
bcn

C/ J. de Arce, 20, 1ª planta
28012 Madrid
Tel: 91 532 53 12 /
Tel: 91 532 53 10 - G.M.



PERIOKIN®

Gel

KIN

PERIOKIN
D-3ON Chlorhexidine D.D.

INDICACIONES
Sensibiliza, Activa, Protege y Hidrata el Enamel.
Oxigena y blanquea el Esmalte.
Disminuye la placa bacteriana, el Mal aliento, la Gingivitis, la Parodontitis, la Halitosis, la Caries, el Dolor de Dientes, el Enrojecimiento de la Lengua, el Dolor de Boca y el Dolor de Garganta.

Modo de uso: Aplicar sobre la zona afectada.
Aplicar 2 veces al día, después de las comidas.
No utilizar en zonas con heridas o lesiones.
No utilizar en zonas con sensibilidad al fluoruro.
No utilizar en zonas con sensibilidad al bicarbonato de sodio.
No utilizar en zonas con sensibilidad al mentol.
No utilizar en zonas con sensibilidad al eucalipto.
No utilizar en zonas con sensibilidad al clorhexidina.
No utilizar en zonas con sensibilidad al alcohol.
No utilizar en zonas con sensibilidad a los colorantes.

PERIOKIN®

Gel

KIN

Elaborado por / Manufactured by / Fabricado por:
KIN
LABORATORIOS KIN S.A.
Calle de Cervantes, 10
E-28004 Madrid, España
T. 91 532 53 12
C.I.A. 1200773



LABORATORIO P. MINGUEZ S.A.
SANDRA C. QUIMONDO
Farmacéutica - Directora Técnica
M.N. N° 12.720 - C.I. 12 565 954

0 9 5 9



HAUTEUR VARIABLE DU TUBE + 1 MM (RETRACTION)

066479 12/09

30 mL

Perio·KIN®
Gel de Clorhexidina 0.20 %

Control de la placa bacteriana ■ Uso periodontal y perimplantario
Control of bacterial plaque ■ Periodontal and peri-implant use

Perio·KIN®
Gel de Clorhexidina
0.20%

VIA TÓPICA BUCAL
TOPICAL ORAL APPLICATION

COMPOSICIÓN / COMPOSITION:
Clorhexidina digluconato
Clorhexidina digluconato 0.2 g
Excipientes e.s.p. 100 g

Dk. Tec. Farm. / Pharm. Tech. Dr. E. Sancho

30 mL

Mantener a temperatura inferior a 30° C
Store product below 30° C

**NO INGERIR
DO NOT SWALLOW**

Mode de uso, Advertencias y restricciones de uso:
ver prospecto en adjunto

Directions for use and precautions: see package insert


Consulte a su dentista /
Consult your dentist

KIN
LABORATORIOS KIN S.A.
C/Alfaro de Granada, 123
E-08018 Barcelona - España
www.kin.es - e-mail: kin@kin.es

(FORMAT/POSITIONNEMENT DU SPOT STANDARD)

AUTORIZADO

Encom. *[Signature]* SARA
A/C Servicio de Inspección de
Productos Cosméticos
Dra. Sofía CABALLERÍ
Prod. de Higiene Oral de Uso Cosmético
Instituto Nacional de Medicamentos



DEPART IMPRESSION 4 mm (5 mm pour le MARC)

TRUQUEL DE 30 ml ALCAN
Pant. 281 Pant. 493

[Signature]
LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
SANGRA E FISMONDO
Farmacéutica - Dirección Técnica
M.N. N° 12.720 - C.I. 12.565.957



Orangefarm S.A.
 Calle 15, Escazura
 Tel. (506) 2239 95 27
 Fax (506) 2239 95 27

Fecha: 27/06/2012

Cliente: KIN

CO62351205


Producto: Tubo 30 ml Gel Perio Kin

Comentarios:

0959



P.245 C 17% P. 245 C P. 281 C



AUTORIZADO
 Farm. Solange CADEMARTORI
 A/C Servicio de Inspectoría de
 Productos Cosméticos
 P. 19
 Dra. Solange CADEMARTORI
 Prod. de Higiene Oral de Uso Odontológico
 Instituto Nacional de Medicamentos

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
 SANDRA C. RIMONDO
 Farmacéutica - Directora Técnica
 M.N. N° 12.720 - C.I. 12.514.147

Perio-KIN[®]
0.20% Chlorhexidine
Gel

Composition:
Chlorhexidine Digluconate 0.2 g
Excipient s.q.p. 100 g

Indications:
- For periodontal and peri-implant use.
- As an adjuvant in the prevention of gingivitis.
- In cases of excessive formation of bacterial plaque.
- As an oral antiseptic before and after surgery.

Dosage and guidelines for administration:
Apply the gel two or three times a day with a smooth brush or cotton swab, massaging the gums, or apply the gel directly on the affected area, if the state of the gum so requires.

Use after meals and it is advisable not to consume any food or drink until at least half an hour after usage. The application will be most effective at night. Do not gargle after use. Do not swallow.

Contra-indications:
It is contra-indicated in patients who have shown a hypersensitivity reaction to chlorhexidine. These reactions are extremely rare.

Side effects:
In some cases, alteration in the sense of taste can occur, it generally decreases with continued use of the product.

Staining of the teeth and fillings can appear after prolonged use, and after contact with certain food and beverages, such as wine and coffee, as well as with tobacco. This staining is not permanent and can be removed by your dentist.

Storage:
Store product below 30° C.

Presentation:
PERIOKIN GEL: 30 ml tube.

Other products (not available in certain markets):
PERIOKIN SPRAY: 40 ml bottle.

Perio-KIN[®]
0.20% Chlorhexidine
Gel

Composition:
Digluconate de Chlorhexidine 0.2 g
Excipient q.s.p. 100 g

Indications:
- Usage parodontal et péri-implantaire.
- Aide à la prévention de la gingivite.
- En cas de formation excessive de la plaque bactérienne.
- Comme antiseptique buccal avant et après les interventions chirurgicales.

Posologie et normes pour son administration:
Appliquer le gel deux ou trois fois par jour avec une brosse douce ou un bâtonnet de coton, en réalisant un massage sur les gencives, ou bien appliquer le gel directement sur la zone affectée, si l'état de la gencive l'exige.

Doit être employé après les repas et on recommande de ne pas avaler de liquide ni d'aliments jusqu'à une demi heure après son utilisation. La plus grande efficacité s'obtient lors des applications nocturnes. Ne pas rincer après son application. Ne pas avaler.

Contre-indications:
Ce produit est contre-indiqué chez les patients qui ont eu une réaction d'hypersensibilité à la Chlorhexidine. Ces réactions sont extrêmement rares.

Effets secondaires:
Dans certains cas, des altérations du sens du goût peuvent se présenter, elles diminuent généralement avec l'utilisation continue du produit.

Après une utilisation prolongée et au contact de certaines boissons ou aliments comme le vin ou le café et avec le tabac, une coloration des dents et des plombages peuvent apparaître. Cette coloration n'est pas permanente et peut être éliminée par votre chirurgien-dentiste.

Conservation:
Maintenir le produit à moins de 30° C.

Présentation:
PERIOKIN GEL: Tube avec 30 ml.

Autres présentations (ne pas disponibles dans certains marchés):
PERIOKIN SPRAY: Flacon avec 40 ml.

Perio-KIN[®]
0.20% Chlorhexidine
Gel

Composición:
Digluconato de Clorhexidina 0.2 g
Excipiente c.s.p. 100 g

Indicaciones:
- Para uso periodontal y perimplantario.
- Adyuvante en la prevención de la gingivitis.
- En casos de formación excesiva de placa bacteriana.
- Como antiséptico oral antes y después de intervenciones dentales.

Posología y administración:
Aplicar el gel dos o tres veces al día con un cepillo suave o un bastoncillo de algodón, realizando un masaje sobre las encías. Alternativamente aplicar el gel directamente sobre la zona afectada, si el estado de las encías lo requiere.

Debe emplearse después de las comidas y se recomienda no ingerir ningún líquido ni alimento hasta pasada media hora de su utilización. La mayor efectividad se consigue en las aplicaciones nocturnas. No enjuagar después de su aplicación. No ingerir.

Contraindicaciones:
Está contraindicado en pacientes que hayan mostrado reacción de hipersensibilidad a la clorhexidina. Estas reacciones son extremadamente raras.

Efectos secundarios:
En algunos casos, puede presentarse alteraciones del sentido del gusto, que generalmente disminuyen con el uso continuado del producto.

Tras el uso prolongado y al contacto de ciertas bebidas o alimentos tales como el vino o el café y también con el tabaco, puede aparecer coloración en los dientes y empastes. Esta coloración no es permanente y puede eliminarse con una profilaxis dental adecuada.

Conservación:
Mantener a temperatura inferior a 30° C.

Presentación:
Tubo con 30 ml

Otras presentaciones (no disponible en algunos países):
PerioKin Spray 40 ml

Ask your dentist and pharmacist for advice.
This will ensure optimal oral and dental health.



LABORATORIOS KIN S.A.
Ciutat de Granada, 123 E-08018 Barcelona - Spain
www.kin.es - e-mail: kin@kin.es

Le conseil de votre chirurgien-dentiste et pharmacien vous
garantit une santé bucco-dentaire optimale.



LABORATORIOS KIN S.A.
Ciutat de Granada, 123 E-08018 Barcelona - Spain
www.kin.es - e-mail: kin@kin.es

El consejo de su Odontólogo y de su Farmacéutico le garantizan
una óptima salud buco-dental.



LABORATORIOS KIN S.A.
Ciutat de Granada, 123 E-08018 Barcelona - Spain
www.kin.es - e-mail: kin@kin.es

MADE IN SPAIN
SANDRA C. RISMONDO
Farmacéutica - Directora Técnica
M.N. N.º 12.120 - C.I. 15.955.954

AUTORIZADO
Ministerio de Sanidad y Consumo
Comisión de Medicamentos
N.º de Higiene y Seguridad: 140.000000000
Farm. Com. Inscripción de Farmacéuticos

CO05871 04/03





Proyecto de Sobrerótulo
PERIOKIN GEL

Producto de Higiene Oral de uso Odontológico. Inscripción ANMAT N°
Ver prospecto adjunto.

Importación y comercialización: Laboratorio Dominguez S.A Av. La Plata 2552
(CABA)-Bs.As. Legajo N°: 6899 y 2.826
Según Disposición 0692/2012

AUTORIZADO


Firm. Sandra SAKA

A/C Servicio de Inspectoría de
Productos Cosméticos

Dra. **Blanca CADEMARTORI**

Prod. de Higiene Oral de uso Odontológico
Instituto Nacional de Medicamentos

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
SANDRA C. RISMONDO
Farmacéutica - Directora Técnica
M.N. N° 12.720 - C.I. 12.605.954



Truquel de 30 ml ALCAN



PANTONE 3282
PANTONE 281
PANTONE 943

Perio·KIN®

Gel de Clorhexidina 0.20 %

KIN



30 mL

- Control de la placa bacteriana
- Control of bacterial plaque
- Uso periodontal y periimplantario
- Periodontal and peri-implant use

Aplicar dos o tres veces al día, según los consejos de su dentista. En topiccaciones puntuales, aplicar una cantidad pequeña del gel sobre la zona afectada. Para topiccaciones más amplias, extender una cantidad apropiada sobre la zona a tratar. La aplicación será más efectiva por la noche. No enjuagar. No ingerir ningún líquido ni alimento hasta pasada media hora de su utilización.

Apply two or three times a day, following the advice of your dentist. For precise use, place a small amount of gel on the affected area. For broader use, spread the appropriate amount over the target area. The application will be most effective at night. Do not rinse after use. Do not ingest food or beverages until at least half an hour after use.

Consultra a su dentista /
Consult your dentist



Perio·KIN®
Gel de Clorhexidina
0.20%

Lote / Cade:

COSANO
1206

AUTORIZADO

LABORATORIO QUINQUEL S.A.
Inspección de
Industria y Comercio

Productos Químicos

CADEMARTORI

Dra. Solange

Prod. de Higiene Oral de la

Instituto Nacional de Medicamentos

LABORATORIO QUINQUEL S.A.

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

Formación - Dirección - Tel. 94 12 15 15 31 4

M.N. N.º 12.720 - C.A. 12.15.15.31.4

Perio·KIN®
Gel de Clorhexidina
0.20%

Perio·KIN®

Gel de Clorhexidina 0.20 %

KIN



30 mL

- Control de la placa bacteriana
- Control of bacterial plaque
- Uso periodontal y periimplantario
- Periodontal and peri-implant use

VÍA TÓPICA BUCAL
TOPICAL ORAL APPLICATION

NO INGERIR
DO NOT SWALLOW

COMPOSICIÓN / COMPOSITION:
Clorhexidina digluconato 0.2 g
Excipientes c.l.p. 100 g
Excipientes s.s.p.

INGREDIENTES / INGREDIENTS:
SORBITOL, ACNIA, PEG-40 HYDROGENATED
CASTOR OIL, HYDROXYETHYLCELLULOSE,
AROMA, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE,
SODIUM METHYLPARABEN, METHYL
SALICYLATE, MENTHOL, CITRIC ACID,
EUGENOL, LIMONENE, CINNAMAL.

Modo de uso, advertencias y restricciones de uso:
ver prospecto adjunto
Directions for use and precautions: see enclosed leaflet

Dra. Tec. Farm./ Pharm. Tech.
Director: E. Sancho

Mantener a temperatura inferior a 30° C
Store product below 30° C
Fabricado por / Manufactured by:
KIN
LABORATORIOS KIN S.A.
C/utet de Granada, 123
E-08016 Barcelona - España
www.kin.es - e-mail: kin@kin.es

0 0 0 0



Fecha: 27/06/2012
 Cliente: KIN
 Producto: Pack PK Gel 30 ml/38g
 Comentarios:

P.345 C 17% P.245 C P.281 C P.3282 C

Orange
 S.A.
 C. de Comercio S.A.
 S. de Representación y
 Distribución
 S. de Alimentos y
 Farmacéuticos S.A.

PERIOKIN®

Gel

30 KIN

PERIOKIN®

Gel

30 KIN

PERIOKIN®

Gel

30 KIN

AUTORIZADO

Form. ARA

A/C Servicio de Inspección de
 Productos Cosméticos -
 Dra. Balongo CADEMARTORI
 Prod. de Higiene Oral de Uso - cosmológico
 Instituto Nacional de Medicamentos

LABORATORIO PUMINGUEZ S.A.
 SANDRA C. DIAMONDO
 Firma. AUTEX - Dirección Técnica
 M.N. N° 12.720 - C.I. 12.585.454

Compañía de Investigación y
 Laboratorio S.A. S. de Representación y
 Distribución
 Calle 1118-42 - Periferia
 Industrial de Fray Benito C.A. 1118-42
 Puerto, Tech. Dr. E. Berrios

Periferia y cosméticos - al por mayor
 Autex S.A. S. de Representación y
 Distribución
 Calle 1118-42 - Periferia Industrial
 de Fray Benito C.A. 1118-42
 Puerto, Tech. Dr. E. Berrios

Periferia y cosméticos - al por mayor
 Autex S.A. S. de Representación y
 Distribución
 Calle 1118-42 - Periferia Industrial
 de Fray Benito C.A. 1118-42
 Puerto, Tech. Dr. E. Berrios

Compañía de Investigación y
 Laboratorio S.A. S. de Representación y
 Distribución
 Calle 1118-42 - Periferia
 Industrial de Fray Benito C.A. 1118-42
 Puerto, Tech. Dr. E. Berrios

Compañía de Investigación y
 Laboratorio S.A. S. de Representación y
 Distribución
 Calle 1118-42 - Periferia
 Industrial de Fray Benito C.A. 1118-42
 Puerto, Tech. Dr. E. Berrios

Compañía de Investigación y
 Laboratorio S.A. S. de Representación y
 Distribución
 Calle 1118-42 - Periferia
 Industrial de Fray Benito C.A. 1118-42
 Puerto, Tech. Dr. E. Berrios

Compañía de Investigación y
 Laboratorio S.A. S. de Representación y
 Distribución
 Calle 1118-42 - Periferia
 Industrial de Fray Benito C.A. 1118-42
 Puerto, Tech. Dr. E. Berrios



0959



Sandra SARA
FUNN. Sandra SARA
A/C Servicio de Inspectorio de
Productos Cosméticos -

AUTORIZADO

Dra. Solange EADEMARTORI
Prod. de Higiene Oral de Uso Odontológico
Instituto Nacional de Medicamentos 12704

(FORMAT/POSITIONNEMENT
DU SPOT STANDARD)

HAUTEUR VARIABLE DU TUBE + 1 MM (RETRACTION)

Perio-KIN®
Gel de Clorhexidina 0.20 %

30 ml

Perio-KIN®
(Gel de Clorhexidina)
0.20%

VÍA TÓPICA BUCAL
TOPICAL ORAL APPLICATION

COMPOSICIÓN / COMPOSITION:
Clorhexidina digluconato 0.2 g
Excipientes e.s.p. 100 g

Dir. Tec. Farm. / Pharm. Tech. Dr. E. Sanchez

30 mL

Mantener a temperatura inferior a 30° C
Store product below 30° C

NO INGERIR
DO NOT SWALLOW


Modo de uso, Advertencias y recomendaciones de uso:
ver prospecto en el tubo

Directions for use and precautions: see enclosed leaflet

Consulte a su dentista /
Consult your dentist

KIN
LABORATORIOS KIN S.A.
C/atal de Granada, 123
E-08018 Barcelona - España
www.kin.es - e-mail: kin@kin.es

DEPART IMPRESSION
4 mm (5 mm pour le MARC)



TRUQUEL DE 30 ml ALCAN
Pant. 281 Pant. 493

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
SANBRO C RISSMONDO
Farmacéutica - Dirección Técnica
M.N. N° 12.720 - C.I. 12.585 4/4

0959



De...
Calle...
Tel. 02 235 99 27
www.orangebcn.com

Fecha: 27/06/2012


Cliente: KIN

CO62351205

Producto: Tubo 30 ml Gel Perio Kin

Comentarios:

P.245 C 17% P. 245 C P. 281 C



CO62351205

PERIOKIN

Gel de clorexidina DG
Chlorhexidine DG Gel

Aplicación oral tópica. No ingerir.
Via tópica oral: buche o aplicación de pastillas.
Tópica oral aplicación. Do not swallow.
Aplicación oral tópica. No se tragar.
Applicazione topica orale. Non ingerire.
Oral use: mouthwash. Do not swallow.

Consulte a su dentista
Consulte a seu médico dentista
Consulte a su dentista
Consulte a vostro dentista
Consulte a su dentista

30 ml/36 g

Pharm. Ind. Quím. S. Sandoz

NS0045517-12800

Reg. LS.P. N° 2320-3408

Manufactured by / Fabricado por

KIN

LABORATORIOS KIN S.A.
Calle de Europa, 17
E-08018 Rubí (Barcelona) - Spain
www.kin.com - www.perio.com

AUTORIZADO

Pharm. Sandoz S.A.
A/C Servicio de Inspección de
Productos Cosméticos

Dra. Sandra C. RISMONDO
Prod. de Higiene Oral de Uso C. dentológico
Instituto Nacional de Medicamentos

LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.
SANDRA C. RISMONDO
Farmacéutica - Directora Técnica
M.N. N° 12.720 - C.I. 12.515.151

Perio-KIN®
0.20% Chlorhexidine
Gel

Composition:
Chlorhexidine Digluconate 0.2 g
Excipient s.q.s 100 g

Indications:
- For periodontal and peri-implant use.
- As an adjuvant in the prevention of gingivitis.
- In cases of excessive formation of bacterial plaque.
- As an oral antiseptic before and after surgery.

Dosage and guidelines for administration:
Apply the gel two or three times a day with a smooth brush or cotton swab, massaging the gums, or apply the gel directly on the affected area, if the state of the gum so requires.

Use after meals and it is advisable not to consume any food or drink until at least half an hour after usage. The application will be most effective at night. Do not gargle after use. Do not swallow.

Contra-indications:
It is contra-indicated in patients who have shown a hypersensitivity reaction to chlorhexidine. These reactions are extremely rare.

Side effects:
In some cases, alteration in the sense of taste can occur, it generally decreases with continued use of the product.

Staining of the teeth and fillings can appear after prolonged use, and after contact with certain food and beverages, such as wine and coffee, as well as with tobacco. This staining is not permanent and can be removed by your dentist.

Storage:
Store product below 30° C.

Presentation:
PERIOKIN GEL: 30 ml tube.

Other products (not available in certain markets):
PERIOKIN SPRAY: 40 ml bottle.

Perio-KIN®
0.20% Chlorhexidine
Gel

Composition:
Digluconate de Chlorhexidine 0.2 g
Excipient q.s.p 100 g

Indications:
- Usage parodontal et péri-implantaire.
- Aide à la prévention de la gingivite.
- En cas de formation excessive de la plaque bactérienne.
- Comme antiseptique buccal avant et après les interventions chirurgicales.

Posologie et normes pour son administration:
Appliquer le gel deux ou trois fois par jour avec une brosse douce ou un bâtonnet de coton, en réalisant un massage sur les gencives, ou bien appliquer le gel directement sur la zone affectée, si l'état de la gencive l'exige.

Doit être employé après les repas et on recommande de ne pas avaler de liquide ni d'aliments jusqu'à une demi heure après son utilisation. La plus grande efficacité s'obtient lors des applications nocturnes. Ne pas rincer après son application. Ne pas avaler.

Contre-indications:
Ce produit est contre-indiqué chez les patients qui ont eu une réaction d'hypersensibilité à la Chlorhexidine. Ces réactions sont extrêmement rares.

Effets secondaires:
Dans certains cas, des altérations du sens du goût peuvent se présenter, elles diminuent généralement avec l'utilisation continue du produit.

Après une utilisation prolongée et au contact de certaines boissons ou aliments comme le vin ou le café et avec le tabac, une coloration des dents et des plombages peuvent apparaître. Cette coloration n'est pas permanente et peut être éliminée par votre chirurgien-dentiste.

Conservation:
Maintenir le produit à moins de 30° C.

Présentation:
PERIOKIN GEL: Tube avec 30 ml.

Autres présentations (no pas disponibles dans certains marchés):
PERIOKIN SPRAY: Flacon avec 40 ml.

Perio-KIN®
0.20% Chlorhexidine
Gel

Composición:
Digluconato de Clorhexidina 0.2 g
Excipiente c.s.p 100 g

Indicaciones:
- Para uso periodontal y periimplantario.
- Adyuvante en la prevención de la gingivitis.
- En casos de formación excesiva de placa bacteriana.
- Como antiséptico oral antes y después de intervenciones dentales.

Posología y administración:
Aplicar el gel dos o tres veces al día con un cepillo suave o un bastoncillo de algodón, realizando un masaje sobre las encías. Alternativamente aplicar el gel directamente sobre la zona afectada, si el estado de las encías lo requiere.

Debe emplearse después de las comidas y se recomienda no ingerir ningún líquido ni alimento hasta pasada media hora de su utilización. La mayor efectividad se consigue en las aplicaciones nocturnas. No enjuagar después de su aplicación. No ingerir.

Contraindicaciones:
Está contraindicado en pacientes que hayan mostrado reacción de hipersensibilidad a la clorhexidina. Estas reacciones son extremadamente raras.

Efectos secundarios:
En algunos casos, puede presentarse alteraciones del sentido del gusto, que generalmente disminuyen con el uso continuado del producto.

Tras el uso prolongado y al contacto de ciertas bebidas o alimentos tales como el vino o el café y también con el tabaco, puede aparecer coloración en los dientes y empastes. Esta coloración no es permanente y puede eliminarse con una profilaxis dental adecuada.

Conservación:
Mantener a temperatura inferior a 30° C.

Presentación:
Tubo con 30 ml

Otras presentaciones (no disponible en algunos países):
PerioKin Spray 40 ml

Pharmaceuticals - Dirección: Barcelona - Spain
M. N. N.º 12.127 - C.I. 12.595.954
SANDRIA C. Farmacia (S) S.A.
M. N. N.º 12.127 - C.I. 12.595.954

Ask your dentist and pharmacist for this.
This will ensure optimal oral and dental health.

KIN
LABORATORIOS KIN S.A.
Ciutat de Granada, 123 E-08018 Barcelona - Spain
www.kin.es - e-mail: kin@kin.es

AUTORIZADO
A la S. de Inspección de Productos Cosméticos de
Farmacia SARA
D.ª S.ª de Inspección de Productos Cosméticos de Farmacia SARA


Le conseil de votre chirurgien-dentiste et pharmacien vous garantit une santé bucco-dentaire optimale.

KIN
LABORATORIOS KIN S.A.
Ciutat de Granada, 123 E-08018 Barcelona - Spain
www.kin.es - e-mail: kin@kin.es

El consejo de su Odontólogo y de su Farmacéutico le garantizan una óptima salud buco-dental.

KIN
LABORATORIOS KIN S.A.
Ciutat de Granada, 123 E-08018 Barcelona - Spain
www.kin.es - e-mail: kin@kin.es

CO5681 04/05



00169