



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: DI-2019-1713-APN-ANMAT#MSYDS

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 15 de Febrero de 2019

Referencia: EX-2018-33916646-APN-DGA#ANMAT

VISTO el EX-2018-33916646-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma ROEMMERS S.A.I.C.F. solicita la aprobación de nuevos proyectos de prospectos e información para el paciente para la Especialidad Medicinal denominada TAURAL PLUS LÍQUIDO / RANITIDINA, DOMPERIDONA y SIMETICONA, Forma farmacéutica y concentración: SUSPENSIÓN ORAL / 0.750 g, 0.050 g y 1.000 g; aprobada por Certificado N° 56.046.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición N°: 5904/96 y Circular N° 4/13.

Que la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. – Autorízase a la firma ROEMMERS S.A.I.C.F. propietaria de la Especialidad Medicinal denominada TAURAL PLUS LÍQUIDO / RANITIDINA, DOMPERIDONA y SIMETICONA, Forma farmacéutica y concentración: SUSPENSIÓN ORAL / 0.750 g, 0.050 g y 1.000 g; el nuevo proyecto de prospecto obrante en el documento IF-2019-02103052-APN- / DERM#ANMAT; e información para el paciente obrante en el documento IF-2019-02103320-

APN-DERM#ANMAT.

ARTICULO 2º. – Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 56.046, cuando el mismo se presente acompañado de la presente Disposición.

ARTICULO 3º. - Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición y rótulos, prospectos e información para el paciente. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2018-33916646-APN-DGA#ANMAT

Digitally signed by CHIALE Carlos Alberto
Date: 2019.02.15 13:38:11 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Carlos Alberto Chiale
Administrador
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2019.02.15 13:38:18 -03'00'



Roemmers

INDUSTRIA ARGENTINA

ORIGINAL

VENTA BAJO RECETA

Taural Plus Líquido
Ranitidina/Domperidona/Simeticona
Suspensión
Vía oral

FÓRMULA

Cada 100 mL contiene: Ranitidina (como Ranitidina Clorhidrato) 0,750 g; Domperidona 0,050 g; Simeticona 1,000 g; Copolímero del Ácido Metacrílico 0,420 g; Carbonato de sodio anhidro 0,120 g; Sorbitol 70% 12,500 g; Benzoato de sodio 0,100 g; Metilparabeno sódico 0,100 g; Propilparabeno sódico 0,030 g; Azúcar 49,000 g; Sucralosa 0,100 g; Dióxido de titanio 0,250 g; Celulosa microcristalina y carboximetilcelulosa sódica 2,000 g; Sacarina sódica 0,015 g; Glicirricinato de amonio 0,010 g; Esencia de vainilla 0,075 g; Colorante amarillo ocase 0,0012 g; Agua purificada c.s.p. 100 mL.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiulceroso. Inhibidor de la secreción ácida gástrica. Gastroquinético. Antiemético. Antinauseoso. Antiflatulento.

INDICACIONES

Esofagitis por reflujo. Gastritis. Duodenitis. Especialmente cuando cursan con síntomas dispépticos tales como distensión postprandial, pirosis, regurgitación, náuseas, vómitos, meteorismo y flatulencia.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Taural Plus Líquido está constituido por Ranitidina, Domperidona y Simeticona. La Ranitidina es un inhibidor reversible y competitivo de los receptores histamínicos H_2 , que disminuye la secreción ácida gástrica tanto basal como provocada por diversos estímulos. La Domperidona es un antagonista de la dopamina con propiedades antieméticas. Su efecto antiemético puede deberse a una combinación de efectos periféricos (gastroquinéticos) y centrales, aunque se ha demostrado que la Domperidona no atraviesa la barrera hematoencefálica. La Simeticona es un agente químicamente inerte y desprovisto de acción sistémica, que actúa como espumolítico-antiflatulento reduciendo la tensión superficial de las burbujas de moco y gas que se forman en el tracto gastrointestinal, favoreciendo la coalescencia de las mismas y aliviando de esta manera la distensión y el meteorismo.

ROEMMERS S.A.I.C.
JORGELINA D'ANGELO
FARMACEUTICA
IF-2019-05009652-APROBADA
M.N. 12.663
APODERADA

IF-2018-02086432-APN-DERIVADOS

ORIGINAL



Farmacocinética

Ranitidina: Los alimentos y los antiácidos no alteran significativamente la absorción de Ranitidina, la biodisponibilidad por vía oral es del 55%. La Ranitidina presenta una vida media de eliminación plasmática de 2,5 a 3 horas. La eliminación se realiza principalmente por la orina (50% sin modificaciones). La Ranitidina atraviesa la barrera placentaria y se detecta en la leche materna. En pacientes con insuficiencia hepática (cirrosis compensada) existen cambios menores y clínicamente no significativos en la vida media, distribución, clearance y biodisponibilidad de la Ranitidina.

Domperidona: Tras la administración por vía oral la Domperidona se absorbe rápidamente, con concentración plasmática máxima a los 30 a 60 minutos. Su biodisponibilidad es de 15% debido a un intenso metabolismo de primer paso. La Domperidona presenta elevada unión a las proteínas plasmáticas (91 a 93%) y amplia distribución en el organismo con bajas concentraciones en tejido cerebral. La vida media de eliminación es de 7 a 9 horas. Sufre un rápido y extenso metabolismo hepático mediante hidroxilación y N-desalquilación, en el que intervienen las isoenzimas 3A4, 1A2 y 2E1 del citocromo P-450. La eliminación urinaria es de 31% y la eliminación en las heces de 66%, principalmente como metabolitos inactivos.

Simeticona: La Simeticona es un compuesto químicamente inerte que no se absorbe en el tracto gastrointestinal. Se excreta en forma inmodificada en las heces sin evidencia de circulación enterohepática.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

Adultos y niños mayores de 12 años (y que pesan más de 35 kg):


La dosis debe ser establecida por el médico para cada caso en particular.

La dosis habitual es 20 ml por la mañana, antes del desayuno, y 20 ml por la noche, antes de acostarse.

Si los síntomas fueran muy intensos, puede añadirse la toma de 20 ml en el momento en que estos se acentúan.

La dosis de mantenimiento es 20 ml por día, antes de acostarse.

La duración inicial del tratamiento es de una semana. Transcurrido este tiempo, los pacientes deben ser reevaluados para determinar la necesidad de continuarlo.


ROEMMERS SAICF
JORGE LUIS ANGELO
FARMACEUTICA
M.N. 12.663
APODERADA

IF-2016-02089035-APN-DICIA/ANMAT

IF-2016-02086652-APN-DORWA/ANMAT

ORIGINAL



CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a la Ranitidina, a la Domperidona, a la Simeticona o a cualquier componente de la fórmula. Tumor hipofisario secretor de prolactina (prolactinoma). Situaciones en las que pueda resultar peligrosa la estimulación de la motilidad gástrica: hemorragia, obstrucción mecánica o perforación digestiva alta. Íleo. Insuficiencia hepática moderada o severa. Pacientes con prolongación existente conocida de los intervalos de conducción cardíaca, en particular del QTc, alteraciones hidroelectrolíticas significativas o cardiopatías subyacentes, como insuficiencia cardíaca congestiva, por el mayor riesgo de aparición de arritmias ventriculares. Administración concomitante con fármacos que prolonguen el intervalo QT (a excepción de la apomorfina) y con fármacos inhibidores potentes del CYP3A4. Embarazo. Lactancia. Niños menores de 12 años o que pesan menos de 35 kg.

PRECAUCIONES

Es conveniente descartar la existencia de neoplasias gástricas antes de administrar Taural Plus Líquido, pues la sintomatología de las mismas puede ser enmascarada por la medicación.

En caso de insuficiencia renal severa, la vida media de eliminación de la Domperidona está aumentada en estos casos, por lo que las dosis deben ser adaptadas al clearance de creatinina existente.

Como la Domperidona presenta un extenso metabolismo hepático, Taural Plus Líquido no debe ser administrado a pacientes con insuficiencia hepática de grado moderado a severo.

El uso de Domperidona se ha asociado a una prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma y de taquicardia ventricular en *Torsade de pointes* en muy raras ocasiones. Esto se observó en pacientes con factores de riesgo tales como confusión y alteraciones electrolíticas.

También se ha asociado el uso de Domperidona a un incremento del riesgo de arritmias ventriculares graves o de muerte súbita cardíaca. Se ha observado un mayor riesgo en pacientes mayores de 60 años, pacientes que tomaban dosis superiores a 30mg y pacientes que usaban en forma concomitante fármacos que prolongan el intervalo QT o inhibidores de la CYP3A4.

Ante la aparición de signos o síntomas asociados a arritmias cardíacas, se debe interrumpir el tratamiento.

Existen informes aislados que sugieren que la Ranitidina puede precipitar las crisis de porfiria en pacientes con porfiria aguda. Debe evitarse la administración de Taural Plus Líquido en pacientes con esta enfermedad.

Embarazo: No existe experiencia en mujeres embarazadas con la asociación de Ranitidina, Domperidona y Simeticona. Taural Plus Líquido no debe ser administrado durante el embarazo.

IF-2019-02086052-APN-DGAVIA/ANMAT

JORGELINA D. ANGELO
FARMACEUTICA
DIRECTORA TECNICA

Nº 12.663
AJUERADA
página 3 de 140

IF-2016-02086652-APN-DGR/A/NMAT



ROEMMERS

ORIGINAL

salvo que sea claramente necesario y que los beneficios para la madre superen los riesgos potenciales para el feto.

Lactancia: La Ranitidina y la Domperidona son eliminadas en la leche materna. Taural Plus Líquido no debe ser administrado durante la lactancia, salvo que sea claramente necesario y se decida suspender la lactación.

Uso pediátrico: No se dispone de estudios sobre la seguridad y eficacia de la Ranitidina en niños menores de 12 años de edad. La sobredosis de Domperidona en niños pequeños puede ocasionar síntomas extrapiramidales. Por lo tanto, Taural Plus Líquido no debe ser administrado a niños menores de 12 años o que pesan menos de 35 kg.

Interacciones medicamentosas:

Ranitidina: A pesar de haber sido descrita su débil unión con el citocromo P-450 *in vitro*, la Ranitidina a las dosis recomendadas no inhibe la acción de las oxigenasas asociadas al citocromo P-450 en el hígado. Sin embargo, existen informes aislados sobre la posible modificación de la biodisponibilidad de algunas drogas por mecanismos no bien conocidos.

Está descrita la posible variación del tiempo de protrombina (aumento o disminución) en pacientes que reciben concomitantemente warfarina. Sin embargo, en estudios de farmacocinética en humanos con dosis de Ranitidina de hasta 400 mg/día no se encontró interacción con la warfarina.

Dosis elevadas de sucralfato (2 g) o antiácidos como el hidróxido de magnesio, aluminio o calcio administradas al mismo tiempo que la Ranitidina, podrían disminuir la absorción de esta última. Por lo tanto, se recomienda administrar estos medicamentos 2 horas después de la administración de Taural Plus Líquido.

Domperidona: La principal vía metabólica de la Domperidona es el CYP3A4. Se ha informado que el uso de drogas que inhiben esta isoenzima (por ej. Ketoconazol, inhibidores de la proteasa, algunos macrólidos como eritromicina, claritromicina y telitromicina, diltiazem, verapamilo) pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de la Domperidona.

Existe riesgo de prolongación del intervalo QT cuando se asocia Domperidona con otras drogas que ya de por sí prolongan el intervalo QTc, como ser: disopiramida, hidroquinidina, quinidina, amiodarona, dofetilida, dronedarona, ibutilida, sotalol, haloperidol, pimozida, sertindol, citalopram, escitalopram, eritromicina, levofloxacina, moxifloxacina, espiramicina, pentamidina, halofantrina, lumefantrina, cisaprida, dolasetrón, prucaloprida, mequitazina, mizolastina, toremifeno, vandetanib, vincamina, bepridil, difemanilo, metadona. En el caso de la apomorfin, se debe justificar el beneficio de la administración conjunta, por lo que se deberán tomar estrictas precauciones.

ROEMMERS SAIW
JORGUINA D'ANGELO
IF-2016-02086052-APN-DERNA/ANMAT
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.683
APODERADA

IF-2018-02086032-APN-DERIV#ANMAT

Página 80 de 110



Roemmers

ORIGINAL

Simeticona: La Simeticona es un compuesto químicamente inerte que no se absorbe en el tracto gastrointestinal. No se han descrito hasta la fecha interacciones para Simeticona.

Pruebas de laboratorio:

La Ranitidina puede provocar resultados falsos positivos en la detección de proteinuria en análisis con tira reactiva (ej. Multistix®). Se recomienda utilizar la técnica del ácido sulfosalicílico.

REACCIONES ADVERSAS

Ranitidina: Se han comunicado las siguientes reacciones adversas, aunque no se ha comprobado fehacientemente la relación causal con la Ranitidina en todos los casos:

Del aparato digestivo: Náuseas, vómitos, diarrea, constipación, malestar abdominal, elevación de transaminasas. Ocasionalmente, hepatitis hepatocelular o hepatocanalicular (con o sin ictericia) que requiere la interrupción inmediata del tratamiento y es usualmente reversible, aunque en algunos casos puede resultar mortal. Excepcionalmente, pancreatitis aguda. *Cardiovasculares:* Como sucede con otros bloqueantes H₂ se han informado raramente: taquicardia, bradicardia sinusal, bloqueo aurículo-ventricular, extrasístoles ventriculares, pausa sinusal (especialmente por vía parenteral). *Hematológicas:* Se han informado unos pocos casos de leucopenia, trombocitopenia y granulocitopenia, usualmente reversibles. Muy raramente se han informado agranulocitosis, pancitopenia, a veces con hipoplasia medular y anemia aplásica. Excepcionalmente, anemia hemolítica inmune adquirida. *Del sistema nervioso:* Cefalea, a veces severa. Raramente, somnolencia, insomnio, vértigos, astenia. Más raramente, especialmente en pacientes ancianos o con insuficiencia renal severa, confusión, agitación, alucinaciones o síndrome depresivo. Visión borrosa o trastornos motrices involuntarios. *Del sistema inmune:* Raramente, reacciones de hipersensibilidad (por ej. broncoespasmo, fiebre, rash, eosinofilia), anafilaxia, edema angioneurótico. *Dermatológicas:* Ocasionalmente erupción, eritema multiforme. Raramente, alopecia. *Osteomusculares:* Raramente, artralgias y mialgias. *Endócrinas:* Ocasionalmente, tensión mamaria, ginecomastia, impotencia y disminución de la libido. *Renales:* Aumento leve de la creatinina sérica.

Domperidona: *Del sistema inmune:* Muy raramente, reacciones de hipersensibilidad. *Del sistema nervioso:* Muy raramente, efectos extrapiramidales. *Del aparato digestivo:* Raramente, trastornos gastrointestinales, incluyendo calambres abdominales muy raros y transitorios. *Dermatológicas:* Muy raramente, urticaria. *Endócrinas:* Raramente, hiperprolactinemia, galactorrea, ginecomastia, amenorrea. *Cardiológicas:* Raramente, arritmias ventriculares, prolongación del QTc, taquicardia ventricular en *Torsade de Pointes*, muerte súbita cardíaca.

Simeticona: No se han descrito.

ROEMMERS SWITZ
JORGENSEN 008870240
IE-2010-0200902-APN-DOR/WAN/MAT
DIRECTORA TÉCNICA
N.º 12.663
AFIDERADA

IF-2019-02086432-APN-DGRM/ANMAT



ORIGINAL

SOBREDOSIFICACIÓN

Síntomas: **Ranitidina:** Existe una experiencia limitada acerca de sobredosis de Ranitidina por vía oral. Existen informes de ingestiones de hasta 18 gramos asociadas con los efectos adversos encontrados en las experiencias clínicas. Se han descrito anomalías de la marcha e hipotensión. **Domperidona:** Vértigo, desorientación y reacciones extrapiramidales, especialmente en niños. Se debe realizar un monitoreo del ECG, debido a la posibilidad de la prolongación del intervalo QT. **Simeticona:** No se han reportado hasta la fecha casos de sobredosificación por Simeticona. **Tratamiento:** No se han descrito antidotos específicos para la Ranitidina y la Domperidona. Luego de la cuidadosa evaluación clínica del paciente el profesional decidirá la realización o no del tratamiento general de rescate (lavado gástrico y/o administración de carbón activado). Se recomienda control clínico cuidadoso y tratamiento de soporte. Los anticolinérgicos y las drogas antiparkinsonianas pueden ser útiles en el control de las reacciones extrapiramidales. La Ranitidina se elimina mediante hemodiálisis. Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247, Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACIONES

Taural Plus Líquido Suspensión: Envases conteniendo 150, 200, 250, 300 y 350 ml.

Fecha de última revisión:

**Producto medicinal. Mantener fuera del alcance de los niños
Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30°C**


MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD
CERTIFICADO N°:

Directora Técnica: Jorgelina D'Angelo - Farmacéutica

Elaborado en Alvaro Barros 1113 – B1838CMC – Luis Guillón – Pcia de Buenos Aires

Información a profesionales y usuarios ☎ 0-800-333-5658

ROEMMERS S.A.I.C.F.
Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos, Pcia. de Buenos Aires
www.roemmers.com.ar


ROEMMERS S.A.I.C.F.
JORGELINA D'ANGELO
FARMACÉUTICA
IF-2019-02066052-APN-DCR/ANMAT
M.N. 12.663
APODERADA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2019-02103052-APN-DERM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 11 de Enero de 2019

Referencia: EX-2018-33916646- Prospecto Taural Plus Liquido

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.01.11 12:20:05 -03'00'

Maria Laura Garcia
Técnico Profesional
Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2019.01.11 12:20:06 -03'00'



ORIGINAL

PROSPECTO: INFORMACION PARA EL PACIENTE

TAURAL PLUS LÍQUIDO
RANITIDINA/DOMPERIDONA/SIMETICONA
Suspensión
Vía oral

Lea todo el prospecto detenidamente antes de comenzar a tomar este medicamento.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, **CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**
- Este medicamento se le ha recetado a usted sólo para su problema médico actual. No se lo recomiende a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarle.

QUE ES TAURAL PLUS LÍQUIDO Y PARA QUÉ SE UTILIZA

TAURAL PLUS LÍQUIDO es un medicamento que reduce la producción de ácido en el estómago y alivia los síntomas asociados a su exceso. También se utiliza para el tratamiento de las náuseas y los vómitos y para el alivio sintomático de los gases.

Taural Plus Líquido está indicado en el tratamiento de:

Esofagitis por reflujo.

Gastritis.

Duodenitis.

Especialmente cuando se acompañan de síntomas gastrointestinales como inflamación abdominal, acidez, regurgitación, náuseas, vómitos y flatulencias.

ANTES DE USAR TAURAL PLUS LÍQUIDO

No tome TAURAL PLUS LÍQUIDO si:

Es alérgico a alguno de los componentes de su fórmula.

Si tiene un prolactinoma (tipo específico de tumor en el cerebro).

Si presenta una condición en la cual puede ser peligroso que se estimulen los movimientos del tubo digestivo: sangrado, obstrucción o perforación del mismo.

Insuficiencia hepática moderada a severa.

Si presenta enfermedad cardíaca o algún tipo de arritmia.

Si toma algún medicamento que prolongue el intervalo QT (a excepción de la apomorfina).

Si toma algún medicamento inhibidor potente de CYP3A4.

ROEMMERS SAICF
JORGE LINARES ÁNGEL
FARMACÉUTICO
N.º 12.683
APODERADA

IF-2016-03086370-APN-DORA#ANMAT

N.º 12.683
APODERADA

IF-2019-02089420-APN-DGR/A/NM/T



ORIGINAL

Antes de iniciar el tratamiento con TAURAL PLUS LÍQUIDO, informe a su médico si usted padece o tiene cualquiera de las situaciones anteriores descriptas.

Uso en Embarazo: No tome TAURAL PLUS LÍQUIDO si está embarazada, intenta quedar embarazada o cree que puede estarlo. Si queda embarazada mientras toma Taural Plus Líquido, deje de tomarlo inmediatamente y consulte a su médico.

Uso en la Lactancia: No tome TAURAL PLUS LÍQUIDO si se encuentra en período de lactancia.

Uso en niños: Este medicamento no debe administrarse a niños menores de 12 años o que pesan menos de 35kg.

Tenga especial cuidado con TAURAL PLUS LÍQUIDO:

Antes de iniciar el tratamiento con TAURAL PLUS LÍQUIDO debe descartarse la presencia de tumores en el tubo digestivo debido a que el uso de este medicamento puede ocultar sus síntomas y retrasar el diagnóstico.

Si usted tiene problemas de riñón graves (insuficiencia renal severa) su médico deberá ajustar la dosis de TAURAL PLUS LÍQUIDO.

Este medicamento contiene un fármaco que se llama Domperidona. Su uso se ha asociado alteraciones en el electrocardiograma, distintos tipos de arritmia y muerte súbita en pacientes con factores de riesgo. Ante la aparición de signos o síntomas de arritmias cardíacas, debe suspender el tratamiento.

Debe evitarse la administración de TAURAL PLUS LÍQUIDO en pacientes con porfiria debido a que podría desencadenar crisis características de esta enfermedad.

Uso de TAURAL PLUS LÍQUIDO con otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento, incluyendo los de venta libre y los productos a base de hierbas.

Medicamentos que deben tomarse con precaución:

-Warfarina.

-Apomorfina

-Se recomienda administrar sucralfato, hidróxido de magnesio, aluminio o calcio 2 horas después de tomar Taural Plus Líquido.

IF-2016-02089310-APN-DRAV#ANMAT

ROEMMERS S.A.
FARMACÉUTICA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.663
ARRODERADA

IF-2019-02086320-APN-DORVA/ANMAT

ORIGINAL



Roemmers

-Ketoconazol, inhibidores de la proteasa, algunos macrólidos como eritromicina, claritromicina y telitromicina, diltiazem, verapamilo, pueden aumentar la concentración de domperidona.

Disopiramida, hidroquinidina, quinidina, amiodarona, dofetilida, dronedarona, ibutilida, sotalol, haloperidol, pimozida, sertindol, citalopram, escitalopram, eritromicina, levofloxacina, moxifloxacina, espiramicina, pentamidina, halofantrina, lumefantrina, cisaprida, dolasetrón, prucaloprida, mequitazina, mizolastina, toremifeno, vandetanib, vincamina, bepridil, difemanilo, metadona, su uso concomitante con TAURAL PLUS LÍQUIDO puede prolongar el intervalo QT.

CÓMO TOMAR ESTE MEDICAMENTO

Adultos y niños mayores de 12 años (y que pesan más de 35 kg):

La dosis debe ser establecida por su médico para cada caso en particular.

La dosis habitual es 20 ml por la mañana, antes del desayuno, y 20 ml por la noche, antes de acostarse. Si los síntomas fueran muy intensos, puede añadirse la toma de 20 ml en el momento en que estos se acentúan. La dosis de mantenimiento es 20 ml por día, antes de acostarse.

Duración y suspensión del tratamiento: La duración inicial del tratamiento es de una semana. Transcurrido este tiempo, los pacientes deben ser reevaluados para determinar la necesidad de continuarlo.

Si toma más TAURAL PLUS LÍQUIDO del que debe:

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología del Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez al teléfono: (011) 4962-6666 / 2247 o del Hospital A. Posadas al teléfono: (011) 4654-6648 / 4658-7777. Optativamente otros centros de intoxicaciones.

Si olvidó tomar TAURAL PLUS LÍQUIDO:

No tome una dosis doble para compensar la olvidada. Si la toma olvidada es reciente tome su dosis inmediatamente y si no, espere a la siguiente dosis. Si está preocupado por ello, consulte a su médico o farmacéutico. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

ROEMMERS SAICA
JORGELINA M. SAICA
DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12.653
APODERADA

IF-2019-02008420-APN-DE/ANMAT

IF-2019-02086420-APN-DGR/A/NMAT

Página 30 de 110



Roemmers

ORIGINAL

POSIBLES EFECTOS INDESEABLES

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Los efectos indeseables suelen aparecer al comienzo del tratamiento y desaparecer con la continuidad del mismo.

Los efectos indeseables observados son:

Ranitidina: *Del aparato digestivo:* Náuseas, vómitos, diarrea, sequedad de vientre, malestar abdominal, elevación de enzimas hepáticas. Ocasionalmente, hepatitis que requiere la interrupción inmediata del tratamiento y es usualmente reversible, aunque en algunos casos puede resultar mortal. Excepcionalmente, pancreatitis aguda. *Cardiovasculares:* Como sucede con otros bloqueantes H₂, se han informado raramente diferentes tipos de alteraciones del ritmo de los latidos cardíacos (arritmias). *Hematológicas:* Se han informado unos pocos casos de alteraciones de los glóbulos blancos y de las plaquetas, usualmente reversibles. Muy raramente se han informado alteraciones en la médula ósea. Excepcionalmente, anemia hemolítica inmune adquirida. *Del sistema nervioso:* dolor de cabeza, a veces severo. Raramente, sensación de sueño, dificultad para conciliar el sueño, vértigos, cansancio. Más raramente, especialmente en pacientes añosos o con insuficiencia renal severa, puede ocurrir confusión, agitación, alucinaciones o síndrome depresivo. Visión borrosa o trastornos del movimiento involuntarios. *Del sistema inmune:* Raramente, reacciones alérgicas (por ej. broncoespasmo, fiebre, rash, eosinofilia), cuadros alérgicos graves que comprometen la vía aérea. *Dermatológicas:* Ocasionalmente erupciones en la piel. Raramente, pérdida de cabello. *Osteomusculares:* Raramente, dolor articular y muscular. *Endócrinas:* Ocasionalmente, tensión mamaria, agrandamiento de la mama en el hombre, impotencia y disminución del deseo sexual. *Renales:* Aumento leve de la creatinina sérica.

Domperidona: *Del sistema inmune:* Muy raramente, reacciones alérgicas. *Del sistema nervioso:* Muy raramente, alteraciones de los movimientos y de la contracción muscular. *Del aparato digestivo:* Raramente, trastornos gastrointestinales, incluyendo calambres abdominales muy raros y transitorios. *Dermatológicas:* Muy raramente, urticaria. *Endócrinas:* Raramente, aumento de la prolactina, eliminación de leche sin estar en período de lactancia, agrandamiento de la mama en el hombre, ausencia del período menstrual. *Cardiológicas:* Raramente, arritmias ventriculares, prolongación del QTc, taquicardia ventricular en *Torsade de Pointes*, muerte súbita cardíaca.

ROEMMERS SAICF
JORGELINA D. ANGELO
FARMACEUTICA
DIRECTORA TECNICA
M.N. 12.663
BODERADA

IF-2010-02089320-APN-DERVA/ANMAT

IF-2019-02086320-APN-DSR/ANMAT

ORIGINAL



ROEMMERS

Si alguno de estos efectos indeseables se vuelve molesto, informe a su médico. Si experimenta efectos indeseables, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos indeseables que no aparecen en el prospecto.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición:

Cada 100 mL contiene

Ingredientes activos: Ranitidina (como Ranitidina Clorhidrato) 0,750 g; Domperidona 0,050 g; Simeticona 1,000 g;

Ingredientes inactivos: Copolímero del Ácido Metacrílico; Carbonato de sodio anhidro 0,120 g; Sorbitol 70%; Benzoato de sodio; Metilparabeno sódico; Propilparabeno sódico; Azúcar; Sacarosa; Dióxido de titanio; Celulosa microcristalina y carboximetilcelulosa sódica; Sacarina sódica; Glicirricinato de amonio; Esencia de vainilla; Colorante amarillo ocaso; Agua purificada c.s.p.

RECORDATORIO

Este producto ha sido prescrito sólo para su problema médico actual. No lo recomiende a otras personas.

PRESENTACIONES

Taural Plus Líquido Suspensión: Envases conteniendo 150, 200, 250, 300 y 350 ml.

**Producto medicinal. Mantener fuera del alcance de los niños
Conservar en lugar seco a temperatura inferior a 30°C**

No utilice **TAURAL PLUS LÍQUIDO** después de la fecha de vencimiento que figura en el embalaje.

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.

MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD

CERTIFICADO N°:

Directora Técnica: Jorgelina D'Angelo - Farmacéutica


Elaborado en Alvaro Barros 1113 – B1838CMC – Luis Guillón – Pcia de Buenos Aires

Información a profesionales y usuarios ☎ 0-800-333-5658

ROEMMERS S.A.I.C.F.

Fray J. Sarmiento 2350, B1636AKJ, Olivos, Pcia. de Buenos Aires

www.roemmers.com.ar


ROEMMERS S.A.I.C.F.
JORGELINA D'ANGELO
DIRECCIÓN TÉCNICA
IF-2019-02089470-APN-DORWA/ANMAT
M.N. 12.663
APODERADA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2019-02103320-APN-DERM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 11 de Enero de 2019

Referencia: EX-2018-33916646- Inf pac Taural Plus Liquido

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.01.11 12:20:41 -03'00'

Maria Laura Garcia
Técnico Profesional
Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2019.01.11 12:20:43 -03'00'