



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 7135

BUENOS AIRES, 01 JUL 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-2110-2403-14-8 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma ERPA S.A.C.I.F. con RNE N°020035335, solicita la reinscripción del certificado de RNPUD N° 0250002 en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 250 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre 2015.

LD
mf
/



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

7 1 3 5

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Reinscríbese el Certificado de RNPUD N° 0250002, que forma parte de la presente Disposición, cuya titularidad detenta la firma ERPA S.A.C.I.F., por el término de 5 años a partir del 20 de Mayo de 2015.

ARTICULO 2º.- Autorizanse los rótulos de fs. 34 correspondiente al envase primario; de fs. 26, 28 y 30 correspondiente al envase secundario; y el prospecto de fs. 32 que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTICULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 79, 80 y 81.

ARTICULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250002.

ARTICULO 5º.- Cancélese el Certificado N° 0250002 otorgado por Expediente N° 1-47-2110-5562-04-3.

ARTICULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, del Certificado mencionado en el artículo 1º, de los rótulos y del prospecto autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N°: 1-47-2110-2403-14-8

DISPOSICION N°:

LD
cr

7 1 3 5


DR. ROBERTO LUIS
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250002

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: **CEBO INSECTICIDA CUCARACHICIDA EN GEL**
2. Marca: **SOMERSET GEL**
3. Origen: **ARGENTINA**
4. Principios Activos: **HIDRAMETILNONA 2 %**
5. Forma de Presentación: **JERINGA PLÁSTICA DE CONT. NETO:3G, 6G Y 12G.**
6. Venta: **VENTA LIBRE**
7. Titular del Producto: **ERPA S.A.C.I.F.**
8. Domiciliado en: **PEDERNERA 1558 - CIUDAD MADERO - BUENOS AIRES**
9. Establecimiento TITULAR: **RNE N° : 020035335**
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-2110-002403-14-8.

Disposición N°: **7 1 3 5**

Fecha: **01 JUL 2016**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 20/05/2015.

DR. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

Sello y Firma del Funcionario Responsable


LD 26

**ATENCIÓN: ANTES DE SU APLICACIÓN
LECTO ADJUNTO
APLICACIÓN CADA 3 MESES**



www.somerset.com.ar

Es un poderoso insecticida que revoluciona todos los métodos tradicionales para el combate y control de cucarachas, gophas adultas y sus crías. Una vez aplicado, el poder extermiador de SOMERSET GEL dura hasta 3 meses.
¡Fácil! Las cucarachas pueden morir aun sin comer el gel. Cuando las cucarachas están muy hambrientas, se alimentan de las heces y de los excrementos de cucarachas contaminados por el gel y luego mueren.
Rápido! Las cucarachas comienzan a aparecer muertas a las 48 horas luego de ingerir el gel.
Seguro! La sencilla dosificadora y la necesidad de pequeñas dosis facilitan su aplicación.



INSTRUCCIONES DE USO:

- 1 Retire el tapón que protege el dosificador de la botella.
- 2 Presione suavemente el émbolo y aplique pequeños puntos del gel en las zonas infestadas, de acuerdo a la dosis indicada.
Dosis básica: 10 puntos en la cocina, 2 puntos en el baño, 5 puntos en el lavadero, y en cada sector de la casa donde las cucarachas fueron vistas o sospechadas.
Si la infestación es grave, aumentar la dosis. Ver tabla de dosificación en el prospecto adjunto.
- 3 Repetir la aplicación cada 3 meses.



NO EXPOSER A LA LIMPIEZA DIARIA. SI LAS ZONAS A TRATAR YA HUBIEREN SIDO TRATADAS DE INSECTICIDAS, NO APLICAR EL GEL PUES SE PRODUCE LA REPELENENCIA AL CIBO.



PRECAUCIONES: CUIDADO PELIGROSO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES DOMESTICOS.
 Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar ropa y zapatos adecuados. Evitar comer o beber durante la aplicación. Mantener alejado de niños y mascotas. Mantener alejado de alimentos y bebidas. Mantener alejado de agua. Mantener alejado de superficies que se limpiarán. Mantener alejado de superficies que se limpiarán. Mantener alejado de superficies que se limpiarán.

LAS CUCARACHAS MUERE

Extermina cucarachas



Derrega Mata Cucarachas

**MUY IMPORTANTE: ANTES DE SU APLICACIÓN LEA EL PROSPECTO ADJUNTO
 LISTO PARA USAR • APTO PARA USO DOMESTICO • FÁCIL DE APLICAR**

Composición:
 Hidrametazina 0,5%
 Deltamethrina 0,02%
 Fenitrothion 0,02%
 Aceite mineral 2,0%
 Aceite vegetal 88,0%

Distribuido exclusivamente por Jansin S.A., Pabellón 1, 650 (1750) Villa Mercedes, Pcia. de Buenos Aires, Tel.: 4654-4500
 Fabricación exclusiva en Argentina
 N.º S.P.D.A. Exp. E.T. F.V. 02-30/02
 Uruguay: FARMACIA S.A.J. y socios, Montevideo, Tel. 23011849 / 24012574.
 U.S.P. Imp. Reg. N.º 605-843-SP. C.C. 2228. L.N. N.º 3. 06.3.1.º 274.



2135

MUY IMPORTANTE: ANTES DE SU APLICACIÓN LEA EL PROSPECTO ADJUNTO.
LISTO PARA USAR • APTO PARA USO DOMÉSTICO • FÁCIL DE USAR
 GEL INSECTICIDA CUCARACHICIDA

Jeringa Mata Cucarachas

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS




Industria Argentina

Extermina cucarachas


LAS CUCARACHAS MUESTRAN SU DEBILIDAD

Contenido: 10 ml.
 Formulacion: 0,5% Dieldrin/0,05% Imidacloprid
 2,0% de un compuesto activo de ultima generacion
 98,0% de solventes
 Desechada exclusivamente por EPA U.S.A. Permiso 1598
 (1786) Villa Maestra, Ruta de Buenos Aires, Tel.: 4854-4500.
 Fabricado en Argentina
 M.S.P.A. S.A. - P.O. Box 1000 - C.A. 1000
 Distribuidor: Farmosil S.A. - P.O. Box 1000 - C.A. 1000
 M.S.P. Imp. Reg. de Prop. Int. N.º 1000 - C.A. 1000

PRECAUCIONES: CUIDADO PELIGROSO: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.
 Peligrosa su ingestión, inhalación o contacto con la piel y ojos. Usar guantes durante su aplicación. Lavarse las manos después de su empleo. No comer, beber ni fumar durante su uso. No transitar ni permanecer en el ambiente. No contaminar platos o vasos de agua con el producto o con sus envases. Cuidado para peces. No aplicar en plantas ni acuarios. Aplicar solo en lugares de difícil acceso para niños y mascotas. Mantener el producto en su empaque original. Prohibido su relleno. No perforar. Destruir los envases vacíos. **¡IMPORTANTE! VENENO A PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto con los ojos, enjuagar éstos con abundante agua limpia. Enjuagado con la piel lavar con agua y jabón. En caso de ingestión accidental lavarse la boca con abundante agua y procurar atención médica. En caso de intoxicación, procurar atención médica y nivel de toxicidad. **NOTAS PARA EL MÉDICO:** Este producto es de la familia Clase III (M.S.) Grupo Químico AMONIO IPRAZONA, Nombre Comercial HIDRAMERILINA. En caso de intoxicación aplicar tratamiento sintomático. No usar alcohol. Para mayor información leer el prospecto adjunto.



INSTRUCCIONES DE USO:
 1. Hacer el punto de aplicación en el borde del alfiler de la jeringa.
 2. Rotar suavemente el borde del alfiler para que el gel se adhiera a la zona indicada.
 3. Aplicar en las zonas indicadas. Evitar que los niños jueguen con el gel.
 4. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
 5. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
 6. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
 7. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
 8. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
 9. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
 10. Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.



Así actúa SOMERSET GEL. El gel se adhiere a las cucarachas y a los puntos de contacto. Al aplicar el gel, las cucarachas mueren al instante. El gel SOMERSET GEL dura hasta 3 meses. Las cucarachas pueden morir aun sin comer el gel. Cuando las cucarachas están muy hambrientas se alimentan de los excrementos de cucarachas, convirtiéndolos en gel y luego mueren. Las cucarachas colgaban a la pared y a las 48 horas luego de aplicar el gel. La necesidad de aplicar el gel se reduce y la necesidad de aplicar el gel se reduce.

1. M. FC 2. MESA DE



MUY IMPORTANTE: ANTES DE SU APLICACIÓN LEA EL PROSPECTO
LISTO PARA USAR - APTO PARA USO DOMÉSTICO
 GEL INSECTICIDA CUCARACHICIDA

Jeringa Mata Cucarachas




Extermina cucarachas

LAS CUCAR

Distribuido exclusivamente por EBR S.A. Pedernera 1550 (1700) Villa Mercedes, Pcia. de Buenos Aires, Tel.: 454-4500. Faxis: 454-4500. EBR S.A. con el Grupo del Proccor. Uruguay: Ravenna S.A. Montevideo, Tel.: 2401004/2401254. M.S. Imp. del "Grafico" S.R.L. S.A. S. 43.17.1.


Composición: 5% Dimetoprilato (insecticida) y 95% agua. No tóxico para humanos y animales. No contaminante. No inflamable. No explosivo. No corrosivo. No irritante. No dañino para el medio ambiente. No perjudicial para el ozono. No perjudicial para el clima.

PRECAUCIONES: CUIDADO PELIGROSO: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICO
 Peligrosa su ingestión, inhalación o contacto con la piel y ojos. Utilizar guantes durante su aplicación. Lavarse las manos después de su empleo. No comer, beber o fumar durante su uso. No transportar ni almacenar con alimentos. No contaminar papas o cursos de agua con el producto o con el envase, tóxico para peces. No aplicar en plantas ni acuarios. Aplicar solo en lugares de difícil acceso para niños y animales. Mantener el producto en su envase original. Prohibido su relleno. No borboteo. Destruir los envases vacíos. **IMPORTANTE: VENENO. 54-PRIL/EROS ALDILIO**
 En caso de contacto con los ojos, enjuagar éstos con abundante agua limpia. En contacto con la piel, lavar con agua y jabón. En caso de ingestión accidental, lavarse la boca con abundante agua y procurar atención médica. En caso de intoxicación, procure inmediata atención médica y llame al estudio **NOTAS PARA EL MÉDICO**. Este producto es de la familia Clase III (O.M.S.) Grupo Químico AMIDNOHIDRAZONA, Nombre Com. HIDRAMETILNONA. En caso de intoxicación aplicar tratamiento sintomático. No tiene antidoto. Para mayor información, lee el prospecto adjunto.



INSTRUCCIONES DE USO:

- 1) Retire el tapón que protege el dorso de la jeringa.
- 2) Rellene suavemente el embolo y apague cualquier punta del gel en las zonas indicadas, de acuerdo a la dosis indicada. Dosis básica: 10 puntos en la cocina, 2 puntos en el baño, 5 puntos en el lavadero. A en cada sector de la casa donde las cucarachas hacen nidos o escondidas. Si la infestación es grave aumentará la dosis. Ver tabla de distribución en el prospecto adjunto.
- 3) Repetir la aplicación cada 3 meses.



...suficiente y la necesidad de pequeñas dosis (facilita su aplicación).

Somerset Gel
Las arañas y las cucarachas
comen una dosis total del gel.

Características: Su fórmula especial hace que las cucarachas coman el gel, retengan a sus ratos desde su boca. Una vez que las cucarachas comen el gel, retienen a sus ratos desde su boca. Las cucarachas continúan el ciclo con la materia fecal y con sus propias excretas, multiplicando la efectividad por efecto dominó. Su fórmula con alto poder de atracción y gran adhesión garantiza la eficiencia del producto con el paso de la aplicación.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

Contiene BITREX

Impresión a sus ratos y contaminación a las demás.

Muestran todos, incluyendo las crías.

En caso de intoxicación procure inmediata atención médica y lleve el estuche.
Notas para el Médico: Este producto es de toxicidad Clase III (D.M.S.) Grupo Químico ANTIKINETICORAZONA. Nombre Común: HIDRATILUMONA. En caso de intoxicación aplicar tratamiento sintomático. No tiene antídoto. Para mayor información, lea el prospecto adjunto.

Composición:
 Hidratilumona 5,5 Dimetilimidazolinon
 2-ara 4-tilumometil ara (4-tilumometil-ara) cromilimidazolinon
 Diluyentes, dispersantes y base 98,0 %

Distribuido exclusivamente por ERPA S.A., Pedernera 1558
 (1700) Villa Madariaga, Pcia. de Buenos Aires, Tel.: (011) 4154-4500
 Imp. y Dist. PAMINOR S.A. Juan Pavlier 1483 - Tel. 24010094/24012514 Montevideo, Uruguay.
 M.S.P. - Imp. Reg. Nº 609-Reg. Nº 5726 - I.M.H. - S de S.P. Nº 274
 Fabricante directo RAE 02005330
 M.S.P.B.A. Exp. E.T. - RRUPD: Car. Nº 650002.
 Visite www.somerset.com.ar

Extermina cucaracha

Manual
CONTROL EFECTIVO

7133

Manual Hai PANTONE Orange 021 CV
 CMYK

*Lic. NOEMI ROSMANA
 Met. C.A.B. B. 7986*

¿Cómo y cuánto aplicar?

● Coloque el tapón que protege el dosificador de la jarra. ● Presione suavemente el botón y aplique pequeños puntos del gel de acuerdo a la dosis indicada, en las zonas donde ve o sospecha que hay cucarachas. ● Repetir la aplicación cada 3 meses. Una vez abierto el envase, utilizar la totalidad del gel dentro de los 90 días.

● Una jarra de 12 gramos es suficiente para tratar una casa de 240 metros cuadrados. ● La dosis de aplicación está determinada en gramos por metro cuadrado. ● Un punto de 3 mm de diámetro por metro cuadrado es suficiente para contrarrestar una infestación moderada de cucarachas grandes.


Plaga	Puntos por m ²		Gramos por m ²	
	Alta	Baja	Alta	Baja
Blattella Germanica (cucaracha alemana) Especie chica: 10-15 mm	•	•	0.10	0.05
Periplaneta americana (cucaracha americana) y Blattella orientalis (cucaracha oriental) Especie grande: 26-41 mm	•	•	0.20	0.10

Somerset Gel

Dosis con de jarra: 0.05g
 rendimiento del gel: 0.05 gramos/metro cuadrado

¿Dónde aplicar?

● Lugares oscuros y húmedos como rincones, furas, grietas, bajo alfombras, hendiduras, sobre rocas, etc. ● Cocinas: Sobre cañerías de agua y de aire acondicionado, detrás y debajo de la cocina, la mesada y la heladera, en alacenas y armarios, cerca de la basura. ● Baños: Detrás del inodoro, el bidet y el lavatorio. ● Lavaderos: Detrás o debajo del lavadero, sobre la cañería de agua, en rincones internos de armarios. ● Otros: Detrás de roperos, aparatos electrónicos, estufas, garajes, sótanos, living, comedor, etc.



Recomendaciones de uso

● Aplique en puntos no accesibles a la limpieza diaria. ● Evite aplicar el producto en superficies que no deban ser lavadas con agua y jabón. ● No aplicar en áreas de alimentos y agua. ● De estar en el proceso de limpieza, aplique el gel en los puntos de aplicación. ● Aplique preferentemente sobre superficies limpias y secas. ● Evite aplicar en lugares cerrados y húmedos.

Control total: ¿Qué se debe hacer?

● Mantenga los ambientes a controlar bien limpios y secos. ● Limpie los alimentos en envases sellados. ● Solicite todo tipo de mantenimiento al personal. ● Mantenga limpias las cañerías de agua. ● Utilice SOMERSET GEL hasta 3 meses. ● Recomiende el uso del producto a los vecinos. ● Evite la humedad y la suciedad. ● Evite aplicar el producto en condiciones que escapen al control del personal. ● Mantenga el control del producto. ● Inscripción aprobada por el M.S.P. Nº 240-0819-0266.

Control total: ¿Qué se debe hacer?

● Mantenga los ambientes a controlar bien limpios y secos. ● Limpie los alimentos en envases sellados. ● Solicite todo tipo de mantenimiento al personal. ● Mantenga limpias las cañerías de agua. ● Utilice SOMERSET GEL hasta 3 meses. ● Recomiende el uso del producto a los vecinos. ● Evite la humedad y la suciedad. ● Evite aplicar el producto en condiciones que escapen al control del personal. ● Mantenga el control del producto. ● Inscripción aprobada por el M.S.P. Nº 240-0819-0266.

Somerset Gel 12g (jarra 240 m²)
Somerset Gel 5g (jarra 120 m²)
Somerset Gel 3g (jarra 80 m²)




2135

PRECAUCIONES: CUIDADO PELIGROSO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES DOMESTICOS. Antes de usar leer atentamente rótulos y prospecto adjunto. Peligrosa su ingestión, inhalación o contacto con la piel y ojos. Utilizar guantes durante su aplicación. Lavarse las manos después de su empleo. No comer, beber o fumar durante su uso. No transportar ni almacenar con alimentos. No contaminar napas o cursos de agua con el producto o con sus envases, tóxico para peces. No aplicar en plantas ni acuarios. Aplicar solo en lugares de difícil acceso para niños y animales. Mantener el producto en su envase original. Prohibido su relleno. No perforar. Destruir los envases vacíos. IMPORTANTE: VENENO 4B.

Somerset Gel

Composición:



Cont. Neto
3g

Industria Argentina

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL PROSPECTO - NOTAS PARA EL MÉDICO: Este producto es de la Clase II (D.M.S.) Grupo Químico AMIDINOLIDRAZONA. Nombre Común: HIDRAKETAJONA. En caso de intoxicación aplicar tratamiento sintomático. No usar antiídoto. En caso de urgencia llamar: Argentina 0800-3330160. Uruguay: CIAT, Tel. 21722

Lic. NOEMI R. SOMMA
Mat. C.P.Q.B.A. 4966

MANRIVÉ ELSON
APODERADO
D.N.I. 14.213.473

PRECAUCIONES: CUIDADO PELIGROSO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES DOMESTICOS. Antes de usar leer atentamente rótulos y prospecto adjunto. Peligrosa su ingestión, inhalación o contacto con la piel y ojos. Utilizar guantes durante su aplicación. Lavarse las manos después de su empleo. No comer, beber o fumar durante su uso. No transportar ni almacenar con alimentos. No contaminar napas o cursos de agua con el producto o con sus envases, tóxico para peces. No aplicar en plantas ni acuarios. Aplicar solo en lugares de difícil acceso para niños y animales. Mantener el producto en su envase original. Prohibido su relleno. No perforar. Destruir los envases vacíos. IMPORTANTE: VENENO 4B.

Somerset Gel

Composición:



Cont. Neto
6g

Industria Argentina

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL PROSPECTO - NOTAS PARA EL MÉDICO: Este producto es de la Clase II (D.M.S.) Grupo Químico AMIDINOLIDRAZONA. Nombre Común: HIDRAKETAJONA. En caso de intoxicación aplicar tratamiento sintomático. No usar antiídoto. En caso de urgencia llamar: Argentina 0800-3330160. Uruguay: CIAT, Tel. 21722

Lic. NOEMI R. SOMMA
Mat. C.P.Q.B.A. 4966

2110-2403-14-8
6D-CD

MANRIVÉ ELSON
APODERADO

PRECAUCIONES: CUIDADO PELIGROSO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES DOMESTICOS. Antes de usar leer atentamente rótulos y prospecto adjunto. Peligrosa su ingestión, inhalación o contacto con la piel y ojos. Utilizar guantes durante su aplicación. Lavarse las manos después de su empleo. No comer, beber o fumar durante su uso. No transportar ni almacenar con alimentos. No contaminar napas o cursos de agua con el producto o con sus envases, tóxico para peces. No aplicar en plantas ni acuarios. Aplicar solo en lugares de difícil acceso para niños y animales. Mantener el producto en su envase original. Prohibido su relleno. No perforar. Destruir los envases vacíos. IMPORTANTE: VENENO 4B.

Somerset Gel

Composición:



Cont. Neto
12g

Industria Argentina

ANTES DE USAR LEA LAS INSTRUCCIONES DEL PROSPECTO - NOTAS PARA EL MÉDICO: Este