

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

- CONSULTE A SU MÉDICO -

ALERCAS CORT

BETAMETASONA, 0,60 mg.

FEXOFENADINA CLORHIDRATO, 120 mg.

Comprimidos - Comprimidos recubiertos

Venta Bajo Receta

Industria Argentina

Lea esta información para el paciente antes de comenzar a tomar **ALERCAS CORT** y cada vez que repita la receta, ya que puede haber nueva información. Esta información no reemplaza a su conversación con el médico sobre su enfermedad o su tratamiento.

Fórmula

Cada comprimido de Betametasona (Corticas) contiene:

Betametasona 0,60 mg. Excipientes: Estearato de magnesio, Lactosa, Croscarmelosa sódica, Povidona K 30, Carboximetilcelulosa cálcica, Almidón de maíz.

Cada comprimido recubierto de Fexofenadina clorhidrato (Alercas) contiene:

Fexofenadina clorhidrato 120 mg. Excipientes: Almidón de maíz, Lactosa, Povidona K-30, Croscarmelosa sódica, Estearato de magnesio, Talco, Hidroxipropilmetilcelulosa E-15, Polietilenglicol 6000, Bióxido de titanio, Sacarina sódica, Óxido de hierro rojo.

¿Qué es ALERCAS CORT y para qué se usa?

ALERCAS CORT asocia un corticoide, la betametasona, con un antihistamínico no sedativo, la fexofenadina.

ALERCAS CORT está indicado para el alivio de los síntomas severos de la dermatitis atópica, angioedema, urticaria, rinitis alérgica estacional y perenne, reacciones alérgicas alimenticias y medicamentosas, dermatitis por contacto alérgica y manifestaciones oculares de tipo alérgico, tales como conjuntivitis alérgica.

Antes de usar ALERCAS CORT

No use ALERCAS CORT si

- es alérgico a fexofenadina, betametasona o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.
- Tiene tuberculosis activa (salvo que se utilicen quimioterápicos anti TBC).

LABORATORIOS CASASCO

ADRIANA C. CARAMER
APODERADA

LABORATORIOS CASASCO SAIG

Dr. ALEJANDRO DANIEL SANTARELLI
FARMACÉUTICO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
MAT. PROF. 12.437

- Tiene una enfermedad generalizada producida por hongos (Micosis sistémicas).
- Tiene enfermedades virales.
- Tiene insuficiencia cardíaca congestiva grave.
- Tiene un aumento severo de la presión arterial.
- Tiene ulcera gastroduodenal.
- Tiene una Psicosis aguda.
- Tiene epilepsia.
- Tiene osteoporosis (enfermedad que produce porosidad en los huesos).
- Tiene presión elevada en los ojos (Glaucoma).

Tenga especial cuidado con ALERCAS CORT

- Si presenta infecciones, ya que los corticoides pueden enmascarar algunos de sus signos. Su empleo puede provocar disminución de la resistencia y dificultad para localizar la infección.
- Si esta por recibir inmunizaciones (vacunaciones).
- Si se va a utilizar este medicamento por tiempo prolongado o con dosis altas, deberá controlarse con su médico hasta por un año luego de suspendida la medicación.
- Las complicaciones de la corticoterapia dependen de la magnitud de la dosis y de la duración del tratamiento. Su médico tomará una decisión basada en los riesgos y beneficios de la administración del fármaco. Debe utilizarse la menor dosis posible de corticosteroide para controlar la afección que se está tratando. Cuando sea posible una disminución de la dosis, la misma deberá ser gradual.

La suspensión demasiado rápida del corticosteroide puede producir una insuficiencia en la secreción de la corteza suprarrenal secundaria.

- Si va utilizar este medicamento en forma prolongada pueden producirse cataratas (opacidad del cristalino del ojo) especialmente en niños, glaucoma (aumento de la presión ocular) e infecciones oculares secundarias a virus u hongos.
- Por su contenido en corticoides este medicamento puede aumentar la presión arterial, retención hidrosalina e incrementar de la eliminación de potasio y calcio.
- Debe evitar quedar expuesto a sarampión o varicela y en caso de que ocurra debe consultar con su médico.
- Si recibe este medicamento teniendo tuberculosis latente o reactividad a la tuberculina debe controlarse seguido, ya que puede ocurrir reactivación de la

LABORATORIOS CASASCO S.A.
ADRIANA C. CARAMES
APODERADA

LABORATORIOS CASASCO SAIC
Dr. ALEJANDRO DANIEL SANTARELLI
FARMACÉUTICO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
MAT. PROF. 12.437

ORIGINAL



enfermedad. Si va a recibir este medicamento en forma prolongada deberá recibir quimioprofilaxis para tuberculosis.

- Si usted presenta hipotiroidismo (baja función tiroidea) o cirrosis (enfermedad hepática severa).
- Si presenta herpes simple ocular.
- Si presenta inestabilidad emocional o trastornos psíquicos (tendencias psicóticas).
- Si presenta colitis ulcerativa inespecífica, con probabilidad de perforación intestinal inminente, absceso (u otra infección piógena); diverticulitis; anastomosis intestinal reciente; úlcera péptica activa o latente; insuficiencia renal; hipertensión arterial; osteoporosis y miastenia gravis (enfermedad con severa debilidad muscular).
- Si presenta infertilidad ya que los corticoides pueden alterar la movilidad y número de espermatozoides.

Toma simultánea de otros medicamentos

Comuniqué a su médico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

- Los productos digestivos que contengan aluminio y magnesio pueden disminuir la cantidad de **ALERCAS CORT** que se absorbe, por lo que se recomienda dejar un intervalo de 2 horas entre la toma de ambos productos.
- El uso concurrente de fenobarbital, fenitoína, rifampicina o efedrina pueden disminuir su acción terapéutica de la betametasona.
- La administración simultánea de corticosteroides con glucósidos cardíacos puede aumentar la posibilidad de arritmias o la toxicidad de la digital asociada con hipopotasemia (potasio bajo).
- El uso concomitante de corticosteroides con anticoagulantes puede aumentar o disminuir los efectos anticoagulantes, requiriendo posiblemente un ajuste de la dosis.
- Los efectos combinados de los antiinflamatorios no esteroides o el alcohol con los glucocorticoides pueden dar lugar a un aumento de la incidencia o gravedad de las úlceras gastrointestinales.
- Cuando se administren corticosteroides a pacientes diabéticos, puede requerirse un ajuste de la posología de la droga antidiabética.

LABORATORIOS CASASCO S.A.
ADRIANA C. CARAMES
APODERADA

LABORATORIOS CASASCO SAIC
Dr. ALEJANDRO DANIEL SANTARELLI
FARMACÉUTICO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
MAT. PROF. 12.437

¿Cómo usar ALERCAS CORT?

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico. La dosis sugerida de **ALERCAS CORT** es de un comprimido de betametasona y un comprimido de fexofenadina ingeridos juntos una vez al día. El tratamiento debe mantenerse hasta que se observe una respuesta adecuada. Cuando los síntomas se hayan controlado satisfactoriamente, se recomienda suspender gradualmente el fármaco, pudiendo continuarse con la administración del antihistamínico como droga única, en caso de necesidad. Si en el curso de una condición crónica se produce un período de remisión espontánea, el tratamiento deberá discontinuarse en forma gradual. Cuando el medicamento deba ser discontinuado después de un tratamiento prolongado, la reducción de la dosis debe hacerse gradualmente. Se recomienda una dosis inicial de 60 mg/día de fexofenadina en pacientes con trastornos de la función renal.

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.

No tome **ALERCAS CORT** si está embarazada a menos que sea absolutamente necesario. No se recomienda la toma de **ALERCAS CORT** durante el periodo de lactancia.

Uso en niños

El crecimiento y desarrollo de los lactantes y niños que reciban corticoterapia prolongada debe vigilarse cuidadosamente, dado que los corticoides pueden alterar las tasas de crecimiento e inhibir la producción endógena de corticosteroides.

Asimismo, la seguridad y eficacia de la fexofenadina no ha sido establecida en pacientes pediátricos menores de 12 años de edad.

Efectos sobre la capacidad de conducción de vehículos

No es probable que **ALERCAS CORT** comprimidos afecte a su capacidad para conducir o utilizar máquinas. Sin embargo, antes de conducir u operar maquinarias, asegúrese de que estos comprimidos no le provocan somnolencia.

Toma conjunta de ALERCAS CORT con alimentos y bebidas

La toma de **ALERCAS CORT** con jugos de fruta (pomelo, naranja, manzana) disminuye la absorción del medicamento, y por lo tanto su efecto terapéutico.

LABORATORIOS CASASCO S.A.

ADRIANA C. CARAMER
APODERADA

Dr. ALEJANDRO DANIEL SANTARELLI
FARMACÉUTICO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
MAT. PROF. 12.437



Uso apropiado del medicamento ALERCAS CORT

Si se olvidó de tomar ALERCAS CORT

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Tome la dosis siguiente en su momento como le haya recetado su médico.

A tener en cuenta mientras toma ALERCAS CORT

Efectos indeseables (adversos)

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Generales: fatiga; somnolencia.

Osteomusculares: debilidad muscular, miopatía corticosteroide, pérdida de masa muscular; agravamiento de los síntomas miasténicos en la miastenia gravis; osteoporosis; fracturas por compresión vertebral; necrosis aséptica de la cabeza femoral y humeral, fracturas patológicas de los huesos largos; ruptura de tendones.

Gastrointestinales: náuseas; dispepsia; úlcera péptica con posibilidad de perforación y hemorragia subsecuente; pancreatitis, distensión abdominal; esofagitis ulcerosa.

Dermatológicas: alteración en la cicatrización de heridas, atrofia cutánea, adelgazamiento y fragilidad de la piel; petequias y equimosis; eritema facial; aumento de la sudoración; reacciones tales como dermatitis alérgica, urticaria.

Neurológicas: convulsiones; aumento de la presión intracraneal; vértigo; cefalea.

Endocrinas: irregularidades menstruales; desarrollo de un estado cushingoide; depresión del crecimiento intrauterino fetal o infantil; aumento de los requerimientos de insulina o hipoglucemiantes orales en los diabéticos.

Oftálmicas: cataratas; aumento de la presión intraocular; glaucoma; exoftalmos.

Psiquiátricas: euforia, oscilaciones del humor; depresión; cambios en la personalidad; irritabilidad; insomnio.

Sistema urogenital: dismenorrea.

Otras: reacciones anafilactoides o de hipersensibilidad y reacciones hipotensivas.

Trastornos hidroelectrolíticos: retención de sodio, pérdida de potasio, alcalosis hipopotasémica; retención de líquido; insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes susceptibles; hipertensión.

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

¿Cómo conservar ALERCAS CORT?

- Conservar a temperatura ambiente entre 15°C y 30 °C. Preservar de la luz y humedad.

LABORATORIOS CASASCO S.A. S. R. L.
ADRIANA C. CARAMES
APODERADA

LABORATORIOS CASASCO SAIC
Dr. ALEJANDRO DANIEL SANTARELLI
FARMACEUTICO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
MAT. PROF. 12.437



- Mantener alejado del alcance de los niños.

Presentación

Envase con 10, 20, 30, 500, 1000 comprimidos de betametasona (Corticas) y con 10, 20, 30, 500 y 1000 comprimidos recubiertos de Fexofenadina clorhidrato (Alercas), respectivamente, siendo los dos últimos de uso hospitalario exclusivo.

Si Ud. toma dosis mayores de ALERCAS CORT de las que debiera

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.

Optativamente otros Centros de Intoxicaciones.

“Este medicamento ha sido prescripto sólo para su problema médico actual.

No lo recomiende a otras personas”.

“Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar

la ficha que está en la Página Web de la ANMAT

<http://anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a

ANMAT responde 0800-333-1234”

Dirección Técnica: Dr. Luis M. Radici – Farmacéutico.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.

Certificado N ° 54.737/48.720

Laboratorios CASASCO S.A.I.C.

Boyacá 237 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C.
ADRIANA C. CARAMES
APODERADA

LABORATORIOS CASASCO SAIG
Dr. ALEJANDRO DANIEL SANTARELLI
FARMACÉUTICO
CO-DIRECTOR TÉCNICO
MAT. PROF. 12.437



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: 3750-18-7 inf paciente alercas cort.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.