



"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº 6244

BUENOS AIRES, 10 JUN 2016

VISTO el Expediente Nº 1-0047-0000-005717-16-3 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma FINADIET S.A.C.I.F.I., solicita la aprobación de nuevos proyectos de prospectos para la Especialidad Medicinal denominada LIPAREX PLUS 10 - 20 / ATORVASTATINA - EZETIMIBA, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS, ATORVASTATINA 10 mg - EZETIMIBA 10 mg; ATORVASTATINA 20 mg - EZETIMIBA 10 mg; aprobada por Certificado Nº 54.220.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición Nº: 5904/96.

Que los procedimientos para las modificaciones y/o rectificaciones de los datos característicos correspondientes a un certificado de Especialidad Medicinal otorgado en los términos de la

ESJ  
4P  
A



"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 6244

Disposición ANMAT N° 5755/96, se encuentran establecidos en la Disposición ANMAT N° 6077/97.

Que la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y Decreto N° 101 de fecha 16 de Diciembre de 2015.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. - Autorízase el cambio de prospectos para la Especialidad Medicinal denominada LIPAREX PLUS 10 - 20 / ATORVASTATINA - EZETIMIBA, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS, ATORVASTATINA 10 mg - EZETIMIBA 10 mg; ATORVASTATINA 20 mg - EZETIMIBA 10 mg, aprobada por Certificado N° 54.220 y Disposición N° 7334/07, propiedad de la firma FINADIET S.A.C.I.F.I., cuyos textos constan de fojas 7 a 45.

JP

✓

ESV



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN 6 2 4 4

ARTICULO 2º. - Sustitúyase en el Anexo II de la Disposición autorizante ANMAT Nº 7334/07 los prospectos autorizados por las fojas 7 a 19 de las aprobadas en el artículo 1º, los que integrarán el Anexo de la presente.

ARTICULO 3º. - Acéptase el texto del Anexo de Autorización de modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado Nº 54.220 en los términos de la Disposición ANMAT Nº 6077/97.

ARTICULO 4º. - Regístrese; por mesa de entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la copia autenticada de la presente disposición conjuntamente con los prospectos y Anexos, gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines de adjuntar al legajo correspondiente. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE Nº 1-0047-0000-005717-16-3

DISPOSICIÓN Nº

Jfs

6 2 4 4

DR. ROBERTO LAVIE  
Subadministrador Nacional  
A.N.M.A.T.

ESV  
SP



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N° **6244** a los efectos de su anexo en el Certificado de Autorización de Especialidad Medicinal N° 54.220 y de acuerdo a lo solicitado por la firma FINADIET S.A.C.I.F.I., del producto inscripto en el registro de Especialidades Medicinales (REM) bajo:

Nombre comercial / Genérico/s: LIPAREX PLUS 10 - 20 / ATORVASTATINA - EZETIMIBA, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS, ATORVASTATINA 10 mg - EZETIMIBA 10 mg; ATORVASTATINA 20 mg - EZETIMIBA 10 mg.-

Disposición Autorizante de la Especialidad Medicinal N° 7334/07.

Tramitado por expediente N° 1-47-0000-015732-07-5.

DATO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION AUTORIZADA
Prospectos	Anexo de Disposición N° 7334/07.	Prospectos de fs. 7 a 45, corresponde desglosar de fs. 7 a 19.-

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

VP  
NSJ



"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del REM  
a la firma FINADIET S.A.C.I.F.I., Titular del Certificado de Autorización N°  
54.220 en la Ciudad de Buenos Aires, a los días.....,del mes de.....

10 JUN 2016

Expediente N° 1-0047-0000-005717-16-3

DISPOSICIÓN N°

Jfs

6 2 4 4

  
Dr. ROBERTO LEDESMA  
Subadministrador Nacional  
A.N.M.A.T.

VP  
ESV

**Proyecto de Prospecto Interno**

Industria Argentina

**LIPAREX PLUS 10 - 20**

**ATORVASTATINA 10 mg - 20 mg**

**EZETIMIBA 10 mg**

Comprimidos

Venta Bajo Receta

10 JUN 2016

**Fórmula**

**LIPAREX PLUS 10**

*Cada comprimido Atorvastatina 10 mg – Ezetimiba 10 mg contiene:*

Atorvastatina (como sal de calcio trihidrato) 10 mg

Ezetimiba 10 mg

*Excipientes:* Almidón pregelatinizado 20 mg, Croscarmelosa sódica 5 mg, Laurilsulfato de sodio 5 mg, Estearato de magnesio 2 mg, Ludipress c.s.p. 150 mg.

**LIPAREX PLUS 20**

*Cada comprimido Atorvastatina 20 mg – Ezetimiba 10 mg contiene:*

Atorvastatina (como sal de calcio trihidrato) 20 mg

Ezetimiba 10 mg

*Excipientes:* Almidón pregelatinizado 40 mg, Croscarmelosa sódica 10 mg, Laurilsulfato de sodio 10 mg, Estearato de magnesio 4 mg, Ludipress c.s.p. 300 mg.

**ACCIÓN TERAPÉUTICA**

Hipocolesterolemia.

Códigos ATC: Atorvastatina: C10AA01. Ezetimiba: C10AX09

**INDICACIONES**



"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

**LIPAREX PLUS** está indicado frente a la falla terapéutica de la monoterapia con atorvastatina o ezetimiba, o para reducir la dosis diaria de atorvastatina, con mantenimiento de los resultados terapéuticos. Los pacientes deben realizar una dieta para disminuir los niveles de colesterol.

Tratamiento adyuvante a la dieta para disminuir los niveles elevados de colesterol total, LDL-colesterol, apolipoproteína B y triglicéridos en pacientes con hipercolesterolemia primaria (heterocigota familiar y no familiar) y en la dislipemia mixta (tipos Fredrickson II a y II b). **LIPAREX PLUS** también está indicado en la reducción del colesterol total y del LDL colesterol en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota como adyuvante a otros tratamientos hipocolesterolemiantes (ej.: aféresis de LDL) o en caso de no disponer de estos tratamientos.

### ACCIÓN FARMACOLÓGICA

Atorvastatina actúa reduciendo los niveles de lípidos en la sangre. Es un inhibidor competitivo y selectivo de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) reductasa. Esta enzima cataliza la conversión de la HMG-CoA a mevalonato, un paso temprano y limitante de la biosíntesis de colesterol.

Tanto atorvastatina como sus metabolitos poseen actividad farmacológica. El hígado representa el principal sitio de acción y el principal órgano encargado de la síntesis de colesterol y la depuración de las LDL.

Ezetimiba reduce los niveles plasmáticos de colesterol inhibiendo su absorción en el intestino delgado. Ezetimiba no inhibe la síntesis hepática de colesterol ni aumenta la excreción de ácidos biliares, sino que parece actuar localizadamente en el ribete en cepillo del intestino delgado inhibiendo la absorción de colesterol, determinando una disminución en la llegada del colesterol intestinal al hígado. De este modo se logra una reducción de los depósitos hepáticos de colesterol y un aumento en el clearance de colesterol sanguíneo. Este mecanismo distintivo es complementario al de los inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Ezetimiba no mostró efectos significativos sobre

NSU

las concentraciones plasmáticas de vitaminas liposolubles (A, D y E), ni afectó la producción de hormonas esteroides de corteza adrenal.

### FARMACOCINÉTICA

Luego de su administración oral atorvastatina se absorbe rápidamente; alcanzando picos de concentración plasmática entre 1 a 2 hs. La biodisponibilidad es de 12% y la inhibición de la HMG-CoA reductasa es de un 30%. La baja disponibilidad se atribuye a depuración en la mucosa gastrointestinal y a un efecto de primer paso hepático. La presencia de alimentos disminuye la velocidad y el grado de absorción en un 25% y 9%, respectivamente. Cuando se mide la reducción de LDL por medio de la Cmax. y el área bajo la curva de concentración plasmática, dicha reducción es similar cuando se administra con o sin alimentos. Las concentraciones plasmáticas de atorvastatina son menores después de la administración vespertina cuando se compara con la administración matinal. Sin embargo, la reducción del LDL-colesterol no se afecta por el momento del día en que administra la dosis.

La unión a proteínas plasmáticas supera un 98%. En animales de experimentación atorvastatina se eliminó por leche materna.

La droga es extensamente metabolizada a derivados orto y parahidroxilados y a varios productos de beta-oxidación. Un 70% de la actividad inhibitoria sobre la HMG-CoA reductasa se atribuye a los metabolitos activos. El citocromo P-450 3A4 parece tener importancia en el metabolismo de atorvastatina, como lo demuestran estudios in vitro en los que se empleó eritromicina.

La eliminación de la droga madre y sus metabolitos se realiza primariamente a través de la bilis después de su metabolismo hepático y/o extrahepático; sin embargo, la droga no parece sufrir recirculación enterohepática. La vida media de eliminación es de 14 horas, aunque la vida media de la actividad inhibitoria de la HMG-CoA reductasa es de 20-30 horas, debido a la actividad de los metabolitos. Menos del 2% de una dosis de atorvastatin se recupera sin cambios en la orina después de su administración oral.

ESV



"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

Tras la administración oral, ezetimiba es absorbida y extensivamente conjugada a un glucurónido fenólico farmacológicamente activo. Tras una dosis única de 10 mg se alcanzan concentraciones plasmáticas máximas de ezetimiba (3.4 a 5.5 ng/ml) entre 4 y 12 hs., mientras que el pico máximo de ezetimiba glucurónido (45 a 71 ng/ml) se alcanza entre la primera y segunda hora. Esta proporcionalidad entre las concentraciones de ambos compuestos se mantuvo con dosis de 5 a 20 mg. Ezetimiba presenta una biodisponibilidad variable según el paciente.


Ezetimiba puede ser administrada con o sin alimentos ya que la ingesta alimentaria no modifica la tasa de absorción. Tanto el Ezetimiba como su forma conjugada se transportan altamente ligados (>90%) a las proteínas plasmáticas. La forma conjugada es excretada por vía biliar y renal. La relación plasmática porcentual entre ezetimiba libre y la forma conjugada es de 10-20% a 80-90% respectivamente, siendo ambos compuestos lentamente eliminados del plasma, con una vida media de aproximadamente 22 hs. y una eliminación prácticamente total a las 48 hs. Se considera que un 78% de la dosis administrada se elimina por vía fecal mientras que un 11% lo hace por vía urinaria.

### **POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN**

- *Hipercolesterolemia (heterocigota familiar y no familiar) y dislipemia mixta (Fredrickson) tipos Ila y IIb*: La dosis inicial recomendada es de 1 comprimido de **LIPAREX PLUS 10** una vez al día. Debe ser administrado en una sola toma diaria en cualquier momento del día, antes o después de la comida.

El tratamiento debe adecuarse a la respuesta individual y al objetivo terapéutico. Después de iniciar el tratamiento y durante la titulación de la dosis los niveles plasmáticos de lípidos deben controlarse cada 2 a 4 semanas para realizar el ajuste de dosis. Dado que el objetivo terapéutico es reducir los niveles de LDL se recomienda utilizar la concentración de LDL como dato previo al inicio del tratamiento y como valor control de la respuesta terapéutica. Solo en casos en los que no se dispone de la medición de LDL, puede utilizarse como dato el nivel de colesterol total.

ESV



"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

- En aquellos pacientes sin respuesta adecuada a la dosis de 20 mg diarios de atorvastatina, debe iniciarse el tratamiento directamente con **LIPAREX PLUS 20**.
- En los pacientes con respuesta inadecuada a 10 mg de diarios de ezetimiba como monoterapia el tratamiento deberá iniciarse con **LIPAREX PLUS 10**.
- *Hipercolesterolemia familiar homocigota*: En estos casos, **LIPAREX PLUS** se utiliza como tratamiento adjunto a otros para disminuir la concentración plasmática de lípidos (ej.: aféresis de LDL) o cuando estos no pudieran utilizarse o no estuvieran disponibles.
- Dosificación en pacientes con insuficiencia renal: No es necesario ajustar la dosis en estos pacientes.

#### **CONTRAINDICACIONES**

- Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula.
- Enfermedad hepática activa, niveles de transaminasas elevados en forma persistente (más de 3 veces el límite superior de la normalidad).
- Embarazo y lactancia.

#### **ADVERTENCIAS**

*Efectos hepáticos*: Al igual que con otros agentes de la misma clase, en pacientes medicados con atorvastatina se informaron elevaciones moderadas de las transaminasas séricas (> de 3 veces el límite superior de la normalidad).

En ensayos clínicos, se observaron en menos del 1% de los pacientes niveles persistentemente altos de transaminasas. Con la disminución de la dosis o la suspensión del tratamiento los niveles de enzimas hepáticas volvían a valores pretratamiento. La mayoría de los pacientes continuaron el tratamiento con una dosis menor de atorvastatina, sin secuelas. Se recomienda realizar tests de función hepática antes de comenzar la administración del fármaco y posteriormente en forma periódica una vez iniciada la terapia. Se recomienda reducir la dosis o interrumpir el tratamiento con **LIPAREX PLUS** en caso de detectarse aumentos en las transaminasas.

"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

**LIPAREX PLUS** debe utilizarse con precaución en pacientes con antecedentes de enfermedad hepática o en aquellos con una importante ingesta alcohólica. La presencia de enfermedad hepática activa o niveles persistentemente elevados de transaminasas son contraindicaciones para el uso de **LIPAREX PLUS** (Ver contraindicaciones).

*Efectos musculoesqueléticos:* La administración de atorvastatina puede producir miopatía, caracterizada por dolor o debilidad muscular acompañados de aumentos de la fosfocreatinquinasa (CPK) > 10 x ULN. Los pacientes deben informar sobre la aparición de dolor muscular sin causa aparente, debilidad muscular, especialmente si se acompaña de fiebre o malestar general. El tratamiento con **LIPAREX PLUS** debe suspenderse ante la persistencia de niveles elevados de CPK o ante la sospecha o diagnóstico de miopatía.

La administración simultánea con ciclosporina, eritromicina, niacina, derivados del ácido fibrótico o antifúngicos azólicos aumenta el riesgo de desarrollo de miopatía. En casos donde se usen tratamientos combinados con las drogas anteriormente mencionadas se recomienda realizar determinaciones de CPK en forma periódica, si bien esta conducta puede no prevenir la aparición de una miopatía severa.

**LIPAREX PLUS** debe suspenderse en forma temporaria en todos los pacientes que desarrollen cuadros compatibles con miopatía o en aquellos que tengan un factor que los predisponga al desarrollo de insuficiencia renal aguda secundaria a rhabdomiolisis (ej.: hipotensión, cirugía mayor, traumatismo, infecciones severas, alteraciones metabólicas severas, crisis convulsivas).

La administración simultánea de ezetimiba en pacientes tratados con inhibidores de la HMG-CoA reductasa no aumenta la incidencia de miopatía que éstos ocasionalmente generan.

En estudios clínicos efectuados en pacientes con insuficiencia hepática de grado variable, el área bajo la curva de ezetimiba aumentó aproximadamente 3 a 4 veces y 5 a 6 veces, respectivamente, en pacientes con moderada o severa falla hepática. Por consiguiente, desconociéndose los efectos de esta mayor exposición al ezetimiba en

"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

pacientes con insuficiencia hepática moderada o severa, no se recomienda el uso de esta medicación en estos enfermos.

En pacientes con insuficiencia renal severa el área bajo la curva de ezetimiba aumentó sólo 1,5 veces en relación con los sujetos normales, por lo cual el uso en estos casos no presenta recomendaciones especiales.

### **PRECAUCIONES**

*Insuficiencia renal:* El deterioro de la función renal no tiene influencia sobre las concentraciones plasmáticas y sobre los efectos hipolipemiantes de **LIPAREX PLUS**. Por lo tanto, no es necesario realizar ajustes en la dosis para estos pacientes.

*Insuficiencia hepática:* Las concentraciones plasmáticas de atorvastatina aumentan en forma pronunciada en pacientes con hepatopatía alcohólica crónica.

*Hígado:* En estudios con ezetimiba como única terapia hipolipemiante, la incidencia de elevación de transaminasas fue similar a la del grupo placebo. En estudios clínicos utilizando ezetimiba asociado a un inhibidor de la HMG-CoA reductasa la elevación de las transaminasas se observó en 1,3% de los casos, y en 0,4% de los pacientes tratados solamente con inhibidores de la HMG-CoA reductasa. Estas elevaciones fueron generalmente asintomáticas, sin colestasis asociadas, y desaparecieron al discontinuar la terapia. En consecuencia, cuando el ezetimiba sea administrado junto con un inhibidor de la HMG-CoA reductasa, deberán realizarse exámenes periódicos evaluando la función hepática.

Ezetimiba no se recomienda en pacientes con insuficiencia hepática moderada o Severa.

### **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS**

Se han reportado casos raros de miopatía necrotizante inmunomediada durante o después del tratamiento con estatinas. La miopatía necrotizante inmunomediada se caracteriza clínicamente por debilidad muscular proximal y elevación de CPK, que persiste a pesar de la discontinuación del tratamiento con estatinas.

LAB. FINADIET S.A.C.I.F.I.

LEONARDO FULLONE  
FARMACÉUTICO  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.N. 12.622

"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

## **EMBARAZO Y LACTANCIA**

Contraindicado durante el embarazo y la lactancia. Las mujeres en edad fértil que reciban tratamiento con LIPAREX PLUS deben utilizar un método anticonceptivo adecuado. No existen datos sobre la excreción de las drogas en leche materna, por lo que se recomienda suspender la lactancia cuando la madre reciba tratamiento con este fármaco.

Uso pediátrico: Se desaconseja el tratamiento con LIPAREX PLUS en niños.

Uso en geriatría: Las concentraciones plasmáticas de atorvastatina en sujetos añosos (mayores de 65 años) son mayores cuando se compararon con adultos jóvenes (en un 40% para la concentración plasmática máxima y en un 30% para el área bajo la curva). Los efectos sobre los lípidos, sin embargo, fueron similares para ambas poblaciones. La efectividad y seguridad del ezetimiba fue evaluada en un grupo de pacientes de más de 75 años, sin hallar diferencias significativas respecto del grupo control.

## **INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS**

### **Atorvastatina**

Existe aumento en el riesgo de desarrollo de miopatía en pacientes que reciben tratamiento simultáneo con ciclosporina, derivados del ácido fibríco, eritromicina, antifúngicos azólicos o niacina.

Antiácidos: La administración simultánea de atorvastatina con antiácidos que contienen hidróxido de magnesio o aluminio reduce las concentraciones plasmáticas del primero en un 35%. Sin embargo, las reducciones de LDL-colesterol no se vieron afectadas.

Antipirina: Atorvastatina no afectó la farmacocinética de la antipirina, por lo tanto, no son de esperar interacciones con drogas que se metabolizan a través de las mismas isoenzimas del citocromo.

Colestiramina: La administración simultánea con colestiramina reduce las concentraciones plasmáticas de atorvastatina en aproximadamente un 25%. Sin

"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

embargo, los efectos sobre la reducción de los niveles de lípidos son mayores cuando ambas drogas se administran en forma conjunta.

*Digoxina:* Los pacientes en tratamiento con digoxina deben ser controlados, debido a que la administración de atorvastatina aumentó las concentraciones plasmáticas de digoxina en un 20%.

*Eritromicina:* La administración de eritromicina, inhibidor del citocromo P450 3A4, se asoció con aumentos de las concentraciones plasmáticas de atorvastatina.

*Anticonceptivos orales:* Los valores del área bajo la curva de concentración de noretindrona y etilestradiol aumentaron en 30% y 20% respectivamente cuando se administraron en forma simultánea con atorvastatina. Este efecto debe considerarse cuando se selecciona un anticonceptivo oral en una mujer que recibe tratamiento con

#### **LIPAREX PLUS.**

Atorvastatina no demostró interacciones clínicamente significativas con warfarina, cimetidina, agentes antihipertensivos y tratamiento de reemplazo hormonal.

#### **Ezetimiba**

*Colestiramina:* La administración concomitante de colestiramina disminuye el área bajo la curva de ezetimiba en 55%, por lo cual los beneficios de asociar ezetimiba al tratamiento con colestiramina son mínimos.

*Fibratos:* La efectividad y seguridad del ezetimiba asociado con fibratos no ha sido establecida. En un estudio en perros el ezetimiba aumentó el contenido de colesterol en bilis, que podría potenciar el conocido aumento en la excreción de colesterol hacia bilis generado por los fibratos. En consecuencia no se recomienda la coadministración de ezetimiba y fibrato.

En un estudio farmacocinético la administración concomitante de fenofibrato aumentó la concentración de ezetimiba en un 50%.

*Gemfibrozil:* En un estudio farmacocinético, la administración concomitante de gemfibrozil aumentó la concentración de ezetimiba en un 70%.

*Inhibidores de HMG-CoA reductasa:* No se observaron interacciones farmacocinéticas entre ezetimiba y atorvastatina, simvastatina, pravastatina, lovastatina o fluvastatina.



"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

*Ciclosporina:* En un paciente con trasplante renal que recibía ciclosporina los niveles de ezetimiba aumentaron 12 veces. En consecuencia, los pacientes que reciben ezetimiba y ciclosporina deben ser cuidadosamente monitoreados.

Ezetimiba no ha demostrado interacciones farmacológicas significativas cuando se administra simultáneamente con warfarina, digoxina, anticonceptivos orales, cimetidina o glipizida.

### **REACCIONES ADVERSAS**

Las reacciones adversas con atorvastatina son generalmente leves y transitorias. En ensayos clínicos, menos del 2% de los pacientes suspendieron el tratamiento debido a efectos adversos causados por atorvastatina.

*En general:* Infección, cefalea, síndrome gripal, dolor abdominal, dolor lumbar, reacción alérgica, astenia, edema facial, fiebre, rigidez cervical, malestar, reacción de fotosensibilidad, edema generalizado.

*Aparato digestivo:* Constipación, diarrea, dispepsia, flatulencia, tests anormales de funcionamiento hepático, úlcera duodenal o gástrica, hepatitis, pancreatitis, ictericia colestática, gastroenteritis, colitis, vómitos, gastritis, hemorragia rectal, esofagitis, glositis, ulceración de la boca, estomatitis, anorexia, aumento del apetito, disfagia, dolor biliar, melena, hemorragia gingival.

*Aparato respiratorio:* Sinusitis, faringitis, neumonía, asma, epistaxis.

*Sistema Nervioso:* Parestesias, somnolencia, amnesia, alteraciones del sueño, disminución de la libido, ataxia, neuropatía periférica, torticolis, parálisis facial, hiperkinesia.

*Aparato musculoesquelético:* Artralgias, mialgias, calambres musculares, bursitis, tenosinovitis, miastenia, miositis, miopatía necrotizante inmunomediada (frecuencia desconocida).

*Piel y anexos:* Eritema, prurito, dermatitis de contacto, alopecia, piel seca, sudoración, acné, urticaria, eczema, seborrea, úlceras de piel.

*Aparato urogenital:* Aumento de la frecuencia urinaria, cistitis, hematuria, impotencia, disuria, litiasis renal, nocturia, epididimitis, enfermedad fibroquística de la mama, hemorragia vaginal, albuminuria, agrandamiento de la mama, metrorragia, nefritis, incontinencia urinaria, retención urinaria, eyaculación anormal.

*Órganos de los sentidos:* Ambliopía, tinitus, sequedad de la conjuntiva, alteraciones de la refracción, ojo rojo, sordera, parosmia, pérdida del gusto, disgeusia.

*Aparato cardiovascular:* Palpitaciones, vasodilatación, síncope, migraña, hipotensión ortostática, flebitis, arritmia.

*Alteraciones metabólicas:* Hiperglucemia, aumento de la CPK, gota, aumento de peso, hipoglucemia.

*Sangre y sistema linfático:* Equimosis, anemia, linfadenopatía, trombocitopenia, petequias.

En los estudios clínicos ezetimiba fue habitualmente bien tolerado, siendo las reacciones adversas leves y transitorias. La incidencia global de efectos secundarios observados con ezetimiba fue similar a la comunicada con placebo, lo mismo que la tasa de interrupción de tratamiento. Las siguientes fueron las reacciones adversas más comunes (1 en 100/100, </1/10) vinculadas a la droga, en los pacientes que recibieron ezetimiba solo: cefalea, dolor abdominal y diarrea.

Cuando ezetimiba fue coadministrado con una estatina, los efectos adversos más comunes fueron: cefalea, fatiga, dolor abdominal, constipación, diarrea, flatulencia, náuseas, incremento en las transaminasas (Ver precauciones) y mialgias.

### **NOTIFICACION DE SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS**

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Nacional de Farmacovigilancia al siguiente link:



[http://sistemas.anmat.gov.ar/aplicaciones\\_net/applications/fvg\\_eventos\\_adversos\\_nuevo/index.html](http://sistemas.anmat.gov.ar/aplicaciones_net/applications/fvg_eventos_adversos_nuevo/index.html)

### **SOBREDOSIFICACIÓN**

No se conoce un tratamiento específico en caso de sobredosis por atorvastatina y/o ezetimiba. En estos casos se recomienda tratar al paciente en forma sintomática y deben indicarse medidas de soporte vital. Se desaconseja el empleo de hemodiálisis, debido al alto porcentaje de atorvastatina unido a proteínas plasmáticas.

**"Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:**

Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" Tel.: (011) 4962-6666/2247.

Hospital de Niños "Dr. Pedro de Elizalde" Tel.: (011) 4300-2115/ 4362-6063.

Hospital Nacional "A. Posadas" Tel.: (011) 4654-6648/ 4658-7777.

Hospital de Pediatría "Sor María Ludovica" Tel.: (0221) 451-5555"

### **Mantener fuera del alcance de los niños**

**Conservación:** Conservar en lugar seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C

### **Presentaciones**

#### **LIPAREX PLUS 10 - LIPAREX PLUS 20**

En envases de 10, 14, 15, 20, 28, 30, 40, 50, 60, 90 comprimidos.

Envases con 500 y 1000 para USO HOSPITALARIO EXCLUSIVO.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificados N° 54.220

**Director Técnico:** Leonardo Fullone. Farmacéutico.



"2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional"

**FINADIET S.A.C.I.F.I.**

Hipólito Yrigoyen 3769/71 (C1208ABE)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

TE (011) 4981-5444/5544/5644

[www.finadiet.com.ar](http://www.finadiet.com.ar)

Fecha última revisión: ...../...../.....

NS3

Hipólito Yrigoyen 3769/71  
C1208ABE - Buenos Aires-  
Tel. (011) 4981-5444/5544/5644/5744 -  
e-mail: lfullone@finadiet.com.ar  
[www.finadiet.com.ar](http://www.finadiet.com.ar)

LAB. FINADIET S.A.C.I.F.I.  
LEONARDO FULLONE  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.N. 12322

