



"2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los trabajadores"

*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

## DISPOSICIÓN N° 1942

BUENOS AIRES, 18 MAR 2011

VISTO el Expediente N° 1-0047-0000-020015-10-9 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica;  
Y

### CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A., solicita la aprobación de nuevos proyectos de prospectos para la Especialidad Medicinal denominada CERTICAN / EVEROLIMUS, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS 0,25mg – 0,50mg – 0,75mg – 1,00mg y COMPRIMIDOS DISPERSABLES 0,1mg – 0,25mg; aprobada por Certificado N° 51.576.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición N°: 5904/96.

Que los procedimientos para las modificaciones y/o rectificaciones de los datos característicos correspondientes a un certificado de Especialidad Medicinal otorgado en los términos de la Disposición ANMAT N° 5755/96, se encuentran establecidos en la Disposición ANMAT N° 6077/97.



*"2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los trabajadores"*

*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

**DISPOSICIÓN N° 1942**

Que a fojas 356 obra el informe técnico favorable de la Dirección de Evaluación de Medicamentos.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros.: 1.490/92 y 425/10.

Por ello:

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. - Autorízase el cambio de prospectos presentado para la Especialidad Medicinal denominada CERTICAN / EVEROLIMUS, aprobada por Certificado N° 51.576 y Disposición N° 4540/04, propiedad de la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A., cuyos textos constan de fojas 40 a 105, para los Comprimidos y de fojas 131 a 196, para los Comprimidos Dispersables.

ARTICULO 2º. - Sustitúyase en el Anexo II de la Disposición autorizante ANMAT N° 4540/04 los prospectos autorizados por las fojas 40 a 61 y 131 a 152, de las aprobadas en el artículo 1º, los que integrarán en el Anexo I de la presente.

ARTICULO 3º. - Acéptase el texto del Anexo de Autorización de modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente



"2011 - Año del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los trabajadores"

Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 1942

disposición y el que deberá agregarse al Certificado N° 51.576 en los términos de la Disposición ANMAT N° 6077/97.

ARTICULO 4º. - Regístrese; gírese a la Coordinación de Informática a los efectos de su inclusión en el legajo electrónico, por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, gírese al Departamento de Registro para que efectúe la agregación del Anexo de modificaciones al certificado original y entrega de la copia autenticada de la presente Disposición. Cumplido, archívese PERMANENTE.

EXPEDIENTE N° 1-0047-0000-020015-10-9

DISPOSICION N° 1942

js

Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENTOR  
A.N.M.A.T.



"2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los trabajadores"

Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

### ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Interventor de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N°.....**1942**..... a los efectos de su anexo en el Certificado de Autorización de Especialidad Medicinal N° 51.576 y de acuerdo a lo solicitado por la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A., del producto inscripto en el registro de Especialidades Medicinales (REM) bajo:

Nombre comercial / Genérico/s: CERTICAN / EVEROLIMUS, Forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS 0,25mg – 0,50mg – 0,75mg – 1,00mg y COMPRIMIDOS DISPERSABLES 0,1mg – 0,25mg.-

Disposición Autorizante de la Especialidad Medicinal N° 4540/04.-

Tramitado por expediente N° 1-47-0000-011316-03-6.-

| DATO A MODIFICAR | DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA    | MODIFICACION AUTORIZADA                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prospectos.      | Anexo de Disposición N° 4974/08.- | Prospectos de fs. 40 a 105, para los Comprimidos y de fojas 131 a 196, para los Comprimidos Dispersables, corresponde desglosar fs. 40 a 61 y 131 a 152.- |

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.



"2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y la Seguridad de los trabajadores"

Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del REM a la firma NOVARTIS ARGENTINA S.A., Titular del Certificado de Autorización N° 51.576 en la Ciudad de Buenos Aires, a los días.....,del mes de.....1.8.MAR.2011.....de 2011

Expediente N° 1-0047-0000-020015-10-9

DISPOSICIÓN N° **1942**

js

*Orsingher*  
Dr. OTTO A. ORSINGER  
SUB-INTERVENIUM  
A.N.M.A.T.

1942

ORIGINAL



PROYECTO DE PROSPECTO DE ENVASE

Novartis

**Certican®**

**Everolimus**

**Comprimidos**

Venta bajo receta archivada

Industria Suiza

**FORMULA**

Cada comprimido de Certican® de 0,25 mg contiene:

Everolimus.....0,25 mg

Excipientes: Butilhidroxitolueno, estearato de magnesio, monohidrato de lactosa, hipromelosa, crospovidona, lactosa anhidra.....c.s.

Cada comprimido de Certican® de 0,50 mg contiene:

Everolimus.....0,50 mg

Excipientes: Butilhidroxitolueno, estearato de magnesio, monohidrato de lactosa, hipromelosa, crospovidona, lactosa anhidra.....c.s.

Cada comprimido de Certican® de 0,75 mg contiene:

Everolimus.....0,75 mg

Excipientes: Butilhidroxitolueno, estearato de magnesio, monohidrato de lactosa, hipromelosa, crospovidona, lactosa anhidra.....c.s.

Cada comprimido de Certican® de 1,00 mg contiene:

Everolimus.....1,00 mg

Excipientes: Butilhidroxitolueno, estearato de magnesio, monohidrato de lactosa, hipromelosa, crospovidona, lactosa anhidra.....c.s.

**ACCION TERAPEUTICA**

Inmunosupresor selectivo. Clasificación ATC: L04A A18.

**INDICACIONES**


Certican® está indicado para la profilaxis del rechazo de órganos en pacientes adultos con riesgo inmunológico leve a moderado que reciben un alotrasplante de riñón o de corazón. Certican® se debe utilizar en asociación con ciclosporina para microemulsión y corticosteroides.

**CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS/PROPIEDADES**

**Acción farmacológica**

Certican® es un inhibidor de la señal de proliferación celular que previene el rechazo del aloinjerto en roedores y simios con alotransplantes. Certican® ejerce su efecto inmunosupresor a través de la inhibición de la proliferación y, en consecuencia, de la expansión clonal de los linfocitos T activados por el antígeno, que está mediada por interleucinas específicas para los linfocitos T, a saber, la interleucina-2 y la interleucina-15. Certican® inhibe una vía de transducción de señales intracelulares que es inducida por la unión de estos factores de crecimiento de los linfocitos T a sus receptores respectivos y que, normalmente, conduce a la proliferación celular. El

Novartis Argentina S.A.  
Farm. Elsa Orosa  
Co-Directora Técnica - M.N. 15.575  
Gte. de Asuntos Regulatorios  
Apoderada



bloqueo de esta señal inducido por everolimus lleva a un arresto de las células en el estadio G1 del ciclo celular.

A escala molecular, Certican® forma un complejo con la proteína citoplasmática FKBP-12. La presencia de Certican® inhibe la fosforilación de la quinasa p70S6, que es estimulada por el factor de crecimiento. Dado que la fosforilación de la quinasa p70S6 está bajo el control de la quinasa FRAP (también denominada m-TOR), este hallazgo sugiere que el complejo everolimus-FKBP-12 se une a FRAP e interfiere con el funcionamiento de esta última. FRAP es una proteína reguladora clave que gobierna el metabolismo, el crecimiento y la proliferación celular, por lo que el bloqueo de la función de FRAP explica el arresto del ciclo celular causado por Certican®.

Everolimus actúa de un modo diferente de la ciclosporina. En los modelos preclínicos de alotrasplante la combinación de everolimus con ciclosporina fue más eficaz que cualquiera de los fármacos por separado.

El efecto del everolimus no se restringe a los linfocitos T. Por el contrario, everolimus inhibe en general la proliferación estimulada por los factores de crecimiento de las células hematopoyéticas y células no hematopoyéticas como, p. ej., las células del músculo liso vascular. La proliferación de las células del músculo liso vascular estimulada por factores de crecimiento, inducida por la injuria de las células endoteliales y que lleva a la formación de neointima, desempeña un papel fundamental en la patogénesis del rechazo crónico. Los estudios preclínicos con everolimus revelan una inhibición de la formación de neointima en un modelo murino de alotrasplante de aorta.

### *Estudios clínicos*

#### Trasplante renal

Se investigaron los efectos de Certican®, a dosis fija de 1,5 mg/día y 3 mg/día, en combinación con dosis convencionales de ciclosporina para microemulsión y corticosteroides en 2 ensayos clínicos sobre trasplante renal *de novo* de fase III (B201 y B251). Como medicamento de referencia se utilizó micofenolato de mofetilo (MMF) 1g 2 veces al día. Los puntos finales compuestos principales fueron el fallo de la eficacia (rechazo agudo confirmado por biopsia, pérdida del injerto, muerte o pérdida para el seguimiento) a los 6 meses y la pérdida del injerto, la muerte o la pérdida para el seguimiento a los 12 meses. Globalmente, Certican® no resultó inferior a MMF en estos ensayos. Las incidencias de rechazo agudo confirmado por biopsia a los 6 meses en el estudio B201 fueron 21,6%; 18,2% y 23,5% para los grupos tratados con 1,5 mg/día de Certican®, 3 mg/día de Certican® y MMF, respectivamente. En el estudio B251 las incidencias fueron 17,1%; 20,1% y 23,5% para los grupos tratados con 1,5 mg/día de Certican®, 3 mg/día de Certican® y MMF, respectivamente.

Se observó disminución de la función del aloinjerto con elevación de la creatinina sérica más frecuentemente en los individuos que utilizaron Certican® asociado a dosis plena de ciclosporina para microemulsión que en los pacientes tratados con MMF. Este efecto sugiere que Certican aumenta la nefrotoxicidad de ciclosporina. El análisis de concentración de medicación- farmacodinamia mostró que la función renal puede ser mejorada con una exposición reducida a ciclosporina mientras que se conserva la eficacia en tanto y cuanto los niveles del valle de everolimus estén por encima de 3 ng/mL. Este concepto fue subsiguientemente confirmado en dos estudios fase III (A2306 y A2307) incluyendo 237 y 256 pacientes respectivamente, los que evaluaron la eficacia y seguridad de Certican® después de la administración de 1,5 mg/día y 3

mg/día de Certican® (dosis inicial, la dosis subsiguiente se basa en la concentración en el valle (C0) deseada  $\geq 3$  ng/mL) en combinación con exposición reducida a la ciclosporina. En ambos estudios la función renal mejoró sin comprometer la eficacia. Sin embargo, en estos ensayos faltó un grupo de comparación no tratado con Certican.

Se ha completado un estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado, de etiqueta abierta, controlado: estudio A2309 en el cual 833 trasplantados renales *de novo* fueron aleatorizados a 1 de 2 regimenes conteniendo Certican®, difiriendo por dosaje, y combinados con dosis reducida de ciclosporina o un regimen standard de micofenolato (MPA) + ciclosporina y tratados por 12 meses. Todos los pacientes recibieron inducción con basiliximab pre-trasplante y en el día 4 post-trasplante. Los corticoesteroides podían ser suministrados según se requiriese post-trasplante.

Las dosis de comienzo en los 2 grupos con Certican® fueron 1,5 y 3 mg/día, suministradas 2 veces al día, subsiguientemente modificadas desde el día 5 en adelante para mantener los niveles del valle de everolimus objetivo, de 3-8 ng/mL y 6-12 ng/mL respectivamente. La dosis de micofenolato de sodio fue de 1,44 g/día. Las dosis de ciclosporina fueron adaptadas para mantener los niveles objetivo dentro de las ventanas como se muestra en la Tabla 1. Los niveles reales medidos para las concentraciones de everolimus y ciclosporina (C0 y C2) se muestran en la Tabla 2.

A pesar de que el régimen de mayor dosis de Certican® fue tan efectivo como el de dosis más baja, la seguridad fue globalmente peor y por lo tanto este nivel alto no es recomendado.

Se recomienda el nivel de dosis más baja (ver "POSOLOGIA/DOSIFICACION – MODO DE ADMINISTRACION")

**Tabla 1 Estudio A2309: niveles del valle objetivo de ciclosporina.**

| Ciclosporina (ng/mL) | C0 | Mes 1   | Mes 2-3 | Mes 4-5 | Mes 6-12 |
|----------------------|----|---------|---------|---------|----------|
| Grupos Certican      |    | 100-200 | 75-150  | 50-100  | 25-50    |
| Grupo MPA            |    | 200-300 | 100-250 | 100-250 | 100-250  |

**Tabla 2 Estudio A2309: niveles del valle medidos de ciclosporina y everolimus. Niveles del valle (ng/mL)**

|              | Grupos Certican® (baja dosis de ciclosporina) |         |                |         | MPA(ciclosporina standard) |         |
|--------------|-----------------------------------------------|---------|----------------|---------|----------------------------|---------|
|              | Certican® 1,5 mg                              |         | Certican® 3 mg |         | Myfortic® 1,44 g           |         |
| Ciclosporina | C0                                            | C2      | C0             | C2      | C0                         | C2      |
| Día 7        |                                               | 195±106 | 192±104        | 718±319 | 239±130                    | 934±438 |
| Mes 1        |                                               | 847±412 | 177± 99        | 762±378 | 250±119                    | 992±482 |
| Mes 3        |                                               | 173± 84 | 123± 75        | 548±272 | 182± 65                    | 821±273 |
| Mes 6        |                                               | 770±364 | 80±40          | 426±225 | 163±103                    | 751±269 |
| Mes 9        |                                               | 122± 53 | 51±30          | 296±183 | 149± 69                    | 648±265 |
| Mes 12       |                                               | 580±322 | 49±27          | 281±198 | 137± 55                    | 587±241 |
|              | 88 ± 55                                       | 408±226 |                |         |                            |         |
|              | 55 ± 24                                       | 319±172 |                |         |                            |         |
|              | 55 ± 38                                       | 291±155 |                |         |                            |         |

Novartis Argentina S.A.  
Farm. Elsa Orsola  
Co-Directora Técnica - M.N. 15.575  
Gte. de Asuntos Regulatorios  
Apooderada

4/6





|            |                       |                        |   |
|------------|-----------------------|------------------------|---|
| Everolimus | Nivel objetivo C0 3-8 | Nivel objetivo C0 6-12 |   |
| Día 7      |                       |                        | - |
| Mes 1      | 4,5±2,3               | 8,3±4,8                | - |
| Mes 3      | 5,3±2,2               | 8,6±3,9                | - |
| Mes 6      | 6,0±2,7               | 8,8±3,6                | - |
| Mes 9      | 5,3±1,9               | 8,0±3,1                | - |
| Mes 12     | 5,3±1,9               | 7,7±2,6                | - |
|            | 5,3±2,3               | 7,9±3,5                |   |

Los números son medias ± desviación standard de los niveles medidos;  
C0= concentración mínima, C2: concentración a las 2 horas post-dosis.

El criterio de valoración principal de la eficacia consistió en una variable compuesta representativa del fracaso terapéutico (rechazo agudo comprobado por biopsia, pérdida del injerto, deceso o paciente perdido al seguimiento). La tabla 3 presenta los resultados.

Tabla 3 Estudio A2309: puntos finales de eficacia individuales y compuestos a los 6 y 12 meses (incidencia en la población ITT).

|                                                   | Certican® 1,5 mg<br>N=277<br>%(n)   |                    | Certican® 3,0 mg<br>N=279<br>%(n) |                     | MPA 1,44 g<br>N=277<br>%(n) |           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
|                                                   | 6m                                  | 12m                | 6m                                | 12m                 | 6m                          | 12m       |
|                                                   | Punto final compuesto (1° criterio) | 19,1(53)           | 25,3(70)                          | 16,8(47)            | 21,5(60)                    | 18,8 (52) |
| Diferencia % (Certican® - MPA) 95% IC             | 0,4%<br>(-6,2;6,9)                  | 1,1%<br>(-6,1;8,3) | -1,9%<br>(-8,3;4,4)               | -2,7%<br>(-9,7;4,3) |                             |           |
| Puntos finales individuales (2° criterio)         |                                     |                    |                                   |                     |                             |           |
| RAPB tratada                                      | 10,8(30)                            | 16,2(45)           | 10,0(28)                          | 13,3(37)            | 13,7(38)                    | 17,0(47)  |
| Pérdida del injerto                               | 4,0(11)                             | 4,3(12)            | 3,9(11)                           | 4,7(13)             | 2,9(8)                      | 3,2(9)    |
| Muerte                                            | 2,2(6)                              | 2,5(7)             | 1,8(5)                            | 3,2(9)              | 1,1(3)                      | 2,2(6)    |
| Pérdida al seguimiento                            | 3,6(10)                             | 4,3(12)            | 2,5(7)                            | 2,5(7)              | 1,8(5)                      | 3,2 (9)   |
| Puntos finales combinados                         |                                     |                    |                                   |                     |                             |           |
| Pérdida del injerto/muerte                        | 5,8 (16)                            | 6,5(18)            | 5,7(16)                           | 7,5(21)             | 4,0(11)                     | 5,4(15)   |
| Pérdida del injerto/muerte/pérdida al seguimiento | 9,4(26)                             | 10,8(30)           | 8,2(23)                           | 10,0(28)            | 5,8(16)                     | 8,7(24)   |

m: meses, 1°: primario, 2°: secundario, IC: intervalo de confianza, el margen de no inferioridad fue 10%.

Punto final combinado: rechazo agudo comprobado por biopsia (RAPB), pérdida del injerto, muerte, pérdida al seguimiento.

Novartis Argentina S.A.  
Farm. Elsa Orsola  
Co-Directora Técnica - M.N. 15.875  
C/ de Asesorías Regulatorias  
Apoderada

Los cambios en la función renal, mostrados como cálculos de la tasa de filtración (TF) usando la fórmula MDER se muestran en la Tabla 4.

La proteinuria fue evaluada en las visitas según lo estipulado por análisis de proteinuria de spot proteinuria/creatininuria y categorizada según niveles de relevancia clínica como está representado en la Tabla 5. Pocos pacientes en alguno de los grupos de tratamiento alcanzaron el umbral nefrótico, pero una mayor proporción de pacientes estuvo consistentemente en la categoría subnefrótica comparado con el grupo MPA. Un efecto relacionado con la concentración se observó como relacionado a la proteinuria sobre todo con niveles del valle superiores a 8 ng/mL.

Los eventos adversos reportados más frecuentemente que con MPA, grupo control, en el rango recomendado de Certican® bajas dosis se han incluido en la tabla 10. Para los pacientes tratados con Certican® se reportó una menor frecuencia de infecciones virales, principalmente menores tasas de infección por CMV (0,7% vs 5,95%) y virus BK (1,5% vs 4,8%).

Tabla 4 Estudio A2309: función renal (TF calculada por MDER) a los 12 meses (población IT).

|                                                     | Certican® 1,5 mg<br>N=277 | Certican® 3 mg<br>N=279 | MPA=1.44G<br>N=277 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| TF media al mes 12<br>(mL/min./1.73m <sup>2</sup> ) | 54,6                      | 51,3                    | 52,2               |
| Diferencia de medias<br>(everolimus-MPA)            | 2,37                      | -0,89                   | -                  |
| IC 95%                                              | (-1,7;6,4)                | (-5,0;3,2)              | -                  |

Imputación por valores faltantes al mes 12 para la TF: pérdida del injerto=0, muerte o pérdida al seguimiento para la función renal (arrastré de la última observación hasta fin de tratamiento (hasta el mes 12))  
 MDER: modificación de la dieta en enfermedad renal.  
 TF: tasa de filtración glomerular.

Tabla 5 Estudio A2309: relación proteína/creatinina urinaria.

| Categoría de proteinuria (mg/mmol) |             |            |          |                      |               |
|------------------------------------|-------------|------------|----------|----------------------|---------------|
| Mes 12                             | Tratamiento | Normal%(n) | Leve%(n) | Sub<br>nefrótico%(n) | Nefrótico%(n) |

| PFT |                     | (<3,39) | (3,39-<33,9) | (33,9-<339) | (>339)  |
|-----|---------------------|---------|--------------|-------------|---------|
|     | Certican®<br>1,5 mg | 0,4(1)  | 64,2(174)    | 32,5(88)    | 3,0(8)  |
|     | Certican®3<br>mg    | 0,7(2)  | 59,2(164)    | 33,9(94)    | 5,8(16) |
|     | MPA 1.44 g          | 1,8(5)  | 73,1(198)    | 20,7(56)    | 4,1(11) |

1 mg/mmol=8,84 mg/g

PFT: Punto final del tratamiento (valor obtenido después de 12 meses o última observación disponible).

### Transplante cardíaco

En el estudio sobre trasplante cardíaco de fase III (B253) se investigó la administración de 1,5 mg/día y 3 mg/día de Certican® en asociación con dosis convencionales de ciclosporina para microemulsión y corticosteroides frente a una dosis de 1-3 mg/Kg/día de azatioprina (AZA) como tratamiento de referencia. El punto final primario fue la incidencia compuesta de rechazo agudo  $\geq$  grado 3A de la *International Society of Heart and Lung Transplant* (ISHLT), rechazo agudo asociado con compromiso hemodinámico, pérdida del injerto, muerte del paciente o pérdida para el seguimiento a los 6; 12 y 24 meses. Ambas dosis de Certican® fueron mejores que la AZA al cabo de 6; 12 y 24 meses. La incidencia de rechazo agudo confirmado por biopsia  $\geq$  grado 3A de ISHLT a los 6 meses fue 27,8% en el grupo tratado con 1,5 mg/día, 19% en el grupo tratado con 3 mg/día y 41,6% en el grupo AZA, respectivamente ( $p = 0,003$  para el grupo 1,5 mg/día frente al grupo control;  $p < 0,001$  para el grupo 3 mg/día frente al grupo control).

Sobre la base de los datos de las ecografías intracoronarias obtenidas en un subgrupo de la población del estudio, ambas dosis de Certican® fueron más eficaces, con nivel de significación estadística, que la AZA para la prevención de la vasculopatía del aloinjerto (definida como un aumento del espesor máximo de la íntima igual o superior a 0,5 mm respecto del espesor basal, en por lo menos un corte apareado de una secuencia automatizada durante la extracción del catéter), que constituye un importante factor de riesgo para la pérdida del injerto en el largo plazo.

Las elevaciones de la creatinemia fueron más frecuentes entre los sujetos que recibieron Certican® asociado con una dosis completa de ciclosporina en microemulsión que en los pacientes tratados con AZA. Estos resultados indicaron que Certican® incrementa la nefrotoxicidad inducida por la ciclosporina; sin embargo, un análisis más profundo indicó que podía mejorarse la función renal reduciendo la dosis de ciclosporina sin afectar la eficacia, siempre que las concentraciones de everolimus se mantuvieran por arriba de un determinado umbral. Así pues, se emprendió el estudio A2411 para investigar esta cuestión.

El estudio A2411, sin ciego, aleatorizado y de 12 meses de duración, comparó el tratamiento con Certican® asociado a dosis reducidas de ciclosporina en microemulsión y corticoesteroides, con el micofenolato mofetilo (MMF) asociado a dosis convencionales de ciclosporina en microemulsión y corticoesteroides en pacientes con un primer trasplante de corazón. El tratamiento con Certican® se inició con la dosis de 1,5 mg al día y luego se ajustó para mantener concentraciones sanguíneas mínimas de

Novartis Argentina S.A.  
Fam. Elsa Orsola  
Co-Directora Técnica - M.N. 15.575  
Gle. de Asesorías Regulatorias  
Apoderada

everolimus entre 3 y 8 ng/mL. El tratamiento con el MMF se inició con la dosis de 1.500 mg 2 veces al día. Las dosis de ciclosporina en microemulsión se ajustaron para conseguir las siguientes concentraciones mínimas (ng/mL):

| Concentración de ciclosporina deseada (C0) | Mes 1   | Mes 2   | Meses 3-4 | Meses 5-6 | Meses 7-12 |
|--------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|------------|
| Grupo tratado con Certican                 | 200-350 | 150-250 | 100-200   | 75-150    | 50-100     |
| Grupo tratado con el MMF                   | 200-350 | 200-350 | 200-300   | 150-250   | 100-250    |

Las concentraciones sanguíneas medidas figuran en la Tabla 6.

Tabla 6. Estudio A2411: resumen estadístico de las concentraciones sanguíneas de ciclosporina A\* (media  $\pm$  DE).

|        | Grupo tratado con Certican® (N=91) | Grupo tratado con el MMF (N=83) |
|--------|------------------------------------|---------------------------------|
| Visita | C0                                 | C0                              |
| Día 4  | 154 $\pm$ 71<br>n=79               | 155 $\pm$ 96<br>n=74            |
| Mes 1  | 245 $\pm$ 99<br>n=76               | 308 $\pm$ 96<br>n=71            |
| Mes 3  | 199 $\pm$ 96<br>n=70               | 256 $\pm$ 73<br>n=70            |
| Mes 6  | 157 $\pm$ 61<br>n=73               | 219 $\pm$ 83<br>n=67            |
| Mes 9  | 133 $\pm$ 67<br>n=72               | 187 $\pm$ 58<br>n=64            |
| Mes 12 | 110 $\pm$ 50<br>n=68               | 180 $\pm$ 55<br>n=64            |

\* Concentraciones sanguíneas de ciclosporina (C0)

La Tabla 7 presenta los cambios de la función renal y la Tabla 8 los resultados sobre la eficacia.

Tabla 7. Estudio A2411: variaciones de la depuración de creatinina durante el estudio (pacientes con pares de valores).

|       |                     | Depuración de creatinina estimada (Cockcroft-Gault)* (mL/min.) |                                                      |                                                    |
|-------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |                     | Valor inicial<br>Media ( $\pm$ DE)                             | Valor en una determinada visita<br>Media ( $\pm$ DE) | Diferencia entre los grupos<br>Media (IC del 95 %) |
| Mes 1 | Certican®<br>(n=87) | 73,8 ( $\pm$ 27,8)                                             | 68,5 ( $\pm$ 31,5)                                   | -7,3                                               |

Novartis Argentina S.A.  
Farm. Elsa Orosa  
Co-Directora Técnica - M.N. 15.575  
Gte. de Asuntos Regulatorios  
Apoderada

|        |                     |               |               |              |
|--------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
|        | MMF<br>(n=78)       | 77,4 (± 32,6) | 79,4 (± 36,0) | (-18,1; 3,4) |
| Mes 6  | Certican®<br>(n=83) | 74,4 (± 28,2) | 65,4 (± 24,7) | -5,0         |
|        | MMF<br>(n=72)       | 76,0 (± 31,8) | 72,4 (± 26,4) | (-13,6; 2,9) |
| Mes 12 | Certican®<br>(n=71) | 74,8 (± 28,3) | 68,7 (± 27,7) | -1,8         |
|        | MMF<br>(n=71)       | 76,2 (± 32,1) | 71,9 (± 30,0) | (-11,2; 7,5) |

\* Incluye los pacientes con un valor inicial y un valor en la visita en cuestión.

Tabla 8. Estudio A2411: Incidencias de acontecimientos representativos de la ineficacia del tratamiento (en la población ITT).

| Variable de eficacia                                        | Certican®<br>n=92 | MMF<br>n=84    | Diferencia<br>Media (IC del<br>95%) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|
| <b>Después de 6 meses</b>                                   |                   |                |                                     |
| Rechazo agudo comprobado por biopsia ≥ grado 3A de la ISHLT | 18<br>(19,6 %)    | 23<br>(27,4 %) | -7,8<br>(-20,3; 4,7)                |
| Variable compuesta de ineficacia *                          | 26<br>(28,3 %)    | 31<br>(36,9 %) | -8,6<br>(-22,5; 5,2)                |
| <b>Después de 12 meses</b>                                  |                   |                |                                     |
| Rechazo agudo comprobado por biopsia ≥ grado 3A de la ISHLT | 21<br>(22,8 %)    | 25<br>(29,8 %) | -6,9<br>(-19,9; 6,1)                |
| Variable compuesta de ineficacia *                          | 30<br>(32,6 %)    | 35<br>(41,7 %) | -9,1<br>(-23,3; 5,2)                |
| Deceso o pérdida del injerto/retrasplante                   | 10<br>(10,9 %)    | 10<br>(11,9 %) | -                                   |

\* La variable compuesta de ineficacia incluye cualquiera de los siguientes criterios: rechazo agudo ≥ grado 3A, rechazo agudo con deficiencia hemodinámica, pérdida del injerto, deceso o paciente perdido al seguimiento.

### Farmacocinética

#### • Absorción

Everolimus alcanza la concentración sérica máxima entre 1 y 2 horas después de la administración de 1 dosis oral. Las concentraciones sanguíneas de everolimus son proporcionales a la dosis en un rango posológico de 0,25 a 15 mg en los pacientes

Novartis Argentina S.A.  
Farm. Eisa Orsa  
Co-Directora Técnica - M.N. 15.575  
Gte. de Asuntos Regulatorios  
Apoderada

trasplantados. La biodisponibilidad relativa del comprimido dispersable es 0,90 (IC 90% 0,76-1,07) sobre la base de la razón del área bajo la curva (ABC).

**Efecto de los alimentos:** La concentración plasmática máxima ( $C_{m\acute{a}x}$ ) y el ABC de everolimus se reducen 60 % y 16%, respectivamente, cuando se administra 1 comprimido con una comida rica en grasas. Certican<sup>®</sup> se debe administrar consistentemente con o sin alimentos para reducir al mínimo la variabilidad.

- **Distribución**

La razón sangre:plasma de everolimus, que depende de la concentración en el rango de 5 a 5000 ng/mL, varía de 17% a 73%. La unión a proteínas plasmáticas es aproximadamente 74 % en individuos sanos y en pacientes con insuficiencia hepática moderada. El volumen de distribución asociado con la fase terminal ( $V_z/F$ ) en los pacientes con un trasplante renal en mantenimiento es  $342 \pm 107$  L.

- **Metabolismo**

Certican<sup>®</sup> es un sustrato de CYP3A4 y de la glicoproteína P (gpP). Las principales vías metabólicas identificadas en el hombre fueron las monohidroxilaciones y O-desalquilaciones. Los 2 principales metabolitos se forman por hidrólisis de la lactona cíclica. Everolimus fue el principal componente circulante en sangre. Se considera improbable que alguno de los metabolitos principales contribuya significativamente a la actividad inmunosupresora de everolimus.

- **Eliminación**

Después de la administración de 1 dosis única de everolimus radioactivo a pacientes trasplantados tratados con ciclosporina, la mayor parte (80%) de la radioactividad se recuperó en las heces y sólo una cantidad muy pequeña (5%) se excretó en la orina. El compuesto original no se detectó en orina ni en heces.

- **Farmacocinética en el estado estacionario**

La farmacocinética fue comparable en los pacientes con un trasplante renal y cardiaco tratados simultáneamente con everolimus 2 veces por día y ciclosporina para microemulsión. El estado estacionario se alcanza hacia el día 4, con concentraciones acumulativas en sangre 2 a 3 veces mayores que la exposición tras la primera dosis. El  $T_{m\acute{a}x}$  ocurre 1 a 2 horas post-dosis. Las  $C_{m\acute{a}x}$  promedian  $11,1 \pm 4,6$  y  $20,3 \pm 8,0$  ng/mL y las ABC  $75 \pm 31$  y  $131 \pm 59$  ng.h/mL, con dosis de 0,75 y 1,5 mg 2 veces al día, respectivamente. Los niveles en sangre en el valle pre-dosis ( $C_{m\acute{i}n}$ ) promedian  $4,1 \pm 2,1$  y  $7,1 \pm 4,6$  ng/mL, a dosis de 0,75 y 1,5 mg dos veces al día, respectivamente. La exposición a everolimus permanece estable con el tiempo durante el primer año post-rasplante. La  $C_{m\acute{i}n}$  se correlaciona de forma estadísticamente significativa con el ABC, el coeficiente de correlación es un valor comprendido entre 0,86 y 0,94. La depuración (*clearance*) oral ( $CL/F$ ) es 8,8 L/h (27% de variación interindividual) y el volumen de distribución central ( $V_c/F$ ) es 110 L (36% de variación interindividual), sobre la base del análisis farmacocinético de una población. La variabilidad residual de las concentraciones en sangre es 31%. La vida media de eliminación es  $28 \pm 7$  horas.

### Insuficiencia hepática

El ABC de Certican<sup>®</sup> en 8 pacientes con insuficiencia hepática moderada (clase B en la escala de Child-Pugh) aumentó un promedio de 2 veces en comparación con 8 individuos sanos. El ABC se correlacionó positivamente con la concentración de la bilirrubina sérica y la prolongación del tiempo de protrombina y negativamente con la concentración de la albúmina sérica. El ABC de everolimus tendió a ser mayor que el



ABC de los individuos sanos si la concentración de la bilirrubina era  $>34 \mu\text{mol/L}$ , RIN  $>1,3$  (prolongación del tiempo de protrombina  $> 4$  segundos), y/o la concentración de albúmina  $<35 \text{ g/L}$ . No se ha evaluado el impacto de la insuficiencia hepática severa (clase C en la escala de Child-Pugh), pero el efecto sobre el ABC de Certican® probablemente sea tan grande o incluso mayor que el observado en la insuficiencia moderada (ver "POSOLOGIA/DOSIFICACION - MODO DE ADMINISTRACION").

#### Insuficiencia renal

El daño renal post-trasplante [Rango de la depuración (*clearance*) de creatinina 11-107 mL/min.] no afectó a la farmacocinética de everolimus.

#### Pediatría

La depuración (*clearance*) de Certican® (CL/F) aumentó de forma lineal con la edad del paciente (1 a 16 años), la superficie corporal (0,49-1,92 m<sup>2</sup>) y el peso (11-77 Kg). La CL/F en el estado estacionario fue  $10,2 \pm 3,0 \text{ L/h/m}^2$  y la vida media de eliminación fue  $30 \pm 11$  horas. Diecinueve pacientes pediátricos con un trasplante renal *de novo* (1 a 16 años) recibieron comprimidos dispersables de Certican® a dosis de  $0,8 \text{ mg/m}^2$  (dosis máxima 1,5 mg) 2 veces diarias con ciclosporina para microemulsión. Los pacientes alcanzaron ABC de everolimus de  $87 \pm 27 \text{ ng.h/mL}$ , semejante al de los adultos tratados con 0,75 mg 2 veces diarias. Las concentraciones en el valle (C<sub>0</sub>) en el estado estacionario fueron de  $4,4 \pm 1,7 \text{ ng/mL}$ .

#### Pacientes de edad avanzada

Se estimó que la depuración (*clearance*) de Certican® por vía oral puede disminuir 0,33% por año en los adultos (rango de edad estudiado 16-70 años). No se considera necesario realizar un ajuste de la dosis.

#### Grupo étnico

La depuración (*clearance*) oral (CL/F) es, en promedio, un 20% más elevada en pacientes trasplantados de raza negra, sobre la base del análisis farmacocinético de una población (ver "POSOLOGIA/DOSIFICACION - MODO DE ADMINISTRACION").

#### Relaciones exposición-respuesta:

En los pacientes con un trasplante renal y cardiaco, la concentración promedio de everolimus en el valle (C<sub>0</sub>) durante los primeros 6 meses post-trasplante guardaba relación con la incidencia de rechazo agudo confirmado por biopsia y de trombocitopenia (ver "Tabla 9").

Novartis Argentina S.A.  
Farm. Elsa Orosa  
Co-Directora Técnica - M.N. 15.575  
Gte. de Asuntos Regulatorios  
Apoderada

Tabla 9.

| <b>Trasplante de riñón</b>                   |       |           |           |            |             |
|----------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|
| Concentraciones mínimas (C0) (ng/mL)         | ≤ 3,4 | 3,5 - 4,5 | 4,6 - 5,7 | 5,8 - 7,7  | 7,8 - 15,0  |
| Sin rechazo                                  | 68 %  | 81 %      | 86 %      | 81 %       | 91 %        |
| Trombocitopenia (< 100 x 10 <sup>9</sup> /L) | 10 %  | 9 %       | 7 %       | 14 %       | 17 %        |
| <b>Trasplante de corazón</b>                 |       |           |           |            |             |
| Concentraciones mínimas (C0) (ng/mL)         | ≤ 3,5 | 3,6 - 5,3 | 5,4 - 7,3 | 7,4 - 10,2 | 10,3 - 21,8 |
| Sin rechazo                                  | 65 %  | 69 %      | 80 %      | 85 %       | 85 %        |
| Trombocitopenia (< 75 x 10 <sup>9</sup> /L)  | 5 %   | 5 %       | 6 %       | 8 %        | 9 %         |

### Datos sobre toxicidad preclínica

Se ha determinado la toxicidad preclínica del everolimus en ratones, ratas, cerdos Minipigs®, monos y conejos. En diversas especies se vieron afectados los órganos reproductores de las hembras y de los machos (degeneración tubular testicular, reducción del contenido de espermatozoides en los epidídimos y atrofia uterina), y los pulmones (aumento de los macrófagos alveolares) y oculares (opacidades de la línea de sutura anterior lenticular) sólo en las ratas. Tanto en la rata como en el ratón se observaron cambios mínimos en el riñón: en la rata una exacerbación de la lipofuscina relacionada con la edad en el epitelio tubular y, en el ratón, una exacerbación de las lesiones subyacentes. No se han observado signos de toxicidad renal ni en los monos ni en los cerdos Minipig®.

Las enfermedades subyacentes de aparición espontánea (miocarditis crónica en las ratas, infección por el virus Coxsackie en el plasma y el corazón de los monos, infestación coccidial del tubo digestivo de los cerdos Minipig®, lesiones cutáneas en los ratones y los monos) parecían exacerbarse espontáneamente con la administración de everolimus. Estos hallazgos se observaron generalmente con concentraciones de exposición sistémica situadas dentro o por encima del intervalo de exposiciones terapéuticas, con la excepción de los hallazgos en ratas, que ocurrieron por debajo de la exposición terapéutica, y ello debido a la elevada distribución tisular.

La asociación de la ciclosporina con el everolimus aumentó la exposición sistémica al everolimus e incrementó la toxicidad. No se encontraron nuevos órganos afectados en la rata. En los monos se observó hemorragia y arteritis en diversos órganos.

En un estudio de la fecundidad de ratas macho, las dosis iguales o superiores a 0,5 mg/Kg afectaron la morfología del testículo y las dosis de 5 mg/Kg produjeron una menor motilidad de espermatozoides, una reducción del número de cabezas de espermatozoides y de las concentraciones plasmáticas de testosterona, lo cual provocó un menoscabo de la fecundidad de los machos. Sin embargo, hubo signos de reversión. La fecundidad de las hembras no se vio afectada, pero el everolimus atravesó la barrera hemato-placentaria y fue tóxica para los productos de la concepción (el embrión o feto



más las membranas). En las ratas, el everolimus causó toxicidad embrionaria y fetal con una exposición sistémica por debajo de la terapéutica, que se manifestó en forma de muerte y reducción del peso de los fetos. A la dosis de 0,3 y 0,9 mg/Kg aumentó la incidencia de cambios esqueléticos y malformaciones (p. ej., fisura de esternón). En los conejos, la toxicidad embrionaria se reflejó en un aumento de resorciones tardías.

Los estudios de genotoxicidad en que se han tenido en cuenta todos los criterios de valoración importantes no indicaron signos de actividad clastógena ni mutágena. La administración de everolimus a ratones y a ratas durante un máximo de 2 años no indicó capacidad oncógena alguna incluso en las dosis más elevadas, que correspondían, respectivamente, a 8,6 y 0,3 veces la exposición clínica estimada.

## POSOLOGIA/DOSIFICACION - MODO DE ADMINISTRACION

Sólo médicos con suficiente experiencia en la administración de un tratamiento inmunodepresor tras un trasplante de órgano y con posibilidades de controlar las concentraciones sanguíneas del everolimus deberán instituir y mantener el tratamiento con Certican.

### Adultos

Para la población general de pacientes con trasplantes renales y cardiacos se recomienda una dosis inicial de 0,75 mg dos veces al día, administrándola lo más pronto posible después del trasplante. La dosis diaria de Certican siempre debe darse en dos tomas orales (dos veces al día). Certican debe administrarse siempre con alimentos o siempre sin alimentos (ver "FARMACOCINÉTICA") y al mismo tiempo que la ciclosporina en microemulsión (ver "MONITOREO TERAPEUTICO DE LA DROGA").

Certican debe tomarse únicamente por vía oral.

Los comprimidos Certican deben deglutirse enteros con un vaso de agua y no deben triturarse antes de usarlos.

En los pacientes que reciben Certican puede ser necesario ajustar la dosis en función de las concentraciones sanguíneas alcanzadas, la tolerabilidad, la respuesta individual, el cambio de fármacos coadministrados y el cuadro clínico. La dosis puede ajustarse cada 4 o 5 días (ver "MONITOREO TERAPEUTICO DE LA DROGA").

### Pacientes de raza negra

En los pacientes de raza negra, la incidencia de episodios de rechazo agudo comprobados por biopsia fue significativamente mayor que en pacientes de otras razas. Los pocos datos disponibles indican que estos pacientes pueden necesitar dosis más elevadas de Certican para conseguir una eficacia similar a la observada con la dosis recomendada para adultos de otras razas (ver "FARMACOCINÉTICA"). En la actualidad, los datos sobre la eficacia y la seguridad son demasiado escasos y no permiten hacer recomendaciones específicas sobre el uso del everolimus en pacientes de raza negra.

### Uso en niños y adolescentes

No se dispone de información adecuada que justifique la administración de Certican en pacientes de estos grupos de edad. No obstante, existe información limitada sobre el uso del medicamento en pacientes pediátricos con trasplante renal (ver "FARMACOCINÉTICA").

Novartis Argentina S.A.  
Farm. Elsa Orosa  
Co-Directora Técnica M.N. 15.575  
Gte. de Asuntos Regulatorios  
Aprobada



### Pacientes de edad avanzada ( $\geq 65$ años)

Es escasa la experiencia clínica en pacientes mayores de 65 años; no obstante, no hay diferencias aparentes en la farmacocinética del everolimus entre los pacientes mayores de 65-70 años y adultos más jóvenes (ver "FARMACOCINÉTICA").

### Pacientes con insuficiencia renal

En estos pacientes no es necesario ajustar la dosis (ver "FARMACOCINÉTICA").

### Pacientes con insuficiencia hepática

En los pacientes con insuficiencia hepática deben vigilarse de cerca las concentraciones sanguíneas mínimas (C<sub>0</sub>) de everolimus. En los pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada (clase A o B de la escala Child-Pugh), la dosis debe reducirse aproximadamente a la mitad de la dosis normal si se cumplen dos de los siguientes criterios: bilirrubina  $> 34 \mu\text{mol/L}$  ( $> 2 \text{ mg/dL}$ ), albúmina  $< 35 \text{ g/L}$  ( $< 3,5 \text{ g/dL}$ ), RIN (razón internacional normalizada)  $> 1,3$  (prolongación del tiempo de protrombina  $> 4$  segundos). Los ajustes adicionales de la dosis deben basarse en los resultados del análisis farmacológico de sangre (ver "FARMACOCINÉTICA"). El everolimus no se ha estudiado en pacientes con insuficiencia hepática grave (clase C de la escala Child-Pugh (ver "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES").

### Monitoreo terapéutico de la droga

Se recomienda el monitoreo rutinario de la concentración de Certican® en sangre. Sobre la base del análisis de la exposición-eficacia y la exposición-seguridad, se ha hallado que los pacientes que alcanzan concentraciones de everolimus en sangre en el valle (C<sub>0</sub>)  $\geq 3,0 \text{ ng/mL}$  presentan una incidencia menor de rechazo agudo confirmado por biopsia tanto en el trasplante renal como en el cardíaco, que los pacientes cuyos niveles en el valle (C<sub>0</sub>) se encuentran por debajo de  $3,0 \text{ ng/mL}$ . El límite superior del rango terapéutico recomendado es  $8 \text{ ng/mL}$ . No se han estudiado los efectos de una exposición superior a  $12 \text{ ng/mL}$ . Estos intervalos de concentración recomendados para everolimus se basan en métodos cromatográficos.

Es particularmente importante vigilar las concentraciones de everolimus en sangre en los pacientes con insuficiencia hepática, durante la administración concomitante de potentes inductores e inhibidores de CYP3A4, cuando se cambia de forma farmacéutica y/o si se reduce significativamente la dosis de ciclosporina (ver *Interacciones*). Las concentraciones de everolimus podrían ser ligeramente menores luego de la administración de comprimidos dispersables.

En teoría, los ajustes de la dosis de Certican® deben basarse en los niveles en el valle obtenidos  $>4-5$  días después del cambio de dosis previo. Dado que existe una interacción de la ciclosporina con everolimus, los niveles de everolimus podrían disminuir si se reduce significativamente la exposición a la ciclosporina (por ejemplo, si la concentración en el valle es inferior a  $50 \text{ ng/mL}$ ).

### Dosis de ciclosporina recomendada en el trasplante renal:

Certican® no se debe utilizar de forma prolongada en asociación con dosis plena de ciclosporina. La disminución de la exposición a la ciclosporina en los pacientes con un trasplante renal tratados con Certican® se asocia con mejor función renal. Basados en

la experiencia obtenida en el estudio 2309 la reducción de la exposición a la ciclosporina debe iniciarse inmediatamente después del trasplante con la siguiente ventana de niveles del valle.

**Trasplante renal: ventana de niveles del valle de ciclosporina recomendados**

| Ciclosporina<br>Objetivo<br>(ng/mL) | Co | Mes 1   | Meses 2-3 | Meses 4-5 | Meses 6-12 |
|-------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|------------|
| Grupos Certican                     |    | 100-200 | 75-150    | 50-100    | 25-50      |

(Las concentraciones medidas figuran en el apartado "Acción farmacológica").

Antes de reducir la dosis de ciclosporina se debe asegurar que las concentraciones de everolimus en el valle (C0) en el estado estacionario sean iguales o superiores a 3 ng/mL.

Existen datos limitados respecto de la administración de Certican® con concentraciones de ciclosporina en el valle (C0) inferiores a 50 ng/mL o con niveles C2 inferiores a 350 ng/mL, en la fase de mantenimiento. Si el paciente no puede tolerar la reducción de la exposición a la ciclosporina se debe reconsiderar la continuación del uso de everolimus.

**Dosis de ciclosporina recomendada en el trasplante cardiaco:**

En los pacientes con un trasplante cardiaco en el periodo de mantenimiento se debe reducir la dosis de ciclosporina para microemulsión, comenzando un mes después del trasplante, según tolerancia, con el objeto de mejorar la función renal. Si el trastorno de la función renal es progresivo o si el clearance de creatinina calculado es <60 mL/min se debe ajustar el régimen terapéutico. En los pacientes con trasplante de corazón, la dosis de ciclosporina debe basarse en la experiencia adquirida en el estudio 2411 en el que se administró Certican® junto con ciclosporina con niveles reducidos de Co según continúa.

**Trasplante cardíaco: ventana de niveles del valle de ciclosporina recomendados.**


| Ciclosporina<br>Objetivo<br>(ng/mL) | Co | Mes 1   | Mes 2   | Meses 3-4 | Meses 5-6 | Meses 7-12 |
|-------------------------------------|----|---------|---------|-----------|-----------|------------|
| Grupos Certican                     |    | 200-350 | 150-250 | 100-200   | 75-150    | 50-100     |

(Las concentraciones medidas figuran en el apartado "Acción farmacológica").

Antes de disminuir la dosis de ciclosporina se debe corroborar que las concentraciones de everolimus en sangre en el valle (C0) en el estado estacionario son iguales o superiores a 3 ng/mL.

En el trasplante de corazón, se dispone de datos limitados sobre la administración de Certican® cuando se reducen las concentraciones mínimas de ciclosporina (C0) a 50-

Novartis Argentina S.A.  
Fam. Elsa Orosa  
Co-Directora Técnica - M.N. 15.575  
Gte. de Asuntos Regulatorios  
Aprobada



100 ng/mL después de 12 meses. Si el paciente no tolera la reducción de la exposición a la ciclosporina, debe reconsiderarse la continuación del tratamiento con Certican®.

### CONTRAINDICACIONES

Certican® está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad demostrada al everolimus, sirolimus o algún otro componente de la fórmula.

### ADVERTENCIAS

El tratamiento con Certican® sólo debe ser prescripto por médicos experimentados en el uso de terapia inmunosupresora tras un trasplante de órganos y con acceso al monitoreo de everolimus en sangre.

### PRECAUCIONES

#### Manejo de la inmunosupresión:

En los ensayos clínicos Certican® se ha administrado concomitantemente con ciclosporina para microemulsión, basiliximab y corticosteroides. No se han investigado adecuadamente los efectos del uso de Certican® en combinación con otros agentes inmunosupresores.

Certican® no se ha sido adecuadamente estudiado en pacientes con alto riesgo inmunológico.

#### Trastorno severo de la función hepática:

Everolimus no ha sido estudiado en pacientes con insuficiencia hepática severa. Se recomienda monitorear cuidadosamente los niveles de everolimus en sangre en el valle (C0) en los pacientes con insuficiencia hepática.

#### Interacción con fuertes inhibidores/inductores de CYP3A4:

No se recomienda la coadministración con inhibidores potentes (p.ej., ketoconazol, itraconazol, voriconazol, claritromicina, telitromicina, ritonavir) e inductores potentes (por ejemplo, rifampicina, rifabutina) de CYP3A4, salvo si el beneficio supera el riesgo. Se recomienda el monitoreo de los niveles de everolimus en sangre en el valle (C0) cuando se administren concomitantemente inductores o inhibidores de CYP3A4 y después de su discontinuación (ver *Interacciones*).

#### Linfomas y otras neoplasias:

Los pacientes bajo tratamiento inmunosupresor, incluido Certican®, presentan mayor riesgo de desarrollar linfomas u otras neoplasias, en especial cutáneas (ver *Reacciones Adversas*). El riesgo absoluto parece guardar relación con la intensidad y la duración de la inmunosupresión más que con el uso de un agente en especial. Se debe controlar regularmente a los pacientes para detectar la aparición de neoplasias cutáneas y se les aconsejará que minimicen la exposición a los rayos ultravioletas y a la luz solar y el uso de filtros solares adecuados.

Novartis Argentina S.A.  
Farm. Elsa Orosa  
Co-Directora Técnica - M.N. 15.575  
Gte. de Asuntos Regulatorios  
Apoderada

### Infecciones Serias y Oportunistas:

Los pacientes tratados con inmunosupresores, lo cual incluye a Certican®, están más expuestos a las infecciones, en especial las causadas por patógenos oportunistas (bacterias, hongos, virus y protozoarios). En los pacientes tratados con Certican® se han notificado casos de septicemia e infecciones mortales (ver Reacciones adversas). Entre las condiciones oportunistas a las cuales los pacientes inmunosuprimidos pueden ser vulnerables están las infecciones por poliovirus que incluye a la nefropatía asociada al virus BK la cual puede llevar a la pérdida del injerto y la potencialmente fatal leucoencefalopatía progresiva múltiple asociada al virus JC (LMP). Estas infecciones, frecuentemente relacionadas a la carga inmunosupresora total, deben ser consideradas en el diagnóstico diferencial de los pacientes inmunosuprimidos con deterioro de la función renal y síntomas neurológicos.

En los ensayos clínicos con Certican®, se administró profilaxis para la neumonía por *Pneumocystis jirovecii* (carinii) durante los primeros 12 meses luego del trasplante. Se recomendó la profilaxis para Citomegalovirus (CMV) durante 3 meses después del trasplante, en particular en los pacientes con alto riesgo de enfermedad por CMV.

### Hiperlipidemia

La utilización de Certican® con ciclosporina para microemulsión en pacientes trasplantados se ha asociado con un aumento del colesterol y los triglicéridos y puede requerir tratamiento. Se debe controlar la hiperlipidemia en los pacientes tratados con Certican® y, en caso necesario, se debe tratar con agentes hipolipemiantes y se deben realizar los ajustes alimentarios adecuados (ver *Interacciones*). Se debe considerar la razón riesgo/beneficio en los pacientes con hiperlipidemia establecida antes de iniciar un régimen de inmunosupresión que incluya Certican®. Análogamente, se reevaluará el riesgo/beneficio de la continuación de la terapia con Certican® en los pacientes con hiperlipidemia severa refractaria.

Los pacientes tratados con un inhibidor de la HMG-CoA reductasa y/o un fibrato deberán ser monitoreados por la posibilidad de que desarrollen rabdomiólisis y otros efectos adversos como los descritos en los respectivos prospectos (ver *Interacciones*).

### Angioedema

Certican ha sido asociado con el desarrollo de angioedema. En la mayoría de los casos los pacientes estaban recibiendo inhibidores ACE como co-medicación.

### Nefrotoxicidad

El uso de Certican con la dosis completa de ciclosporina eleva el riesgo de disfunción renal. Para evitar esto es necesario reducir la dosis de la ciclosporina cuando se asocia con Certican.

Se recomienda el control regular de la función renal en todos los pacientes. En los pacientes con niveles de creatinina sérica elevados se deberá considerar el ajuste apropiado del régimen de inmunosupresión, en particular la reducción de la dosis de ciclosporina. Se debe ser especialmente cauto cuando se coadministren otros agentes con efecto deletéreo conocido sobre la función renal.

### Proteinuria

Novartis Argentina S.A.  
Farm. Elsa Orsola  
Co-Directora Técnica - M.N. 15.575  
Gte. de Asuntos Regulatorios  
Apoderada

El uso de Certican® con ciclosporina en trasplantados renales de novo se ha asociado con aumento de la proteinuria. El riesgo se incrementa con niveles elevados de everolimus.

En los pacientes trasplantados renales con proteinuria leve mientras que están con terapia inmunosupresora incluyendo un inhibidor de la calcineurina (CNI) ha habido reportes de empeoramiento de la proteinuria cuando el CNI es reemplazado por Certican®. Se ha observado reversibilidad cuando se interrumpe el Certican® y se reintroduce el CNI. La seguridad y eficacia de la conversión desde el CNI a Certican® en tales pacientes no se ha establecido.

Los pacientes que reciben Certican® deben ser monitoreados para la proteinuria.

### Trombosis del injerto renal

Se ha reportado un aumento del riesgo de trombosis de la arteria o vena renal, que resulta en pérdida del injerto, sobre todo en los primeros 30 días post trasplante.

### Complicaciones de la curación de las heridas

Certican, como otros inhibidores mTOR, puede entorpecer la curación de las heridas aumentando las complicaciones post trasplante como la dehiscencia de la herida, colecciones líquidas, e infección de la herida que requiere cirugía adicional. El linfocele es la complicación más frecuentemente reportada, este evento en los pacientes trasplantados renales tiende a ser más frecuente en los pacientes con mayor índice de masa corporal. La frecuencia de derrame pericárdico y pleural está incrementada en los trasplantados cardíacos.

### Microangiopatía trombótica/Púrpura trombótica trombocitopénica/Síndrome Urémico Hemolítico

La administración concomitante de Certican® con inhibidores de la calcineurina (CNI) puede aumentar el riesgo de síndrome urémico hemolítico inducido por CNI/Púrpura trombótica trombocitopénica/microangiopatía trombótica.

### Enfermedad Pulmonar Intersticial/Neumonitis no infecciosa

En los pacientes que se presentan con síntomas de neumonía infecciosa que no responde al tratamiento con antibióticos se debe considerar el diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial (EPI), luego de haber descartado causas infecciosas, neoplasias y otras causas ajenas a las drogas (no farmacológicas) a través de estudios apropiados. Se han informado casos de EPI causada por Certican® que responde a la interrupción de la medicación con o sin tratamiento con glucocorticoides (ver "REACCIONES ADVERSAS").

### Diabetes mellitus de reciente comienzo

Se ha mostrado que Certican® aumenta el riesgo de diabetes mellitus de reciente comienzo después del trasplante. Las concentraciones de glucemia deben ser monitoreadas de cerca en los pacientes tratados con Certican®.

### Infertilidad en los hombres

Novartis Argentina S.A.  
Farm. Elsa Orso  
Co-Directora Técnica M.N. 15.575  
Gte. de Asuntos Regulatorios  
Apoderada

Hay reportes en la literatura de azoospermia reversible y oligospermia en pacientes tratados con inhibidores mTOR. Los estudios preclínicos toxicológicos han mostrado que everolimus puede reducir la fertilidad masculina y ser esto considerado un riesgo potencial para el tratamiento prolongado con Certican®.

### Riesgo de intolerancia a los excipientes

Los pacientes con problemas hereditarios infrecuentes de intolerancia a la galactosa, deficiencia de lactasa severa o malabsorción de glucosa-galactosa no deben recibir este medicamento.

### Interacciones

Certican® es metabolizado principalmente por CYP3A4 en el hígado y, en menor grado, en la pared intestinal. También es un sustrato de la bomba de eflujo de fármacos, la glicoproteína P (PgP). Por consiguiente, la absorción y la ulterior eliminación del everolimus absorbido en la circulación general pueden verse influidas por drogas que afecten a CYP3A4 y/o PgP. Se desaconseja el tratamiento concomitante con inhibidores e inductores potentes de CYP3A4. Los inhibidores de PgP pueden reducir el eflujo de everolimus de las células intestinales y aumentar las concentraciones sanguíneas de everolimus. *In vitro*, everolimus es un inhibidor competitivo de CYP3A4 y CYP2D6, potencialmente capaz de aumentar las concentraciones de las drogas eliminadas por estas enzimas. Por ello debe tenerse cuidado cuando se administre everolimus asociado con sustratos de CYP3A4 y CYP2D6 de estrecho índice terapéutico. Todos los estudios de interacciones *in vivo* se realizaron sin ciclosporina concurrente.

**Ciclosporina** (inhibidor de CYP3A4/PgP) La biodisponibilidad de everolimus aumenta significativamente con la coadministración de ciclosporina. En un estudio con dosis única en individuos sanos, la administración de ciclosporina para microemulsión (Neoral®) produjo un aumento de 168% en el AUC de everolimus (rango, 46% a 365%) y de 82% en la  $C_{máx}$  (rango, 25% a 158%) en comparación con la administración de everolimus solo. Si se modifica la dosis de ciclosporina podría ser necesario el ajuste de la dosis de everolimus (ver *Posología / Dosificación - Modo de Administración*). Certican® tuvo sólo una influencia clínicamente menor sobre la farmacocinética de la ciclosporina en los pacientes con trasplante renal y cardiaco tratados con ciclosporina para microemulsión.

**Rifampicina** (inductor de CYP3A4): El tratamiento previo de individuos sanos con dosis múltiples de rifampicina seguido de una dosis única de Certican® aumenta casi 3 veces la depuración (clearance) de everolimus y disminuye 58% la  $C_{máx}$  y 63% el AUC. Se desaconseja el uso en combinación con rifampicina (ver *Advertencias y Precauciones*).

**Atorvastatina** (sustrato de CYP3A4) y **pravastatina** (sustrato de PgP): La administración de una dosis única de Certican® con atorvastatina o pravastatina a individuos sanos no alteró la farmacocinética de la atorvastatina, de la pravastatina ni del everolimus ni tampoco la biorreactividad plasmática total de la HMG-CoA reductasa en un grado clínicamente relevante. No obstante, estos resultados no pueden extrapolarse a otros inhibidores de la HMG-CoA reductasa.

Se debe controlar si los pacientes presentan manifestaciones de rabdomiolisis u otros eventos adversos descritos en el Prospecto de los inhibidores de la HMG-CoA reductasa.

**Otras interacciones posibles:** Los inhibidores moderados de CYP3A4 y PgP podrían aumentar las concentraciones de everolimus en sangre (por ejemplo, **agentes antimicóticos:** fluconazol, **antibióticos macrólidos,** como la eritromicina; **bloqueantes de los canales de calcio:** verapamilo, nicardipina, diltiazem; **inhibidores de proteasa:** nelfinavir, indinavir, aprenavir. Los inductores de CYP3A4 pueden aumentar el metabolismo de everolimus y disminuir las concentraciones de este fármaco en sangre (por ejemplo, hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*), **anticonvulsivantes:** carbamazepina, fenobarbital, difenilhidantoína; **drogas anti-VIH:** efavirenz, nevirapina).

El pomelo y el jugo de pomelo afectan la actividad del citocromo P450 y de la PgP y por eso deben evitarse.

#### **Vacunación:**

Los inmunosupresores pueden afectar la respuesta a las vacunas y por ello las vacunas pueden ser menos eficaces durante el tratamiento con Certican®. Se debe evitar el uso de vacunas elaboradas con microorganismos vivos (vacunas atenuadas).

#### **Embarazo y lactancia**

No existen datos adecuados sobre el uso de Certican® en mujeres embarazadas. Los estudios en animales han evidenciado efectos tóxicos sobre la reproducción, que incluyen embriotoxicidad y fetotoxicidad. Se desconoce el riesgo potencial en seres humanos. Se debe evitar la administración de Certican® a mujeres embarazadas, excepto cuando el beneficio potencial para la madre supere el riesgo eventual para el feto. Las mujeres en edad de poder concebir, deben utilizar un método de anticoncepción efectivo para prevenir un posible embarazo y continuar utilizándolo por un período adicional de 8 semanas después de haber recibido la última dosis de Certican®.

Se desconoce si Certican® se excreta en la leche humana, pero en los estudios en animales, everolimus y/o sus metabolitos pasaban fácilmente a la leche de ratas en periodo de amamantamiento. Por consiguiente, las mujeres que reciben Certican® no deben amamantar.

#### **Efecto sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar máquinas**

No se han realizado estudios de los efectos de Certican® sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria.

### **REACCIONES ADVERSAS**

La frecuencia de reacciones adversas listadas más abajo representan aquellas observadas en pacientes tratados con un regimen de Certican combinado con ciclosporina y corticoesteroides en estudios multicéntricos, aleatorizados y controlados. Estos incluyen 5 estudios en pacientes trasplantados *de novo* renales totalizando 2497 pacientes y dos estudios en trasplantados *de novo* cardíacos, totalizando 810 pacientes (ver "Acción farmacológica").

La Tabla 10 contiene reacciones adversas posible o probablemente relacionadas con Certican® observadas en estudios clínicos de fase III, (trasplante renal y cardiaco), comparando pacientes en regimenes de Certican® + ciclosporina con pacientes en regimenes no Certican® y basados en ciclosporina (ver "Acción farmacológica") Están agrupados de acuerdo a la MedDRA (Standard organ classes):

Novartis Argentina S.A.  
Fabi Elsa Orosa  
Co-Directora Técnica - M.N. 15.575  
Gte. de Asuntos Regulatorios  
Apoderada



Las reacciones adversas se clasificaron en orden de frecuencia de la siguiente manera: *muy frecuentes* ( $\geq 1/10$ ); *frecuentes* ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ); *infrecuentes* ( $\geq 1/1000$ ,  $< 1/100$ ); *raras* ( $\geq 1/10.000$ ,  $< 1/1000$ ); *muy raras* ( $< 1/10.000$ ).

Tabla 10

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Infecciones e infestaciones</b><br><i>Frecuentes</i>                                                                     | Infecciones, virales, bacterianas y fúngicas, neumonía, sepsis, infecciones del tracto urinario.                                                                  |
| <i>Infrecuentes</i>                                                                                                         | Infección de heridas.                                                                                                                                             |
| <b>Desórdenes del sistema sanguíneo y linfático</b><br><i>Muy frecuentes</i><br><i>Frecuentes</i>                           | Leucopenia <sup>1</sup> .<br>Trombocitopenia <sup>1</sup> , anemia <sup>1</sup> , coagulopatía, púrpura trombótica trombocitopénica, síndrome urémico hemolítico. |
| <i>Infrecuentes</i>                                                                                                         | Hemólisis, pancitopenia <sup>6</sup> .                                                                                                                            |
| <b>Trastornos cardiacos</b><br><i>Muy frecuentes</i>                                                                        | Derrame pericárdico <sup>2</sup> .                                                                                                                                |
| <b>Desórdenes endócrinos</b><br><i>Infrecuentes</i>                                                                         | Hipogonadismo masculino (reducción de testosterona, aumento de FSH y LH).                                                                                         |
| <b>Desórdenes metabólicos y nutricionales</b><br><i>Muy frecuentes</i><br><i>Frecuentes</i>                                 | Hipercolesterolemia, hiperlipidemia.<br>Hipertrigliceridemia, diabetes de reciente comienzo.                                                                      |
| <b>Desórdenes vasculares</b><br><i>Frecuentes</i>                                                                           | Hipertensión, linfocel <sup>3</sup> , tromboembolismo venoso, trombosis del injerto <sup>3</sup> .                                                                |
| <i>Raras</i>                                                                                                                | Vasculitis leucocitoclástica <sup>6</sup> .                                                                                                                       |
| <b>Desórdenes respiratorios, torácicos y del mediastino</b><br><i>Muy frecuentes</i><br><i>Infrecuentes</i><br><i>Raras</i> | Derrame pleural <sup>2</sup> .<br>Enfermedad pulmonar intersticial.<br>Proteinosis alveolar pulmonar.                                                             |
| <b>Desórdenes gastrointestinales</b><br><i>Frecuentes</i>                                                                   | Dolor abdominal, diarrea, náusea, vómito, pancreatitis, estomatitis, ulceraciones orales.                                                                         |
| <b>Desórdenes hepatobiliares</b><br><i>Infrecuentes</i>                                                                     | Hepatitis, trastornos hepáticos, ictericia, test de la función hepática anormal <sup>4</sup> .                                                                    |
| <b>Desórdenes de la piel y tejido subcutáneo</b>                                                                            |                                                                                                                                                                   |

|                                                                                |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Frecuentes</i>                                                              | Edema angioneurótico <sup>5</sup> , acné,<br>complicación de heridas quirúrgicas. |
| <i>Infrecuentes</i>                                                            | Rash.                                                                             |
| <b>Desórdenes osteomusculares y del tejido conectivo</b><br><i>Inrecuentes</i> | Mialgia.                                                                          |
| <b>Desórdenes renales y urinarios</b><br><i>Frecuentes</i>                     | Proteinuria <sup>3</sup> .                                                        |
| <i>Infrecuentes</i>                                                            | Necrosis renal tubular <sup>3</sup> , pielonefritis.                              |
| <b>Trastornos del sistema reproductivo y las mamas</b><br><i>Frecuentes</i>    | Disfunción eréctil.                                                               |
| <b>Desórdenes generales y del sitio de administración</b><br><i>Frecuentes</i> | Edema, dolor, trastornos de la cicatrización.                                     |

<sup>1</sup> Se estableció un efecto vinculado a la dosis o fue visto en forma significativa, en pacientes recibiendo 3 mg/día.

<sup>2</sup> En trasplante cardíaco.

<sup>3</sup> En trasplante renal.

<sup>4</sup> y-GT, AST, ALT elevada.

<sup>5</sup> Predominantemente en pacientes recibiendo en forma concomitante IECA.

<sup>6</sup> Hallazgo post-marketing.

En estudios clínicos controlados en los que un total de 2335 pacientes recibieron Certican (1.5 mg ó 3 mg/día) en combinación con otros inmunosupresores y fueron monitoreados al menos durante 1 año, se desarrollaron neoplasias en el 2,6% de los pacientes, con 1% de neoplasias de piel y 0,43% que desarrollaron linfoma o enfermedad linfoproliferativa.

La ocurrencia de las reacciones adversas puede depender del grado y de la duración del régimen inmunosupresor. En los estudios pivotaes, un aumento de creatinina sérica fue observado más frecuentemente en pacientes medicados con Certican® en combinación con dosis plena de ciclosporina para microemulsión que en pacientes de control. La incidencia total de reacciones adversas fue más baja con dosis reducidas de ciclosporina para microemulsión (ver "Acción farmacológica: Ensayos clínicos").

En los estudios que utilizaron una dosis menor de ciclosporina, el perfil de seguridad de Certican® fue similar al descrito en los 3 estudios fundamentales en los que se administró la dosis completa de ciclosporina, salvo que los aumentos de creatinina fueron menos frecuentes y las medias y medianas de la creatininemia fueron más bajas que en los otros estudios de fase III. Una tasa menor de enfermedades virales, primariamente debidas a los virus CMV y BK ha sido observada, con la dosis recomendada de Certican en el esquema inmunosupresor en los trasplantados renales (ver "Acción farmacológica: Ensayos clínicos").

Los casos de enfermedad pulmonar intersticial, que implican inflamación pulmonar intraparenquimatosas (neumonitis) y/o fibrosis de etiología no infecciosa, algunos fatales, han ocurrido en pacientes que recibían rapamicina y sus derivados, incluyendo Certican®. La condición se resuelve mayormente después de la discontinuación de la medicación y/o con la adición de glucocorticoides.

Novartis Argentina S.A.  
Firm. Elsa Orsola  
Co-Directora Técnica - M.N. 15.575  
Gte. de Asuntos Regulatorios  
Apoderada



## SOBREDOSIFICACION

En los estudios en animales, Certican® mostró bajo potencial de toxicidad aguda. No se observó letalidad ni toxicidad severa después de la administración de una dosis oral única de 2.000 mg/Kg (ensayo límite) a ratones o a ratas.

Los antecedentes de sobredosis en seres humanos son muy escasos; existe un único caso de ingestión accidental de 1,5 mg de everolimus en un niño de 2 años de edad sin que se observaran eventos adversos. Se han administrado dosis únicas de hasta 25 mg a pacientes trasplantados con tolerabilidad aceptable.

En todos los casos de sobredosis se deben iniciar medidas de generales de apoyo.

*Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:*

*Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247.*

*Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.*

## INSTRUCCIONES DE USO

Los comprimidos de Certican® se pueden tomar con o sin alimentos, pero de manera sistemática, es decir siempre deben tomarse con comida o siempre sin comida.

Los comprimidos de Certican® no deben ingerirse con pomelo ni con jugo de pomelo dado que esto puede interferir con ciertas enzimas del organismo que modifican los efectos de Certican®.

## INCOMPATIBILIDADES

Cuando también se administre ciclosporina para microemulsión por sonda nasogástrica, se debe administrar antes que Certican®. No se deben mezclar ambos fármacos.

## PRESENTACIONES

Envases conteniendo 20, 50, 60, 100, 120 y 250 comprimidos.

## CONSERVACION

Certican® no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Debe ser conservado a temperatura no mayor a 30°C en el envase original al abrigo de la luz y la humedad.

**Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.**

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud - Certificado N° 51.576

®Marca Registrada

Elaborado por: Novartis Pharma Stein AG - Stein - Suiza.

Novartis Argentina S.A.

Ramallo 1851 - C1429DUC - Buenos Aires, Argentina.

Director Técnico: Dr. Lucio Jeroncic - Químico, Farmacéutico.

CDS: 22/03/2010.

Novartis Argentina S.A.  
 Farm. Elsa Orosa  
 Co-Directora Técnica - M.N. 18.576  
 Gte. de Asuntos Regulatorios  
 Apoderada

**PROYECTO DE PROSPECTO DE ENVASE**

Novartis

**Certican®  
Everolimus**Comprimidos dispersables  
Venta bajo receta archivada

Industria Suiza

**Fórmula**

Cada comprimido dispersable de Certican® de 0,1 mg contiene:

Everolimus.....0,1 mg  
 Excipientes: Butilhidroxitolueno, estearato de magnesio, monohidrato de lactosa, hipromelosa, crospovidona, lactosa anhidra.....c.s.

Cada comprimido dispersable de Certican® de 0,25 mg contiene:

Everolimus.....0,25 mg  
 Excipientes: Butilhidroxitolueno, estearato de magnesio, monohidrato de lactosa, hipromelosa, crospovidona, lactosa anhidra.....c.s.

**Acción terapéutica**

Inmunosupresor selectivo

Clasificación ATC: L04A A18


**Indicaciones**

Certican® está indicado para la profilaxis del rechazo de órganos en pacientes adultos con riesgo inmunológico leve a moderado que reciben un alotrasplante de riñón o de corazón. Certican® se debe utilizar en asociación con ciclosporina para microemulsión y corticosteroides.

**Características farmacológicas / propiedades****Acción farmacológica**

Certican® es un inhibidor de la señal de proliferación celular que previene el rechazo del aloinjerto en roedores y simios con alotrasplantes. Certican® ejerce su efecto inmunosupresor a través de la inhibición de la proliferación y, en consecuencia, de la expansión clonal de los linfocitos T activados por el antígeno, que está mediada por interleucinas específicas para los linfocitos T, a saber, la interleucina-2 y la interleucina-15. Certican® inhibe una vía de transducción de señales intracelulares que es inducida por la unión de estos factores de crecimiento de los linfocitos T a sus receptores respectivos y que, normalmente, conduce a la proliferación celular. El bloqueo de esta señal inducido por everolimus lleva a un arresto de las células en el estadio G<sub>1</sub> del ciclo celular.

A escala molecular, Certican® forma un complejo con la proteína citoplasmática FKBP-12. La presencia de Certican® inhibe la fosforilación de la cinasa p70S6, que es estimulada por el factor de crecimiento. Dado que la fosforilación de la cinasa p70S6 está bajo el control de la cinasa FRAP (también denominada m-TOR), este hallazgo



sugiere que el complejo everolimus-FKBP-12 se une a FRAP e interfiere con el funcionamiento de esta última. FRAP es una proteína reguladora clave que gobierna el metabolismo, el crecimiento y la proliferación celular, por lo que el bloqueo de la función de FRAP explica el arresto del ciclo celular causado por Certican®.

Everolimus actúa de un modo diferente de la ciclosporina. En los modelos preclínicos de alotrasplante la combinación de everolimus con ciclosporina fue más eficaz que cualquiera de los fármacos por separado.

El efecto del everolimus no se restringe a los linfocitos T. Por el contrario, el everolimus inhibe en general la proliferación estimulada por los factores de crecimiento de las células hematopoyéticas y células no hematopoyéticas como, por ejemplo, las células del músculo liso vascular. La proliferación de las células del músculo liso vascular estimulada por factores de crecimiento, inducida por la injuria de las células endoteliales y que lleva a la formación de neoíntima, desempeña un papel fundamental en la patogénesis del rechazo crónico. Los estudios preclínicos con everolimus revelan una inhibición de la formación de neoíntima en un modelo murino de alotrasplante de aorta.

#### • Estudios clínicos

##### *Trasplante renal*

Se investigaron los efectos de Certican®, a dosis fija de 1,5 mg/día y 3 mg/día, en combinación con dosis convencionales de ciclosporina para microemulsión y corticosteroides en dos ensayos clínicos sobre trasplante renal *de novo* de fase III (B201 y B251). Como medicamento de referencia se utilizó micofenolato de mofetilo (MMF) 1g b.i.d. Los puntos finales compuestos principales fueron el fallo de la eficacia (rechazo agudo confirmado por biopsia, pérdida del injerto, muerte o pérdida para el seguimiento) a los 6 meses y la pérdida del injerto, la muerte o la pérdida para el seguimiento a los 12 meses. Globalmente, Certican® no resultó inferior a MMF en estos ensayos. Las incidencias de rechazo agudo confirmado por biopsia a los 6 meses en el estudio B201 fueron 21,6%; 18,2% y 23,5% para los grupos tratados con 1,5 mg/día de Certican®, 3 mg/día de Certican® y MMF, respectivamente. En el estudio B251 las incidencias fueron 17,1%; 20,1% y 23,5% para los grupos tratados con 1,5 mg/día de Certican®, 3 mg/día de Certican® y MMF, respectivamente.

Se observó disminución de la función del aloinjerto con elevación de la creatinina sérica más frecuentemente en los individuos que utilizaron Certican® asociado a dosis plena de ciclosporina para microemulsión que en los pacientes tratados con MMF. Este efecto sugiere que Certican aumenta la nefrotoxicidad de ciclosporina. El análisis de concentración de medicación- farmacodinamia mostró que la función renal puede ser mejorada con una exposición reducida a ciclosporina mientras que se conserva la eficacia en tanto y cuanto los niveles del valle de everolimus estén por encima de 3 ng/mL. Este concepto fue subsiguientemente confirmado en dos estudios fase III (A2306 y A2307, incluyendo 237 y 256 pacientes respectivamente), los que evaluaron la eficacia y seguridad de Certican® después de la administración de 1,5 mg/día y 3 mg/día de Certican® (dosis inicial), la dosis subsiguiente se basa en la concentración en el valle (C<sub>0</sub>) deseada  $\geq 3$  ng/mL en combinación con exposición reducida a la ciclosporina. En ambos estudios la función renal mejoró sin comprometer la eficacia. Sin embargo, en estos ensayos faltó un grupo de comparación no tratado con Certican.

Novartis Argentina S.A.  
Farm. Eisa Orsa  
Co-Dirección Técnica - M.N. 15.575  
Gte. de Asuntos Regulatorios  
Apoderada

Se ha completado un estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado, de etiqueta abierta, controlado: estudio 2309 en el cual 833 trasplantados renales de novo fueron aleatorizados a uno de dos regimenes conteniendo Certican®, difiriendo por dosaje, y combinados con dosis reducida de ciclosporina o un régimen standard de micofenolato(MPA) + ciclosporina y tratados por 12 meses. Todos los pacientes recibieron inducción con basiliximab pre-trasplante y en el día 4 post trasplante. Los esteroides podían ser suministrados según se requiriese post trasplante.

Las dosis de comienzo en los dos grupos con Certican fueron 1.5 y 3 mg/día, suministradas b.i.d, subsiguientemente modificadas desde el día 5 en adelante para mantener los niveles del valle de everolimus objetivo, de 3-8 ng/ml y 6-12 ng/ml respectivamente. La dosis de micofenolato de sodio fue de 1.44 g/día. Las dosis de ciclosporina fueron adaptadas para mantener los niveles objetivo dentro de las ventanas como se muestra en la Tabla 1. Los niveles reales medidos para las concentraciones de everolimus y ciclosporina (C0 y C2) se muestran en la Tabla 2.

A pesar de que el regimen de mayor dosis de Certican fue tan efectivo como el de dosis más baja, la seguridad fue globalmente peor y por lo tanto este nivel alto no es recomendado.

Se recomienda el nivel de dosis más baja (ver "Posología /Dosificación - Modo de Administración").

**Tabla 1 Estudio A2309: niveles del valle objetivo de ciclosporina**

| Ciclosporina (ng/mL) | C0 | Mes 1   | Mes 2-3 | Mes 4-5 | Mes 6-12 |
|----------------------|----|---------|---------|---------|----------|
| Grupos Certican      |    | 100-200 | 75-150  | 50-100  | 25-50    |
| Grupo MPA            |    | 200-300 | 100-250 | 100-250 | 100-250  |

**Tabla 2 Estudio A2309: niveles del valle medidos de ciclosporina y everolimus**

| Niveles del valle (ng/ml) | Grupos Certican (baja dosis de ciclosporina) |         |                        |         | MPA(ciclosporina standard) |         |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------|------------------------|---------|----------------------------|---------|
|                           | Certican 1,5 mg                              |         | Certican 3 mg          |         | Myfortic 1,44 g            |         |
|                           | C0                                           | C2      | C0                     | C2      | C0                         | C2      |
| Ciclosporina              |                                              |         |                        |         |                            |         |
| Día 7                     | 195±106                                      | 847±412 | 192±104                | 718±319 | 239±130                    | 934±438 |
| Mes 1                     | 173± 84                                      | 770±364 | 177± 99                | 762±378 | 250±119                    | 992±482 |
| Mes 3                     | 122± 53                                      | 580±322 | 123± 75                | 548±272 | 182± 65                    | 821±273 |
| Mes 6                     | 88 ± 55                                      | 408±226 | 80±40                  | 426±225 | 163±103                    | 751±269 |
| Mes 9                     | 55 ± 24                                      | 319±172 | 51±30                  | 296±183 | 149± 69                    | 648±265 |
| Mes 12                    | 55 ± 38                                      | 291±155 | 49±27                  | 281±198 | 137± 55                    | 587±241 |
| Everolimus                | Nivel objetivo C0 3-8                        |         | Nivel objetivo C0 6-12 |         |                            |         |
| Día 7                     | 4,5±2,3                                      |         | 8,3±4,8                |         |                            |         |
| Mes 1                     | 5,3±2,2                                      |         | 8,6±3,9                |         |                            |         |
| Mes 3                     | 6,0±2,7                                      |         | 8,8±3,6                |         |                            |         |
| Mes 6                     | 5,3±1,9                                      |         | 8,0±3,1                |         |                            |         |
| Mes 9                     | 5,3±1,9                                      |         | 7,7±2,6                |         |                            |         |
| Mes 12                    | 5,3±2,3                                      |         | 7,9±3,5                |         |                            |         |

Los números son medias  $\pm$  desviación standard de los niveles medidos de C0, C2: valor a las dos horas post dosis

El criterio de valoración principal de la eficacia consistió en una variable compuesta representativa del fracaso terapéutico (rechazo agudo comprobado por biopsia, pérdida del injerto, deceso o paciente perdido al seguimiento). La Tabla 3 presenta los resultados.

Tabla 3 Estudio A2309: Puntos finales de eficacia individuales y compuestos a los 6 y 12 meses (incidencia en la población ITT)

|                                                   | Certican 1.5 mg<br>N=277<br>%(n) |          | Certican 3.0 mg<br>N=279<br>%(n) |          | MPA 1.44 g<br>N=277<br>%(n) |           |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|
|                                                   | 6m                               | 12m      | 6m                               | 12m      | 6m                          | 12m       |
| Punto final compuesto (1° criterio)               | 19.1(53)                         | 25.3(70) | 16.8(47)                         | 21.5(60) | 18.8 (52)                   | 24.2 (67) |
| Diferencia % (Certican - MPA) 95% IC              | 0.4%                             | 1.1%     | -1.9%                            | -2.7%    | -                           | -         |
|                                                   | (-6.2,6.9)(-6.1,8.3)             |          | (-8.3,4.4) (-9.7,4.3)            |          | -                           | -         |
| Puntos finales individuales (2° criterio)         |                                  |          |                                  |          |                             |           |
| BPAR tratada                                      | 10.8(30)                         | 16.2(45) | 10.0(28)                         | 13.3(37) | 13.7(38)                    | 17.0(47)  |
| Pérdida del injerto                               | 4.0(11)                          | 4.3(12)  | 3.9(11)                          | 4.7(13)  | 2.9(8)                      | 3.2(9)    |
| Muerte                                            | 2.2(6)                           | 2.5(7)   | 1.8(5)                           | 3.2(9)   | 1.1(3)                      | 2.2(6)    |
| Pérdida al seguimiento                            | 3.6(10)                          | 4.3(12)  | 2.5(7)                           | 2.5(7)   | 1.8(5)                      | 3.2 (9)   |
| Puntos finales combinados                         |                                  |          |                                  |          |                             |           |
| Pérdida del injerto/muerte                        | 5.8 (16)                         | 6.5(18)  | 5.7(16)                          | 7.5(21)  | 4.0(11)                     | 5.4(15)   |
| Pérdida del injerto/muerte/pérdida al seguimiento | 9.4(26)                          | 10.8(30) | 8.2(23)                          | 10.0(28) | 5.8(16)                     | 8.7(24)   |

m: mes, 1°: primario, 2°: secundario, IC: intervalo de confianza, el margen de no inferioridad fue 10%.

Punto final combinado: rechazo agudo comprobado por biopsia (BPAR), pérdida del injerto, muerte, pérdida al seguimiento.

Los cambios en la función renal, mostrados como cálculos de la tasa de filtración (TF) usando la fórmula MDER se muestran en la Tabla 4.

La proteinuria fue evaluada en las visitas según lo estipulado por análisis de proteinuria de spot proteinuria/creatininuria y categorizada según niveles de relevancia clínica como está representado en la Tabla 5. Pocos pacientes en alguno de los grupos de tratamiento alcanzaron el umbral nefrótico, pero una mayor proporción de pacientes

estuvo consistentemente en la categoría subnefrótica comparado con el grupo MPA. Un efecto relacionado con la concentración se observó como relacionado a la proteinuria sobre todo con niveles del valle superiores a 8 ng/ml.

Los eventos adversos reportados más frecuentemente que con MPA, grupo control, en el rango recomendado de Certican bajas dosis se han incluido en la Tabla 10. Para los pacientes tratados con Certican se reportó una menor frecuencia de infecciones virales, principalmente menores tasas de infección por CMV (0.7% vs 5.95%) y virus BK (1.5% vs 4.8%).

**Tabla 4 Estudio A2309: función renal (TF calculada por MDER) a los 12 meses (población ITT)**

|                                                    | Certican 1.5 mg<br>N=227 | Certican 3 mg<br>N=279 | MPA=1.44G<br>N=277 |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| TF media al mes 12<br>(ml/min/1.73m <sup>2</sup> ) | 54.6                     | 51.3                   | 52.2               |
| Diferencia de medias<br>(everolimus-MPA)           | 2.37                     | -0.89                  | -                  |
| IC 95%                                             | (-1.7,6.4)               | (-5.0,3.2)             | -                  |

Imputación por valores faltantes al mes 12 para la TF: pérdida del injerto=0, muerte o pérdida al seguimiento para la función renal=LOCF1 (arrastré de la última observación hasta fin de tratamiento (hasta el mes 12))

MDER: modificación de la dieta en enfermedad renal

TF: tasa de filtración glomerular

**Tabla 5 Estudio A2309: relación proteína/creatinina urinaria.**

| Categoría de proteinuria (mg/mmol) |                    |                       |                          |                                     |                         |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Mes 12<br>PFT                      | Tratamiento        | Normal%(n)<br>(<3,39) | Leve%(n)<br>(3,39-<33,9) | Sub<br>nefrótico%(n)<br>(33,9-<339) | Nefrótico%(n)<br>(>339) |
|                                    | Certican 1.5<br>mg | 0.4(1)                | 64.2(174)                | 32.5(88)                            | 3.0(8)                  |
|                                    | Certican 3<br>mg   | 0.7(2)                | 59.2(164)                | 33.9(94)                            | 5.8(16)                 |
|                                    | MPA 1.44 g         | 1,8(5)                | 73.1(198)                | 20.7(56)                            | 4.1(11)                 |

1 mg/mmol=8.84 mg/  
PFT: Punto final del tratamiento (mes 12 o última observación arrastrada (carried forward))



### Trasplante cardíaco

En el estudio sobre trasplante cardíaco de fase III (B253) se investigó la administración de 1,5 mg/día y 3 mg/día de Certican® en asociación con dosis convencionales de ciclosporina para microemulsión y corticosteroides frente a una dosis de 1-3 mg/kg/día de azatioprina (AZA) como tratamiento de referencia. El punto final primario fue la incidencia compuesta de rechazo agudo  $\geq$  grado 3A de la International Society of Heart and Lung Transplant (ISHLT), rechazo agudo asociado con compromiso hemodinámico, pérdida del injerto, muerte del paciente o pérdida para el seguimiento a los 6; 12 y 24 meses. Ambas dosis de Certican® fueron mejores que la AZA al cabo de 6; 12 y 24 meses. La incidencia de rechazo agudo confirmado por biopsia  $\geq$  grado 3A de ISHLT a los 6 meses fue 27,8% en el grupo tratado con 1,5 mg/d, 19% en el grupo tratado con 3 mg/d y 41,6% en el grupo AZA, respectivamente ( $p = 0,003$  para el grupo 1,5 mg/d frente al grupo control;  $p < 0,001$  para el grupo 3 mg/d frente al grupo control).


Sobre la base de los datos de las ecografías intracoronarias obtenidas en un subgrupo de la población del estudio, ambas dosis de Certican® fueron más eficaces, con nivel de significación estadística, que la AZA para la prevención de la vasculopatía del aloinjerto (definida como un aumento del espesor máximo de la íntima igual o superior a 0,5 mm respecto del espesor basal, en por lo menos un corte apareado de una secuencia automatizada durante la extracción del catéter), que constituye un importante factor de riesgo para la pérdida del injerto en el largo plazo.

Las elevaciones de la creatininemia fueron más frecuentes entre los sujetos que recibieron Certican® asociado con una dosis completa de ciclosporina en microemulsión que en los pacientes tratados con AZA. Estos resultados indicaron que Certican® incrementa la nefrotoxicidad inducida por la ciclosporina; sin embargo, un análisis más profundo indicó que podía mejorarse la función renal reduciendo la dosis de ciclosporina sin afectar la eficacia, siempre que las concentraciones de everolimus se mantuvieran por arriba de un determinado umbral. Así pues, se emprendió el estudio A2411 para investigar esta cuestión.

El estudio A2411, sin ciego, aleatorizado y de 12 meses de duración, comparó el tratamiento con Certican® asociado a dosis reducidas de ciclosporina en microemulsión y corticoesteroides, con el micofenolato mofetilo (MMF) asociado a dosis convencionales de ciclosporina en microemulsión y corticoesteroides en pacientes con un primer trasplante de corazón. El tratamiento con Certican® se inició con la dosis de 1,5 mg al día y luego se ajustó para mantener concentraciones sanguíneas mínimas de everolimus entre 3 y 8 ng/ml. El tratamiento con el MMF se inició con la dosis de 1.500 mg dos veces al día. Las dosis de ciclosporina en microemulsión se ajustaron para conseguir las siguientes concentraciones mínimas (ng/ml):

| Concentración de ciclosporina deseada (C <sub>0</sub> ) | Mes 1 | Mes 2 | Meses 3-4 | Meses 5-6 | Meses 7-12 |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|------------|
|                                                         |       |       |           |           |            |

Novartis Argentina S.A.  
 Farm. Elsa Orosa  
 Co-Directora Técnica - M.N. 15.575  
 Gte. de Asuntos Regulatorios  
 Apoderada



|                             |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Grupo tratado con Certican® | 200-350 | 150-250 | 100-200 | 75-150  | 50-100  |
| Grupo tratado con el MMF    | 200-350 | 200-350 | 200-300 | 150-250 | 100-250 |

Las concentraciones sanguíneas medidas figuran en la Tabla 6.

Tabla 6. Estudio A2411: resumen estadístico de las concentraciones sanguíneas de ciclosporina A \* (media  $\pm$  DE)

|        | Grupo tratado con Certican® (N=91) |          | Grupo tratado con el MMF (N=83) |          |
|--------|------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Visita | C0                                 |          | C0                              |          |
| Día 4  | 154<br>n=79                        | $\pm$ 71 | 155<br>n=74                     | $\pm$ 96 |
| Mes 1  | 245<br>n=76                        | $\pm$ 99 | 308<br>n=71                     | $\pm$ 96 |
| Mes 3  | 199<br>n=70                        | $\pm$ 96 | 256<br>n=70                     | $\pm$ 73 |
| Mes 6  | 157<br>n=73                        | $\pm$ 61 | 219<br>n=67                     | $\pm$ 83 |
| Mes 9  | 133<br>n=72                        | $\pm$ 67 | 187<br>n=64                     | $\pm$ 58 |
| Mes 12 | 110<br>n=68                        | $\pm$ 50 | 180<br>n=64                     | $\pm$ 55 |

\* Concentraciones sanguíneas de ciclosporina (C0)

La Tabla 7 presenta los cambios de la función renal y la Tabla 8 los resultados sobre la eficacia.

Tabla 7. Estudio A2411: variaciones de la depuración de creatinina durante el estudio (pacientes con pares de valores)

|       |                     | Depuración de creatinina estimada (Cockcroft-Gault)* (ml/min) |                                                      |                                                    |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|       |                     | Valor inicial<br>Media ( $\pm$ DE)                            | Valor en una determinada visita<br>Media ( $\pm$ DE) | Diferencia entre los grupos<br>Media (IC del 95 %) |
| Mes 1 | Certican®<br>(n=87) | 73,8 ( $\pm$ 27,8)                                            | 68,5 ( $\pm$ 31,5)                                   | -7,3<br>(-18,1, 3,4)                               |
|       | MMF<br>(n=78)       | 77,4 ( $\pm$ 32,6)                                            | 79,4 ( $\pm$ 36,0)                                   |                                                    |

|        |                     |               |               |              |
|--------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| Mes 6  | Certican®<br>(n=83) | 74,4 (± 28,2) | 65,4 (± 24,7) | -5,0         |
|        | MMF<br>(n=72)       | 76,0 (± 31,8) | 72,4 (± 26,4) | (-13,6, 2,9) |
| Mes 12 | Certican®<br>(n=71) | 74,8 (± 28,3) | 68,7 (± 27,7) | -1,8         |
|        | MMF<br>(n=71)       | 76,2 (± 32,1) | 71,9 (± 30,0) | (-11,2, 7,5) |

\* Incluye los pacientes con un valor inicial y un valor en la visita en cuestión

Tabla 8. Estudio A2411: Porcentajes de eficacia (incidencia en la población ITT)

| Variable de eficacia                                        | Certican®<br>n=92 | MMF<br>n=84 | Diferencia<br>Media (IC del<br>95%) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>Después de 6 meses</b>                                   |                   |             |                                     |
| Rechazo agudo comprobado por biopsia ≥ grado 3A de la ISHLT | 18 (19,6 %)       | 23 (27,4 %) | -7,8 (-20,3, 4,7)                   |
| Variable compuesta de ineficacia *                          | 26 (28,3 %)       | 31 (36,9 %) | -8,6 (-22,5, 5,2)                   |
| <b>Después de 12 meses</b>                                  |                   |             |                                     |
| Rechazo agudo comprobado por biopsia ≥ grado 3A de la ISHLT | 21 (22,8 %)       | 25 (29,8 %) | -6,9 (-19,9, 6,1)                   |
| Variable compuesta de ineficacia *                          | 30 (32,6 %)       | 35 (41,7 %) | -9,1 (-23,3, 5,2)                   |
| Deceso o pérdida del injerto/retrasplante                   | 10 (10,9 %)       | 10 (11,9 %) | -                                   |

\* La variable compuesta de ineficacia incluye cualquiera de los siguientes criterios: rechazo agudo ≥ grado 3A, rechazo agudo con deficiencia hemodinámica, pérdida del injerto, deceso o indisponibilidad del paciente.

### Farmacocinética

#### • Absorción

Everolimus alcanza la concentración sérica máxima entre 1 y 2 horas después de la administración de una dosis oral. Las concentraciones sanguíneas de everolimus son proporcionales a la dosis en un rango posológico de 0,25 a 15 mg en los pacientes trasplantados. La biodisponibilidad relativa del comprimido dispersable es 0,90 (IC 90% 0,76-1,07) sobre la base de la razón de AUC.

**Efecto de los alimentos:** La  $C_{m\acute{a}x}$  y el AUC de everolimus se reducen 60 % y 16%, respectivamente, cuando se administra un comprimido con una comida rica en grasas. Certican<sup>®</sup> se debe administrar consistentemente con o sin alimentos para reducir al mnimo la variabilidad.

- **Distribucin**

La razn sangre:plasma de everolimus, que depende de la concentracin en el rango de 5 a 5000 ng/mL, vara de 17% a 73%. La unin a protenas plasmticas es aproximadamente 74 % en individuos sanos y en pacientes con insuficiencia heptica moderada. El volumen de distribucin asociado con la fase terminal ( $V_z/F$ ) en los pacientes con un trasplante renal en mantenimiento es  $342 \pm 107$  L.

- **Metabolismo**

Certican<sup>®</sup> es un sustrato de CYP3A4 y de la glicoprotena P (PgP). Las principales vas metablicas identificadas en el hombre fueron las monohidroxilaciones y O-desalquilaciones. Los 2 principales metabolitos se forman por hidrlisis de la lactona cclica. Everolimus fue el principal componente circulante en sangre. Se considera improbable que alguno de los metabolitos principales contribuya significativamente a la actividad inmunosupresora de everolimus.

- **Eliminacin**

Despus de la administracin de una dosis nica de everolimus radioactivo a pacientes trasplantados tratados con ciclosporina, la mayor parte (80 %) de la radioactividad se recuper en las heces y slo una cantidad muy pequea (5 %) se excret en la orina. El compuesto original no se detect en orina ni en heces.

- **Farmacocintica en el estado estacionario**

La farmacocintica fue comparable en los pacientes con un trasplante renal y cardaco tratados simultneamente con everolimus dos veces por da y ciclosporina para microemulsin. El estado estacionario se alcanza hacia el da 4, con concentraciones acumulativas en sangre 2 a 3 veces mayores que la exposicin tras la primera dosis. El  $T_{m\acute{a}x}$  ocurre 1 a 2 h postdosis. Las  $C_{m\acute{a}x}$  promedian  $11,1 \pm 4,6$  ng/mL y  $20,3 \pm 8,0$  ng/mL y las AUC  $75 \pm 31$  ng.h/mL y  $131 \pm 59$  ng.h/mL, con dosis de 0,75 y 1,5 mg b.i.d., respectivamente. Los niveles en sangre en el valle pre-dosis ( $C_{mn}$ ) promedian  $4,1 \pm 2,1$  y  $7,1 \pm 4,6$  ng/mL, a dosis de 0,75 y 1,5 mg b.i.d., respectivamente. La exposicin a everolimus permanece estable con el tiempo durante el primer ao postrasplante. La  $C_{mn}$  se correlaciona de forma estadsticamente significativa con el AUC, el coeficiente de correlacin es un valor comprendido entre 0,86 y 0,94. La depuracin (clearance) oral ( $CL/F$ ) es 8,8 L/h (27% de variacin interindividual) y el volumen de distribucin central ( $V_c/F$ ) es 110 L (36% de variacin interindividual), sobre la base del anlisis farmacocintico de una poblacin. La variabilidad residual de las concentraciones en sangre es 31%. La vida media de eliminacin es  $28 \pm 7$  h.

**Trastornos hepticos:** El AUC de Certican<sup>®</sup> en 8 pacientes con insuficiencia heptica moderada (clase B en la escala de Child-Pugh) aument un promedio de 2 veces en comparacin con 8 individuos sanos. El AUC se correlacion positivamente con la concentracin de la bilirrubina srica y la prolongacin del tiempo de protrombina y negativamente con la concentracin de la albmina srica. El AUC de everolimus tendi a ser mayor que el AUC de los individuos sanos si la concentracin de la bilirrubina era  $>34$   $\mu$ mol/L,  $RIN >1,3$  (prolongacin del tiempo de protrombina  $> 4$  segundos), y/o la concentracin de albmina  $<35$  g/L. No se ha evaluado el impacto de

la insuficiencia hepática severa (clase C en la escala de Child-Pugh), pero el efecto sobre el AUC de Certican® probablemente sea tan grande o incluso mayor que el observado en la insuficiencia moderada (ver *Posología / Dosificación - Modo de administración*).

**Trastornos renales:** El daño renal postrasplante [Rango de la depuración (clearance) de creatinina 11-107 mL/min] no afectó a la farmacocinética de everolimus.

#### Pediatría:

La depuración (clearance) de Certican® (CL/F) aumentó de forma lineal con la edad del paciente (1 a 16 años), la superficie corporal (0,49-1,92 m<sup>2</sup>) y el peso (11-77 kg). La CL/F en el estado estacionario fue  $10,2 \pm 3,0$  L/h/m<sup>2</sup> y la vida media de eliminación fue  $30 \pm 11$  h. Diecinueve pacientes pediátricos con un trasplante renal *de novo* (1 a 16 años) recibieron comprimidos dispersables de Certican® a dosis de 0,8 mg/m<sup>2</sup> (dosis máxima 1,5 mg) dos veces diarias con ciclosporina para microemulsión. Los pacientes alcanzaron AUC de everolimus de  $87 \pm 27$  ng·h/ml, semejante al de los adultos tratados con 0,75 mg dos veces diarias. Las concentraciones en el valle (C<sub>0</sub>) en el estado estacionario fueron de  $4,4 \pm 1,7$  ng/ml.

#### Ancianos

Se estimó que la depuración (clearance) de Certican® por vía oral puede disminuir 0,33% por año en los adultos (rango de edad estudiado 16-70 años). No se considera necesario realizar un ajuste de la dosis.

#### Grupo étnico

La depuración (clearance) oral (CL/F) es, en promedio, un 20% más elevada en pacientes trasplantados de raza negra, sobre la base del análisis farmacocinético de una población (ver *Posología / Dosificación - Modo de administración*).

#### Relaciones exposición-respuesta:


En los pacientes con un trasplante renal y cardíaco, la concentración promedio de everolimus en el valle (C<sub>0</sub>) durante los primeros 6 meses postrasplante guardaba relación con la incidencia de rechazo agudo confirmado por biopsia y de trombocitopenia (ver Tabla 9).

Tabla 9

| Trasplante de riñón                               |       |           |           |            |             |   |
|---------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-------------|---|
| Concentraciones mínimas (C <sub>0</sub> ) (ng/ml) | ≤ 3,4 | 3,5 - 4,5 | 4,6 - 5,7 | 5,8 - 7,7  | 7,8 - 15,0  | - |
| Sin rechazo                                       | 68 %  | 81 %      | 86 %      | 81 %       | 91 %        |   |
| Trombocitopenia (< 100 x 10 <sup>9</sup> /l)      | 10 %  | 9 %       | 7 %       | 14 %       | 17 %        |   |
| Trasplante de corazón                             |       |           |           |            |             |   |
| Concentraciones mínimas (C <sub>0</sub> ) (ng/ml) | ≤ 3,5 | 3,6 - 5,3 | 5,4 - 7,3 | 7,4 - 10,2 | 10,3 - 21,8 | - |
| Sin rechazo                                       | 65 %  | 69 %      | 80 %      | 85 %       | 85 %        |   |
| Trombocitopenia (< 75 x 10 <sup>9</sup> /l)       | 5 %   | 5 %       | 6 %       | 8 %        | 9 %         |   |

#### Datos sobre toxicidad preclínica

Se ha determinado la toxicidad preclínica del everolimus en ratones, ratas, cerdos Minipigs®, monos y conejos. En diversas especies se vieron afectados los órganos



reproductores de las hembras y de los machos (degeneración tubular testicular, reducción del contenido de esperma en los epidídimos y atrofia uterina), pero sólo en la rata se observaron afectaciones pulmonares (aumento de los macrófagos alveolares) y oculares (opacidades de la línea de sutura anterior lenticular). Tanto en la rata como en el ratón se observaron cambios mínimos en el riñón: en la rata una exacerbación de la lipofuscina relacionada con la edad en el epitelio tubular y, en el ratón, una exacerbación de las lesiones subyacentes. No se han observado signos de toxicidad renal ni en los monos ni en los cerdos Minipig®.

Las enfermedades subyacentes de aparición espontánea (miocarditis crónica en las ratas, infección por el virus Coxsackie en el plasma y el corazón de los monos, infestación coccidial del tubo digestivo de los cerdos Minipig®, lesiones cutáneas en los ratones y los monos) parecían exacerbarse con la administración de everolimus. Estos hallazgos se observaron generalmente con concentraciones de exposición sistémica situadas dentro o por encima del intervalo de exposiciones terapéuticas, con la excepción de los hallazgos en ratas, que ocurrieron por debajo de la exposición terapéutica, y ello debido a la elevada distribución tisular.

La asociación de la ciclosporina con el everolimus aumentó la exposición sistémica al everolimus e incrementó la toxicidad. No se encontraron nuevos órganos afectados en la rata. En los monos se observó hemorragia y arteritis en diversos órganos.

En un estudio de la fecundidad de ratas macho, las dosis iguales o superiores a 0,5 mg/kg afectaron la morfología del testículo y las dosis de 5 mg/kg produjeron una menor motilidad de espermatozoides, una reducción del número de cabezas de espermatozoides y de las concentraciones plasmáticas de testosterona, lo cual provocó un menoscabo de la fecundidad de los machos. Sin embargo, hubo signos de reversión. La fecundidad de las hembras no se vio afectada, pero el everolimus atravesó la barrera hematoplacentaria y fue tóxica para los productos de la concepción (el embrión o feto más las membranas). En las ratas, el everolimus causó toxicidad embrionaria y fetal con una exposición sistémica por debajo de la terapéutica, que se manifestó en forma de muerte y reducción del peso de los fetos. A la dosis de 0,3 y 0,9 mg/kg aumentó la incidencia de cambios esqueléticos y malformaciones (por ejemplo, fisura de esternón). En los conejos, la toxicidad embrionaria se reflejó en un aumento de resorciones tardías.

Los estudios de genotoxicidad en que se han tenido en cuenta todos los criterios de valoración importantes no indicaron signos de actividad clastógena ni mutágena. La administración de everolimus a ratones y a ratas durante un máximo de 2 años no indicó capacidad oncógena alguna incluso en las dosis más elevadas, que correspondían, respectivamente, a 8,6 y 0,3 veces la exposición clínica estimada.

### Posología / Dosificación - Modo de Administración

Sólo médicos con suficiente experiencia en la administración de un tratamiento inmunodepresor tras un trasplante de órgano y con posibilidades de controlar las concentraciones sanguíneas del everolimus deberán instituir y mantener el tratamiento con Certican.

Uso en adultos

Dosis recomendada

Novartis Argentina S.A.  
Farm. Elsa Orosa  
Co. Director Técnica - M.N. 15.575  
Gte. de Asuntos Regulatorios  
Apoderada

Se debe administrar una dosis diaria inicial de 1,5 mg, dividida en dos dosis de 0,75 mg cada una, que es la dosis recomendada en la población general de pacientes con trasplantes renales y cardiacos, inmediatamente después del trasplante.

La dosis diaria de Certican® deberá ser administrada dividida en dos dosis (b.i.d.), consistentemente con o sin comida (ver *Farmacocinética*) y a la misma hora que la ciclosporina para microemulsión (ver *Monitoreo terapéutico de la droga*).

Certican® se debe administrar por vía oral únicamente.

Los pacientes tratados con Certican® pueden requerir ajustes de la dosis, sobre la base de los niveles sanguíneos alcanzados, la tolerabilidad, la respuesta individual, el cambio de medicaciones concomitantes y la situación clínica. Los ajustes de la dosis pueden realizarse a intervalos de 4-5 días (ver *Monitoreo terapéutico de la droga*).

### Pacientes de raza negra

En los pacientes de raza negra, la incidencia de episodios de rechazo agudo comprobados por biopsia fue significativamente mayor que en pacientes de otras razas. Los pocos datos disponibles indican que estos pacientes pueden necesitar dosis más elevadas de Certican para conseguir una eficacia similar a la observada con la dosis recomendada para adultos de otras razas (ver "Farmacocinética"). En la actualidad, los datos sobre la eficacia y la seguridad son demasiado escasos y no permiten hacer recomendaciones específicas sobre el uso del everolimus en pacientes de raza negra.

### Uso en niños y adolescentes

No se dispone de información adecuada que justifique la administración de Certican en pacientes de estos grupos de edad. No obstante, existe información limitada sobre el uso del medicamento en pacientes pediátricos con trasplante renal (ver "Farmacocinética").

### Pacientes de edad avanzada (≥ 65 años)

Es escasa la experiencia clínica en pacientes mayores de 65 años; no obstante, no hay diferencias aparentes en la farmacocinética del everolimus entre los pacientes mayores de 65-70 años y adultos más jóvenes (ver "Farmacocinética").

### Pacientes con insuficiencia renal

En estos pacientes no es necesario ajustar la dosis (ver "Farmacocinética").

### Pacientes con insuficiencia hepática

En los pacientes con insuficiencia hepática deben vigilarse de cerca las concentraciones sanguíneas mínimas (C<sub>0</sub>) de everolimus. En los pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada (clase A o B de la escala Child-Pugh), la dosis debe reducirse aproximadamente a la mitad de la dosis normal si se cumplen dos de los siguientes criterios: bilirrubina > 34 μmol/l (> 2 mg/dl), albúmina < 35 g/l (< 3,5 g/dl), RIN (razón internacional normalizada) > 1,3 (prolongación del tiempo de protrombina > 4 segundos). Los ajustes adicionales de la dosis deben basarse en los resultados del análisis farmacológico de sangre (ver "Farmacocinética"). El everolimus no se ha

estudiado en pacientes con insuficiencia hepática grave (clase C de la escala Child-Pugh, ver "Precauciones").

#### Monitoreo terapéutico de la droga

Se recomienda el monitoreo rutinario de la concentración de Certican® en sangre. Sobre la base del análisis de la exposición-eficacia y la exposición-seguridad, se ha hallado que los pacientes que alcanzan concentraciones de everolimus en sangre en el valle (C0)  $\geq 3,0$  ng/mL presentan una incidencia menor de rechazo agudo confirmado por biopsia tanto en el trasplante renal como en el cardíaco, que los pacientes cuyos niveles en el valle (C0) se encuentran por debajo de 3,0 ng/mL. El límite superior del rango terapéutico recomendado es 8 ng/mL. No se han estudiado los efectos de una exposición superior a 12 ng/mL. Estos intervalos de concentración recomendados para everolimus se basan en métodos cromatográficos.

Es particularmente importante vigilar las concentraciones de everolimus en sangre en los pacientes con insuficiencia hepática, durante la administración concomitante de potentes inductores e inhibidores de CYP3A4, cuando se cambia de forma farmacéutica y/o si se reduce significativamente la dosis de ciclosporina (ver *Interacciones*). Las concentraciones de everolimus podrían ser ligeramente menores luego de la administración de comprimidos dispersables.

En teoría, los ajustes de la dosis de Certican® deben basarse en los niveles en el valle obtenidos >4-5 días después del cambio de dosis previo. Dado que existe una interacción de la ciclosporina con everolimus, los niveles de everolimus podrían disminuir si se reduce significativamente la exposición a la ciclosporina (por ejemplo, si la concentración en el valle es inferior a 50 ng/mL).

#### Dosis de ciclosporina recomendada en el trasplante renal:

Certican® no se debe utilizar de forma prolongada en asociación con dosis plena de ciclosporina. La disminución de la exposición a la ciclosporina en los pacientes con un trasplante renal tratados con Certican® se asocia con mejor función renal. Basados en la experiencia obtenida en el estudio 2309 la reducción de la exposición a la ciclosporina debe iniciarse inmediatamente después del trasplante con la siguiente ventana de niveles del valle.

Trasplante renal: ventana de niveles del valle de ciclosporina recomendados

| Ciclosporina<br>Objetivo Co (ng/ml) | Mes 1   | Meses 2-3 | Meses 4-5 | Meses 6-12 |
|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|------------|
| Grupos Certican                     | 100-200 | 75-150    | 50-100    | 25-50      |

(El apartado "Acción Farmacológica" presenta las concentraciones medidas).

Antes de reducir la dosis de ciclosporina se debe asegurar que las concentraciones de everolimus en el valle (C0) en el estado estacionario sean iguales o superiores a 3 ng/mL.

Existen datos limitados respecto de la administración de Certican® con concentraciones de ciclosporina en el valle (C0) inferiores a 50 ng/mL o con niveles C2 inferiores a 350 ng/mL, en la fase de mantenimiento. Si el paciente no puede tolerar la reducción de la exposición a la ciclosporina se debe reconsiderar la continuación del uso de everolimus.

#### Dosis de ciclosporina recomendada en el trasplante cardíaco:



En los pacientes con un trasplante cardíaco en el periodo de mantenimiento se debe reducir la dosis de ciclosporina para microemulsión según tolerancia, comenzando un mes después del trasplante con el objeto de mejorar la función renal. Si el trastorno de la función renal es progresivo o si el clearance de creatinina calculado es  $<60$  mL/min se debe ajustar el régimen terapéutico. En los pacientes con trasplante de corazón, la dosis de ciclosporina debe basarse en la experiencia adquirida en el estudio 2411 en el que se administró Certican® junto con ciclosporina con niveles reducidos de Co según continúa.

Trasplante cardíaco: ventana de niveles del valle de ciclosporina recomendados.

| Ciclosporina        | Mes 1   | Mes 2   | Meses 3-4 | Meses 5-6 | Meses 7-12 |
|---------------------|---------|---------|-----------|-----------|------------|
| Objetivo Co (ng/ml) |         |         |           |           |            |
| Grupos Certican     | 200-350 | 150-250 | 100-200   | 75-150    | 50-100     |

(El apartado "Acción Farmacológica" presenta las concentraciones medidas).

Antes de disminuir la dosis de ciclosporina se debe corroborar que las concentraciones de everolimus en sangre en el valle (C0) en el estado estacionario son iguales o superiores a 3 ng/mL.

En el trasplante de corazón, se dispone de datos limitados sobre la administración de Certican® cuando se reducen las concentraciones mínimas de ciclosporina (C0) a 50-100 ng/mL después de 12 meses. Si el paciente no tolera la reducción de la exposición a la ciclosporina, debe reconsiderarse la continuación del tratamiento con Certican®.

### Contraindicaciones

Certican® está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad demostrada al everolimus, sirolimus o algún otro componente de la fórmula.

### Advertencias

El tratamiento con Certican® sólo debe ser prescripto por médicos experimentados en el uso de terapia inmunosupresora tras un trasplante de órganos y con acceso al monitoreo de everolimus en sangre.

### Precauciones

#### Manejo de la inmunosupresión


En los ensayos clínicos Certican® se ha administrado concomitantemente con ciclosporina para microemulsión, basiliximab y corticosteroides. No se han investigado adecuadamente los efectos del uso de Certican® en combinación con otros agentes inmunosupresores.

Certican® no se ha sido adecuadamente estudiado en pacientes con alto riesgo inmunológico.

#### Trastorno severo de la función hepática

Everolimus no ha sido estudiado en pacientes con insuficiencia hepática severa. Se recomienda monitorear cuidadosamente los niveles de everolimus en sangre en el valle (C0) en los pacientes con insuficiencia hepática.

Novartis Argentina S.A.  
 Farm. Elsa Orosa  
 Co-Directora Técnica - M.N. 15.575  
 Gr. de Asuntos Regulatorios  
 Apoderada



### Interacción con fuertes inhibidores/inductores de CYP3A4

No se recomienda la coadministración con inhibidores potentes (p.ej., ketoconazol, itraconazol, voriconazol, claritromicina, telitromicina, ritonavir) e inductores potentes (por ejemplo, rifampicina, rifabutina) de CYP3A4, salvo si el beneficio supera el riesgo. Se recomienda el monitoreo de los niveles de everolimus en sangre en el valle (C0) cuando se administren concomitantemente inductores o inhibidores de CYP3A4 y después de su discontinuación (ver *Interacciones*).

### Linfomas y otras neoplasias

Los pacientes bajo tratamiento inmunosupresor, incluido Certican®, presentan mayor riesgo de desarrollar linfomas u otras neoplasias, en especial cutáneas (ver *Reacciones Adversas*). El riesgo absoluto parece guardar relación con la intensidad y la duración de la inmunosupresión más que con el uso de un agente en especial. Se debe controlar regularmente a los pacientes para detectar la aparición de neoplasias cutáneas y se les aconsejará que minimicen la exposición a los rayos ultravioletas y a la luz solar y el uso de una filtros solares adecuados.

### Infecciones Serias y Oportunistas

Los pacientes tratados con inmunosupresores, lo cual incluye a Certican®, están más expuestos a las infecciones, en especial las causadas por patógenos oportunistas (bacterias, hongos, virus y protozoarios). En los pacientes tratados con Certican® se han notificado casos de septicemia e infecciones mortales (ver "REACCIONES ADVERSAS"). Entre las condiciones oportunistas a las cuales los pacientes inmunosuprimidos pueden ser vulnerables están las infecciones por poliovirus que incluye a la nefropatía asociada al virus BK la cual puede llevar a la pérdida del injerto y la potencialmente fatal leucoencefalopatía progresiva múltiple asociada al virus JC (LMP). Estas infecciones, frecuentemente relacionadas a la carga inmunosupresora total, deben ser consideradas en el diagnóstico diferencial de los pacientes inmunosuprimidos con deterioro de la función renal y síntomas neurológicos.

En los ensayos clínicos con Certican®, se administró profilaxis para la neumonía por *Pneumocystis jirovecii* (carinii) durante los primeros 12 meses luego del trasplante. Se recomendó la profilaxis para Citomegalovirus (CMV) durante 3 meses después del trasplante, en particular en los pacientes con alto riesgo de enfermedad por CMV.

### Hiperlipidemia

La utilización de Certican® con ciclosporina para microemulsión en pacientes trasplantados se ha asociado con un aumento del colesterol y los triglicéridos y puede requerir tratamiento. Se debe controlar la hiperlipidemia en los pacientes tratados con Certican® y, en caso necesario, se debe tratar con agentes hipolipemiantes y se deben realizar los ajustes alimentarios adecuados (ver *Interacciones*). Se debe considerar la razón riesgo/beneficio en los pacientes con hiperlipidemia establecida antes de iniciar un régimen de inmunosupresión que incluya Certican®. Análogamente, se reevaluará el riesgo/beneficio de la continuación de la terapia con Certican® en los pacientes con hiperlipidemia severa refractaria.

Novartis Argentina S.A.  
Farm. Elsa Orosa  
Co-Directora Técnica - M.N. 15.575  
Gte. de Asuntos Regulatorios  
Apoderada



Los pacientes tratados con un inhibidor de la HMG-CoA reductasa y/o un fibrato deberán ser monitoreados por la posibilidad de que desarrollen rhabdomiólisis y otros efectos adversos como los descritos en los respectivos prospectos (ver "Interacciones").

### Angioedema

Certican ha sido asociado con el desarrollo de angioedema en la mayoría de los casos los pacientes estaban recibiendo inhibidores ACE como co-medicación.

### Nefrotoxicidad

El uso de Certican con la dosis completa de ciclosporina eleva el riesgo de disfunción renal. Para evitar esto es necesario reducir la dosis de la ciclosporina cuando se asocia con Certican.

Se recomienda el control regular de la función renal en todos los pacientes. En los pacientes con niveles de creatinina sérica elevados se deberá considerar el ajuste apropiado del régimen de inmunosupresión, en particular la reducción de la dosis de ciclosporina. Se debe ser especialmente cauto cuando se coadministren otros agentes con efecto deletéreo conocido sobre la función renal.

### Proteinuria

El uso de Certican® con ciclosporina en trasplantados renales de novo se ha asociado con aumento de la proteinuria. El riesgo se incrementa con niveles elevados de everolimus.

En los pacientes trasplantados renales con proteinuria leve mientras que están con terapia inmunosupresora incluyendo un inhibidor de la calcineurina (CNI) ha habido reportes de empeoramiento de la proteinuria cuando el CNI es reemplazado por Certican®. Se ha observado reversibilidad cuando se interrumpe el Certican® y se reintroduce el CNI. La seguridad y eficacia de la conversión desde el CNI a Certican® en tales pacientes no se ha establecido.

Los pacientes que reciben Certican® deben ser monitoreados para la proteinuria.

### Trombosis del injerto renal

Se ha reportado un aumento del riesgo de trombosis de la arteria o vena renal, que resulta en pérdida del injerto, sobre todo en los primeros 30 días post trasplante.

### Complicaciones de la curación de las heridas

Certican, como otros inhibidores mTOR, puede entorpecer la curación de las heridas aumentando las complicaciones post trasplante como la dehiscencia de la herida, colecciones líquidas, e infección de la herida que requiere cirugía adicional. El linfocele es la complicación más frecuentemente reportada, este evento en los pacientes trasplantados renales tiende a ser más frecuente en los pacientes con mayor índice de masa corporal. La frecuencia de derrame pericárdico y pleural está incrementada en los trasplantados cardíacos.

### Microangiopatía trombótica/Púrpura trombótica trombocitopénica/Síndrome Urémico Hemolítico

Novartis Argentina S.A.  
 Pam. Elsa Orosa  
 2o-Directora Técnica - M.N. 15.575  
 Gte. de Asuntos Regulatorios  
 Avellaneda

La administración concomitante de Certican® con inhibidores de la calcineurina (CNI) puede aumentar el riesgo de síndrome urémico hemolítico inducido por CNI/Púrpura trombótica trombocitopénica/microangiopatía trombótica.

#### Enfermedad Pulmonar Intersticial/Neumonitis no infecciosa

En los pacientes que se presentan con síntomas de neumonía infecciosa que no responde al tratamiento con antibióticos se debe considerar el diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial (EPI), luego de haber descartado causas infecciosas, neoplasias y otras causas ajenas a las drogas (no farmacológicas) a través de estudios apropiados. Se han informado casos de EPI causada por Certican® que responde a la interrupción de la medicación con o sin tratamiento con glucocorticoides (ver "REACCIONES ADVERSAS").

#### Diabetes mellitus de reciente comienzo

Se ha mostrado que Certican® aumenta el riesgo de diabetes mellitus de reciente comienzo después del trasplante. Las concentraciones de glucemia deben ser monitoreadas de cerca en los pacientes tratados con Certican®.

#### Infertilidad en los hombres

Hay reportes en la literatura de azoospermia reversible y oligospermia en pacientes tratados con inhibidores mTOR. Los estudios preclínicos toxicológicos han mostrado que everolimus puede reducir la fertilidad masculina y ser esto considerado un riesgo potencial para el tratamiento prolongado con Certican®.

#### Riesgo de intolerancia a los excipientes

Los pacientes con problemas hereditarios infrecuentes de intolerancia a la galactosa, deficiencia de lactasa severa o malabsorción de glucosa-galactosa no deben recibir este medicamento.

#### **Interacciones:**

Certican® es metabolizado principalmente por CYP3A4 en el hígado y, en menor grado, en la pared intestinal. También es un sustrato de la bomba de flujo de fármacos, la glicoproteína P (PgP). Por consiguiente, la absorción y la ulterior eliminación del everolimus absorbido en la circulación general pueden verse influidas por drogas que afecten a CYP3A4 y/o PgP. Se desaconseja el tratamiento concomitante con inhibidores e inductores potentes de CYP3A4. Los inhibidores de PgP pueden reducir el flujo de everolimus de las células intestinales y aumentar las concentraciones sanguíneas de everolimus. *In vitro*, everolimus es un inhibidor competitivo de CYP3A4 y CYP2D6, potencialmente capaz de aumentar las concentraciones de las drogas eliminadas por estas enzimas. Por ello debe tenerse cuidado cuando se administre everolimus asociado con sustratos de CYP3A4 y CYP2D6 de estrecho índice terapéutico. Todos los estudios de interacciones *in vivo* se realizaron sin ciclosporina concurrente.

Novartis Argentina S.A.  
Farm. Elsa Orosa  
Cd. Director de Certican - M.N. 15.575  
Gte. de Asuntos Regulatorios  
Aprobada

**Ciclosporina** (inhibidor de CYP3A4/PgP): La biodisponibilidad de everolimus aumenta significativamente con la coadministración de ciclosporina. En un estudio con dosis única en individuos sanos, la administración de ciclosporina para microemulsión (Neoral®) produjo un aumento de 168% en el AUC de everolimus (rango, 46% a 365%) y de 82% en la  $C_{m\acute{a}x}$  (rango, 25% a 158%) en comparación con la administración de everolimus solo. Si se modifica la dosis de ciclosporina podría ser necesario el ajuste de la dosis de everolimus (ver *Posología / Dosificación - Modo de Administración*). Certican® tuvo sólo una influencia clínicamente menor sobre la farmacocinética de la ciclosporina en los pacientes con trasplante renal y cardíaco tratados con ciclosporina para microemulsión.

**Rifampicina** (inductor de CYP3A4): El tratamiento previo de individuos sanos con dosis múltiples de rifampicina seguido de una dosis única de Certican® aumenta casi 3 veces la depuración (clearance) de everolimus y disminuye 58% la  $C_{m\acute{a}x}$  y 63% el AUC. Se desaconseja el uso en combinación con rifampicina (ver *Advertencias y Precauciones*).

**Atorvastatina** (sustrato de CYP3A4) y **pravastatina** (sustrato de PgP): La administración de una dosis única de Certican® con atorvastatina o pravastatina a individuos sanos no alteró la farmacocinética de la atorvastatina, de la pravastatina ni del everolimus ni tampoco la biorreactividad plasmática total de la HMG-CoA reductasa en un grado clínicamente relevante. No obstante, estos resultados no pueden extrapolarse a otros inhibidores de la HMG-CoA reductasa.

Se debe controlar si los pacientes presentan manifestaciones de rabdomiolisis u otros eventos adversos descritos en el Prospecto de los inhibidores de la HMG-CoA reductasa.

**Otras interacciones posibles:** Los inhibidores moderados de CYP3A4 y PgP podrían aumentar las concentraciones de everolimus en sangre (por ejemplo, **agentes antimicóticos:** fluconazol, **antibióticos macrólidos,** como la eritromicina; **bloqueantes de los canales de calcio:** verapamilo, nicardipina, diltiazem; **inhibidores de proteasa:** nelfinavir, indinavir, aprenavir. Los inductores de CYP3A4 pueden aumentar el metabolismo de everolimus y disminuir las concentraciones de este fármaco en sangre (por ejemplo, hierba de San Juan (*Hypericum perforatum*), **anticonvulsivantes:** carbamazepina, fenobarbital, fenitoína; **drogas anti-VIH:** efavirenz, nevirapina).

El pomelo y el jugo de pomelo afectan la actividad del citocromo P450 y de la PgP y por eso deben evitarse.

#### Vacunación:

Los inmunosupresores pueden afectar la respuesta a las vacunas y por ello las vacunas pueden ser menos eficaces durante el tratamiento con Certican®. Se debe evitar el uso de vacunas elaboradas con microorganismos vivos (vacunas atenuadas).

#### Embarazo y lactancia

No existen datos adecuados sobre el uso de Certican® en mujeres embarazadas. Los estudios en animales han evidenciado efectos tóxicos sobre la reproducción, que incluyen embriotoxicidad y fetotoxicidad. Se desconoce el riesgo potencial en seres humanos. Se debe evitar la administración de Certican® a mujeres embarazadas, excepto cuando el beneficio potencial para la madre supere el riesgo eventual para el feto. Las mujeres en edad de poder concebir, deben utilizar un método de anticoncepción efectivo para prevenir un posible embarazo y continuar utilizándolo

por un período adicional de 8 semanas después de haber recibido la última dosis de Certican®.

Se desconoce si Certican® se excreta en la leche humana, pero en los estudios en animales, everolimus y/o sus metabolitos pasaban fácilmente a la leche de ratas en periodo de amamantamiento. Por consiguiente, las mujeres que reciben Certican® no deben amamantar.

#### Efecto sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar máquinas

No se han realizado estudios de los efectos de Certican® sobre la capacidad para conducir o utilizar maquinaria.

### Reacciones Adversas

La frecuencia de reacciones adversas listadas más abajo representan aquellas observadas en pacientes tratados con un regimen de Certican combinado con ciclosporina y corticoesteroides en estudios multicéntricos, aleatorizados y controlados. Estos incluyen 5 estudios en pacientes trasplantados de novo renales totalizando 2497 pacientes y dos estudios en trasplantados de novo cardíacos, totalizando 810 pacientes (ver "Acción Farmacológica").

La Tabla 10 contiene reacciones adversas posible o probablemente relacionadas con Certican® observadas en estudios clínicos de fase III (trasplante renal y cardíaco), comparando pacientes en regimenes de Certican® + ciclosporina con pacientes en regimenes no Certican® y basados en ciclosporina (ver "Acción Farmacológica"). Están agrupados de acuerdo a la MedDRA Standard organ classes:

*Las reacciones adversas se clasificaron en orden de frecuencia de la siguiente manera: muy frecuentes ( $\geq 1/10$ ); frecuentes ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ); infrecuentes ( $\geq 1/1000$ ,  $< 1/100$ ); raras ( $\geq 1/10.000$ ,  $< 1/1000$ ); muy raras ( $< 1/10.000$ ).*

Tabla 10 Reacciones adversas posible o probablemente relacionadas con Certican

|                                                                              |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Infecciones e infestaciones<br>Frecuentes                                    | Infecciones, virales, bacterianas y fúngicas, neumonía, sepsis, infecciones del tracto urinario                                                                |
| No frecuentes                                                                | Infección de heridas                                                                                                                                           |
| Desórdenes del sistema sanguíneo y linfático<br>Muy frecuentes<br>Frecuentes | Leucopenia <sup>1</sup><br>Trombocitopenia <sup>1</sup> , anemia <sup>1</sup> , coagulopatía, púrpura trombótica trombocitopénica, síndrome urémico hemolítico |
| No frecuentes                                                                | Hemólisis, pancitopenia <sup>6</sup>                                                                                                                           |
| Trastornos cardíacos:                                                        |                                                                                                                                                                |
| Muy frecuentes:                                                              | Derrame pericárdico <sup>2</sup>                                                                                                                               |
| Desórdenes endócrinos<br>No frecuentes                                       | Hipogonadismo masculino (reducción de testosterona, aumento de FSH y LH)                                                                                       |
| Desórdenes metabólicos<br>nutricionales                                      | y                                                                                                                                                              |

|                                                                                   |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muy frecuentes<br>Frecuentes                                                      | Hipercolesterolemia, hiperlipidemia<br>Hipertrigliceridemia, diabetes de reciente comienzo          |
| Desórdenes vasculares<br>Frecuentes                                               | Hipertensión, linfocel <sup>3</sup> ,<br>tromboembolismo venoso, trombosis del injerto <sup>3</sup> |
| Raros                                                                             | Vasculitis leucocitoclástica <sup>6</sup>                                                           |
| Desórdenes respiratorios, torácicos y del mediastino<br>Muy frecuente             | Derrame pleural <sup>2</sup><br>Enfermedad Pulmonar Intersticial<br>Proteinosis Alveolar Pulmonar   |
| No frecuentes<br>Rara                                                             |                                                                                                     |
| Desórdenes gastrointestinales<br>Frecuentes                                       | Dolor abdominal, diarrea, náusea, vómito, Pancreatitis, estomatitis, ulceraciones orales            |
| Desórdenes hepato biliares<br>No frecuentes                                       | Hepatitis, trastornos hepáticos, ictericia, test de la función hepática anormal <sup>4</sup>        |
| Desórdenes de la piel y tejido subcutáneo<br>Frecuente                            | Edema angioneurótico <sup>5</sup> , acné, complicación de heridas quirúrgicas<br>Rash               |
| No frecuentes                                                                     |                                                                                                     |
| Desórdenes del sistema musculoesquelético y del tejido conectivo<br>No frecuentes | Mialgia                                                                                             |
| Desórdenes renales y urinarios<br>Frecuentes                                      | Proteinuria <sup>3</sup><br>Necrosis renal tubular <sup>3</sup> , pielonefritis                     |
| No frecuentes                                                                     |                                                                                                     |
| Trastornos del sistema reproductivo y las mamas<br>Frecuente                      | Disfunción eréctil                                                                                  |
| Desórdenes generales y condiciones del sitio<br>Frecuente                         | Edema, dolor, trastornos de la cicatrización                                                        |

<sup>1</sup> Se estableció un efecto vinculado a la dosis o fue visto en forma significativa, en pacientes recibiendo 3 mg/día

<sup>2</sup> En trasplante cardíaco

<sup>3</sup> En trasplante renal

<sup>4</sup> y-GT, AST, ALT elevada

<sup>5</sup> Predominantemente en pacientes recibiendo en forma concomitante inhibidores ACE

<sup>6</sup> Hallazgo post-marketing

Novartis Argentina S.A.  
Farm. Elca Orosa  
Co-Directora Técnica - M.N. 15.575  
Gte. de Asuntos Regulatorios  
Apoderada

En estudios clínicos controlados en los que un total de 2335 pacientes recibieron Certican (1.5 mg o 3 mg/día) en combinación con otros inmunosupresores y fueron monitoreados al menos durante 1 año, se desarrollaron neoplasias en el 2,6% de los pacientes, con 1% de neoplasias de piel y 0,43% que desarrollaron linfoma o enfermedad linfoproliferativa.

La ocurrencia de las reacciones adversas puede depender del grado y de la duración del régimen inmunosupresor. En los estudios pivotaes, un aumento de creatinina sérica fue observado más frecuentemente en pacientes medicados con Certican® en combinación con dosis plena de ciclosporina para microemulsión que en pacientes de control. La incidencia total de reacciones adversas fue más baja con dosis reducidas de ciclosporina para microemulsión (ver "Acción Farmacológica" y "Ensayos Clínicos").

En los estudios que utilizaron una dosis menor de ciclosporina, el perfil de seguridad de Certican® fue similar al descrito en los 3 estudios fundamentales en los que se administró la dosis completa de ciclosporina, salvo que los aumentos de creatinina fueron menos frecuentes y las medias y medianas de la creatininemia fueron más bajas que en los otros estudios de fase III. Una tasa menor de enfermedades virales, primariamente debidas a los virus CMV y BK ha sido observada, con la dosis recomendada de Certican en el esquema inmunosupresor en los trasplantados renales (ver "Acción Farmacológica" y "Ensayos Clínicos"). Los casos de enfermedad pulmonar intersticial, que implican inflamación pulmonar intraparenquimatosa (neumonitis) y/o fibrosis de etiología no infecciosa, algunos fatales, han ocurrido en pacientes que recibían rapamicina y sus derivados, incluyendo Certican®. La condición se resuelve mayormente después de la discontinuación de la medicación y/o con la adición de glucocorticoides.

### Sobredosificación

En los estudios en animales, Certican® mostró bajo potencial de toxicidad aguda. No se observó letalidad ni toxicidad severa después de la administración de una dosis oral única de 2.000 mg/kg (ensayo límite) a ratones o a ratas.

Los antecedentes de sobredosis en seres humanos son muy escasos; existe un único caso de ingestión accidental de 1,5 mg de everolimus en un niño de 2 años de edad sin que se observaran eventos adversos. Se han administrado dosis únicas de hasta 25 mg a pacientes trasplantados con tolerabilidad aceptable.

En todos los casos de sobredosis se deben iniciar medidas de generales de apoyo.

*Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:*

*Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 / 2247.*

*Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777.*

### Instrucciones de uso:

Los comprimidos dispersables de Certican® se pueden tomar con o sin alimentos, pero de manera sistemática, es decir siempre deben tomarse con comida o siempre sin comida.

Los comprimidos dispersables de Certican® no deben ingerirse con pomelo ni con jugo de pomelo dado que esto puede interferir con ciertas enzimas del organismo que modifican los efectos de Certican®.

Novartis Argentina S.A.  
 Farm. Elsa Orosa  
 Co-Directora Técnica - M.N. 15.575  
 Gle. de Asuntos Regulatorios  
 Apoderada



**Incompatibilidades:** Cuando también se administre ciclosporina para microemulsión por sonda nasogástrica, se debe administrar antes que Certican®. No se deben mezclar ambos fármacos.

**Administración en jeringa oral de 10 ml:** Coloque los comprimidos dispersables de Certican® dentro de la jeringa. La cantidad máxima de Certican® que puede disgregarse en una jeringa de 10 ml es de 1,25 mg. Añada agua hasta la marca de 5 ml. Espere 90 segundos mientras agita con suavidad. Después de la disgregación, vierta el contenido directamente en la boca. Enjuague la jeringa con 5 ml de agua y vuelva a verter su contenido en la boca. Beba adicionalmente de 10 a 100 ml de agua (o de jarabe diluido).

**Administración con una taza de plástico:** Coloque los comprimidos dispersables de Certican® en aproximadamente 25 ml de agua dentro de una taza de plástico. La cantidad máxima de Certican® que puede disgregarse en 25 ml de agua es de 1,5 mg. Deje reposar la taza unos 2 minutos hasta que los comprimidos se disuelvan y luego agite suavemente antes de beber. Enjuague inmediatamente la taza con un volumen adicional de 25 ml de agua y bébalo.

**Administración por sonda nasogástrica:** Coloque los comprimidos dispersables de Certican® en un pequeño vaso de precipitación de plástico para medicamentos que contenga 10 ml de agua; espere unos 90 segundos mientras agita con suavidad. Trasvase la dispersión a una jeringa e inyecte lentamente (por espacio de 40 segundos) en la sonda nasogástrica. Enjuague el vaso (y la jeringa) tres veces con 5 ml de agua e inyecte en la sonda. Finalmente, enjuague la sonda nasogástrica con unos 10 ml de agua. La sonda nasogástrica debe pinzarse durante por lo menos 30 minutos después de la administración de Certican®.

### Presentaciones:

Envases conteniendo 20, 50, 60, 100, 120 y 250 comp.

### Conservación:

Certican® no debe utilizarse después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Debe ser conservado a temperatura no mayor a 30°C en el envase original al abrigo de la luz y la humedad.

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud - Certificado N° 51.576

Elaborado por: Novartis Pharma Stein AG, - Stein, Suiza.

Novartis Argentina S.A.  
Ramallo 1851 - CP C1429DUC Capital Federal  
Buenos Aires - Argentina  
Director Técnico: Dr. Lucio Jeronic - Químico, Farmacéutico  
CDS: 22/03/2010.

Novartis Argentina S.A.  
Farm. Elsa Orosa  
Co-Directora Técnica - M.N. 15.575  
Gte. de Asuntos Regulatorios  
Apoderada