

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



**UPTRAVI®  
SELEXIPAG**  
200 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg, 1000 mcg, 1200 mcg, 1400 mcg y 1600 mcg  
Comprimidos recubiertos

Industria alemana

Venta bajo receta archivada

**COMPOSICIÓN**

Cada comprimido recubierto de **UPTRAVI® 200 mcg** contiene: Selexipag 200 mcg.

Excipientes: Núcleo del comprimido: manitol; almidón de maíz; hidroxipropilcelulosa de baja sustitución; hidroxipropilcelulosa; estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido: hipromelosa; propilenglicol; dióxido de titanio; óxido de hierro amarillo; cera carnauba.

Cada comprimido recubierto de **UPTRAVI® 400 mcg** contiene: Selexipag 400 mcg.

Excipientes: Núcleo del comprimido: manitol; almidón de maíz; hidroxipropilcelulosa de baja sustitución; hidroxipropilcelulosa; estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido: hipromelosa; propilenglicol; dióxido de titanio; óxido de hierro rojo; cera carnauba.

Cada comprimido recubierto de **UPTRAVI® 600 mcg** contiene: Selexipag 600 mcg.

Excipientes: Núcleo del comprimido: manitol; almidón de maíz; hidroxipropilcelulosa de baja sustitución; hidroxipropilcelulosa; estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido: hipromelosa; propilenglicol; dióxido de titanio; óxido de hierro rojo; óxido de hierro negro; cera carnauba.

Cada comprimido recubierto de **UPTRAVI® 800 mcg** contiene: Selexipag 800 mcg.

Excipientes: Núcleo del comprimido: manitol; almidón de maíz; hidroxipropilcelulosa de baja sustitución; hidroxipropilcelulosa; estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido: hipromelosa; propilenglicol; dióxido de titanio; óxido de hierro negro; óxido de hierro amarillo; cera carnauba.

Cada comprimido recubierto de **UPTRAVI® 1000 mcg** contiene: Selexipag 1000 mcg.

Excipientes: Núcleo del comprimido: manitol; almidón de maíz; hidroxipropilcelulosa de baja sustitución; hidroxipropilcelulosa; estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido: hipromelosa; propilenglicol; dióxido de titanio; óxido de hierro rojo; óxido de hierro amarillo; cera carnauba.

Cada comprimido recubierto de **UPTRAVI® 1200 mcg** contiene: Selexipag 1200 mcg.

Excipientes: Núcleo del comprimido: manitol; almidón de maíz; hidroxipropilcelulosa de baja sustitución; hidroxipropilcelulosa; estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido: hipromelosa; propilenglicol; dióxido de titanio; óxido de hierro rojo; óxido de hierro negro; cera carnauba.

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0\_es

IF-2018-62771606-APN-DERM#ANMAT  
CLAUDIA BRUNO MAGNASSO  
Farmacéutica - C.R. 11261 M.P. 20286  
Página 25 de 25  
Técnica / Apoderada  
JANSSEN CILAG FARMACÉUTICA S.A.

IF-2019-10238978-APN-DERM#ANMAT  
Página 59 de 91

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



Cada comprimido recubierto de UPTRAVI® 1400 mcg contiene: Selexipag 1400 mcg.

**Excipientes:** Núcleo del comprimido: manitol; Almidón de maíz; hidroxipropilcelulosa de baja sustitución; hidroxipropilcelulosa; estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido: hipromelosa; propilenglicol; dióxido de titanio; óxido de hierro; cera carnauba.

Cada comprimido recubierto de UPTRAVI® 1600 mcg contiene: Selexipag 1600 mcg.

**Excipientes:** Núcleo del comprimido: manitol; almidón de maíz; hidroxipropilcelulosa de baja sustitución; hidroxipropilcelulosa; estearato de magnesio. Recubrimiento del comprimido: hipromelosa; propilenglicol; dióxido de titanio; óxido de hierro rojo; óxido de hierro negro; óxido de hierro amarillo; cera carnauba.

## ACCIÓN TERAPÉUTICA

Grupo farmacoterapéutico: Agentes antitrombóticos, inhibidores de la agregación plaquetaria excluyendo heparina, código ATC: B01AC27.

## INDICACIONES

### Hipertensión arterial pulmonar

UPTRAVI® está indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP, OMS Grupo 1), para demorar la progresión de la enfermedad y reducir el riesgo de hospitalización por HAP.

Se estableció la efectividad en un estudio a largo plazo conducido en pacientes con HAP con síntomas de la clase funcional II-III de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los pacientes tenían HAP idiopática y hereditaria, HAP asociada con enfermedades del tejido conectivo, HAP asociada con enfermedades cardíacas congénitas con derivaciones corregidas (ver "Estudios clínicos").

## PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

### Mecanismo de acción

Selexipag es un agonista oral del receptor de la prostaciclina (receptor IP) que es estructuralmente diferente de la prostaciclina. Selexipag es hidrolizado por la carboxilesterasa 1 para producir su metabolito activo, que es aproximadamente 37 veces más potente que selexipag. Selexipag y el metabolito activo son selectivos para el receptor IP frente a otros receptores prostanoideos (EP<sub>1-4</sub>, DP, FP y TP).

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0 es

CLAUDIA BRUNO MAGNASCO  
IF-2018-62771606-APN-DERM#ANMAT  
Página 2 de 26  
JANSSEN LAC FARMACÉUTICA S.A.

IF-2019-10238028-APN-DERM#ANMAT  
Página 50 de 911

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



## Farmacodinamia

### Electrofisiología cardiaca

Con la dosis máxima tolerada de 1600 mcg dos veces al día, selexipag no prolonga el intervalo QT en ningún grado clínicamente relevante.

### Agregación plaquetaria

Tanto selexipag como su metabolito activo causaron una inhibición de la agregación plaquetaria *in vitro* dependiente de la concentración con un IC<sub>50</sub> de 5,5 µM y 0,21 µM, respectivamente. Sin embargo, en concentraciones clínicamente relevantes, no hubo ningún efecto sobre los parámetros de la prueba de agregación plaquetaria como se observó tras la administración de dosis múltiples de selexipag en sujetos sanos con dosis de 400 mcg hasta 1800 mcg dos veces al día.

### Hemodinamia pulmonar

Un estudio clínico de fase 2 evaluó las variables hemodinámicas después de 17 semanas de tratamiento en pacientes con HAP con clase funcional OMS II-III que recibían concomitantemente antagonistas de los receptores de la endotelina (AREs) y/o inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (IPDE-5). Los pacientes titulando selexipag hasta una dosis tolerada en forma individual (incrementos de 200 mcg dos veces al día hasta alcanzar los 800 mcg dos veces al día) (N = 33) lograron una media en la reducción estadísticamente significativa de la resistencia vascular pulmonar de 30,3% (intervalo de confianza del 95% [IC] -44,7%, -12,2%) y un aumento en el índice cardiaco (mediana del efecto del tratamiento) de 0,41 L/min/m<sup>2</sup> (IC del 95%: 0,10; 0,71) en comparación con el placebo (N=10).

### Interacciones medicamentosas

En un estudio realizado en sujetos sanos, selexipag (400 mcg dos veces al día) no influyó en el efecto farmacodinámico de la warfarina en la razón internacional normalizada.

## Farmacocinética

Se estudió la farmacocinética de selexipag y de su metabolito activo principalmente en sujetos sanos. La farmacocinética de selexipag y del metabolito activo, después de la administración tanto de dosis únicas como de dosis múltiples, fue proporcional a la dosis hasta una dosis única de 800 mcg y dosis múltiples de hasta 1800 mcg dos veces al día.

En sujetos sanos, la variabilidad intersujeto en la exposición (área bajo la curva a lo largo de un intervalo de dosificación, AUC) en estado estacionario fue de 43% y 39% para selexipag y el metabolito activo, respectivamente. La variabilidad intrasujeto en la exposición fue de 24% y 19% para selexipag y el metabolito activo, respectivamente.

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0\_es

CLAUDIA BRUNO MAGNASCO  
IF-2018-62771606-APN-DEMA#ANMAT  
Coordinadora Técnica / Apoderada  
Página 3 de 26  
Cilag Farmacéutica S.A.

IF-2019-10238028-APN-DERM#ANMAT  
Página 57 de 911

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



Las exposiciones a selexipag y al metabolito activo en estado estacionario en pacientes con HAP y sujetos sanos fueron similares. La farmacocinética de selexipag y del metabolito activo en pacientes con HAP no fueron influenciados por la severidad de la enfermedad y no cambiaron con el transcurso del tiempo.

Tanto en sujetos sanos como en pacientes con HAP, después de la administración oral, la exposición en estado estacionario al metabolito activo es de aproximadamente 3 a 4 veces la de selexipag. La exposición al metabolito activo es aproximadamente 30% mayor después de la administración oral en comparación con la misma dosis intravenosa en sujetos sanos.

#### Absorción

La biodisponibilidad absoluta de selexipag es de aproximadamente el 49%. Tras la administración oral, las concentraciones plasmáticas máximas observadas de selexipag y de su metabolito activo se alcanzan en aproximadamente 1 a 3 horas y en 3-4 horas, respectivamente.

En presencia de alimentos, la absorción de selexipag fue prolongada, lo cual resulta en un retraso del tiempo hasta alcanzar la concentración máxima ( $T_{max}$ ) y una menor concentración plasmática máxima ( $C_{max}$ ) de aproximadamente ~30%. La exposición a selexipag y al metabolito activo (AUC) no cambió significativamente en presencia de alimentos.

#### Distribución

El volumen de distribución de selexipag en estado estacionario es 11,7 L.

Selexipag y su metabolito activo se unen mayoritariamente a las proteínas plasmáticas (aproximadamente un 99% en total y en la misma medida a la albúmina y a la alfa1-glicoproteína ácida).

#### Metabolismo

Selexipag es hidrolizado por carboxilesterasas para producir su metabolito activo, (ácido carboxílico libre) en el hígado y en el intestino. El metabolismo oxidativo, catalizado principalmente por CYP2C8 y en menor medida por CYP3A4, conduce a la formación de derivados hidroxilados y desalquilados. Las enzimas UGT1A3 y UGT2B7 están involucradas en la glucuronidación del metabolito activo. Excepto para el metabolito activo, ninguno de los metabolitos circulantes en el plasma humano superó el 3% del total de materiales relacionados con el medicamento.

#### Eliminación

La eliminación de selexipag se realiza predominantemente a través del metabolismo, con una vida media terminal promedio de 0,8-2,5 horas. La vida media terminal de eliminación del metabolito activo es 6,2-13,5 horas. Existe una mínima acumulación del metabolito activo tras la administración repetida dos veces al día, lo que sugiere que la vida media efectiva se encuentra en el rango de las 3-4 horas. El aclaramiento corporal total de selexipag es de 17,9 L/hora.

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V1.0\_es

CLAUDIA BRUNO MAGNASCO  
APN-DERM#ANMAT  
Página 4 de 26  
Cilag Farmacéutica S.A.

IF-2019-10238078-APN-DERM#ANMAT  
Página 58 de 911

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



### Excreción

En un estudio realizado en sujetos sanos con selexipag radiomarcado, aproximadamente el 93% del material del medicamento radiactivo fue eliminado en las heces y sólo un 12% en la orina. Ni selexipag ni su metabolito activo se encontraron en la orina.

### Poblaciones específicas

No se observaron efectos clínicamente relevantes del sexo, raza, edad o peso corporal sobre la farmacocinética de selexipag ni de su metabolito activo en sujetos sanos ni en pacientes con HAP.

#### *Edad*

Las variables farmacocinéticas ( $C_{max}$  y AUC) fueron similares en los sujetos adultos y de edad avanzada de hasta 75 años. No hubo ningún efecto de la edad sobre la farmacocinética de selexipag ni del metabolito activo en pacientes con HAP.

#### *Insuficiencia hepática*

En sujetos con insuficiencia hepática leve (clase A de Child-Pugh) o moderada (clase B de Child-Pugh), la exposición a selexipag fue de 2 y 4 veces la observada en los sujetos sanos. La exposición al metabolito activo de selexipag permaneció prácticamente invariable en los sujetos con insuficiencia hepática leve y se duplicó en los sujetos con insuficiencia hepática moderada (ver "Advertencias y precauciones especiales de empleo – Insuficiencia hepática").

Sobre la base de un modelo farmacocinético de datos procedentes de un estudio realizado en sujetos con insuficiencia hepática, se espera que la exposición al metabolito activo en estado estacionario en sujetos con insuficiencia hepática moderada (clase B de Child-Pugh) después de la administración de un régimen de dosificación de una vez al día sea similar a la observada en sujetos sanos que recibieron un régimen de dosificación de dos veces al día. Se prevé que la exposición a selexipag en estado estacionario en estos pacientes durante un régimen de dosificación de una vez al día sea de aproximadamente 2 veces más que la observada en sujetos sanos que recibieron un régimen de dosificación de dos veces al día.

#### *Insuficiencia renal*

Se observó un incremento del 40-70% en la exposición (concentración plasmática máxima y área bajo la curva de concentración plasmática-tiempo) a selexipag y su metabolito activo en sujetos con insuficiencia renal grave (tasa de filtrado glomerular estimada  $\geq 15$  ml/min/1,73 m<sup>2</sup> y  $< 30$  ml/min/1,73 m<sup>2</sup>) (ver "Advertencias y precauciones especiales de empleo – Insuficiencia renal").

### Estudios de interacción medicamentosa

#### *Estudios in vitro*

Selexipag es hidrolizado por carboxilesterasas para producir su metabolito activo. Tanto selexipag como su metabolito activo sufren un metabolismo oxidativo mediado principalmente por CYP2C8 y, en menor medida, por CYP3A4. Las enzimas UGT1A3 y UGT2B7 catalizan la glucuronidación del

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0\_es

IF-2018-62771606-CLAUDIA BRUNO MAGNASCO  
Página 5 de 26  
JANSSEN-CILAC FARMACÉUTICA S.A.

IF-2019-10238028-APN-DERM#ANMAT  
Página 5 de 911

Producto: UPTRAVI®  
 Nro de registro: 58.818




metabolito activo. Selexipag y su metabolito activo son sustratos de los transportadores OATP1B1 y OATP1B3. Selexipag es un sustrato de la glucoproteína P (P-gp) y el metabolito activo es un sustrato del transportador de la proteína de resistencia del cáncer de mama (BCRP, por sus siglas en inglés).

Selexipag y su metabolito activo no inhiben ni inducen las enzimas del citocromo P450 ni las proteínas transportadoras, en concentraciones clínicamente relevantes.

No se ha estudiado el efecto de los inhibidores moderados de CYP2C8 sobre la exposición a selexipag o a su metabolito activo. La administración concomitante con inhibidores moderados del CYP2C8 puede resultar en un incremento significativo de la exposición a selexipag y a su metabolito activo (ver "Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción").

Los resultados de estudios de interacciones *in vivo* se presentan en las Figuras 1 y 2.

**Figura 1: Efecto de otros medicamentos sobre UPTRAVI® y su metabolito activo**



\*Datos de ARE e inhibidor PDE-5 del estudio GRIPHON.

Specialist: SF

HA approval date:

MAF revision: LA

QC: BDM

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17

V2.0 de CLAUDIA BRUNO MAGNASCO  
 IF-2018-62771606-APN-DERMA#ANMAT  
 Farmacología, CXN, 11/26/18, P. 24/286  
 60 Blvd. Río Piedras y Apoderada  
 FARMACÉUTICA FARMACÉUTICA S.A.


Página 6 de 26

IF-2019-10238028-APN-DERM#ANMAT

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



Figura 2: Efecto de UPTRAVI® sobre otros medicamentos



### POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

El tratamiento debe ser iniciado y supervisado únicamente por un médico con experiencia en el tratamiento de la HAP.

#### Posología

##### Ajuste individualizado de la dosis

Se debe ajustar la dosis de cada paciente hasta alcanzar la dosis más alta tolerada de forma individual, que puede oscilar entre 200 microgramos administrados dos veces al día y 1600 microgramos administrados dos veces al día (dosis de mantenimiento individualizada).

La dosis inicial recomendada es de 200 microgramos administrados dos veces al día, con un intervalo entre tomas de aproximadamente 12 horas. La dosis se aumenta en incrementos de 200 microgramos administrados dos veces al día, generalmente con intervalos de una semana. Al inicio del tratamiento y en cada fase de aumento progresivo de la dosis, se recomienda la administración de la primera dosis por la noche. Durante el ajuste de la dosis pueden presentarse reacciones adversas que reflejan el mecanismo de acción de UPTRAVI® (como cefalea, diarrea, náuseas y vómitos, dolor mandibular, mialgia, dolor en las extremidades, artralgia y rubefacción). Estas suelen ser transitorias o controlables con un tratamiento sintomático (ver "Reacciones adversas"). Sin embargo, si un paciente alcanza una dosis que no puede tolerar, esta debe reducirse al nivel de dosis previo.

En los pacientes en que el aumento progresivo de la dosis se vea limitado por razones ajenas a las reacciones adversas que reflejan el mecanismo de acción de UPTRAVI®, se puede considerar un

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0\_es

IF-2018-62771606-APN-DG-ANMAT

Página 7 de 26

IF-2019-10238028-APN-DERM#ANMAT

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



segundo intento para continuar con el aumento progresivo de la dosis hasta la dosis más alta tolerada de forma individual hasta una dosis máxima de 1600 microgramos administrados dos veces al día.

*El kit o empaque para titulación de la dosis (UPTRAVI® 200 mcg envase con 140 comprimidos recubiertos) contiene una guía de titulación que proporciona información sobre el proceso de titulación o incremento progresivo de la dosis permitiendo registrar el número de tabletas que el paciente ingiere cada día.*

#### Dosis de mantenimiento individualizada

Se debe mantener la dosis más alta tolerada alcanzada durante el ajuste de la dosis. Si con el tiempo el tratamiento se tolera peor a una dosis determinada, se debe considerar el tratamiento sintomático y/o la reducción de la dosis hasta el nivel inmediatamente inferior.

#### Interrupciones y suspensiones

En caso de olvidar tomar una dosis, esta se debe tomar lo antes posible. La dosis olvidada no se debe tomar en caso de que la siguiente dosis programada deba tomarse en las siguientes 6 horas aproximadamente.

En caso de interrumpir el tratamiento durante 3 o más días, se debe volver a tomar UPTRAVI® a una dosis inferior y a continuación ajustar la dosis.

Se dispone de escasa experiencia sobre la suspensión brusca del tratamiento con UPTRAVI® en pacientes con HAP. No se han observado casos de rebote agudo.

Sin embargo, si se toma la decisión de retirar el tratamiento con UPTRAVI®, se debe hacer de forma gradual a la vez que se introduce un tratamiento alternativo.

#### Pacientes de edad avanzada (mayor o igual a 65 años)

No se requieren ajustes de la dosis en pacientes de edad avanzada (ver "Propiedades farmacológicas - Farmacocinética"). Existe una experiencia clínica limitada en pacientes mayores de 75 años; por lo tanto, UPTRAVI® se debe utilizar con precaución en esta población (ver "Advertencias y precauciones especiales de empleo").

#### Insuficiencia hepática

No se debe administrar UPTRAVI® en pacientes con insuficiencia hepática grave (clase C de Child-Pugh, ver "Advertencias y precauciones especiales de empleo"). En pacientes con insuficiencia hepática moderada (clase B de Child-Pugh), la dosis inicial de UPTRAVI® debe ser de 200 microgramos administrados una vez al día, y se debe aumentar con intervalos semanales mediante incrementos de 200 microgramos administrados una vez al día hasta que se experimenten reacciones adversas que reflejen el mecanismo de acción de selexipag que no sean tolerables o no se puedan

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0\_es

CLAUDIA BRUNO MAGNASCIO  
IF-2018-62771606-APN-DEGA#ANMAT  
Co-Directora Técnica / Apoderada  
JANSSEN-CILIAK FARMACÉUTICA S.A.

Página 8 de 26

IF-2019-10238078-APN-DERM#ANMAT



Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



tratar médicamente. No se requiere un ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve (clase A de Child-Pugh).

#### Insuficiencia renal

No se requiere un ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. No se requiere modificar la dosis inicial en pacientes con insuficiencia renal grave (tasa de filtración glomerular estimada [TFGe] < 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>); el ajuste de la dosis debe realizarse con precaución en estos pacientes (ver "Advertencias y precauciones especiales de empleo").

#### Población pediátrica (< 18 años)

No se ha establecido todavía la seguridad y la eficacia de UPTRAVI® en niños entre 0 y 18 años. No se dispone de datos. No se recomienda la administración de selexipag en la población pediátrica. Los estudios realizados en animales mostraron un mayor riesgo de intususcepción, aunque se desconoce la relevancia clínica de estos hallazgos (ver "Datos preclínicos sobre seguridad").

#### **Modo de administración**

Vía oral.

Los comprimidos recubiertos se deben administrar por vía oral por la mañana y por la noche. Para mejorar la tolerabilidad se recomienda tomar UPTRAVI® junto con las comidas y, al inicio de cada fase de aumento progresivo de la dosis, tomar la primera dosis aumentada por la noche.

No se deben partir, triturar ni masticar los comprimidos; estos se deben ingerir con agua.

Se indicará a los pacientes con mala visión o no videntes que soliciten ayuda de otra persona para tomar UPTRAVI® durante el periodo de ajuste de la dosis.

#### **CONTRAINDICACIONES**

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección "Composición".
- Cardiopatía isquémica grave o angina inestable.
- Infarto de miocardio en los 6 últimos meses.
- Insuficiencia cardíaca descompensada sin estricta supervisión médica.
- Arritmias graves.
- Acontecimientos cerebrovasculares (p. ej., accidente isquémico transitorio o accidente cerebrovascular) en los 3 últimos meses.
- Defecto valvular congénito o adquirido, con alteraciones clínicamente relevantes en la función miocárdica no relacionadas con la hipertensión pulmonar.
- Uso concomitante con inhibidores potentes de CYP2C8 (p.ej., gemfibrozilo; ver "Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción").

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0\_61 AUDIA BRUNO MAGNASCO

IF-2018-62771600-APN-DCA#ANMAT  
Página 9 de 26

IF-2019-10238078-APN-DERM#ANMAT  
Página 42 de 94

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO

### Hipotensión

UPTRAVI® presenta propiedades vasodilatadoras que pueden provocar una disminución de la presión arterial. Antes de prescribir UPTRAVI®, el médico debe considerar con detenimiento la posibilidad de que los pacientes con determinadas enfermedades subyacentes pudieran verse afectados negativamente por los efectos vasodilatadores (p. ej., los pacientes en tratamiento con antihipertensivos o con hipotensión en reposo, hipovolemia, obstrucción grave del flujo de salida del ventrículo izquierdo o disfunción autonómica).

### Hipertiroidismo

Se han observado casos de hipertiroidismo durante el tratamiento con UPTRAVI®. Se recomienda la realización de pruebas de la función tiroidea en presencia de síntomas o signos de hipertiroidismo.

### Enfermedad pulmonar venooclusiva

Se han notificado casos de edema pulmonar asociado al tratamiento con vasodilatadores (principalmente con las prostaciclina) en pacientes con enfermedad pulmonar venooclusiva. Por consiguiente, si se presentan signos de edema pulmonar cuando se administra UPTRAVI® a pacientes con HAP, debe valorarse una posible enfermedad pulmonar venooclusiva. En caso de que se confirme, debe discontinuarse el tratamiento con UPTRAVI®.

### Inhibidores moderados de CYP2C8

La administración concomitante de selexipag con inhibidores moderados de CYP2C8 (p.ej., clopidogrel, deferasirox, teriflunomida) puede aumentar la exposición a selexipag y a su metabolito activo principal. Se debe considerar un ajuste de la dosis de selexipag cuando se administra junto con un inhibidor moderado de CYP2C8 o se interrumpe.

### Edad avanzada (≥ 65 años)

Se dispone de escasa experiencia clínica sobre el tratamiento con selexipag en pacientes mayores de 75 años; por lo tanto, UPTRAVI® debe administrarse con precaución en esta población de pacientes (ver "Posología y modo de administración").

### Insuficiencia hepática

No se dispone de experiencia clínica en relación al tratamiento con selexipag en pacientes con insuficiencia hepática grave (clase C de Child-Pugh); por tanto, no debe administrarse UPTRAVI® en estos pacientes. La exposición a selexipag y su metabolito activo resulta aumentada en los pacientes con insuficiencia hepática moderada (clase B de Child-Pugh; ver "Propiedades farmacológicas – Farmacocinética"). En los pacientes con insuficiencia hepática moderada, se debe administrar UPTRAVI® una vez al día (ver "Posología y modo de administración").

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0\_es

IF-2018-62771606-APN-DERM#ANMAT

Página 10 de 26

IF-2019-10238078-APN-DERM#ANMAT

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



### Insuficiencia renal

En pacientes con insuficiencia renal grave (TFGe < 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup>), se debe prestar especial atención durante la fase de ajuste de la dosis. No se dispone de experiencia en relación al tratamiento con UPTRAVI® en pacientes sometidos a diálisis (ver "Propiedades farmacológicas – Farmacocinética"), por lo que no se debe administrar UPTRAVI® a estos pacientes.

### Mujeres en edad fértil

Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con selexipag.

## INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN

### Efecto de otros medicamentos sobre selexipag

Selexipag se hidroliza para dar lugar a su metabolito activo mediante carboxilesterasas (ver "Propiedades farmacológicas – Farmacocinética"). Tanto selexipag como su metabolito activo están sujetos al metabolismo oxidativo llevado a cabo principalmente por CYP2C8 y en menor medida por CYP3A4. La glucuronidación del metabolito activo es catalizada por UGT1A3 y UGT2B7. Selexipag y su metabolito activo son sustratos de OATP1B1 y OATP1B3. Selexipag es un sustrato débil de la bomba de extrusión P-gp. El metabolito activo es un sustrato débil de la proteína de resistencia del cáncer de mama (BCRP).

La farmacocinética de selexipag y su metabolito activo no se ve afectada por la warfarina.

### *Inhibidores de CYP2C8*

En presencia de gemfibrozilo 600 mg, un inhibidor potente de CYP2C8, administrado dos veces al día, la exposición a selexipag aumentó 2 veces de forma aproximada, mientras que la exposición al metabolito activo, el mayor contribuyente a la eficacia aumentó 11 veces de forma aproximada. La administración concomitante de UPTRAVI® con inhibidores potentes de CYP2C8 (por ejemplo, gemfibrozilo) está contraindicada (ver "Contraindicaciones").

No se ha estudiado el efecto de los inhibidores moderados de CYP2C8 (p. ej., clopidogrel, deferasirox, teriflunomida) sobre la exposición a selexipag y su metabolito activo. Se debe considerar un ajuste de la dosis de UPTRAVI cuando se administra junto con un inhibidor moderado de CYP2C8 o se interrumpe. No se puede excluir una posible interacción farmacocinética con inhibidores moderados de CYP2C8 (ver "Advertencias y precauciones especiales de empleo").

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0\_es  
CLAUDIA BRUNO MAGNASCO  
IF-2018-62771606-APN-~~DERM#ANMAT~~ 10286  
Co-Directora Técnica / Apoderada  
Página 11 de 26  
CILAG FARMACEUTICA S.A.

IF-2019-10238928-APN-DERM#ANMAT  
Página 11 de 26

No se ha estudiado el efecto de los inhibidores potentes de UGT1A3 y UGT2B7 (ácido valproico, probenecid y fluconazol) sobre la exposición a selexipag y su metabolito activo. Se requiere precaución al administrar estos medicamentos de forma concomitante con UPTRAVI®. No se puede excluir una posible interacción farmacocinética con inhibidores potentes de UGT1A3 y UGT2B7.

#### *Inhibidores e inductores de CYP3A4*

En presencia de lopinavir/ritonavir 400/100 mg (un inhibidor potente de CYP3A4) administrado dos veces al día, la exposición a selexipag aumentó hasta aproximadamente doblarse, mientras que la exposición al metabolito activo de selexipag no se modificó. Teniendo en cuenta la potencia 37 veces mayor del metabolito activo, este efecto no resulta clínicamente relevante. No se prevé un efecto de los inductores de CYP3A4 sobre la farmacocinética del metabolito activo, ya que un inhibidor potente de CYP3A4 no afecta a su farmacocinética, lo que indica que la vía de CYP3A4 no resulta importante en la eliminación del metabolito activo.

#### *Tratamientos específicos de la HAP*

En el ensayo de fase III controlado con placebo realizado en pacientes con HAP, el tratamiento con selexipag en combinación con un ARE y un inhibidor de la PDE-5 dio lugar a una disminución del 30 % en la exposición al metabolito activo.

#### *Inhibidores del transportador (lopinavir/ritonavir)*

En presencia de lopinavir/ritonavir 400/100 mg, administrado dos veces al día, un inhibidor potente de OATP (OATP1B1 y OATP1B3) y de P-gp, la exposición a selexipag aumentó hasta aproximadamente doblarse, mientras que la exposición al metabolito activo de selexipag no se modificó. Teniendo en cuenta que la mayor parte del efecto farmacológico se debe al metabolito activo, este efecto no resulta clínicamente relevante.

#### Efecto de selexipag sobre otros medicamentos

Selexipag y su metabolito activo no inhiben ni inducen las enzimas del citocromo P450 y las proteínas transportadoras a concentraciones clínicamente relevantes.

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0\_es

IF-2018-62771606-APN-DG#ANMAT

Página 12 de 26

IF-2019-10238928-APN-DERM#ANMAT

Página 16 de 37

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



*Inductores de CYP2C8*

En presencia de rifampicina 600 mg, un inductor de CYP2C8 (y enzimas UGT), administrado una vez al día, la exposición a selexipag no se modificó, mientras que la exposición al metabolito activo se redujo a la mitad. Se debe considerar un ajuste de la dosis de selexipag cuando se administra con inductores de CYP2C8 (p.ej., rifampicina, carbamazepina, fenitoína).

TABLETAS 100mg, 150mg, 200mg

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



#### *Inductores de CYP2C8*

En presencia de rifampicina 600 mg, un inductor de CYP2C8 (y enzimas UGT), administrado una vez al día, la exposición a selexipag no se modificó, mientras que la exposición al metabolito activo se redujo a la mitad. Se debe considerar un ajuste de la dosis de selexipag cuando se administra con inductores de CYP2C8 (p.ej., rifampicina, carbamazepina, fenitoína).

#### *Inhibidores de UGT1A3 y UGT2B7*

No se ha estudiado el efecto de los inhibidores potentes de UGT1A3 y UGT2B7 (ácido valproico, probenecid y fluconazol) sobre la exposición a selexipag y su metabolito activo. Se requiere precaución al administrar estos medicamentos de forma concomitante con UPTRAVI®. No se puede excluir una posible interacción farmacocinética con inhibidores potentes de UGT1A3 y UGT2B7.

#### *Inhibidores e inductores de CYP3A4*

En presencia de lopinavir/ritonavir 400/100 mg (un inhibidor potente de CYP3A4) administrado dos veces al día, la exposición a selexipag aumentó hasta aproximadamente doblarse, mientras que la exposición al metabolito activo de selexipag no se modificó. Teniendo en cuenta la potencia 37 veces mayor del metabolito activo, este efecto no resulta clínicamente relevante. No se prevé un efecto de los inductores de CYP3A4 sobre la farmacocinética del metabolito activo, ya que un inhibidor potente de CYP3A4 no afecta a su farmacocinética, lo que indica que la vía de CYP3A4 no resulta importante en la eliminación del metabolito activo.

#### *Tratamientos específicos de la HAP*

En el ensayo de fase III controlado con placebo realizado en pacientes con HAP, el tratamiento con selexipag en combinación con un ARE y un inhibidor de la PDE-5 dio lugar a una disminución del 30 % en la exposición al metabolito activo.

#### *Inhibidores del transportador (lopinavir/ritonavir)*

En presencia de lopinavir/ritonavir 400/100 mg, administrado dos veces al día, un inhibidor potente de OATP (OATP1B1 y OATP1B3) y de P-gp, la exposición a selexipag aumentó hasta aproximadamente doblarse, mientras que la exposición al metabolito activo de selexipag no se modificó. Teniendo en cuenta que la mayor parte del efecto farmacológico se debe al metabolito activo, este efecto no resulta clínicamente relevante.

#### Efecto de selexipag sobre otros medicamentos

Selexipag y su metabolito activo no inhiben ni inducen las enzimas del citocromo P450 y las proteínas transportadoras a concentraciones clínicamente relevantes.

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0\_es

IF-2018-62771606-APN-DG-ANMAT  
Página 12 de 26

IF-2019-10238928-APN-DERM#ANMAT  
Página 10 de 97

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



### *Anticoagulantes o inhibidores de la agregación plaquetaria*

Selexipag es un inhibidor de la agregación plaquetaria *in vitro*. En el estudio de fase III controlado con placebo realizado en pacientes con HAP, no se detectó un aumento del riesgo de hemorragia con selexipag en comparación con el placebo, incluyendo los casos en que selexipag se administró junto con anticoagulantes (como la heparina o anticoagulantes de tipo cumarina) o inhibidores de la agregación plaquetaria. En un estudio realizado en sujetos sanos, selexipag (400 microgramos dos veces al día) no alteró la exposición a S-warfarina (sustrato de CYP2C9) o R-warfarina (sustrato de CYP3A4) tras la administración de una única dosis de 20 mg de warfarina. Selexipag no alteró el efecto farmacodinámico de la warfarina sobre la razón internacional normalizada (RIN).

### *Midazolam*

En el estado estacionario tras alcanzar la dosis máxima de 1600 µg de selexipag dos veces al día, no se observaron cambios clínicamente relevantes sobre la exposición a midazolam, sustrato sensible de CYP3A4 en el intestino y el hígado, o a su metabolito, 1 hidroximidazolam. La administración concomitante de selexipag con sustratos del CYP3A4 no requiere ajuste de dosis.

### *Anticonceptivos hormonales*

No se han realizado estudios específicos de interacción con los anticonceptivos hormonales. Teniendo en cuenta que selexipag no afecta a la exposición a los sustratos del CYP3A4, midazolam y R-warfarina, o al sustrato de CYP2C9, S-warfarina, no se prevé una disminución de la eficacia de los anticonceptivos hormonales.

## **FERTILIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA**

### **Mujeres en edad fértil**

Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con selexipag.

### **Embarazo**

No se dispone de datos sobre el tratamiento con selexipag en mujeres embarazadas. Los estudios llevados a cabo en animales no indican ningún efecto perjudicial directo o indirecto en relación a la toxicidad para la reproducción. Selexipag y su metabolito principal presentaron una potencia *in vitro* del receptor de prostaciclina (IP) entre 20 y 80 veces inferior en especies animales en un modelo de toxicidad para la reproducción comparada con humanos. Por tanto, los márgenes de seguridad para los posibles efectos asociados al receptor IP sobre la reproducción son menores a los efectos no asociados al IP (ver sección "Datos preclínicos sobre seguridad").

No se recomienda el uso de UPTRAVI® durante el embarazo y en mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticonceptivos.

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0\_06

IF-2018-62771606-APN-DERM#ANMAT  
Co-Directora Técnica / Apoderada  
Página 13 de 26

IF-2019-10238078-APN-DERM#ANMAT  
Página 17 de 97

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



### Lactancia

Se desconoce si selexipag o sus metabolitos se excretan en la leche materna. En ratas, selexipag o sus metabolitos, se excretan en la leche (ver sección "Datos preclínicos sobre seguridad"). No puede excluirse un riesgo para el lactante. UPTRAVI® no debe utilizarse durante la lactancia.

### Fertilidad

No se dispone de datos clínicos. En estudios realizados en ratas, selexipag a altas dosis provocó alteraciones transitorias en los ciclos estrales que no afectaron a la fertilidad (ver sección "Datos preclínicos sobre seguridad"). Se desconoce la relevancia en humanos.

### EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS

La influencia de UPTRAVI® sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña. Se debe tener en cuenta el estado clínico del paciente y el perfil de reacciones adversas de selexipag (como cefalea, hipotensión) a la hora de considerar la capacidad del paciente para conducir y utilizar máquinas.

### DATOS PRECLÍNICOS SOBRE SEGURIDAD

En estudios sobre toxicidad inducida por la administración de dosis repetidas realizados en roedores, la importante disminución de la tensión arterial como resultado de una farmacología exagerada provocó signos clínicos transitorios, una disminución en la ingesta alimentaria y una ganancia de peso. En perros adultos y jóvenes, se identificaron los intestinos y huesos / médula ósea como los principales órganos diana tras el tratamiento con selexipag. Se observó un retraso en el cierre de la placa de crecimiento epifisaria femoral o tibial en perros jóvenes. No se ha establecido un nivel en el que no se observen efectos secundarios. En perros jóvenes, se observó esporádicamente una intususcepción debida a efectos asociados a la prostaciclina en la motilidad intestinal. Los márgenes de seguridad adaptados a la potencia del receptor IP para el metabolito activo fueron el doble (basándose en la exposición total) respecto a la exposición terapéutica en humanos. Este hallazgo no se produjo en los estudios de toxicidad realizados en ratones o ratas. Debido a la tendencia específica de especie de los perros a desarrollar una intususcepción, este hallazgo no se considera relevante para los humanos adultos.

El aumento en la osificación del hueso y los cambios asociados en la médula ósea observados en los estudios realizados en perros se consideran debidos a la activación de los receptores EP<sub>4</sub> en perros. Dado que los receptores EP<sub>4</sub> humanos no son activados por selexipag o su metabolito activo, este efecto es específico de especie y, por tanto, no resulta relevante en humanos.

Selexipag y su metabolito activo no son genotóxicos considerando la totalidad de los datos obtenidos en los estudios sobre genotoxicidad realizados.

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.00

CEA BRUNO MAGGIORO  
Farmaceutica S.p.A. - Via S. Maria 110 - 00187 Roma  
06-47821111 - 06-47821112  
06-47821113 - 06-47821114  
Página 14 de 26

IF-2018-62771606-APN-DER#ANMAT  
Página 14 de 26

IF-2019-10238028-APN-DERM#ANMAT  
Página 48 de 94



Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



En estudios sobre carcinogenicidad de 2 años de duración, selexipag provocó un aumento en la incidencia de adenomas tiroideos en ratones y de adenomas de células de Leydig en ratas. Los mecanismos son específicos de los roedores. Se observó tortuosidad en las arteriolas retinianas tras 2 años de tratamiento, únicamente en ratas. A nivel de mecanismo, el efecto se considera inducido por una vasodilatación crónica y los posteriores cambios en la hemodinámica ocular. Únicamente se observaron otras alteraciones histopatológicas de selexipag con exposiciones consideradas superiores a la máxima humana, lo que indica poca relevancia para su uso en humanos.

En un estudio sobre fertilidad realizado en ratas, se observó una prolongación de los ciclos estrales que dio lugar a un aumento en los días transcurridos hasta la cópula con exposiciones de 173 veces superiores a las terapéuticas (basándose en las exposiciones totales), mientras que el nivel en que no se observaron efectos fue 30 veces superior a las exposiciones terapéuticas. Por otro lado, los parámetros de fertilidad no se vieron afectados.

Selexipag no resultó teratogénico en ratas y conejos (márgenes de exposición por encima de la exposición terapéutica 13 veces superior para selexipag y 43 veces para el metabolito activo, basándose en la exposición total). Los márgenes de seguridad para los efectos potenciales sobre la reproducción relacionados con el receptor IP fueron de 20 para la fertilidad y 5 y 1 (en base a la exposición) para el desarrollo embrio-fetal en ratas y conejos cuando se adaptaron las diferencias en la potencia del receptor. En el estudio sobre desarrollo pre y posnatal realizado en ratas, selexipag no provocó ningún efecto sobre la función reproductiva materna y fetal.

## REACCIONES ADVERSAS

### Resumen del perfil de seguridad

Las reacciones adversas que se observan con mayor frecuencia son cefalea, diarrea, náuseas y vómitos, dolor mandibular, mialgia, dolor en las extremidades, artralgia y rubefacción. Estas reacciones son más frecuentes durante la fase de aumento de la dosis. La mayor parte de estas reacciones son de intensidad leve o moderada.

### Tabla de reacciones adversas

La seguridad de selexipag se ha evaluado en un ensayo de fase III controlado con placebo a largo plazo en 1156 pacientes con HAP sintomática. La duración media del tratamiento fue de 76,4 semanas (mediana 70,7 semanas) en los pacientes en tratamiento con selexipag frente a 71,2 semanas (mediana 63,7 semanas) en los pacientes con placebo. La exposición a selexipag fue de hasta 4,2 años.

En la tabla siguiente se muestran las reacciones adversas asociadas a selexipag obtenidas a partir del estudio clínico. En cada agrupación de frecuencia se presentan los efectos adversos en orden de gravedad decreciente.

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0 es

CLAUDIA BRUNO MAENASCO  
Farmacóloga M.N. 11151115  
IF-2018-62771600-6-APN-DERMA#ANMAT  
JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA S.A.  
Página 15 de 26

IF-2019-10238028-APN-DERM#ANMAT  
Página 19 de 311

Producto: UPTRAVI®  
 Nro de registro: 58.818



| Sistema de clasificación de órganos                               | Muy frecuentes (≥ 1/10)   | Frecuentes (≥ 1/100 hasta < 1/10)   | Poco frecuentes (≥ 1/1.000 hasta < 1/100)                                    |
|---|---|---|--|
| Trastornos de la sangre y del sistema linfático                   |   | Anemia<br>Disminución de la hemoglobina   |  |
| Trastornos endocrinos   |   | Hipertiroidismo<br>Disminución de la tirotrópina (ver "Advertencias y precauciones especiales de empleo") |  |
| Trastornos del metabolismo y de la nutrición                      |   | Disminución del apetito<br>Pérdida de peso  |  |
| Trastornos del sistema nervioso                                   | Cefalea*  |   |  |
| Trastornos cardíacos  |   |   | Taquicardia sinusal (ver "Advertencias y precauciones especiales de empleo") |
| Trastornos vasculares   | Rubefacción*  | Hipotensión (ver "Advertencias y precauciones especiales de empleo")                                      |  |
| Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos               | Nasofaringitis (de origen no infeccioso)                                  | Congestión nasal  |  |
| Trastornos gastrointestinales                                     | Diarrea*<br>Vómitos*<br>Náuseas*  | Dolor abdominal   |  |
| Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo                     |   | Erupción<br>Urticaria<br>Eritema  |  |
| Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo            | Dolor mandibular*<br>Mialgia*<br>Artralgia*<br>Dolor en las extremidades* |   |  |
| Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración |   | Dolor   |  |

\*Ver sección "Descripción de reacciones adversas seleccionadas".

Specialist: SF

HA approval date:

MAF revision: LA

QC: BDM

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0

CLAUDIA BRUNO MAGNASCO  
 IF-2018-62771606-APN-DERM#ANMAT  
 Co-Directora Técnica / Apoderada  
 JANSSEN-CILAC FARMACEUTICA S.A.

Página 16 de 26

IF-2019-60238928-APN-DERM#ANMAT  
 Página 50 de 94

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



### Descripción de reacciones adversas seleccionadas

#### Efectos farmacológicos relacionados con el ajuste de la dosis y el tratamiento de mantenimiento

Las reacciones adversas seleccionadas con el mecanismo de acción de selexipag se han observado con frecuencia, en particular durante la fase de ajuste individualizado de la dosis, y se enumeran en la siguiente tabla:

| Reacciones adversas relacionadas con la prostaciclina | Ajuste de la dosis |         | Mantenimiento |         |
|---|--------------------|---------|---------------|---------|
|   | Selexipag          | Placebo | Selexipag     | Placebo |
| Cefalea   | 64%                | 28%     | 40%           | 20%     |
| Diarrea   | 36%                | 12%     | 30%           | 13%     |
| Náuseas   | 29%                | 13%     | 20%           | 10%     |
| Dolor mandibular                                      | 26%                | 4%      | 21%           | 4%      |
| Mialgia   | 15%                | 5%      | 9%            | 3%      |
| Dolor en las extremidades                             | 14%                | 5%      | 13%           | 6%      |
| Vómitos   | 14%                | 4%      | 8%            | 6%      |
| Rubefacción   | 11%                | 4%      | 10%           | 3%      |
| Artralgia   | 7%                 | 5%      | 9%            | 5%      |

Estos efectos suelen ser transitorios o controlables mediante tratamiento sintomático. El 7,5 % de los pacientes en tratamiento con selexipag abandonaron el tratamiento a causa de estas reacciones adversas. La tasa aproximada de reacciones adversas que resultaron ser graves fue del 2,3 % en el grupo de tratamiento con selexipag y del 0,5 % en el grupo con placebo. En la práctica clínica, se ha observado que los acontecimientos gastrointestinales responden al tratamiento con medicamentos antidiarreicos, antieméticos y antinauseosos y/o medicamentos para los trastornos gastrointestinales funcionales. Los acontecimientos relacionados con dolor se han tratado con frecuencia con medicamentos analgésicos (como paracetamol).

#### Disminución de la hemoglobina

En un estudio de fase III controlado con placebo realizado en pacientes con HAP, la media de los cambios absolutos en la hemoglobina en las visitas periódicas en comparación con los niveles iniciales osciló entre -0,34 y -0,02 g/dl en el grupo de selexipag frente a -0,05 y 0,25 g/dl en el grupo de placebo. Se observó una disminución en la concentración de hemoglobina respecto al nivel inicial hasta niveles inferiores a 10 g/dl en el 8,6% de los pacientes tratados con selexipag y en el 5,0% de los pacientes tratados con placebo.

#### Pruebas de la función tiroidea

El estudio de fase III controlado con placebo realizado en pacientes con HAP, se observó hipertiroidismo en el 1,6% de los pacientes en el grupo de selexipag, frente a ningún caso en el grupo placebo (ver "Advertencias y precauciones especiales de empleo"). Se observó una reducción (hasta -0,3 MU/l respecto a la mediana basal de 2,5 MU/l) en la mediana de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) en la mayoría de las visitas realizadas en los pacientes incluidos en el grupo de

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17 V2.0 es

IF-2018-62771606-APN-DGA#ANMAT  
Página 17 de 28  
CLAUDIA BRUNO MARIASO  
Farmacóloga Titular  
C7 Dirección Técnica / Apoderada  
JANSSEN-CILAG FARMACÉUTICA S.A.

IF 2019-10238928-APN-DERM#ANMAT  
Página 51 de 94

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



selexipag. En el grupo de placebo se observó un cambio mínimo en los valores medianos. No se observaron cambios en la triyodotironina (T3) o tiroxina (T4).

#### *Aumento de la frecuencia cardíaca*

En el estudio de fase III controlado con placebo realizado en pacientes con HAP, se observó un aumento transitorio en la frecuencia cardíaca media de 3-4 lpm a las 2-4 horas tras la administración de una dosis. Las exploraciones mediante electrocardiograma mostraron taquicardia sinusal en el 11,3 % de los pacientes en el grupo de selexipag frente al 8,8 % en el grupo de placebo (ver también "Advertencias y precauciones especiales de empleo" y "Propiedades farmacológicas - Farmacodinamia").

#### Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio / riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas al través del sistema nacional de notificación.

## ESTUDIOS CLINICOS

### Hipertensión arterial pulmonar

Se demostró el efecto de selexipag sobre la progresión de la HAP en un estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, determinado por los eventos (estudio GRIPHON) realizado en 1156 pacientes con HAP sintomática (clase funcional OMS I [0,8%], II [46%], III [53%] y IV [1%]). Los pacientes fueron aleatorizados para recibir placebo (N = 582) o UPTRAVI® (N = 574). Se aumentó la dosis en intervalos semanales en incrementos de 200 mcg dos veces al día hasta alcanzar la dosis más alta tolerada de hasta 1600 mcg dos veces al día.

El criterio de valoración primario del estudio fue el tiempo transcurrido desde la primera ocurrencia del evento hasta la finalización del tratamiento de: a) fallecimiento, b) hospitalización por HAP, c) empeoramiento de la HAP resultando en la necesidad de trasplante pulmonar o septostomía auricular con balón, d) inicio de una terapia con prostanoides parenterales u oxigenoterapia crónica u e) otros eventos de progresión de la enfermedad sobre la base de una disminución del 15% con respecto al estado basal en la PM6M (Prueba de marcha de seis minutos, su sigla en inglés 6MWD) más el empeoramiento de la clase funcional o la necesidad de una terapia específica para la HAP adicional.

La edad promedio fue de 48 años; la mayoría de los pacientes eran blancos (65%) y mujeres (80%). Casi todos los pacientes tenían clase funcional OMS II y III en el estado basal.

La HAP hereditaria o idiopática fue la etiología más frecuente en la población del estudio (58%), seguida por la HAP asociada con enfermedades del tejido conectivo (29%), la HAP asociada con

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0\_es

IF-2018-62771606-APN-DGA#ANMAT

Página 18 de 26

IF-2019-60238028-APN-DERM#ANMAT

Producto: UPTRAVI®  
 Nro de registro: 58.818




enfermedades cardíacas congénitas con derivaciones reparadas (10%), medicamentos y toxinas (2%), y el VIH (1%).

En el estado basal, la mayoría de los pacientes enrolados (80%) fueron tratados con una dosis estable de un antagonista de receptor de endotelina (15%), un inhibidor de la PDE-5 (32%) o ambos (33%).

Los pacientes tratados con selexipag alcanzaron dosis dentro de los siguientes grupos: 200-400 mcg (23%), 600-1000 mcg (31%) y 1200-1600 mcg (43%).

El tratamiento con UPTRAVI® resultó en una reducción del 40% (IC del 99%: 22 a 54%; rango logarítmico bilateral, valor de  $p < 0,0001$ ) de la ocurrencia de eventos del criterio de valoración primario en comparación con el placebo (Tabla 1; Figura 3). El efecto beneficioso de UPTRAVI® se debió principalmente a una reducción en la hospitalización por HAP y a una reducción en los demás eventos de progresión de la enfermedad (Tabla 1). El beneficio observado de UPTRAVI® fue similar, independientemente de la dosis alcanzada, cuando se ajustó la dosis de los pacientes a la dosis más alta tolerada (ver "Posología y modo de administración").

**Figura 3: Estimaciones de Kaplan-Meier del primer evento de morbilidad-mortalidad en el estudio GRIPHON**



| Pacientes tratados con UPTRAVI®: |  |
|----------------------------------|--|
| en riesgo                        | 574    455    361    246    171    101    40 |
| Pacientes tratados con placebo:  |  |
| en riesgo                        | 582    433    347    220    149    88    28  |

Specialist: SF

MAF revision: LA

HA approval date:

QC: BDM

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_v2.0\_es

IF-2018-62771606-APN-DGA#ANMAT

Página 19 de 26

IF-2019-10238028-APN-DERM#ANMAT

Producto: UPTRAVI®  
 Nro de registro: 58.818



**Tabla 1: Criterios de valoración primarios y componentes relacionados en el estudio GRIPHON**

|  | UPTRAVI®<br>N=574 |      | Placebo<br>N=582 |      | Cociente de riesgos<br>(IC del 99%) | Valor de p |
|--|-------------------|------|------------------|------|-------------------------------------|------------|
|  | n                 | %    | n                | %    |                                     |            |
| <b>Eventos del criterio de valoración primario hasta la finalización del tratamiento</b>   |                   |      |                  |      |                                     |            |
| Todos los eventos del criterio de valoración primario  | 155               | 27,0 | 242              | 41,6 | 0,60 [0,46;0,78]                    | <0,0001    |
| Como primer evento:  |                   |      |                  |      |                                     |            |
| • Hospitalización por HAP  | 78                | 13,6 | 109              | 18,7 |                                     |            |
| • Otro evento de progresión de la enfermedad (disminución en la distancia PM6M más el empeoramiento de la clase funcional o necesidad de otra terapia) | 38                | 6,6  | 100              | 17,2 |                                     |            |
| • Fallecimiento  | 28                | 4,9  | 18               | 3,1  |                                     |            |
| • Terapia con prostanoides parenterales u oxigenoterapia crónica   | 10                | 1,7  | 13               | 2,2  |                                     |            |
| • Empeoramiento de la HAP que resulta en la necesidad de trasplante pulmonar o septostomía auricular con balón   | 1                 | 0,2  | 2                | 0,3  |                                     |            |

Se desconoce si el exceso en la cantidad de fallecimientos en el grupo de selezipag está relacionado con el medicamento porque hubo muy pocos fallecimientos y no se observó el desequilibrio hasta 18 meses después en el estudio GRIPHON.

Las figuras 4A, B y C muestran los análisis del tiempo transcurrido hasta el primer evento de los componentes del criterio de valoración primario de hospitalización por HAP (A), otro evento de progresión de la enfermedad (B) y fallecimiento (C) - todos censurados 7 días después de cualquier evento del criterio de valoración primario (debido a que muchos pacientes tratados con placebo pasaron a UPTRAVI® a etiqueta abierta en este período).

El desequilibrio entre los grupos de tratamiento para el análisis del punto final muerte hasta el fin de tratamiento (Figura 4C) puede haberse visto afectado por la censura informativa y, por lo tanto, debe interpretarse con precaución.

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0


IF-2018-62771606-APN-DCV#ANMAT  
 20 de 26

IF-2019-50238028-APN-DERM#ANMAT  
 Página 5 de 9

Producto: UPTRAVI®  
 Nro de registro: 58.818



**Figura 4A: Hospitalización por HAP como primer criterio de valoración en el estudio GRIPHON**



|   | Meses desde la aleatorización |     |     |     |     |     |    |
|---|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| <b>Pacientes tratados con UPTRAVI®:</b> |                               |     |     |     |     |     |    |
| en riesgo                               | 574                           | 455 | 361 | 246 | 171 | 101 | 40 |
| <b>Pacientes tratados con placebo:</b>  |                               |     |     |     |     |     |    |
| en riesgo                               | 582                           | 433 | 347 | 220 | 149 | 88  | 28 |

Specialist: SF

HA approval date:

MAF revision: LA

QC: BDM

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0


*Handwritten signature*  
 CLAUDIA BRUNO MAGNASCO  
 Farmacóloga - C.N. 11251 M.P. 20255  
 IF-2018-62771606-APN-DGA#ANMAT  
 JANSSEN-Cilag FARMACEUTICA S.A.  
 Página 21 de 26

IF-2019-10238928-APN-DERM#ANMAT  
 Página 59 de 91

Producto: UPTRAVI®  
 Nro de registro: 58.818



**Figura 4B: Progresión de la enfermedad como primer criterio de valoración en el estudio GRIPHON**



|   |  | Meses desde la aleatorización |     |     |     |     |     |    |
|---|--|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|   |  | 0                             | 6   | 12  | 18  | 24  | 30  | 36 |
| <b>Pacientes tratados con UPTRAVI®:</b> |  |                               |     |     |     |     |     |    |
| en riesgo                               |  | 574                           | 455 | 361 | 246 | 171 | 101 | 40 |
| <b>Pacientes tratados con placebo:</b>  |  |                               |     |     |     |     |     |    |
| en riesgo                               |  | 582                           | 433 | 347 | 220 | 149 | 88  | 28 |

Specialist: SF

HA approval date:

MAF revision: LA

QC: BDM

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0\_66  
 IF-2018-62771606-APN-DERMA#ANMAT 65  
 66 - Directora Técnica / Apoderada  
 PÁGINA 22 DE 26  
 LAG FARMACÉUTICA S.A.


IF-2019-10238028-APN-DERM#ANMAT  
 Página 56 de 91



Producto: UPTRAVI®  
 Nro de registro: 58.818



Figura 4C: Fallecimiento como primer criterio de valoración en el estudio GRIPHON



|   | Meses desde la aleatorización |     |     |     |     |     |    |
|---|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| <b>Pacientes tratados con UPTRAVI®:</b> |                               |     |     |     |     |     |    |
| en riesgo                               | 574                           | 455 | 361 | 246 | 171 | 101 | 40 |
| <b>Pacientes tratados con placebo:</b>  |                               |     |     |     |     |     |    |
| en riesgo                               | 582                           | 433 | 347 | 220 | 149 | 88  | 28 |

El efecto del tratamiento de UPTRAVI® sobre el tiempo transcurrido hasta el primer evento primario fue coherente independientemente de la terapia de base para la HAP (es decir, en combinación con un ARE, PDE-5i, ambos o sin terapia de base) (Figura 5).

Specialist: SF

HA approval date:

MAF revision: LA

QC: BDM

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0.es


CLAUDIA BRUNO MAGNASCO  
 IF-2018-62771606-APN-DGA#ANMAT  
 Co-Fundadora Titular Acreditada  
 JANSSEN UYUJAL FARMACÉUTICA S.A.  
 Página 23 de 26

IF-2019-10238918-APN-DERM#ANMAT  
 Página 57 de 8918

Producto: UPTRAVI®  
 Nro de registro: 58.818



Figura 5: Análisis de los subgrupos del criterio de valoración primario en el estudio GRIPHON



Nota: El grupo racial "Otros" no se muestra en el análisis, ya que la población es menor a 30. EU = cantidad de pacientes tratados con UPTRAVI® con eventos, NU = cantidad de pacientes aleatorizados para recibir UPTRAVI®, EP = cantidad de pacientes tratados con placebo con eventos, NP = cantidad de pacientes aleatorizados para recibir placebo, HR = cociente de riesgos, IC = intervalo de confianza, el tamaño de los cuadrados representa la cantidad de pacientes en el subgrupo.

Nota: La figura que se muestra arriba presenta los efectos en distintos subgrupos, todos los cuáles son características basales y fueron todos preestablecidos. Los límites de confianza del 99% que se muestran no tienen en cuenta la cantidad de comparaciones realizadas ni reflejan el efecto de un factor en particular luego del ajuste de todos los demás factores. No se deberá interpretar más de lo necesario la homogeneidad o heterogeneidad aparente entre los grupos.

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_V2.0\_es

IF-2018-62771606-AR-NDG#ANMAT

Página 24 de 26

CLAUDIA BRUNO MAGNASSO  
 Janssen-Cilag Farmacéutica S.A.  
 Representante Técnica / Asesora

IF-2019-10238028-APN-DERM#ANMAT

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



Prueba de marcha de seis minutos (PM6M o 6MWD, por sus siglas en inglés)

La capacidad de realizar ejercicio se evaluó como criterio de valoración secundario. La mediana del cambio absoluto desde el estado basal hasta la semana 26 en la PM6M medida en el nivel mínimo (es decir, aproximadamente 12 horas después de administrarse la dosis) fue de +4 metros con UPTRAVI® y de -9 metros en el grupo de placebo. Esto resultó en una mediana del efecto del tratamiento corregido con placebo de 12 metros (IC del 99%: 1, 24 metros; p bilateral = 0,005).

**SOBREDOSIFICACIÓN**

Se han notificado casos aislados de sobredosis por encima de 3200 microgramos. La única consecuencia informada fueron náusea leve y transitoria. En caso de sobredosis deben adoptarse las medidas de apoyo necesarias. Es poco probable que la diálisis resulte efectiva, ya que selexipag y su metabolito activo se encuentran mayoritariamente unidos a las proteínas.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología de:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez – Tel: (011) 4962-6666 / 2247  
Hospital A. Posadas – Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777

**INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE**

Aconseje al paciente que lea el prospecto de información para el paciente.

Informe a los pacientes:

- qué hacer si se olvidan de tomar una dosis
- que no deben partir, triturar ni masticar los comprimidos.

**PRESENTACIÓN**

Los comprimidos recubiertos de UPTRAVI® (selexipag) se presentan en las siguientes configuraciones:

| Concentración (mcg) | Color          | Grabado | Contenido del envase  |
|---------------------|----------------|---------|---|
| 200                 | Amarillo claro | 2       | 60 comprimidos recubiertos<br>140 comprimidos recubiertos (Kit o empaque para titulación de la dosis)*. |
| 400                 | Rojo           | 4       | 60 comprimidos recubiertos  |
| 600                 | Violeta claro  | 6       | 60 comprimidos recubiertos  |
| 800                 | Verde          | 8       | 60 comprimidos recubiertos  |
| 1000                | Naranja        | 10      | 60 comprimidos recubiertos  |

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_v2.0\_es

IF-2018-62771606-APN-DOXA#ANMAT  
Página 25 de 26  
JANSSEN CILAG FARMACEUTICA S.A.

IF-2019-10238028-APN-DERM#ANMAT  
Página 59 de 94

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



|      |                 |    |                            |
|------|-----------------|----|----------------------------|
| 1200 | Violeta oscuro  | 12 | 60 comprimidos recubiertos |
| 1400 | Amarillo oscuro | 14 | 60 comprimidos recubiertos |
| 1600 | Marrón          | 16 | 60 comprimidos recubiertos |

\* El kit o empaque para titulación de la dosis contiene una guía de titulación que proporciona información sobre el proceso de titulación o incremento progresivo de la dosis permitiendo registrar el número de tabletas que el paciente ingiere cada día.

## ALMACENAMIENTO

Conservar a temperatura ambiente entre 20°C y 25°C. Se permiten desvíos de temperatura entre 15°C y 30°C.

“Este medicamento se encuentra bajo un programa médico Plan de Gestión de Riesgos, cuya finalidad es garantizar la seguridad y protección de pacientes.”

## MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Excella GmbH & Co. KG, Nuernberger Strasse 12, 90537 Feucht, Alemania.

Acondicionado por: Allpack Group AG Pfeffingerstrasse 45, 4153 Reinach, Suiza.

Acondicionamiento secundario alternativo: JANSSEN CILAG Farmacéutica S.A., Ruta 8, Km 63.5, Localidad de Fátima, Pilar, Buenos Aires, Argentina.

Importado por JANSSEN CILAG FARMACÉUTICA S.A.  
Mendoza 1259 - C1428DJG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Venta bajo receta archivada.  
Certificado N° 58.818  
Director Técnico: Georgina Rodriguez, Farmacéutica-Bioquímica

## Centro de Atención al Cliente

Por correo electrónico: [infojanssen@janar.jnj.com](mailto:infojanssen@janar.jnj.com)

Por teléfono: 0800 122 0238

© Marca Registrada

Fecha de última revisión:

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: BDM

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PI\_EUPI Sep-18+USPI Dec-17\_VZ0 es

IF-2018-62771606-APN-DERM#ANMAT

Página 26 de 26

IF-2019-10238028-APN-DERM#ANMAT

Página 60 de 311



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2019-10238028-APN-DERM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Martes 19 de Febrero de 2019

**Referencia:** EX-2018-62526556- Prospecto Upravi.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 26 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.02.19 17:30:47 -0300'

Analia Claudia Sabattini  
Profesión de la Salud  
Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,  
serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.02.19 17:30:49 -0300'

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

### UPTRAVI® SELEXIPAG

200 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg, 1000 mcg, 1200 mcg, 1400 mcg y 1600 mcg  
Comprimidos recubiertos

Industria alemana

Venta bajo receta archivada

**Lea todo el prospecto detenidamente antes de tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto (ver sección 4).

#### Contenido del prospecto

1. Qué es UPTRAVI® y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar UPTRAVI®
3. Cómo tomar UPTRAVI®
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de UPTRAVI®
6. Contenido del envase e información adicional

#### 1. Qué es UPTRAVI® y para qué se utiliza

UPTRAVI® es un medicamento que contiene el principio activo selexipag. Actúa en los vasos sanguíneos de forma similar a la sustancia natural prostaciclina, haciendo que se relajen y ensanchen.

UPTRAVI® se utiliza en el tratamiento a largo plazo de la hipertensión arterial pulmonar (HAP) en pacientes adultos. UPTRAVI® puede ser utilizado en combinación con otro tipo de medicamentos para la HAP conocidos como antagonistas del receptor de la endotelina e inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. UPTRAVI® puede ser utilizado por si solo si el paciente no es candidato a estos medicamentos.

Specialist: SF

HA approval date:

MAF revision: LA

QC: MEG

AR\_SELE\_FCT\_PIL\_EUPI Sep-18\_V2.0\_es

IF-2018-62771606-APN-DGA#ANMAT

Página 1 de 11

CLAUDIA BRUNO MAGNASSO  
M.N. 11261 M.P. 20206  
Co-Directora Técnica / Acreditada  
JANSSEN-CILAG FARMACÉUTICA S.A.

IF-2019-10238196-APN-DERM#ANMAT

Página 1 de 9

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



La HAP es una enfermedad caracterizada por la alta presión arterial que afecta a los vasos sanguíneos que transportan la sangre del corazón a los pulmones (las arterias pulmonares). En las personas con HAP, estas arterias son más estrechas, por lo que el corazón debe trabajar más para bombear la sangre. Esto puede hacer que se sientan cansadas, mareadas, con dificultad para respirar o que experimenten otros síntomas.

De la misma manera que la prostaciclina, UPTRAVI® ensancha las arterias pulmonares y reduce su endurecimiento. Esto hace que al corazón le resulte más fácil bombear la sangre a lo largo de las arterias pulmonares. Alivia los síntomas de la HAP y mejora el curso de la enfermedad.

## 2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar UPTRAVI®

### No tome UPTRAVI®

- si es alérgico a selexipag o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6)
- si tiene algún trastorno en el corazón, como:
  - flujo sanguíneo disminuido a los músculos cardíacos (cardiopatía isquémica grave o angina inestable); los síntomas pueden incluir dolor torácico
  - infarto de miocardio en los 6 últimos meses
  - debilidad cardíaca (insuficiencia cardíaca descompensada) sin estricta supervisión médica
  - latido cardíaco irregular grave
  - defecto en las válvulas cardíacas (congénito o adquirido) que hace que el corazón funcione con dificultad (no relacionado con la hipertensión pulmonar)
- si ha sufrido algún accidente cerebrovascular (ictus) en los 3 últimos meses, o cualquier otro evento de reducción del flujo sanguíneo al cerebro (por ejemplo, accidente isquémico transitorio)
- si está tomando gemfibrozilo (medicamento utilizado para reducir el nivel de grasas [lípidos] en la sangre)

### Advertencias y precauciones

Consulte a su médico antes de empezar a tomar UPTRAVI® en caso de que:

- esté tomando medicamentos para la hipertensión (tensión arterial alta)
- tenga tensión arterial baja asociada a síntomas como mareo
- haya sufrido recientemente una pérdida importante de sangre o pérdida de líquidos como una diarrea severa o vómitos
- tenga problemas en la glándula tiroides
- tenga problemas graves en los riñones o esté siendo tratado con diálisis
- tenga o haya tenido problemas graves en el funcionamiento correcto del hígado

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: MEG

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PIL\_EUPI Sep-18\_V2.0\_es

CLAUDIA BRUNO MAGNASCO  
IF-2018-62771606-APN-~~DERM#ANMAT~~ 20285  
Página 2 de 11  
Directora Técnica / Apoderada  
JANSSEN-CILAG FARMACEUTICAS SA

IF-2019-10238196-APN-~~DERM#ANMAT~~

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



- esté tomando clopidogrel, deferasirox o teriflunomida

Si experimenta alguno de los signos anteriores o su enfermedad se modifica, **informe inmediatamente a su médico.**

#### Niños y adolescentes

No administrar este medicamento a niños menores de 18 años de edad, ya que UPTRAVI® no se ha evaluado en niños.

#### Pacientes de edad avanzada

Se dispone de escasa experiencia sobre UPTRAVI® en pacientes mayores de 75 años. UPTRAVI® se debe utilizar con precaución en pacientes de este grupo de edad.

#### Otros medicamentos y UPTRAVI®

Informe a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o prevé tomar algún otro medicamento.

Tomar otros medicamentos puede afectar al funcionamiento de UPTRAVI®.

Informe a su médico especialista en HAP si está tomando alguno de los medicamentos que se indican a continuación:

- Gemfibrozilo (medicamento utilizado para reducir los niveles de grasas [lípidos] en la sangre)
- Clopidogrel (medicamento utilizado para prevenir la formación de coágulos sanguíneos (trombos) en la enfermedad de las arterias coronarias)
- Deferasirox (medicamento utilizado para eliminar el exceso de hierro del organismo)
- Teriflunomida (medicamento utilizado para tratar la esclerosis múltiple remitente recurrente)
- Carbamazepina (medicamento utilizado para tratar ciertos tipos de epilepsia, neuralgia o para ayudar a controlar trastornos graves del comportamiento cuando otros medicamentos no funcionan)
- Fenitoína (medicamento utilizado para tratar la epilepsia)
- Ácido valproico (medicamento utilizado para tratar la epilepsia)
- Probenecid (medicamento utilizado para tratar la gota)
- Fluconazol, rifampicina o rifapentina (antibióticos utilizados para tratar las infecciones)

#### Embarazo y lactancia

No se recomienda el uso de UPTRAVI® durante el embarazo y la lactancia. Si es mujer y puede quedar embarazada, debe utilizar un método anticonceptivo eficaz mientras esté tomando

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: MEG

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PIL\_EUPI Sep-18\_V7.0\_es

IF-2018-62771(06-APN-DERMA#ANMAT)  
Página 3 de 4  
CLAUDIA BRUNO MAGNASCO  
Directora Técnica / Apoderada  
JANSSEN-Cilag FARMACEUTICA S.A.

IF-2019-10238196-APN-DERM#ANMAT  
Página 127 de 311



Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



UPTRAVI®. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

### Conducción y uso de máquinas

UPTRAVI® puede provocar efectos adversos como cefaleas y disminución de la tensión arterial (ver sección 4), que pueden afectar a su capacidad para conducir; los síntomas de su enfermedad pueden también disminuir su capacidad para conducir.

### 3. Cómo tomar UPTRAVI®

El tratamiento con UPTRAVI® debe ser iniciado y controlado por un médico que tenga experiencia en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP).

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.

Si tiene mala visión o experimenta cualquier tipo de ceguera, solicite ayuda de otra persona para tomar UPTRAVI® durante el periodo de ajuste de la dosis.

### Ajuste de la dosis adecuada para usted

Al inicio del tratamiento, tomará la dosis más baja. Esta es de un comprimido de **200 microgramos por la mañana y otro comprimido de 200 microgramos por la noche**. Se debe iniciar el tratamiento por la noche. Su médico le indicará que debe aumentar progresivamente la dosis. Es lo que se denomina ajuste de la dosis, y permite a su cuerpo adaptarse al nuevo medicamento. El objetivo del ajuste de la dosis es alcanzar la dosis más adecuada. Esta será la dosis más alta que pueda tolerar, pudiendo llegar a alcanzar la dosis máxima de 1.600 microgramos por la mañana y por la noche.

La primera caja de comprimidos que reciba contendrá los comprimidos de color amarillo claro de 200 microgramos.

Su médico le indicará que aumente la dosis en fases, generalmente cada semana, aunque el intervalo entre incrementos puede ser mayor.

En cada fase, añadirá un comprimido de 200 microgramos a la dosis matutina y otro comprimido de 200 microgramos a la dosis nocturna. La primera toma de la dosis aumentada debe realizarse por la noche. El diagrama siguiente muestra el número de comprimidos que debe tomar **cada mañana y cada noche** en las primeras 4 fases.

Especialist: SF

HA approval date:

MAF revision: LA

QC: MEG

AR\_SELE\_FCT\_PIL\_EUPI Sep-18\_V2.0\_es

IF-2018-62771606-APN-DGA#ANMAT

Página 4 de 11 BRUNO MAGNASCO

Farma Subica - M.N. 11261 M.P. 20286

Co-Directora Técnica / Apoderada


IF-2019-19338196-APN-DERMA#ANMAT

Página 1 de 3

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



Cada fase del ajuste de la dosis dura  
aproximadamente 1 semana



Si su médico le indica que siga aumentando la dosis y proceda a la fase 5, puede hacerlo tomando un comprimido verde de 800 microgramos y un comprimido amarillo claro de 200 microgramos por la mañana y un comprimido de 800 microgramos y un comprimido de 200 microgramos por la noche.

Si su médico le indica que siga aumentando la dosis, añadirá un comprimido de 200 microgramos a la dosis matutina y un comprimido de 200 microgramos a la dosis nocturna en cada nueva fase. La primera toma de la dosis aumentada debe realizarse por la noche. La dosis máxima de UPTRAVI® es de 1600 microgramos por la mañana y 1600 microgramos por la noche. Sin embargo, no todos los pacientes alcanzarán esta dosis, cada paciente requiere una dosis distinta.

El diagrama de abajo muestra el número de comprimidos que debe tomar cada mañana y cada noche en cada fase, empezando por la fase 5.

Specialist: SF

HA approval date:

MAF revision: LA

QC: MEG

AR\_SELE\_FCT\_PIL\_EUPI Sep-18\_V2.0\_es

IF-2018-62771606-CA-PN-DE-BO-ANMAT-SCO


Página 5 de 21 - M.N. 11261 M.P. 20286

Co-Directora Técnica / Apoderada  
JANSSEN-CILAC FARMACEUTICA S.A.

IF-2019-10338196-APN-DERM#ANMAT

Página 129 de 311

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



El envase para el ajuste de la dosis (UPTRAVI® 200 mcg envase con 140 comprimidos recubiertos) contiene también una guía que proporciona información sobre el proceso de ajuste de la dosis y le permite anotar el número de comprimidos que toma diariamente.

Recuerde anotar el número de comprimidos que toma cada día en su diario de ajuste de la dosis. Las fases de ajuste suelen durar aproximadamente 1 semana. Si su médico le indica que prolongue cada fase de ajuste por encima de 1 semana, dispone de páginas adicionales en el diario que le permiten hacerlo. **Recuerde comunicarse con su médico especialista en HAP de forma periódica durante la fase de ajuste de la dosis.**

#### Disminución de la dosis debido a efectos adversos

Durante el ajuste de la dosis, puede experimentar efectos adversos como dolor de cabeza, diarrea, sensación de malestar (náuseas), malestar (vómitos), dolor mandibular, dolor muscular, dolor en las extremidades inferiores, dolor articular o enrojecimiento facial (ver sección 4). Si estos efectos adversos le resultan difíciles de tolerar, consulte con su médico la forma de controlarlos o tratarlos. Hay tratamientos disponibles para ayudarle a aliviar estos efectos adversos. Por ejemplo, analgésicos como el paracetamol pueden ayudarle a tratar el dolor y el dolor de cabeza.

Specialist: SF

HA approval date:

MAF revision: LA

QC: MEG

AR\_SELE\_FCT\_PIL\_EUPI Sep-18\_V2.0\_es

IF-2018-62771606-APN-DERM#ANMAT

Página 6 de 11


CLÍNICA DEBUNO MAGNUSCO  
Farmacéutica - M.I. 11251 M.F. 20286  
Co-Directora Técnica / Apoderada  
JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA S.A.

IF-2019-10238196-APN-DERM#ANMAT  
Página 130 de 311

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



Si no se pueden tratar los efectos adversos, o estos no mejoran gradualmente con la dosis que está tomando, su médico puede ajustar la dosis reduciendo el número de comprimidos de color amarillo claro de 200 microgramos que toma, quitando un comprimido por la mañana y otro por la noche. El esquema siguiente muestra cómo reducir la dosis. Esto se debe realizar únicamente en caso de que así lo indique su médico.



Si los efectos adversos que experimenta pueden controlarse tras la reducción de la dosis, su médico puede decidir que debe mantener esa dosis. Para obtener información adicional, consulte la sección "Dosis de mantenimiento" a continuación.

#### Dosis de mantenimiento

La dosis más alta que pueda tolerar durante la fase de ajuste de la dosis se convertirá en su dosis de mantenimiento. Su dosis de mantenimiento es la dosis que debe seguir tomando de forma habitual.

Su médico le recetará la concentración (microgramos) adecuada para su dosis de mantenimiento.

Con el tiempo, su médico puede ajustar su dosis de mantenimiento si fuera necesario.

Si en cualquier momento, tras tomar la misma dosis durante un largo periodo, experimenta efectos adversos que no puede tolerar o efectos adversos que afectan a las actividades de la vida diaria, contacte con su médico, ya que puede requerir una reducción de la dosis. El médico puede, en ese caso, recetarle una concentración menor. Recuerde desechar los comprimidos no utilizados (ver sección 5).

Specialist: SF

HA approval date:

MAF revision: LA

QC: MEG

AR\_SELE\_FCT\_PIL\_EUPI Sep-18\_V2.0\_es

IF-2018-62771606-APN-DGA#ANMAT

Página 7 de 11

FARMACIA BUKO MAGNASSO

Farmacéutica - M.N. 11251 M.F. 20285

Co-Directora Técnica / Apoderada

IF-2019-19238196-APN-DERMA#ANMAT

Página 19 de 31

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



**Tome UPTRAVI® una vez por la mañana y otra por la noche, con un intervalo de aproximadamente 12 horas.**

Tome los comprimidos junto con las comidas, ya que esto puede ayudarle a tolerar mejor el medicamento. Trague los comprimidos enteros con ayuda de un vaso de agua.

#### **Si toma más UPTRAVI® del que debe**

Si toma más comprimidos de los que debe, consulte inmediatamente a su médico.

#### **Si olvidó tomar UPTRAVI®**

Si olvidó tomar UPTRAVI®, tome una dosis tan pronto como se acuerde, y a continuación siga tomando los comprimidos en el horario habitual. En caso de que sea casi el momento de tomar su siguiente dosis (en un plazo de 6 horas antes de la hora en que suele tomarla), debe dejar de tomar la dosis olvidada y continuar tomando el medicamento en el horario habitual. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

#### **Si interrumpe el tratamiento con UPTRAVI®**

La interrupción brusca del tratamiento con UPTRAVI® puede hacer que sus síntomas empeoren. No deje de tomar UPTRAVI®, salvo que su médico se lo indique. Su médico puede indicarle que reduzca la dosis gradualmente antes de interrumpir el tratamiento por completo.

Si, por alguna razón, deja de tomar UPTRAVI® durante más de 3 días consecutivos (si ha olvidado 3 dosis matutinas y 3 dosis nocturnas, o 6 dosis seguidas o más), **contacte con su médico inmediatamente, ya que puede tener que ajustar la dosis para evitar efectos adversos.** Su médico puede decidir volver a empezar el tratamiento a una dosis inferior, para incrementarla gradualmente hasta alcanzar su dosis de mantenimiento.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico.

#### **4. Posibles efectos adversos**

Igual que todos los medicamentos, UPTRAVI® puede producir efectos adversos. Puede experimentar efectos adversos, no solo durante la fase de ajuste de la dosis, durante la cual se está aumentando su dosis, sino también más adelante, tras haber tomado la misma dosis durante un largo período.

**Si experimenta alguno de los siguientes efectos adversos: dolor de cabeza, diarrea, sensación de malestar (náuseas), malestar (vómitos), dolor mandibular, dolor muscular, dolor en las extremidades inferiores, dolor articular o enrojecimiento facial, que no puede**

Specialist: SF

MAF revision: LA

QC: MEG

HA approval date:

AR\_SELE\_FCT\_PIL\_EUPI Sep-18\_V2.0\_es

IF-2018-62771-606-ARN-DGA#ANMAT

Página 8 de 11

CLUBIA BRUNO MAGNUSCO

Pharm. Mag. M.N. 11261 M.P. 20285

Co-Directora Técnica / Apoderada

JANSSEN-ILAG FARMACEUTICAS A

IF-2019-19338196-APN-DERM#ANMAT

Página 192 de 311

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



**tolerar o no es tratable, debe contactar con su médico, ya que la dosis que está tomando puede ser demasiado alta para usted y puede requerir una reducción.**

**Efectos adversos muy frecuentes** (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)

- Dolor de cabeza
- Rubefacción (enrojecimiento facial)
- Náuseas y vómitos
- Diarrea
- Dolor mandibular, dolor muscular, dolor articular, dolor en las extremidades inferiores
- Nasofaringitis (congestión nasal)

**Efectos adversos frecuentes** (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- Anemia (nivel bajo de glóbulos rojos)
- Hipertiroidismo (glándula tiroides hiperactiva)
- Disminución del apetito
- Pérdida de peso
- Hipotensión (tensión arterial baja)
- Dolor de estómago
- Dolor
- Cambios en algunos resultados analíticos, incluyendo los que miden los niveles de células sanguíneas y la función tiroidea
- Erupciones, incluida la urticaria, que pueden provocar sensación de quemazón o de escozor y enrojecimiento de la piel

**Efectos adversos poco frecuentes** (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

- Aumento de la frecuencia cardíaca

#### **Comunicación de efectos adversos**

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del sistema nacional de notificación. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

#### **5. Conservación de UPTRAVI®**

Mantener este medicamento fuera del alcance de los niños.

No utilice UPTRAVI® después de la fecha de vencimiento que aparece en la caja y en el blister. La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica.

Specialist: SF

HA approval date:

MAF revisión: LA

QC: MEG

AR\_SELE\_FCT\_PIL\_EUPI Sep-18\_V2.0\_es

IF-2018-62771606-APN-DGA#ANMAT

Página 9 de 11

CLAUDIA BRUNO MAGNASCO  
Farmacóloga - M.M. 11351 M.P. 20266

IF-2019-10338196-APN-DERMA#ANMAT

Página 13 de 31

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



Conserve los comprimidos de UPTRAVI® a temperatura ambiente entre 20°C y 25°C. Se permiten desvíos de temperatura entre 15°C y 30°C.

## 6. Contenido del envase e información adicional

### Composición de UPTRAVI®

- El principio activo es selexipag.
- Los demás componentes son:

#### *En el núcleo de los comprimidos:*

Manitol, almidón de maíz, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, hidroxipropilcelulosa y estearato de magnesio.

#### *En la cubierta pelicular:*

Hipromelosa, propilenglicol, dióxido de titanio, cera de carnauba y óxidos de hierro (ver abajo).

UPTRAVI® 200 microgramos contiene óxido de hierro amarillo.

UPTRAVI® 400 microgramos contiene óxido de hierro rojo.

UPTRAVI® 600 microgramos contiene óxido de hierro rojo y óxido de hierro negro.

UPTRAVI® 800 microgramos contiene óxido de hierro amarillo y óxido de hierro negro.

UPTRAVI® 1000 microgramos contiene óxido de hierro rojo y óxido de hierro amarillo.

UPTRAVI® 1200 microgramos contiene óxido de hierro negro y óxido de hierro rojo.

UPTRAVI® 1400 microgramos contiene óxido de hierro amarillo.

UPTRAVI® 1600 microgramos contiene óxido de hierro negro, óxido de hierro rojo y óxido de hierro amarillo.

### Aspecto de UPTRAVI® y contenido del envase

Los comprimidos recubiertos de UPTRAVI® se presentan en blister, en las siguientes configuraciones:

| Concentración (mcg) | Color          | Grabado | Contenido del envase  |
|---------------------|----------------|---------|---|
| 200                 | Amarillo claro | 2       | 60 comprimidos recubiertos<br>140 comprimidos recubiertos (Kit o empaque para titulación de la dosis)*. |
| 400                 | Rojo           | 4       | 60 comprimidos recubiertos  |
| 600                 | Violeta claro  | 6       | 60 comprimidos recubiertos  |
| 800                 | Verde          | 8       | 60 comprimidos recubiertos  |

Specialist: SF

HA approval date:

MAF revision: LA

QC: MEG

AR\_SELE\_FCT\_PIL\_EUPI Sep-18\_V2.0\_es

IF-2018-62771606-APN-DGA#ANMAT

Página 10 de 11

CLAUDIA BRUNO MAGNASCO  
Farmacéutica - M.N. 11261 M.P. 20286

IF-2019-10238196-APN-DERMA#ANMAT  
Página 10 de 11

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



|      |                 |    |                            |
|------|-----------------|----|----------------------------|
| 1000 | Naranja         | 10 | 60 comprimidos recubiertos |
| 1200 | Violeta oscuro  | 12 | 60 comprimidos recubiertos |
| 1400 | Amarillo oscuro | 14 | 60 comprimidos recubiertos |
| 1600 | Marrón          | 16 | 60 comprimidos recubiertos |

\* El kit o empaque para titulación de la dosis contiene una guía de titulación que proporciona información sobre el proceso de titulación o incremento progresivo de la dosis permitiendo registrar el número de comprimidos que el paciente ingiere cada día.

*Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la  
Página Web de la ANMAT:*

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>

o

*llamar a ANMAT responde 0800-333-1234*

“Este medicamento se encuentra bajo un programa médico Plan de Gestión de Riesgos, cuya finalidad es garantizar la seguridad y protección de pacientes.”

#### MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Excella GmbH & Co. KG, Nuemberger Strasse 12, 90537 Feucht, Alemania.

Acondicionado por: Allpack Group AG Pfeffingerstrasse 45, 4153 Reinach, Suiza.

Acondicionamiento secundario alternativo: JANSSEN CILAG Farmacéutica S.A., Ruta 8, Km 63.5, Localidad de Fátima, Pilar, Buenos Aires, Argentina.

Importado por JANSSEN CILAG FARMACÉUTICA S.A.  
Mendoza 1259 - C1428DJG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina  
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Venta bajo receta archivada.  
Certificado N° 58.818  
Director Técnico: Georgina Rodriguez, Farmacéutica-Bioquímica

#### Centro de Atención al Cliente

Por correo electrónico: [infojanssen@janar.jnj.com](mailto:infojanssen@janar.jnj.com)

Por teléfono: 0800 122 0238

® Marca Registrada

#### Fecha de última revisión:

Specialist: SF

HA approval date:

MAF revision: LA

QC: MEG

AR\_SELE\_FCT\_PIL\_EUPI Sep-18\_V2.0\_es

IF-2018-62771606-APN-~~DA~~<sup>DA</sup>0101A-PRIMOVAT

Página 11 de 11

Farmacéutica - M.N. 11251 M.P. 20286  
Co-Directora Técnica / Apoderada  
JANSSEN CILAG FARMACEUTICA S.A.

IF-2019-10338196-APN-DERMA-PRIMOVAT

Página 11 de 11





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2019-10238196-APN-DERM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Martes 19 de Febrero de 2019

**Referencia:** EX-2018-62526556- Inf Pac Uptravi.

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 11 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.02.19 17:31:18 -0300

Analia Claudia Sabattini  
Profesional de la Salud  
Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,  
serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.02.19 17:31:19 -0300

Producto: UPTRAVI®  
Nro de registro: 58.818



## GUÍA PARA EL AJUSTE DE DOSIS

### Página 1

**UPTRAVI®  
SELEXIPAG  
Comprimidos recubiertos**

**Guía para el ajuste de la dosis**

**Inicio del tratamiento con UPTRAVI®**

Por favor, lea el prospecto adjunto antes de empezar el tratamiento.

### Página 2

**Índice**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ¿Cómo tomar UPTRAVI®?.....            | 4  |
| ¿Cómo aumentar la dosis?.....         | 6  |
| ¿Cuáles son las fases?.....           | 8  |
| ¿Cuándo debe disminuir la dosis?..... | 10 |
| Disminución de la dosis.....          | 12 |

### Página 3

|  |    |
|--|----|
| Cambio a la dosis de mantenimiento.....      | 14 |
| Si olvida tomar UPTRAVI®.....                | 16 |
| Si interrumpe el tratamiento con UPTRAVI®... | 17 |
| Diario para el ajuste de la dosis.....       | 18 |

### Página 4

**¿Cómo tomar UPTRAVI®?**

UPTRAVI® es un medicamento que se debe tomar **por la mañana y por la noche** para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar, también denominada HAP.

La dosis inicial de UPTRAVI® es de 200 microgramos **por la mañana y por la noche**.

La primera toma de UPTRAVI® se debe realizar por la noche.

Debe tomar cada dosis con un vaso de agua, preferentemente durante las comidas.

**Hay 2 fases de tratamiento con UPTRAVI®:**

**Ajuste de la dosis**  
Durante las primeras semanas, su médico necesitará su colaboración para hallar la dosis de UPTRAVI® más adecuada para usted. Su médico puede aumentarle la dosis a partir de la dosis inicial. Su médico puede disminuirle la dosis. Este proceso se conoce como ajuste de la dosis, y permite a su cuerpo adaptarse gradualmente al medicamento.

**Mantenimiento**  
Una vez su médico haya encontrado la dosis adecuada para usted, esta será la dosis que tomará de forma habitual. Esta se denomina dosis de mantenimiento.

Specialist: SF

HA approval date:

MAF revision: LA

QC: MEG

AR\_SELE\_FCT\_PT\_EUPI Sep-18\_V2.0.es

IF-2018-62771606-APN-DGA#ANMAT

CLAUDIA BRUNO MAGNASCIO  
FARMACIA  
Co-Directora Técnica / Apoderada  
JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA S.A.

Página 1 de 7

IF-2019-10238337-APN-DERM#ANMAT

Página 1 de 7

**Página 6**

**¿Cómo aumentar la dosis?**

El tratamiento empezará a una dosis de 200 microgramos por la mañana y por la noche, y tras discutirlo con su médico aumentará la dosis hasta la siguiente fase.

La primera toma de la dosis aumentada se debe realizar por la noche. Cada fase de ajuste suele durar aproximadamente 1 semana. Puede tardar varias semanas en encontrar la dosis adecuada para usted.

**El objetivo es alcanzar la dosis más adecuada para su tratamiento.**

Esta dosis será su dosis de mantenimiento.


**Página 7**

**Cada paciente con HAP es distinto. No todos los pacientes acabarán teniendo la misma dosis de mantenimiento.**

Algunos pacientes podrán tomar 200 microgramos por la mañana y por la noche como dosis de mantenimiento, mientras que otros alcanzarán la dosis máxima de 1.600 microgramos por la mañana y por la noche.

Otros pueden alcanzar una dosis de mantenimiento en algún punto entre ambas. Lo importante es alcanzar la dosis más adecuada para su propio tratamiento.

**Página 8**



**Página 9**

**Página 10**

**¿Cuándo debe disminuir la dosis?**

Como con todos los medicamentos, puede experimentar efectos adversos a medida que aumenta la dosis de UPTRAVI®.

Consulte a su médico si presenta efectos adversos. Hay tratamientos disponibles para ayudarle a aliviarlos.

Los efectos adversos más frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas) que puede experimentar mientras toma UPTRAVI® son:

- Dolor de cabeza • Diarrea • Náuseas • Vómitos
- Dolor mandibular • Dolor muscular • Dolor en las extremidades inferiores • Dolor articular • Enrojecimiento facial

Consulte el prospecto para obtener la lista completa de los efectos adversos e información adicional.

**Página 11**

Si no puede tolerar los efectos adversos incluso después de que su médico los haya intentado tratar, puede que le recomiende que disminuya la dosis.

**Si su médico le indica que disminuya la dosis, tome un comprimido de 200 microgramos menos por la mañana y otro menos por la noche.**

Únicamente debe disminuir la dosis tras consultar con su médico. Este proceso de disminución de la dosis le ayudará a encontrar la dosis adecuada para usted, también denominada dosis de mantenimiento.

Specialist: SF

HA approval date:

MAF revision: LA

QC: MEG


AR\_SELE\_FCT\_PT\_EUPL Sep-18\_V2.0.es

IF-2018-62771606-APN-DERMA#ANMAT

CLAUDIA BRUNO MARIASCO  
Farmacéutica - M.N. 11/2011 P. 2026  
C/Alameda, 11 - 08002 Barcelona  
JANSSEN-BIORG FARMACÉUTICA S.A.

Página 12

Página 13



Página 14

Página 15

**Cambio a la dosis de mantenimiento**

La dosis más alta que pueda tolerar durante la fase de ajuste de la dosis se convertirá en su **dosis de mantenimiento**. Su dosis de mantenimiento es la dosis que debe seguir tomando de forma habitual.

Por ejemplo, si su dosis más alta tolerada durante la fase de ajuste de la dosis fue de 1.200 microgramos una vez por la mañana y otra por la noche:



Con el tiempo, su médico puede ajustar su dosis de mantenimiento si fuera necesario.

Página 16

Página 17

**Si olvida tomar UPTRAVI®**

Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde, y a continuación siga tomando los comprimidos en el horario habitual. En caso de que se acuerde en las 6 horas previas a la hora en que debería tomar la siguiente dosis, debe dejar de tomar la dosis olvidada y continuar tomando el medicamento en el horario habitual.  
**No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.**

**Si interrumpe el tratamiento con UPTRAVI®**

No deje de tomar UPTRAVI®, salvo que su médico se lo indique. Si, por alguna razón, deja de tomar UPTRAVI® durante más de 3 días consecutivos (si ha olvidado 6 dosis seguidas o más), **contacte con su médico inmediatamente, ya que puede tener que ajustar la dosis para evitar los efectos adversos.**

Su médico puede decidir volver a empezar el tratamiento a una dosis inferior, para incrementarla gradualmente hasta alcanzar su dosis de mantenimiento previa.

Specialist: SF

HA approval date:

MAF revision: LA

QC: MEG

AR\_SEL\_FCT\_PT\_EUPI Sep-18 V2.0 es

IF-2018-6277 T606-APN-DGAFANMAT

CLAUDIA BRUNO MAGRASCÓ  
 CO-DIRECTORA TÉCNICA / Aprobada  
 PÁGINA 8 DE 8 - JANSSEN PHARMACEUTICALS DE ESPAÑA S.A.

IF-2019-10238337-APN-DERM#ANMAT

**Página 18**

**Diario para el ajuste de la dosis**

**Lea detenidamente las instrucciones contenidas en el prospecto.**

Las siguientes páginas del diario le ayudarán a mantener un registro del número de comprimidos que debe tomar por la mañana y por la noche durante el ajuste de la dosis.

Utilícelas para anotar el número de comprimidos que toma por la mañana y por la noche.

Cada fase suele durar aproximadamente 1 semana, salvo que su médico le indique lo contrario. Si las fases de ajuste de la dosis duran más de una semana, dispone de páginas adicionales en su diario para registrarlo.

● Utilice las páginas 20 a 27 para registrar las primeras semanas de tratamiento, cuando recibe únicamente comprimidos de 200 microgramos (fases 1-4).

● Si le han recetado comprimidos tanto de 200 como de 800 microgramos, utilice las páginas 30 a 37. (fases 5-8)

**Página 19**

**Recuerde comunicarse con su médico especialista en HAP de forma regular.**

Anote las indicaciones de su médico:

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Teléfono del médico: .....

Correo electrónico del médico: .....

Notas:

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Página 20**

**1** 1ª DE SEMANA Escribe cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. **Háblle con tu médico el** \_\_\_\_\_  
**Fecha:** \_\_\_\_\_

**Mañana** 200  microgramos

**Noche** 200  microgramos

La primera vez que tome Upravi deberá ser por la noche

**Página 21**

**20** 2ª DE SEMANA Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda. Escribe cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. **Háblle con tu médico el** \_\_\_\_\_  
**Fecha:** \_\_\_\_\_

**Mañana** 200  microgramos

**Noche** 200  microgramos

La primera vez que tome una dosis aumentada de Upravi deberá ser por la noche

Specialist: SF

HA approval date:

MAF revision: LA

QC: MEG

AR\_SELE\_FCT\_PT\_EUPL Sep-18 V2.0.es


CLAUDIA BRUNO MAGNASCIO  
 APN-DGA#ANMAT 0286  
 Co-Directora Técnica y Apoyada  
 JANSSEN-CILAC FARMACEUTICA S.A.


IF-2019-10238337-APN-DERM#ANMAT  
 Página 168 de 317

**Página 22**

**N.º DE SEMANA** Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda.  
 Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Hable con su médico si \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_


**Mañana**  200 microgramos


**Noche**  200 microgramos

**Página 23**

**N.º DE SEMANA** Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda.  
 Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Hable con su médico si \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Mañana**  200 microgramos


**Noche**  200 microgramos


Pase a la página 26 si su médico le receta los comprimidos de 800 microgramos

**Página 24**

**N.º DE SEMANA** Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda.  
 Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Hable con su médico si \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Mañana**  200 microgramos


**Noche**  200 microgramos


Pase a la página 26 si su médico le receta los comprimidos de 800 microgramos

**Página 25**

**N.º DE SEMANA** Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda.  
 Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Hable con su médico si \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Mañana**  200 microgramos


**Noche**  200 microgramos


Pase a la página 26 si su médico le receta los comprimidos de 800 microgramos

**Página 26**

**N.º DE SEMANA** Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda.  
 Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Hable con su médico si \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Mañana**  200 microgramos


**Noche**  200 microgramos


Pase a la página 28 si su médico le receta los comprimidos de 800 microgramos

**Página 27**

**N.º DE SEMANA** Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda.  
 Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Hable con su médico si \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**Mañana**  200 microgramos


**Noche**  200 microgramos


Pase a la página 28 si su médico le receta los comprimidos de 800 microgramos

**Página 28**

Utilice las siguientes páginas del diario si su médico le receta comprimidos de 800 microgramos además de los comprimidos de 200 microgramos.

En las páginas del diario, compruebe que ha tomado un comprimido de 800 microgramos cada día por la mañana y por la noche junto con el número de comprimidos de 200 microgramos que se le ha recetado.

 Comprimido de 200 microgramos

 Comprimido de 800 microgramos (utilice uno de la foto si a la hora de reducir el número de comprimidos el día se indica (una por noche))

**Página 29**

Recuerde comunicarse con su médico especialista en HAP de forma regular.

Anote las indicaciones de su médico:  
 .....

Teléfono del médico: .....

Correo electrónico del médico: .....

Notas:  
 .....

Specialist: SF  
 HA approval date:

MAF revision: LA  
 QC: MEG  
 AR\_SELE\_FCT\_PT\_EUPI Sep-18\_V2.0 es  
 IF-2018-62771606-APN-DERM#ANMAT  
 IF-2019-10338337-APN-DERM#ANMAT  
 Página 5 de 7

Producto: UPIRAVI™  
Nro de registro: 58.818



Página 30

N.º DE SEMANA: \_\_\_\_\_  
Añote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda.  
Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Hable con mi médico si: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

|        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 200 microgramos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Noche  | 800 microgramos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Página 31

N.º DE SEMANA: \_\_\_\_\_  
Añote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda.  
Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Hable con mi médico si: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

|        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 200 microgramos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Noche  | 800 microgramos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Página 32

N.º DE SEMANA: \_\_\_\_\_  
Añote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda.  
Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Hable con mi médico si: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

|        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 200 microgramos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Noche  | 800 microgramos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Página 33

N.º DE SEMANA: \_\_\_\_\_  
Añote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda.  
Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Hable con mi médico si: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

|        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 200 microgramos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Noche  | 800 microgramos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Página 34

N.º DE SEMANA: \_\_\_\_\_  
Añote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda.  
Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Hable con mi médico si: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

|        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 200 microgramos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Noche  | 800 microgramos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Página 35

N.º DE SEMANA: \_\_\_\_\_  
Añote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda.  
Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Hable con mi médico si: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

|        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 200 microgramos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Noche  | 800 microgramos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Página 36

N.º DE SEMANA: \_\_\_\_\_  
Añote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda.  
Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Hable con mi médico si: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

|        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 200 microgramos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Noche  | 800 microgramos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Página 37

N.º DE SEMANA: \_\_\_\_\_  
Añote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda.  
Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Hable con mi médico si: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_


|        |                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | 200 microgramos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Noche  | 800 microgramos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Specialist: SF  
HA approval date:

MAF revision: LA  
QC: MEG  
AR\_SELE\_FCT\_PT\_EUPI Sep-18\_V2.0 es

IF-2018-62771606-APN-DGWA#ANMAT  
Página 6 de 7  
FARMACIA - M.N. 14251 M.P. 20086  
CALLE 19 DE ABRIL 1000 / APODERADA  
JANSSEN ORLAC FARMACEUTICA S.A.  
IF-2019-19238337-APN-DERM#ANMAT  
Página 6 de 7

Producto: UPIRAVI<sup>™</sup>  
Nro de registro: 58.818



Página 38

Página 39

|       |  |
|-------|--|
| Notas | Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°: 58.818<br>Elaborado por: Excella GmbH & Co. KG, Nuernberger Strasse 12, 90537 Feucht, Alemania<br>Acondicionado por: Allpack Group AG Pfeffingerstrasse 45, 4153 Reinach, Suiza<br>Acondicionado secundario alternativo: JANSSEN CILAG Farmacéutica S.A., Ruta 8, Km 63.5, Localidad de Fátima, Pilar, Buenos Aires, Argentina<br>Importado por: JANSSEN CILAG Farmacéutica S.A., Mendoza 1259 - C1428DJG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina<br>Directora Técnica: Georgina Rodríguez, Farmacéutica-Bioquímica<br><b>Centro de atención al cliente:</b><br>Por correo electrónico:<br><a href="mailto:infojanssen@janar.jnj.com">infojanssen@janar.jnj.com</a><br>Por teléfono: 0800-122-0238<br>Fecha de última revisión:<br>© Marca Registrada |
|-------|--|

**Nota: La presente Guía para el Ajuste de la Dosis se incluirá en la caja de UPTRAVI<sup>®</sup> 200 mcg x 140 comprimidos recubiertos junto al Prospecto.**

Specialist: SF

HA approval date:

MAF revision: LA

QC: MEG

AR\_SELE\_FCT\_PT\_EUPI Sep-18\_V2.0.es

IF-2018-62771606-APN-DGA#ANMAT

*CLAUDIA BRUNO MAGNASCIO*  
Farmacéutica - Uta Técnica / Apoderada  
Página 7 de 7  
JANSSEN CILAG FARMACÉUTICA S.A.

IF-2019-10238337-APN-DERM#ANMAT  
Página 171 de 311





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2019-10238337-APN-DERM#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Martes 19 de Febrero de 2019

**Referencia:** EX-2018-62526556- Inf Pac guia ajuste dosis Upravi

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.02.19 17:31:46 -0300

Analia Claudia Sabattini  
Profesional de la Salud  
Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,  
serialNumber=CUIT 30715117564  
Date: 2019.02.19 17:31:47 -0300