



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

"2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres"

DISPOSICIÓN N° **3716**

BUENOS AIRES, 08 MAY 2015

VISTO el Expediente N° 1-0047-0000-009826-13-1 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A., solicita la aprobación de nuevos proyectos de prospectos y la nueva presentación de venta para la Especialidad Medicinal denominada GAVISCON / ALGINATO DE SODIO - BICARBONATO DE SODIO - CARBONATO DE CALCIO Forma farmacéutica y concentración: SUSPENSION ORAL EN SACHETS, ALGINATO DE SODIO 500 mg - BICARBONATO DE SODIO 267 mg - CARBONATO DE CALCIO 160 mg, COMPRIMIDOS MASTICABLES, ALGINATO DE SODIO 250 mg - BICARBONATO DE SODIO 133,5 mg - CARBONATO DE CALCIO 80 mg; aprobada por Certificado N° 55.329.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición N°: 753/12.

ff  
Rg



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° 3716

Que lo solicitado se encuadra dentro de los alcances de la Disposición N°: 855/89, de la Ex-Subsecretaría de Regulación y Control sobre autorización automática para la nueva presentación de venta.

Que los procedimientos para las modificaciones y/o rectificaciones de los datos característicos correspondientes a un certificado de Especialidad Medicinal otorgado en los términos de la Disposición ANMAT N° 5755/96, se encuentran establecidos en la Disposición ANMAT N° 6077/97.

Que a fojas 119 obra el informe técnico favorable de la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros.: 1.490/92 y 1886/14.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Autorízase a la firma RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A., propietaria de la Especialidad Medicinal denominada GAVISCON / ALGINATO DE SODIO - BICARBONATO DE SODIO - CARBONATO DE CALCIO Forma farmacéutica y concentración: SUSPENSION ORAL EN

flp  
flp  
y



*Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.7.*

DISPOSICIÓN N° **3716**

SACHETS, ALGINATO DE SODIO 500 mg - BICARBONATO DE SODIO 267 mg - CARBONATO DE CALCIO 160 mg, la nueva presentación de envases, según consta en el Anexo de Autorización de Modificaciones.

ARTICULO 2º.- Autorízase el cambio de prospectos presentado para la Especialidad Medicinal denominada GAVISCON / ALGINATO DE SODIO - BICARBONATO DE SODIO - CARBONATO DE CALCIO Forma farmacéutica y concentración: SUSPENSION ORAL EN SACHETS, ALGINATO DE SODIO 500 mg - BICARBONATO DE SODIO 267 mg - CARBONATO DE CALCIO 160 mg, COMPRIMIDOS MASTICABLES, ALGINATO DE SODIO 250 mg - BICARBONATO DE SODIO 133,5 mg - CARBONATO DE CALCIO 80 mg, aprobada por Certificado N° 55.329 y Disposición N° 0083/10, propiedad de la firma RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A., cuyos textos constan de fojas 92 a 118.

ARTICULO 3º. - Sustitúyase en el Anexo II de la Disposición autorizante ANMAT N° 0083/10 los prospectos autorizados por las fojas 92 a 100, de las aprobadas en el artículo 1º, los que integrarán el Anexo de la presente.

ARTICULO 4º. - Acéptase el texto del Anexo de Autorización de modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado N° 55.329 en los términos de la Disposición ANMAT N° 6077/97.

RP  
EP. d



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº **3716**

ARTICULO 5º. - Regístrese; por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la copia autenticada de la presente disposición conjuntamente con los rótulos, prospectos y Anexos, gírese a la Dirección de Gestión de información técnica a los fines de confeccionar el legajo correspondiente, Cumplido, Archívese.

EXPEDIENTE Nº 1-0047-0000-009826-13-1

DISPOSICIÓN Nº **3716**

Jfs

FL  
Rp. ✓

Ing. ROGELIO LOPEZ  
Administrador Nacional  
A.N.M.A.T.



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.7.

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N°.....**3716** a los efectos de su anexo en el Certificado de Autorización de Especialidad Medicinal N° 55.329 y de acuerdo a lo solicitado por la firma RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A., del producto inscripto en el registro de Especialidades Medicinales (REM) bajo:

Nombre comercial / Genérico/s: GAVISCON / ALGINATO DE SODIO - BICARBONATO DE SODIO - CARBONATO DE CALCIO Forma farmacéutica y concentración: SUSPENSION ORAL EN SACHETS, ALGINATO DE SODIO 500 mg - BICARBONATO DE SODIO 267 mg - CARBONATO DE CALCIO 160 mg, COMPRIMIDOS MASTICABLES, ALGINATO DE SODIO 250 mg - BICARBONATO DE SODIO 133,5 mg - CARBONATO DE CALCIO 80 mg.-

Disposición Autorizante de la Especialidad Medicinal N° 0083/10.

Tramitado por expediente N° 1-47-0000-011776-08-4.

DATO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION AUTORIZADA
Prospectos.	Anexo de Disposición N° 0083/10.	Prospectos de fs. 92 a 118, corresponde desglosar de fs. 92 a 100.
Nueva presentación de venta	Suspensión: 8, 12, 24, 32, 36 y 48 sachets de 10 ml. Suspensión: 100, 150 y 200 ml.	Suspensión: 8, 12 y 24 sachets de 10 ml. Suspensión: 100, 150 y 200 ml.

FP  
Bo  
f



Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas,  
Regulación e Institutos  
A.N.M.A.T.

	Comprimidos masticables: 8, 16 y 18 unidades. Cajas conteniendo 3, 4, 6 y 8 blísters con 6/8 comprimidos masticables.	Comprimidos masticables: 8, 16, 18 y 24 unidades.
--	--	---

El presente sólo tiene valor probatorio anexado al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del REM a la firma RECKITT BENCKISER ARGENTINA S.A., Titular del Certificado de Autorización Nº 55.329 en la Ciudad de Buenos Aires, a los días.....,del mes de..... **08 MAY 2015**

Expediente Nº 1-0047-0000-009826-13-1

DISPOSICIÓN Nº

**3716**

Jfs

RP  
Kp.

  
Ing. ROGELIO LOPEZ  
Administrador Nacional  
A.N.M.A.T.

08 MAY 2015

HEALTH • HYGIENE • HOME



ORIGINAL

**PROYECTO DE PROSPECTO**

**GAVISCON**

**SUSPENSIÓN ORAL EN SACHETS**

3716

ALGINATO DE SODIO  
BICARBONATO DE SODIO  
CARBONATO DE CALCIO

Suspensión Oral sabor a Menta  
Industria Inglesa  
VENTA LIBRE  
Contenido: 12 sachets de 10 ml

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

**¿QUÉ CONTIENE GAVISCON?**

Cada sachet de 10 ml de suspensión oral contiene:

Ingredientes activos: alginato de sodio 500 mg, bicarbonato de sodio 267 mg, carbonato de calcio 160 mg.  
Ingredientes inactivos: carbomer 974P, metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica, esencia de menta, hidróxido de sodio, agua.

**ACCIÓN:** Alivia la acidez gástrica

**¿PARA QUÉ SE USA GAVISCON?**

Gaviscon está indicado para el alivio de los trastornos digestivos asociados a desordenes de la ingesta.

**¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR GAVISCON?**


NO USE este medicamento:


- si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes.
- si tiene enfermedad o sufre de cálculos renales, enfermedad del hígado o enfermedad del corazón.
- si tiene los niveles de calcio en sangre elevados o los niveles de fosfato en sangre bajos.

**¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

Si usted:

- está siguiendo una dieta baja en sodio. Cada sachet contiene 141 mg de sodio

  
Farm DIEGO ALBERTO DIAZ  
Co Director Técnico  
M.P. 19120  
Reckitt Benckiser Argentina S.A.

  
Farm ROMINA LAURA MAGA  
DIRECTORA TÉCNICA - APODERADA  
M.N. 13904 M.P. 17346  
Reckitt Benckiser Argentina S.A.

FP

**ORIGINAL**



- está siguiendo un tratamiento por hipercalcemia (aumento de calcio en sangre), nefrocalcinosis (depósito de calcio en el riñón) o cálculos renales recurrentes. Cada sachet contiene 160 mg de carbonato de calcio
- tiene problemas de insuficiencia cardíaca, renal y/o hepática
- Si está recibiendo otro medicamento.
- Está embarazada o dando pecho a su bebé.

3710

Consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

### **¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?**

Como Gaviscon puede interferir con algunos medicamentos, después de tomarlo, debe esperar 2 horas antes de tomar otro medicamento por vía oral. Si ha tomado otro medicamento, antes de tomar Gaviscon debe esperar de 1 a 2 horas para obtener el máximo beneficio del tratamiento con el otro medicamento.

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como reacción alérgica, por ejemplo urticaria (ronchas rojizas en la piel) y/o dificultad para respirar, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Se debe tener cuidado en el tratamiento de pacientes con hipercalcemia, nefrocalcinosis y cuadros de cálculos renales reiterados.

SI LA ACIDEZ PERSISTE POR MÁS DE 3 DÍAS, O EMPEORA, CONSULTE A SU MÉDICO.

### **¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?**

Para administración oral. Agítese bien el sachet antes de abrir.

Adultos y niños mayores de 12 años: Tomar el contenido de 1 sachet después de las comidas y por la noche al acostarse. Dosis diaria máxima: 4 sachets. No consumir por más de 7 días.

### **¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?**

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

- Centro Nacional de Toxicología: Tel: 0-800-333-0160
- Servicio de Toxicología Hospital de Niños La Plata. Tel.: 0-800-222-9911.

### **¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?**

Llame al Servicio de Atención al Consumidor de Reckitt Benckiser Argentina S.A. (llamada gratuita): 0-800-333-0085.

ANMAT Responde: 0800-333-1234.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

### **FORMA DE CONSERVACIÓN:**

No almacenar a temperaturas mayores a 25°C. No almacenar en heladera o freezer.

Farm. DIEGO ALBERTO DÍAZ  
Co Director Técnico  
M.P. 19120  
Reckitt Benckiser Argentina S.A.

Farm. ROMINA LAURA MAGA  
DIRECTORA TÉCNICA - APODERADA  
M.N. 13904 M.P. 17346  
Reckitt Benckiser Argentina S.A.

FP



ORIGINAL



**Elaborado en:** Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Hull, Reino Unido.

**Importado por:** Reckitt Benckiser Argentina S.A. Ruta Provincial 36 N° 8300, entre 1236 y Diagonal Perito Moreno, Ing. Allan (1890), Partido de Florencio Varela, Bs. As.

**Directora Técnica:** Romina L. Maga, Farmacéutica.

**Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 55329**

**Ultima revisión del prospecto Disposición ANMAT N° fecha:**

**Presentaciones:** Estuche conteniendo 12 sachets de 10 ml cada uno.

LOTE:

VENC:

Nota: Igual texto llevarán las presentaciones conteniendo 8 y 24 sachets de 10 ml.

Farm. DIEGO ALBERTO DIAZ  
Co Director Técnico  
M.P. 19120  
Reckitt Benckiser Argentina S.A.

Farm. ROMINA LAURA MAGA  
DIRECTORA TÉCNICA - APODERADA  
M.N. 13904 M.P. 17346  
Reckitt Benckiser Argentina S.A.

fp

ORIGINAL

HEALTH · HYGIENE · HOME



PROYECTO DE PROSPECTO

GAVISCON

COMPRIMIDOS MASTICABLES

3718

ALGINATO DE SODIO

BICARBONATO DE SODIO

CARBONATO DE CALCIO

Comprimidos Masticables sabor a Menta

Industria Inglesa

VENTA LIBRE

Contenido: 8 Comprimidos masticables

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

**¿QUÉ CONTIENE GAVISCON?**

Cada comprimido masticable contiene:

Ingredientes activos: alginato de sodio 250 mg, bicarbonato de sodio 133,5 mg, carbonato de calcio 80 mg.

Ingredientes inactivos: manitol, aspartame, estearato de magnesio, macrogol 20000, copovidona, esencia de menta, acesulfame potásico.

**ACCIÓN:** Alivia la acidez gástrica.

**¿PARA QUÉ SE USA GAVISCON?**

Gaviscon está indicado para el alivio de los trastornos digestivos asociados a desorden de la ingesta.

**¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR GAVISCON?**

NO USE este medicamento:

- si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes.
- si tiene enfermedad o sufre de cálculos renales, enfermedad del hígado o enfermedad del corazón.
- si tiene los niveles de calcio en sangre elevados o los niveles de fosfato en sangre bajos.
- Fenilcetonúricos: contiene fenilalanina.

**¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**


Si usted:

- está siguiendo una dieta baja en sodio
- está siguiendo un tratamiento por hipercalcemia (aumento de calcio en sangre), nefrocalcinosis (depósito de calcio en el riñón) o cálculos renales recurrentes

Farm. DIEGO ALBERTO DIAZ  
Co Director Técnico  
M.P. 19120  
Reckitt Benckiser Argentina S.A.

Farm. ROMANA LAURA MAGA  
DIRECTORA TÉCNICA - APODERADA  
P.N. 13904 M.P. 17346  
Reckitt Benckiser Argentina S.A.

**ORIGINAL**



**3716**

- tiene problemas de insuficiencia cardíaca, renal y/o hepática
- recibe algún otro medicamento.
- está embarazada o dando pecho a su bebé,

Consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

### ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Como Gaviscon puede interferir con algunos medicamentos, después de tomarlo, debe esperar 2 horas antes de tomar otro medicamento por vía oral. Si ha tomado otro medicamento, antes de tomar Gaviscon debe esperar de 1 a 2 horas para obtener el máximo beneficio del tratamiento con el otro medicamento. Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como reacciones alérgicas, por ejemplo urticaria (ronchas rojizas en la piel) y/o dificultad para respirar, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Se debe tener cuidado en el tratamiento de pacientes con hipercalcemia, nefrocalcinosis y cuadros de cálculos renales reiterados.

SI LA ACIDEZ PERSISTE POR MÁS DE 3 DÍAS, O EMPEORA, CONSULTE A SU MÉDICO.

### ¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Para administración oral. Mastique bien el comprimido antes de tragar. Adultos y niños mayores de 12 años: 2 comprimidos después de las comidas y por la noche al acostarse. Dosis diaria máxima: 8 comprimidos masticables. No consumir por más de 7 días.

### ¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

- Centro Nacional de Toxicología: Tel: 0-800-333-0160
- Servicio de Toxicología Hospital de Niños La Plata. Tel.: 0-800-222-9911.

### ¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Llame al Servicio de Atención al Consumidor de Reckitt Benckiser Argentina S.A. (llamada gratuita): 0-800-333-0085.

ANMAT Responde: 0800-333-1234.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**


### FORMA DE CONSERVACIÓN:

No almacenar a temperaturas mayores a 30°C.

**Elaborado en:** Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Hull, Reino Unido.

**Importado por:** Reckitt Benckiser Argentina S.A. Ruta Provincial 36 N° 8300, entre 1236 y Diagonal Perito Moreno, Ing. Allan (1890), Partido de Florencio Varela, Bs. As.

  
Farm. DR. ALBERTO DIAZ  
Co. Director Técnico  
M.P. 19120  
Reckitt Benckiser Argentina S.A.

  
Farm. ROMINA LAURA MAGA  
DIRECTORA TÉCNICA - APODERADA  
M. N. 13904 / M. P. 17346  
Reckitt Benckiser Argentina S.A.

ORIGINAL



Directora Técnica: Romina L. Maga, Farmacéutica.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 55329

Última revisión del prospecto, Disposición ANMAT N°:      fecha:

57 8 8

Presentaciones: Estuche conteniendo 8 comprimidos masticables.

LOTE:

VENC:


Nota: Igual texto llevarán las presentaciones conteniendo 16, 18 y 24 comprimidos masticables.

Farm DIEGO ALBERTO DIAZ  
Co Director Técnico  
M.P. 19120  
Reckitt Benckiser Argentina S.A.

Farm. ROMINA LAURA MAGA  
DIRECTORA TÉCNICA APODERADA  
M.N. 13904 M.P. 17346  
Reckitt Benckiser Argentina S.A.

ff

ORIGINAL



**PROYECTO DE PROSPECTO**

**GAVISCON**

**SUSPENSIÓN ORAL**

ALGINATO DE SODIO  
BICARBONATO DE SODIO  
CARBONATO DE CALCIO

Suspensión oral sabor a Menta

Industria Inglesa

VENTA LIBRE

Contenido: 150 ml

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

**¿QUÉ CONTIENE GAVISCON?**

Cada 10 ml de suspensión oral contiene:

Ingredientes activos: alginato de sodio 500 mg, bicarbonato de sodio 267 mg, carbonato de calcio 160 mg.

Ingredientes inactivos: carbomer 974P, metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica, esencia de menta, hidróxido de sodio, agua.

**ACCIÓN:** Alivia la acidez gástrica.

**¿PARA QUÉ SE USA GAVISCON?**

Gaviscon está indicado para el alivio de los trastornos digestivos asociados a desordenes de la ingesta.

**¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR GAVISCON?**

NO USE este medicamento:

- si usted sabe que es alérgico a alguno de los ingredientes.
- si tiene enfermedad o sufre de cálculos renales, enfermedad del hígado o enfermedad del corazón.
- si tiene los niveles de calcio en sangre elevados o los niveles de fosfato en sangre bajos.


**¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

Si usted:

- está siguiendo una dieta baja en sodio. Cada 10 ml contiene 141 mg de sodio

AP

  
Farm. DIEGO ALBERTO DIAZ  
Co Director Técnico  
M.P. 19120  
Reckitt Benckiser Argentina S.A.

  
Farm. ROXANA LAURA MAGA  
DIRECTORA TÉCNICA - APODERADA  
M.N. 13904 M.P. 17346  
Reckitt Benckiser Argentina S.A.

**ORIGINAL**

HEALTH · HYGIENE · HOME



- está siguiendo un tratamiento por hipercalcemia (aumento de calcio en sangre), nefrocalcinosis (depósito de calcio en el riñón) o cálculos renales recurrentes. Cada 10 ml contiene 160 mg de carbonato de calcio
- tiene problemas de insuficiencia cardíaca, renal y/o hepática
- recibe algún otro medicamento.
- está embarazada o dando pecho a su bebé

3716

Consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

### ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Como Gaviscon puede interferir con algunos medicamentos, después de tomarlo, debe esperar 2 horas antes de tomar otro medicamento por vía oral. Si ha tomado otro medicamento, antes de tomar Gaviscon debe esperar de 1 a 2 horas para obtener el máximo beneficio del tratamiento con el otro medicamento.

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como reacción alérgica, por ejemplo urticaria (ronchas rojizas en la piel) y/o dificultad para respirar, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal.

Se debe tener cuidado en el tratamiento de pacientes con hipercalcemia, nefrocalcinosis y cuadros de cálculos renales reiterados.

SI LA ACIDEZ PERSISTE POR MÁS DE 3 DÍAS, O EMPEORA, CONSULTE A SU MÉDICO.

### ¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Para administración oral. Agítese bien antes de usar.

Adultos y niños mayores de 12 años: tomar de 10 ml (2 cucharaditas de té de 5 ml) después de las comidas y al acostarse. Dosis diaria máxima: 40 ml. No consumir por más de 7 días.

Controlar que la tapa no esté dañada antes de utilizar este medicamento.

### ¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.

- Centro Nacional de Toxicología: Tel: 0-800-333-0160
- Servicio de Toxicología Hospital de Niños La Plata. Tel.: 0-800-222-9911.


### ¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?


Llame al Servicio de Atención al Consumidor de Reckitt Benckiser Argentina S.A. (llamada gratuita): 0-800-333-0085

ANMAT Responde: 0800-333-1234

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

  
Farm. DIEGO ALBERTO DIAZ  
Co Director Técnico  
M.P. 19120  
Reckitt Benckiser Argentina S A

  
Farm. ROBERTA LAURA MAGA  
DIRECTORA TÉCNICA - APODERADA  
M.N. 13904 M.P. 17346  
Reckitt Benckiser Argentina S.A.

ORIGINAL

HEALTH · HYGIENE · HOME



3716

**FORMA DE CONSERVACIÓN:**

No almacenar a temperaturas mayores a 30°C. No almacenar en heladera o freezer.

**Elaborado en:** Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Hull, Reino Unido.

**Importado por:** Reckitt Benckiser Argentina S.A. Ruta Provincial 36 N° 8300, entre 1236 y Diagonal Perito Moreno, Ing. Allan (1890), Partido de Florencio Varela, Bs. As.

**Directora Técnica:** Romina L. Maga, Farmacéutica.

**Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 55329**

**Ultima revisión del prospecto Disposición ANMAT N° ..... fecha .....**


**Presentaciones:** Frascos conteniendo 150 ml.


LOTE:

VENC:

Nota: Igual texto llevarán los envases conteniendo 100 ml y 200 ml.

ff

  
Farm. DIEGO ALBERTO DIAZ  
Co Director Técnico  
M.P. 19120  
Reckitt Benckiser Argentina S.A.

  
Farm. ROMINA LAURA MAGA  
DIRECTORA TÉCNICA - APODERADA  
M.N. 13904 M.P. 17346  
Reckitt Benckiser Argentina S.A.