



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 5096

BUENOS AIRES, 05 MAY 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-13381-15-9 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma S.C JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C. solicita la inscripción del producto denominado Tabletas termoevaporables contra mosquitos, marca FUYI, como producto domisanitario, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 255 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de Diciembre 2015.

LD

28-

7



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN Nº 5096

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Inscribáse ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto denominado Tabletas termoevaporables contra mosquitos, marca FUYI, de acuerdo con lo solicitado por la firma S.C JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C.; con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) Nº 010040444, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD Nº 0250549, que forma parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Autorízanse los rótulos de fs. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTICULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs.7, 12 y 13.

ARTICULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD Nº 0250549.

ARTICULO 5º.- La vigencia del certificado mencionado en el artículo 1º será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente disposición.

ARTICULO 6º.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición,

LD
28.7



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°
5096

del Certificado mencionado en el artículo 1°, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-0000-13381-15-9

DISPOSICION N°

LN
CYO

5096

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250549

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: TABLETAS TERMOEVAPORABLES CONTRA MOSQUITOS
2. Marca: FUYI
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: BUTOXIDO DE PIPERONILO 2,6 % y PRALETRINA 1,5 %
5. Forma de Presentación: FILM DE CELOFAN CONTENIENDO 4 TABLETAS. ESTUCHE DE CARTULINA CONTENIENDO 12, 28 Y 120 TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE 9MG DE PRALETRINA Y 15MG DE BUTOXIDO DE PIPERONILO.
6. Venta: VENTA LIBRE
7. Titular del Producto: S.C. JOHNSON & SON DE ARGENTINA S.A.I.C.
8. Domiciliado en: CALLE 9 Y DEL GASODUCTO - PARQUE INDUSTRIAL PILAR - PILAR - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 010040444
FRACCIONADOR: RNE N° : 020035114 KASEMA S.A.
FRACCIONADOR: RNE N° : 020034622 ESKEA S.R.L.
FRACCIONADOR: RNE N° : 020046809 BLIGRAF S.A.

10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-013381-15-9.

Disposición N°: **5 0 9 6**

Fecha: **0 5 MAY 2016**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

Dr. ROBERTO LEDE
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.

Sello y Firma del Funcionario Responsable

LD
of

Fuyi TABLETAS CONTRA MOSQUITOS

16 NOCHES

NUEVA FÓRMULA

Johnson
A Family Company

Fuyi

TABLETAS CONTRA MOSQUITOS

16 NOCHES



ATENCIÓN CUIDADO. ANTES DE USARLEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS

CONTENIDO NETO:
16 Tabletas Contra Mosquitos y zancudos
INDUSTRIA ARGENTINA
INSECTICIDA. PRODUCTO DE VENTA GENERAL.

Fuyi TABLETAS CONTRA MOSQUITOS

16 NOCHES

Johnson
A Family Company

A family company since 1886
Fuyi

INDUSTRIA ARGENTINA INSECTICIDA. PRODUCTO DE VENTA GENERAL. 16 Tabletas Contra Mosquitos y zancudos. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS. ATENCIÓN CUIDADO. ANTES DE USARLEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS. CONTENIDO NETO: 16 Tabletas Contra Mosquitos y zancudos. INDUSTRIA ARGENTINA INSECTICIDA. PRODUCTO DE VENTA GENERAL.


NUEVA FÓRMULA

Johnson
A Family Company

Fuyi

TABLETAS CONTRA MOSQUITOS

16 NOCHES



817302
7790520016829

CONTENIDO NETO:
16 Tabletas Contra Mosquitos y zancudos
INDUSTRIA ARGENTINA
INSECTICIDA. PRODUCTO DE VENTA GENERAL.

INDUSTRIA ARGENTINA INSECTICIDA. PRODUCTO DE VENTA GENERAL. 16 Tabletas Contra Mosquitos y zancudos. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS. ATENCIÓN CUIDADO. ANTES DE USARLEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DEL ROTULO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMESTICOS. CONTENIDO NETO: 16 Tabletas Contra Mosquitos y zancudos. INDUSTRIA ARGENTINA INSECTICIDA. PRODUCTO DE VENTA GENERAL.

Fam. MARIJA JOSE SANCHEZ
Directora de la Salud
de Producción y Asesoría
A.N.M.A.T.

Fam. Maricel Barbarica
Directora Técnica
M.N. 11471 M.P. 16788
SC Johnson & Son Argentina SAIC

CI. NUSE. AG. G. E. S. E.
A. P. O. D. E. S. A. D. O.
C. I. 8.571.179

1-47-0000-13361-15-9
5096
05 MAY 2016
MESA DE ENTRADA

INSTRUCCIONES DE USO: 1. Retire la tableta del envoltorio. 2. Introduzca la tableta en el aparato. 3. Enchufe el aparato, de modo que la tableta permanezca horizontal. 4. Luego de 10 horas, cuando la tableta pierda el color azul, remueva la tableta usada empujándola con una nueva. 5. Almacene el producto en un lugar fresco y seco. COMPOSICIÓN CADA TABLETA: praletina (CAS N° 23031-36-9) 9 mg y butóxido de piperonilo (CAS N° 51-03-6) 15 mg. Fuyi® y Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Producto elaborado y distribuido en Argentina por: S. C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. Calle 9 y Del Gasoducto - Parque Industrial Pilar - Pilar - Provincia de Buenos Aires. R.N.E. 010040444. Producto autorizado por RNPUD: _____. Importado o distribuido en: Chile: S. C. Johnson & Son Chile Ltda., Av. Del Valle 869, Of. 403, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago, Registro I.S.P. N° _____. Uruguay: S. C. Johnson & Son de Uruguay S.A., Luis Alberto de Herrera 1248, Torre 3, Oficina 1176, Montevideo. Tel 2622-4444 MSP N° _____. Bolivia: DICOM Distribuidores del Oriente S.R.L., Av. Cristo Redentor N° 554, Santa Cruz. Tel. 3-432000, NIT: 1031023028, Reg. San.: _____. Paraguay: S. C. Johnson & Son de Paraguay S.R.L., Eulogio Estigarribia N° 4846, Asunción; Tel. (021) 228321, RUC 80024644-6, Hab. Emp. N° 021/12, Autorizado por la D.N.V.S. Registro Sanitario N° _____. Empacado por (ver letra en el envase): (BG) BLIGRAF S.A. R.N.E. 020046809, (K) KASEMA S.A., R.N.E. 020035114, (B) ESKEA S.R.L., R.N.E. 020034622. Plazo de validez: 2 años a partir de la fecha de elaboración (ver en el envase). Producto de venta general.

A family company
since 1886.

Fisk Johnson

Johnson consultas
Argentina 0-800-555-6467
Chile 800-200013
Uruguay 0-800-5420
Paraguay 0-800-11-7272

www.proteccionfuyi.com.ar
www.johnson.com.ar

1-47-0000-13381-15-9
67-17

81



5096



Farm. Maribel Barberi
Directora Técnica
M.N. 11671 M.P. 16798
SC Johnson & Son Argentina SAIC

CI AUDIO BARREROS
RECORRIDO
21.5.87.1.19

Farm. **MARCELO JOSÉ SANCHEZ**
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
AN.M.A.T.

PRECAUCIONES: PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL. No aplicar sobre alimentos o superficies en contacto con los mismos, utensilios de cocina, plantas o acuarios. No fumar, beber o comer durante su aplicación. No volver a utilizar los envases vacíos. Mantener el producto en su envase original. No toque el repuesto con el aparato conectado. No lo cubra ni introduzca objetos. Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto. No toque la tableta caliente con sus dedos. No toque el aparato con instrumentos metálicos o manos húmedas. Desconecte el aparato cuando no lo esté usando y guardar en un lugar seguro. Enchufar el aparato solamente en toma corrientes que funcionen correctamente donde el dispositivo esté ventilado. No utilizar extensiones de cables ni multi-adaptadores de corriente. No sumergir en agua. Nunca conectar otro dispositivo eléctrico cerca del aparato caliente. Utilizar solamente el producto recomendado para el dispositivo. Este producto no puede ser utilizado en ambientes con poca ventilación, ni en presencia de personas asmáticas o alérgicos respiratorios. Mantener la cabeza a una distancia mínima de 2 metros del punto de liberación del producto. Utilizar solamente en áreas bien ventiladas. No almacenar cerca de alimentos, cocinas o vestimentas. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.** Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto. Este producto no puede ser utilizado en ambientes con poca ventilación, ni en presencia de personas asmáticas o alérgicos respiratorios. Mantener la cabeza a una distancia mínima de 2 metros del punto de liberación del producto. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto directo con el producto, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto directo con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. Su ingestión puede ser fatal. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito. En caso de intoxicación, concurrir al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

INDICACIONES PARA USO MÉDICO: Grupo químico: Piretroides. Nombre común: Praletrina. Sinergista: Butóxido de Piperonilo. Acción tóxica: Disturbios sensoriales cutáneos, hipersensibilidad, neuritis periférica. Antídoto: Antihistaminico y tratamiento sintomático. Clase III OMS Ligeramente peligroso. Uso Doméstico. **CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:** En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160, Ciudad de Bs. As.: Hosp. de Niños Dr. R. Gutiérrez, Tel. (011) 4962-6666/2247. Hosp. de Niños Dr. P. de Elizalde (011) 4300-2115. Pcia. de Bs. As.: Centro Nac. de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas, Tel. (011) 4658-7777/4654-6648. Sala de Toxicología Hosp. de Niños de La Plata, Tel. (0221) 451-5555. Córdoba: Hosp. Municipal de Urgencias, Tel. (0351) 427-6200/434-1201. Rosario: Serv. de Toxicología Sanatorio de Niños, Tel. (0341) 448-0202. En Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Tel. 1722. En Paraguay: Emergencia Médica: Tel. (021) 204-800/532, Centro Nacional de Toxicología: Tel. (021) 220-418. En Chile: Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC): Tel. (02) 2635-3800. Atención 24hs., los 365 días del año. En Bolivia: Emergencias Toxicológicas: Hospital Japonés, Av. Japón e/Paraguá 3er. anillo externo, Santa Cruz Tel. (03) 3-489996. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito.

Farm. **Maricel Barbaricca**
Directora Técnica
M.N. 11471 M.P. 16768
Johnson & Son Argentina SAIC

1-UR-0000-13381-15-8
GT-LD

50961

CLAUDIO SANCHEZ
AFODERADO
C.I. 81871.719



Farm. MARIA JOSÉ SANCHEZ
 Directora de Vigilancia
 de Productos para la Salud
 S.N.M.A.T.

INSTRUCCIONES DE USO: 1. Retire la tableta del **envoltorio**. 2. **Introduzca la tableta** en el aparato. 3. Enchufe el aparato, de modo que la tableta permanezca horizontal. 4. Luego de 10 horas, cuando la **tableta pierda el color azul**, remueva la tableta usada empujándola con una nueva. 5. Almacene el producto en un lugar fresco y seco. **COMPOSICIÓN CADA TABLETA:** praletina (CAS N° 23031-36-9) 9 mg y butóxido de piperonilo (CAS N° 51-03-6) 15 mg. Fuyi® y Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Producto elaborado y distribuido en Argentina por: S. C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. Calle 9 y Del Gasoducto - Parque Industrial Pilar - Pilar - Provincia de Buenos Aires. R.N.E. 010040444. Producto autorizado por RNPUD: _____. Importado o distribuido en: Chile: S. C. Johnson & Son Chile Ltda., Av. Del Valle 869, Of. 403, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago, Registro I.S.P. N° _____. Uruguay: S. C. Johnson & Son de Uruguay S.A., Luis Alberto de Herrera 1248, Torre 3, Oficina 1176, Montevideo. Tel 2622-4444 MSP N° _____. IMM N° _____. Bolivia: DICOM Distribuidores del Oriente S.R.L., Av. Cristo Redentor N° 554, Santa Cruz. Tel. 3-432000, NIT: 1031023028, Reg. San.: _____. Paraguay: S. C. Johnson & Son de Paraguay S.R.L., Eulogio Estigarribia N° 4846, Asunción; Tel. (021) 228321, RUC 80024644-6, Hab. Emp. N° 021/12, Autorizado **por la D.M.V.S.** Registro Sanitario N° _____. Empacado por (ver letra en el envase): (BG) BLIGRAF S.A. R.N.E. 020046809, (K) KASEMA S.A., R.N.E. 020035114, (B) ESKEA S.R.L., R.N.E. 020034622. Plazo de validez: 2 años a partir de la fecha de elaboración (ver en el envase). Producto de venta general.

A family company
 since 1886.
Fiske Johnson

Johnson consultas
 Argentina 0-800-555-6467
 Chile 800-200013
 Uruguay 0-800-5420
 Paraguay 0-800-11-7272

www.proteccionfuyi.com.ar
www.johnson.com.ar

147-0000-13381-1529
 6D-03

Farm. Maricel Barbaricca
 Directora Técnica
 M.H. 11471 M.F. 16768
 S.C. Johnson & Son Argentina SAIC

C. ALBERTO SANCHEZ
 APODERADO
 Tel. 0171117

5096



Directorio de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.
MARIA JOSE SANCTEZ

PRECAUCIONES: PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL. No aplicar sobre alimentos o superficies en contacto con los mismos, utensilios de cocina, plantas o acuarios. No fumar, beber o comer durante su aplicación. No volver a utilizar los envases vacíos. Mantener el producto en su envase original. No toque el repuesto con el aparato conectado. No lo cubra ni introduzca objetos. Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto. No toque la tableta caliente con sus dedos. No toque el aparato con instrumentos metálicos o manos húmedas. Desconecte el aparato cuando no lo esté usando y guardar en un lugar seguro. Enchufar el aparato solamente en toma corrientes que funcionen correctamente donde el dispositivo esté ventilado. No utilizar extensiones de cables ni multi-adaptadores de corriente. No sumergir en agua. Nunca conectar otro dispositivo eléctrico cerca del aparato caliente. Utilizar solamente el producto recomendado para el dispositivo. Este producto no puede ser utilizado en ambientes con poca ventilación, ni en presencia de personas asmáticas o alérgicos respiratorios. Mantener la cabeza a una distancia mínima de 2 metros del punto de liberación del producto. Utilizar solamente en áreas bien ventiladas. No almacenar cerca de alimentos, cocinas o vestimentas. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.** Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto. Este producto no puede ser utilizado en ambientes con poca ventilación, ni en presencia de personas asmáticas o alérgicos respiratorios. Mantener la cabeza a una distancia mínima de 2 metros del punto de liberación del producto. **PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de contacto directo con el producto, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto directo con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. Si ingestión puede ser fatal. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito. En caso de intoxicación, concurrir al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

INDICACIONES PARA USO MÉDICO: Grupo químico: Piretroides. Nombre común: Pralletrina. Sinergista: Butóxido de Piperonilo. Acción tóxica: Disturbios sensoriales cutáneos, hipersensibilidad, neuritis periférica. Antídoto: Antihistamínico y tratamiento sintomático. Clase III DHS Ligeramente peligroso. Uso Doméstico. **CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:** En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160, Ciudad de Bs. As.: Hosp. de Niños Dr. R. Gutiérrez, Tel. (011) 4962-6666/2247. Hosp. de Niños Dr. P. de Elizalde (011) 4300-2115. Pda. de Bs. As.: Centro Nac. de Intoxicaciones Polidiv. Prof. A. Posadas, Tel. (011) 4658-7777/4654-6648. Sala de Toxicología Hosp. de Niños de La Plata, Tel. (0221) 451-5555. Córdoba: Hosp. Municipal de Urgencias, Tel. (0351) 427-6200/434-1201. Rosario: Serv. de Toxicología Sanatorio de Niños, Tel. (0341) 448-0202. En Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Tel. 1722. En Paraguay: Emergencia Médica: Tel. (021) 204-800/532, Centro Nacional de Toxicología: Tel. (021) 220-418. En Chile: Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC): Tel. (02) 2635-3800. Atención 24hs., los 365 días del año. En Bolivia: Emergencias Toxicológicas: Hospital Japonés, Av. Japón e/Paraguá 3er. anillo externo, Santa Cruz Tel. (03) 3-489996. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito.

Farm. Martel Barbaricca
Directora Técnica
M.N. 1471 M.F. 16788
SC Johnson & Son Argentina SAIC

CLAUDIO SAGGESI
APODERADO
C.I. 8.571.719

5096



1-47-0000-13381-15-R
607-25



5096

1-47-0000-13381-15-8
60-40

Fuji

PRECAUCIONES: PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL. No aplicar sobre alimentos o superficies en contacto con los mismos, utensilios de cocina, plantas o acuarios. No fumar, beber o comer durante su aplicación. No volver a utilizar los envases vacíos. Mantener el producto en su envase original. No toque el repuesto con el aparato conectado. No lo cubra ni introduzca objetos. Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto. No toque la tableta caliente con sus dedos. No toque el aparato con instrumentos metálicos o manos húmedas. Desconecte el aparato cuando no lo esté usando y guardar en un lugar seguro. Enchufar el aparato solamente

en toma corrientes que funcionen correctamente donde el dispositivo esté ventilado. No utilizar extensiones de cables ni multi-adaptadores de corriente. No sumergir en agua. Nunca conectar otro dispositivo eléctrico cerca del aparato caliente. Utilizar solamente el producto recomendado para el dispositivo. Este producto no puede ser utilizado en ambientes con poca ventilación, ni en presencia de personas asmáticas o alérgicos respiratorios. Mantener la cabeza a una distancia mínima de 2 metros del punto de liberación del producto. Utilizar solamente en áreas bien ventiladas. No almacenar cerca de alimentos, cocinas o vestimentas. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.** Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto. Este producto no puede ser utilizado en ambientes con poca ventilación, ni en presencia de personas asmáticas o alérgicos respiratorios. Mantener la cabeza a una distancia mínima de 2 metros del punto de liberación del producto.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto directo con el producto, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto directo con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. Su ingestión puede ser fatal. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito. En caso de intoxicación, concurrir al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

INDICACIONES PARA USO MÉDICO:

Grupo químico: Piretroides. Nombre común: Praletrina. Sinergista: Butóxido de Piperonilo. Acción tóxica: Disturbios sensoriales cutáneos, hipersensibilidad, neuritis periférica. Antídoto: Antihistamínico y tratamiento sintomático. Clase III OMS Ligeramente peligroso. **Uso Doméstico. CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:** En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160, Ciudad de Bs. As.: Hosp. de Niños Dr. R. Gutiérrez, Tel. (011) 4962-6666/2247. Hosp. de Niños Dr. P. de Elizalde (011) 4300-2115. Pcia. de Bs. As.: Centro Nac. de Intoxicaciones Policlínico Prof. A. Posadas, Tel. (011) 4658-7777/4654-6648. Sala de Toxicología Hosp. de Niños de La Plata, Tel. (0221) 451-5555. Córdoba: Hosp. Municipal de Urgencias, Tel. (0351) 427-6200/434-1201. Rosario: Serv. de Toxicología Sanatorio de Niños, Tel. (0341) 448-0202. En Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Tel. 1722. En Paraguay: Emergencia Médica: Tel. (021) 204-800/532, Centro Nacional de Toxicología: Tel. (021) 220-418. En Chile: Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC): Tel. (02) 2635-3800. Atención 24hs., los 365 días del año. En Bolivia: Emergencias Toxicológicas: Hospital Japonés, Av. Japón e/Paraguá 3er. anillo externo, Santa Cruz Tel. (03) 3-489996. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito.

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

Farm. Maricel Barbaricco
Directora Técnica
M.N. 11471 A.P. 16708
SC Johnson & Son Argentina SAIC

CLAUDIO SAGGESE
APODERADO
C.I. 9.571.719



5096

1-47-0000-13381-15-9
6D-CD 1

Fuyi

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Retire la tableta del envoltorio.
2. Introduzca la tableta en el aparato.
3. Enchufe el aparato, de modo que la tableta permanezca horizontal.
4. Luego de 10 horas, cuando la tableta pierda el color azul, remueva la tableta usada empujándola con una nueva.
5. Almacene el producto en un lugar fresco y seco.

COMPOSICIÓN CADA TABLETA: praletrina (CAS N° 23031-36-9) 9 mg y butóxido de piperonilo (CAS N° 51-03-6) 15 mg.

Fuyi° y Johnson° son marcas registradas usadas bajo autorización de S. C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Producto elaborado y distribuido en Argentina por: S. C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. Calle 9 y Del

Gasoducto - Parque Industrial Pilar - Pilar - Provincia de Buenos Aires. R.N.E. 010040444. Producto autorizado por RNPUD: _____.
Importado o distribuido en: Chile: S. C. Johnson & Son Chile Ltda., Av. Del Valle 869, Of. 403, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago, Registro I.S.P. N° _____. Uruguay: S. C. Johnson & Son de Uruguay S.A., Luis Alberto de Herrera 1248, Torre 3, Oficina 1176, Montevideo. Tel 2622-4444 MSP N° _____ IMM N° _____. Bolivia: DICOM Distribuidores del Oriente S.R.L., Av. Cristo Redentor N° 554, Santa Cruz. Tel. 3-432000, NIT: 1031023028, Reg. San.: _____. Paraguay: S. C. Johnson & Son de Paraguay S.R.L., Eulogio Estigarribia N° 4846, Asunción; Tel. (021) 228321, RUC 80024644-6, Hab. Emp. N° 021/12, Autorizado por la D.N.V.S. Registro Sanitario N° _____. Empacado por (ver letra en el envase): (BG) BLIGRAF S.A. R.N.E. 020046809, (K) KASEMA S.A., R.N.E. 020035114, (B) ESKEA S.R.L., R.N.E. 020034622.

Plazo de validez: 2 años a partir de la fecha de elaboración (ver en el envase).
Producto de venta general.

Johnson consultas
 Argentina 0-800-555-6467
 Chile 800-200013
 Uruguay 0-800-5420
 Paraguay 0-800-11-7272

www.proteccionfuyi.com.ar
www.johnson.com.ar

A family company since 1886. *Fiske Johnson*

Farm. **MARIA JOSÉ SÁNSHEZ**
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

[Signature]
Farm. **Maricel Barbaricca**
Directora Técnica
M.N. 11471 M.P. 16768
SC Johnson & Son Argentina SAIC

[Signature]
CLAUDIO SARGESE
APODERADO
C.I. 8.571.719



5096

1-47-0000-13381-15-9


62-9

SC Johnson
A Family Company

Fuyi

12
NOCHES

**TABLETAS
CONTRA MOSQUITOS**



ATENCIÓN CUIDADO. ANTES DE USAR LEA CON ATENCIÓN LAS INSTRUCCIONES DEL RÓTULO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

CONTENIDO NETO:

1 Aparato para tabletas contra mosquitos Origen Brasil.

12 Tabletillas INDUSTRIA ARGENTINA.
INSECTICIDA. PRODUCTO DE VENTA GENERAL

USO DOMESTICO - LEA LA ETIQUETA

**NUEVA
FÓRMULA**

Incluye:
**12
TABLETAS
GRATIS**

INSI
1) R
2) In
3) Es
4) L
5) D
6) Al
Mod
Par
tom
Tire
fin d
Para
ta pi
tom
Plaz
Prox
INI
con
Dis
Ant
Liq
INI
OST
(01
Pcl
Tel
La
Tel
de
Ase
Mé
22f
Cat
En
eP
Ing

[Signature]
Farm. **MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ**
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

[Signature]
Farm. **Maricel Barbaricca**
Directora Técnica
M.N. 11471 M.P. 16768
SC Johnson & Son Argentina SAIC

[Signature]
CLAUDIO SAGGESE
APODERADO
GL 1871-19



5 0 9 6

1-47-0000-13381-15-9
60-07

Fuyi

INSTRUCCIONES DE USO:

- 1) Retire la tableta del envoltorio.
- 2) Introduzca la tableta en el aparato.
- 3) Enchufe el aparato, de modo que la tableta permanezca horizontal.
- 4) Luego de 10 horas, cuando la tableta pierda el color azul, remueva la tableta usada empujándola con una nueva.
- 5) Desenchufe el aparato cuando no lo use.
- 6) Almacene el producto en un lugar fresco y seco.

Modo de uso del Guardacable:

Para desenrollarlo, sostenga el aparato por la base y tire la ficha tomacorriente.

Tire del cable siempre desde una distancia cercana a la boca de salida, a fin de evitar deterioros en la unidad sellada de la ficha tomacorriente.

Para guardar el cable, sostenga la base del aparato Fuyi® y gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta que la ficha tomacorriente haga tope con la boca de salida.

Plazo de validez: 2 años a partir de la fecha de elaboración (ver en el envase).
Producto de venta general.

INDICACIONES PARA USO MÉDICO: Grupo químico: Piretroides. Nombre común: Praletrina. Sinergista: Butóxido de Piperonilo. Acción tóxica: Disturbios sensoriales cutáneos, hipersensibilidad, neuritis periférica. Antídoto: Antihistamínico y tratamiento sintomático. Clase III OMS Ligeramente peligroso. Uso Doméstico. **CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN:** En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160, Ciudad de Bs. As.: Hosp. de Niños Dr. R. Gutiérrez, Tel. (011) 4962-6666/2247. Hosp. de Niños Dr. P. de Elizalde (011) 4300-2115. Pcia. de Bs. As.: Centro Nac. de Intoxicaciones Polidínico Prof. A. Posadas, Tel. (011) 4658-7777/4654-6648. Sala de Toxicología Hosp. de Niños de La Plata, Tel. (0221) 451-5555. Córdoba: Hosp. Municipal de Urgencias, Tel. (0351) 427-6200/434-1201. Rosario: Serv. de Toxicología Sanatorio de Niños, Tel. (0341) 448-0202. En Uruguay: Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Tel. 1722. En Paraguay: Emergencia Médica: Tel. (021) 204-800/532, Centro Nacional de Toxicología: Tel. (021) 220-418. En Chile: Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC): Tel. (02) 2635-3800. Atención 24hs., los 365 días del año. En Bolivia: Emergencias Toxicológicas: Hospital Japonés, Av. Japon e/Paraguá 3er. anillo externo, Santa Cruz Tel. (03) 3-489996. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito.



Johnson consultas
 Argentina 0-800-555-6467
 Uruguay 0-800-5420
 Paraguay 0-800-11-7272

www.proteccionfuyi.com.ar
www.johnson.com.ar

A family company since 1886. Fiske Johnson

CONT
 1 Ap
 12

Farm. MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
 Directora de Vigilancia
 de Producción para la Salud
 A.N.M.A.T.

Farm. Maricel Barbaricca
 Directora Técnica
 M.N. 11471 M.P. 16768
 SC Johnson & Son Argentina SAIC

CLAUDIO SAGGESE
 A.S. 2000
 C.I. E.571.719



5 0 9 6

8-51-18341-0000-43-1
D-09

Fuyi

A

PRECAUCIONES: PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL. No aplicar sobre alimentos o superficies en contacto con los mismos, utensilios de cocina, plantas o acuarios. No fumar, beber o comer durante su aplicación. No volver a utilizar los envases vacíos. Mantener el producto en su envase original. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.** **IMPORTANTE:** No toque el repuesto con el aparato conectado. No lo cubra ni introduzca objetos. Lavar las manos con agua y jabón después de aplicar el producto. No toque la tableta caliente con sus dedos. No toque el aparato con instrumentos metálicos o manos húmedas. Desconecte el aparato cuando no lo esté usando y guardar en un lugar seguro. Enchufar el aparato solamente en toma corrientes que funcionen correctamente donde el dispositivo esté ventilado. No utilizar extensiones de cables ni multi-adaptadores de corriente. No sumergir en agua. Nunca conectar otro dispositivo eléctrico cerca del aparato caliente. Utilizar solamente el producto recomendado para el dispositivo. Este producto no puede ser utilizado en ambientes con poca ventilación, ni en presencia de personas asmáticas o alérgicos respiratorios. Mantener la cabeza a una distancia mínima de 2 metros del punto de liberación del producto. Utilizar solamente en áreas bien ventiladas. No almacenar cerca de alimentos, cocinas o vestimentas.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto directo con el producto, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto directo con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. Su ingestión puede ser fatal. En caso de ingestión accidental no provoque el vómito. En caso de intoxicación, concurrir al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o el rótulo del producto.

IMPORTANTE: Este aparato es apto para cualquier tableta contra mosquitos, pero a fin de obtener la máxima efectividad del sistema, use las tabletas Fuyi®. El equipo sólo debe ser usado con el medio vaporizador recomendado. El uso de otra sustancia puede producir una elevada toxicidad o un riesgo de incendio. Si el cable de alimentación se daña, este debe ser reemplazado por personal calificado con el fin de evitar riesgos.

Fuyi® y Johnson® son marcas registradas usadas bajo autorización de S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin, EE. UU. Producto autorizado por RNPUD.: _____. Elaborado y distribuido en Argentina por: Argentina: S.C. Johnson & Son Argentina, Calle 9 y Del gasoducto, Parque Industrial Pilar, Pilar, Buenos Aires, R.N.E. 010040444. Empacado por (ver letra en el envase): (BG) BLIGRAF S.A., R.N.E. 020046809, (K) KASEMA S.A., R.N.E. 020035114, (B) ESKEA S.R.L., R.N.E. 020034622. Importado o distribuido por: Uruguay: S. C. Johnson & Son de Uruguay S.A., Luis Alberto de Herrera 1248, Torre 3, Oficina 1176, Montevideo. Tel 2622-4444 MSP N° ____; IMM N° _____. Paraguay: S. C. Johnson & Son de Paraguay S.R.L., Eulogio Estigarribia N° 4846, Asunción; Tel. (021) 228321, RUC 80024644-6, Hab. Emp. N° 021/12, Autorizado por la D.N.V.S. Registro Sanitario N° _____. Bolivia: DICOM Distribuidores del Oriente S.R.L., Av. Cristo Redentor N° 554, Santa Cruz. Tel. 3-432000, NIT: 1031023028, Reg. San.: _____.

(*) **ADVERTENCIA: EL EMPLEO DE ESTE PRODUCTO NO ASEGURA LA NO TRANSMISIÓN DE LA ENFERMEDAD. SE DEBERÁN RESPETAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN RECOMENDADAS POR LA AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE.**
(**) 10 horas de duración cada tableta.

Composición cada tableta: praletrina (CAS N° 23031-36-9) 9 mg y butóxido de piperonilo (CAS N° 51-03-6) 15 mg.

Farm. **MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ**
Directora de Vigilancia
de Productos para la Salud
A.N.M.A.T.

Farm. **Maricel Barbaricca**
Directora Técnica
M.N. 11471 M.P. 16768
SC Johnson & Son Argentina SAIC

CLAUDIO SAGOLSI
APODERADO
C.I. 6.971.712