



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

5614

BUENOS AIRES,

20 MAYO 2016

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-15733-14-6 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

CONSIDERANDO;

Que por las presentes actuaciones la firma PUNCH QUIMICA S.A. solicita la inscripción del producto denominado RATICIDA RODÉNTICIDA, marca BRUMOLINE BLOC, como producto domisanitario, bajo las categorías de venta libre y de venta profesional en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 709/98 y normas complementarias.

Que a fojas 271 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de Diciembre 2015.

LD
[Firma manuscrita]
7



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

5614

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º.- Inscríbase ante el Registro Nacional de Productos de Uso Doméstico (RNPUD) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el producto denominado RATICIDA RODENTICIDA, marca BRUMOLINE BLOC, de acuerdo con lo solicitado por la firma PUNCH QUIMICA S.A., con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N°020034835, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en los Certificados de RNPUD N°0250054 y 0250055 bajo las categorías de venta libre y de venta profesional, respectivamente, que forman parte de la presente Disposición.

ARTICULO 2º.- Autorícense los rótulos de fs. 258 y 265 para la categoría de venta libre y el rótulo que obra a fs. 270 para la categoría de venta profesional que se desglosan y forman parte de la presente Disposición.

ARTICULO 3º.- Autorízase la composición centesimal obrante a fs. 10, 15 y 20.

ARTICULO 4º.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N°0250054 para la categoría de venta libre y RNPUD N°0250055 para la categoría de venta profesional.

ARTICULO 5º.- La vigencia de los certificados mencionados en el artículo 1º será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha de emisión de la presente

LD
20
7



Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación
e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

5614

disposición.

ARTICULO 6°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de copia autenticada de la presente Disposición, de los Certificados mencionados en el artículo 1°, de los rótulos autorizados y de la composición centesimal aprobada. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-0000-15733-14-6

DISPOSICION N°

LD

ro

5614

Dr. ROBERTO LEDESMA
Subadministrador Nacional
A.N.M.A.T.



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250054

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: RATICIDA RODENTICIDA
2. Marca: BRUMOLINE BLOC
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: BRODIFACOUM 0,005 %
5. Forma de Presentación: BLOQUE PARAFINADO DE 4G, 5G, 10G, 20G, 25G, 30G, 40G, Y 50G A RAZON DE UN BLOQUE POR CEBADERA.
6. Venta: VENTA LIBRE
7. Titular del Producto: PUNCH QUIMICA S.A.
8. Domiciliado en: MARCELO T. DE ALVEAR 4730 - CIUDADELA - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020034835
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-015733-14-6.

Disposición N°:

5614

Fecha:

20 MAYO 2016

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.

Dr. ROBERTO LEIDE

Subadministrador Nacional

Sello y Firma del Titular Responsable

L.D.



República Argentina
Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario

0250055

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: RATICIDA RODENTICIDA
2. Marca: BRUMOLINE BLOC
3. Origen: ARGENTINA
4. Principios Activos: BRODIFACOUM 0,005 %
5. Forma de Presentación: BOLSA POR 120G CONT. 6 BLOQUES DE 20G C/U EN CAJA DE 1.44KG, BOLSA POR 60G CONT. 6 BLOQUES DE 10G C/U EN CAJA DE 1.44KG, BALDE/BOLSA POR 1KG, 2.5KG, 5KG, 10KG, 20KG, 25KG Y 50KG CONT. BLOQUES DE 4G,5G,10G,20G ,25G,30G,40G Y 50G PARA SER APLICADOS EN CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS.
6. Venta: VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL
7. Titular del Producto: PUNCH QUIMICA S.A.
8. Domiciliado en: MARCELO T. DE ALVEAR 4730 - CIUDADELA - BUENOS AIRES
9. Establecimiento TITULAR: RNE N° : 020034835
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-015733-14-6.

Disposición N°: **5614**

Fecha: **20 MAYO 2016**

La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir de la fecha consignada en la disposición de autorización.


Dr. ROBERTO LEIDE
Subadministrador Nacional

ANMAT
Sello y Firma del Funcionario Responsable

L.D. 

BRUMOLINE[®] BLOC

FORMA DE USO:

Colocar la cebadera donde se observen signos de presencia de roedores, (excrementos, pisadas, pelos, manchas de grasa) en las cercanías de las cuevas y lugares de tránsito. MANTENER EN LUGARES INACCESIBLES A NIÑOS Y MASCOTAS

DOSIS: 1 cebadera a intervalo de 4-9 metros.

Al cesar la actividad de los roedores descartar la cebadera. La Empresa garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal uso o usos diferentes a los indicados en este marbete y declina toda responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento inadecuado del producto.

El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por factores que escapan al control del fabricante.

BRUMOLINE[®] BLOC



condicione la persistencia del raticida en el ambiente.

3 Las mujeres embarazadas no pueden manejar el raticida ni estar expuestas a los lugares donde el mismo fue aplicado.

4 Dado que existe la posibilidad que las superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser esta una posible fuente de contaminación se recomienda la limpieza del lugar desratizado.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

5 No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos.

6 Guardar el raticida bajo llave, en lugar fresco y seco.

RIESGO AMBIENTAL:

7 Se recomienda eliminar los roedores muertos poniéndolos previa envoltura en bolsas de residuos utilizando guantes y desechándolos en la basura.

Advertencia para el médico: Producto Clase IV. Producto anticoagulante enérgico de actividad prolongada.

raticida.

Las medidas en caso de activado, un purgante salino en las primeras 24 hs. y reiterarse.

Se aconseja el asesoramiento y tratamiento del paciente.


Antídoto: Vitamina K1. La administración en clínica. Las superwarfarinas presentes en grasas e hígado, presentan circulación prolongada. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

EN CASO DE INTOXICACION ACUDIR A LOS TELEFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA: Centro de intoxicaciones del Hospital de la Cruz 4962-2247. Centro Nacional de intoxicaciones 4654-6648 y 0800 3330160. Hospital de la Cruz 0800-2229911

EL ROTULO DEBERA CUMPLIRSE
CON LA LEGISLACION VIGENTE
EXPT. N° 5733-14-6

Handwritten signature

20 MAYO 2016
67-1-14-6



RATICIDA - RODENTICIDA

SUPERWARFARÍNICO - MONODÓSICO - RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

BRUMOLINE[®] BLOC

NUEVO
CEBO EN BLOQUE + CEBADERA
FÁCIL DE USAR

CAJA CEBADERA CON CEBO EN BLOQUE PARAFÍNICO



VENTA LIBRE
CONT.
NETO **50g.**



**CUIDADO
VENENO**

LEA LA ETIQUETA

PRECAUCIONES GENERAL:

- 1 Aplicar en sitios inaccesibles para niños y/o mascotas o animales no blanco.
- 2 No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, o fuente de ventilación que condicione la persistencia del raticida en el ambiente.
- 3 Las mujeres embarazadas no pueden manejar el raticida ni estar expuestas a los lugares donde el mismo fue aplicado.
- 4 Dado que existe la posibilidad que las superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser esta una posible fuente de contaminación se recomienda la limpieza del lugar desratizado.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- 5 No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos.
- 6 Guardar el raticida bajo llave, en lugar fresco y seco.

RIESGO AMBIENTAL:

- 7 Se recomienda eliminar los roedores muertos poniéndolos previa envoltura en bolsas de residuos utilizando guantes y desechándolos en la basura.
- Advertencia para el médico: Producto Clase IV. Producto anticoagulante enérgico de actividad prolongada.

BRUMOLINE[®]
BLOC

Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición al raticida.

Las medidas en caso de ingestión son el rescate del tóxico (vómito provocado, carbón activado, un purgante salino). El monitoreo del tiempo de protrombina, debe realizarse en las primeras 24 hs. y reiterarse a las 72.

Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.


Antídoto: Vitamina K1. La administración y las dosis están determinadas por la evolución clínica. Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad, se almacenan en las grasas e hígado, presentan circulación en terohepática y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

EN CASO DE INTOXICACION ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y LLAMAR A LOS TELEFONOS DE CONSULTA TOXICOLOGICA:

Centro de intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 y 4962-2247. Centro Nacional de intoxicaciones Policlínico Posadas: (011) 4658-7777. 4654-6648 y 0800 3330160. Hospital de Niños de La Plata: (0221) 451-5555. 0800-2229911


PUNCH QUIMICA S.A.

Gustavo H. Schneider
C.A. 10.000.000



RÓTULO PRIMARIO CEBADERA
VENTA LIBRE

5614



EL ROTULO DEBERA CUMPLIR
CON LA LEGISLACION VIGENTE
EX.PTE. N° 15333-14-6

RATICIDA - RODENTICIDA

SUPERWARFARÍNICO - MONODÓSICO - RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

BRUMOLINE[®] BLOC

CAJA CEBADERA CON CEBO EN BLOQUE PARAFÍNICO



VENTA LIBRE



COMPOSICIÓN

Composición brodifacum-(3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin.....0,005 g
colorante e inertes c.s.p.100 g
Contiene amargante que previene la ingesta involuntaria

LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO Y LA CORRECTA DOSIFICACION, ASI COMO LAS PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

MANTENER EN LUGARES INACCESIBLES A NIÑOS Y MASCOTAS
DEBERA APLICAR EL PRODUCTO EN CAJAS CEBADERAS DE DIFICIL ACCESO
PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BLANCO (VER FORMA DE USO)

Centro Nacional de intoxicaciones Policlínico Posadas: 0800 3330160.

RNPUD:
Poco Inflamable Industria Argentina

Peso
Neto: **0.50 g.**

Elaborado por: Punch Química S.A.
Av. M.T. de Alvear 4734 (1702) Ciudadela Pcia. Bs. As.
RNE: 020034835

Distribuido por: Arquim S.A.
Jose Mármol 1506 Vicente Lopez, Buenos Aires. Tel.: (011) 4791-9931
RNE: 010044971

PUNCH QUIMICA S.A.

Gustavo H. Schneider
Ingeniero Químico

CARLOS H. ANAYA
INGENIERO AGRICOLA
M.N. 12614

32

47

RATICIDA - RODENTICIDA 7:44-0-15433-14-6

SUPERWARFARÍNICO - MONODÓSICO - RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

BRUMOLINE BLOC

CEBO EN BLOQUES PARAFÍNICOS

MATA RATAS, RATONES Y LAUCHAS

Venta y uso reservado para aplicadores profesionales habilitados
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE



CUIDADO VENENO

Peso Neto: **1** Kg.

5614



COMPOSICIÓN

Composición brodifacum-(3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin.....0,005 g
colorante e inertes c.s.p.100 g
Contiene amargante que previene la ingesta involuntaria

Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición al raticida.

Las medidas en caso de ingestión son el rescate del tóxico (vómito provocado, carbón activado, un purgante salino). El monitoreo del tiempo de protrombina, debe realizarse en las primeras 24 hs. y reiterarse a las 72.

Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.

Antídoto: Vitamina K1. La administración y las dosis están determinadas por la evolución clínica. Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad, se almacenan en las grasas e hígado, presentan circulación enterohepática y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO Y LA CORRECTA DOSIFICACION, ASI COMO LAS PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

MANTENER EN LUGARES INACCESIBLES A NIÑOS Y MASCOTAS DEBERA APLICAR EL PRODUCTO EN CAJAS CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BLANCO (VER FORMA DE USO)

RNPUD:

Poco Inflamable Industria Argentina

CARLOS R. ALAYA
INGENIERO QUÍMICO

Elaborado por: Punch Química S.A.
Av. M.T. de Alvear 4734 (1702) Ciudadela Pcia. Bs. As.
RNE: 020034835

PUNCH QUÍMICA S.A.

Distribuido por: Arquim S.A.

Jose Mármol 1506 Vicente Lopez, Buenos Aires. Tel.: (011) 4791-9931
RNE: 010044971

Gustavo H. Schneider
Elaborado

PRECAUCIONES GENERAL:

- Durante su manipuleo evitar el contacto con la piel, boca y ojos. Utilizar guantes y no comer, beber ni fumar. Luego de la aplicación y en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón; Si el contacto fuera con los ojos lavarse abundantemente con agua.
- Aplicar en sitios inaccesibles para niños y/o mascotas o animales no blanco.
- No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, o fuente de ventilación que condicione la persistencia del raticida en el ambiente.
- Las mujeres embarazadas no pueden manejar el raticida ni estar expuestas a los lugares donde el mismo fue aplicado.
- Dado que existe la posibilidad que las superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser esta una posible fuente de contaminación se recomienda la limpieza del lugar desratizado.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos.
- Guardar el raticida bajo llave, en lugar fresco y seco.

RIESGO AMBIENTAL:

• Producto tóxico para mamíferos, aves y peces. No deben contaminarse los cursos de agua. Se recomienda eliminar los roedores muertos poniéndolos previa envoltura en bolsas de residuos utilizando guantes y desechándolos en la basura. Advertencia para el médico: Producto Clase IV. Producto anticoagulante energético de actividad prolongada.

EN CASO DE INTOXICACION ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y LLAMAR A LOS TELEFONOS DE CONSULTA TOXICOLOGICA:

Centro de intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 y 4962-2247. Centro Nacional de intoxicaciones Policlínico Posadas: (011) 4658-7777; 4654-6648 y 0800 3330160. Hospital de Niños de La Plata: (0221) 451-5555. 0800-2229911

RECOMENDACIONES DE USO:

Brumoline es un rodenticida anticoagulante monodósico. Con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del segundo día. La muerte se asemeja a la que produce la vejez y de este modo sus congéneres no recelan del alimento.

PLAGAS QUE CONTROLA:

Laucha o ratón doméstico (*Mus musculus*); Rata negra (*Rattus rattus*); Rata gris (*Rattus norvegicus*); Rata alejandrina (*Rattus rattus* var. *Alejandrinus*); Ratones de campo (*Calomys* sp, *Akodon* sp.), Rata colorada (*Holochilus brasiliensis*)

FORMA DE USO:

Colocar el cebo dentro de cebaderas de difícil acceso para niños y mascotas o animales no blanco, las cuales deben ser involucables y proteger el cebo de las condiciones ambientales, dando además tranquilidad a los roedores al comer ya que prefieren hacerlo sin ser observados. Colocar la cebadera donde se observen signos de presencia de roedores, (excrementos, pisadas, pelos, manchas de grasa) en las cercanías de las cuevas y lugares de tránsito.

DOSIS:

Ratas: 20-80 gramos en cebaderas a intervalo de 4-9 metros.
Ratones: 10 gramos en cebadera a intervalo de 4-9 metros.
Mantener ininterrumpidamente la cantidad de cebo limpio y fresco hasta que no se evidencien signos de presencia de roedores.

La empresa garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal uso o usos diferentes a los indicados en este marbete y declina toda responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento inadecuado del producto. El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por factores que escapan al control del fabricante.

RATICIDA - RODENTICIDA

SUPERWARFARÍNICO - MONODÓSICO - RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

BRUMOLINE[®] BLOC

CEBO EN BLOQUES PARAFÍNICOS

MATA RATAS, RATONES Y LAUCHAS

Venta y uso reservado para aplicadores profesionales habilitados
PROHIBIDA SU VENTA LIBRE



CUIDADO
VENENO

Peso
Neto: 1 Kg.



COMPOSICIÓN

Composición brodifacum-(3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin.....0,005 g
colorante e inertes c.s.p.100 g

Contiene amargante que previene la ingesta involuntaria

5614

LEA DETENIDAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE USO Y LA CORRECTA DOSIFICACION, ASI COMO LAS PRECAUCIONES GENERALES Y ADVERTENCIAS ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

MANTENER EN LUGARES INACCESIBLES A NIÑOS Y MASCOTAS
DEBERA APLICAR EL PRODUCTO EN CAJAS CEBADERAS DE DIFICIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BLANCO (VER FORMA DE USO)

RNPUD:

Poco inflamable Industria Argentina

CARLOS R. ARANDA
INGENIERO QUIMICO

Elaborado por: Punch Química S.A.
Av. M.T. de Alvear 4734 (1702) Ciudadela Pcia. Bs/As.
RNE: 020034835

Distribuido por: Arqim S.A.

Jose Mármol 1506 Vicente Lopez, Buenos Aires. Tel.: (011) 4791-9931 F. Schneider
RNE: 010044971

PRECAUCIONES GENERAL:

- Durante su manipuleo evitar el contacto con la piel, boca y ojos. Utilizar guantes y no comer, beber ni fumar. Luego de la aplicación y en caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón; Si el contacto fuera con los ojos lavarse abundantemente con agua.
- Aplicar en sitios inaccesibles para niños y/o mascotas o animales no blanco.
- No aplicar en ambientes cerrados, mal ventilados, o fuente de ventilación que condicione la persistencia del raticida en el ambiente.
- Las mujeres embarazadas no pueden manejar el raticida ni estar expuestas a los lugares donde el mismo fue aplicado.
- Dado que existe la posibilidad que las superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser esta una posible fuente de contaminación se recomienda la limpieza del lugar desratizado.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE :

- No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos.
- Guardar el raticida bajo llave, en lugar fresco y seco.

RIESGO AMBIENTAL:

- Producto tóxico para mamíferos, aves y peces. No deben contaminarse los cursos de agua. Se recomienda eliminar los roedores muertos poniéndolos previa envoltura en bolsas de residuos utilizando guantes y desechándolos en la basura. Advertencia para el médico: Producto Clase IV. Producto anticoagulante energético de actividad prolongada.

Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición al raticida.

Las medidas en caso de ingestión son el rescate del tóxico (vómito provocado, carbón activado, un purgante salino). El monitoreo del tiempo de protrombina, debe realizarse en las primeras 24 hs. y reiterarse a las 72.

Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.

Antídoto: Vitamina K1. La administración y las dosis están determinadas por la evolución clínica. Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad, se almacenan en las grasas e hígado, presentan circulación enterohepática y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

EN CASO DE INTOXICACION ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y LLAMAR A LOS TELEFONOS DE CONSULTA TOXICOLOGICA:

Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666 y 4962-2247. Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: (011) 4658-7777; 4654-6648 y 0800 3330160. Hospital de Niños de La Plata: (0221) 451-5555. 0800-2229911

RECOMENDACIONES DE USO:

Brumoline es un rodenticida anticoagulante monodósico. Con una sola ingestión elimina ratas y ratones a partir del segundo día. La muerte se asemeja a la que produce la vejez y de este modo sus congéneres no recelan del alimento.

PLAGAS QUE CONTROLA:

Laucha o ratón doméstico (*Mus musculus*); Rata negra (*Rattus rattus*); Rata gris (*Rattus norvegicus*); Rata alejandrina (*Rattus rattus* var. *Alejandrinus*); Ratones de campo (*Calomys* sp, *Akodon* sp.), Rata colorada (*Holochilus brasiliensis*)

FORMA DE USO:

Colocar el cebo dentro de cebaderas de difícil acceso para niños y mascotas o animales no blanco, las cuales deben ser involucables y proteger el cebo de las condiciones ambientales, dando además tranquilidad a los roedores al comer ya que prefieren hacerlo sin ser observados. Colocar la cebadera donde se observen signos de presencia de roedores, (excrementos, pisadas, pelos, manchas de grasa) en las cercanías de las cuevas y lugares de tránsito.

DOSIS:

Ratas: 20-80 gramos en cebaderas a intervalo de 4-9 metros.

Ratones: 10 gramos en cebadera a intervalo de 4-9 metros.

Mantener ininterrumpidamente la cantidad de cebo limpio y fresco hasta que no se evidencien signos de presencia de roedores.

La empresa garantiza la calidad del producto hasta su fecha de vencimiento. No asume responsabilidad por los resultados y/o daños derivados del mal uso o usos diferentes a los indicados en este marbete y declina toda responsabilidad por los daños que deriven del almacenamiento inadecuado del producto.

El usuario asume los riesgos de los daños ocasionados por factores que escapan al control del fabricante.