



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** EX-2022-136304611-APN-DGA#ANMAT

---

VISTO el EX-2022-136304611-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma LABORATORIOS BAGÓ S.A. solicita la aprobación de nuevos rótulos, prospecto e información para el paciente para la Especialidad Medicinal denominada GLIFOSIN / DAPAGLIFLOZINA; forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS RECUBIERTOS / DAPAGLIFLOZINA 10 mg; aprobada por Certificado N° 59.694.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición N°: 5904/96 y Circular N° 4/13.

Que por Disposición A.N.M.A.T. N° 680/13 se adoptó el SISTEMA DE GESTION ELECTRÓNICA CON FIRMA DIGITAL para el trámite de SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (REM) encuadrada en el Artículo 4° del Decreto N° 150/92 (t.o. 1993) para ingredientes activos (IFA'S) de origen sintético y semisintético, otorgándose certificados firmados digitalmente.

Que la Dirección de Investigación Clínica y Gestión del Registro de Medicamentos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. – Autorízase a la firma LABORATORIOS BAGÓ S.A. propietaria de la Especialidad Medicinal denominada GLIFOSIN / DAPAGLIFLOZINA; forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS RECUBIERTOS / DAPAGLIFLOZINA 10 mg; los nuevos rótulos obrantes en los documentos IF-2023-48394052-APN-DERM#ANMAT, IF-2023-48393974-APN-DERM#ANMAT; el nuevo prospecto obrante en el documento IF-2023-48393884-APN-DERM#ANMAT e información para el paciente obrante en el documento IF-2023-48394143-APN-DERM#ANMAT.

ARTICULO 2º. – Extiéndase por la Dirección de Gestión de Información Técnica el Certificado actualizado N° 59.694, consignando lo autorizado por el/los artículo/s precedente/s, cancelándose la versión anterior.

ARTICULO 3º. - Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición conjuntamente con el prospecto e información para el paciente. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2022-136304611-APN-DGA#ANMAT

mb

ab

Digitally signed by GARAY Valéria Teresa  
Date: 2023.05.29 16:33:26 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.05.29 16:33:31 -03:00

## PROYECTO DE RÓTULO

### **Glifosin** **Dapagliflozina 10 mg** **Comprimidos Recubiertos**



Industria Argentina  
EXPENDIO BAJO RECETA

#### **FÓRMULA**

Cada Comprimido Recubierto contiene: Dapagliflozina (como Dapagliflozina Propanodiol Monohidrato) 10 mg. Excipientes: Lactosa; Anhídrido Silícico Coloidal; Povidona Reticulada; Estearato de Magnesio; Celulosa Microcristalina; Hipromelosa; Dióxido de Titanio; Polietilenglicol, Óxido Férrico Amarillo.

**Este Medicamento es Libre de Gluten.**

Contenido: 15 Comprimidos Recubiertos.

Posología: según prescripción médica.

**Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 30 °C. Mantener en su envase original.**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 59.694.



*Ética al servicio de la salud*

#### **LABORATORIOS BAGÓ S.A.**

Adm.: Bernardo de Irigoyen Nro. 248. Tel.: (011) 4344-2000/19. Buenos Aires.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54. La Plata.

[www.bago.com.ar](http://www.bago.com.ar)

**Lote Nro.:**

**Fecha de Vencimiento:**



HRYCIUK Nadina  
CUIL 27205366208



ECHEVERRIA Paula Fernanda  
CUIL 27177154259

**Nota:** Los envases conteniendo 30 y 60 Comprimidos Recubiertos, llevarán el mismo texto.



*Ética al servicio de la salud*



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** ROTULO PROD. GLIFOSIN EX-2022-13630461 1- -APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.04.28 17:37:59 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.04.28 17:37:59 -03:00

## PROYECTO DE RÓTULO USO HOSPITALARIO

### **Glifosin** **Dapagliflozina 10 mg** **Comprimidos Recubiertos**

Industria Argentina  
EXPENDIO BAJO RECETA



#### **FÓRMULA**

Cada Comprimido Recubierto contiene: Dapagliflozina (como Dapagliflozina Propanodiol Monohidrato) 10 mg. Excipientes: Lactosa; Anhídrido Silícico Coloidal; Povidona Reticulada; Estearato de Magnesio; Celulosa Microcristalina; Hipromelosa; Dióxido de Titanio; Polietilenglicol, Óxido Férrico Amarillo .

**Este Medicamento es Libre de Gluten.**

Contenido: 500 Comprimidos Recubiertos.

Posología: según prescripción médica.

**Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 30 °C. Mantener en su envase original.**

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 59.694.



*Ética al servicio de la salud*

#### **LABORATORIOS BAGÓ S.A.**

Adm.: Bernardo de Irigoyen Nro. 248. Tel.: (011) 4344-2000/19. Buenos Aires.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54. La Plata.

[www.bago.com.ar](http://www.bago.com.ar)

**Lote Nro.:**

**Fecha de Vencimiento:**



*Ética al servicio de la salud*

---

**Nota:** Los envases conteniendo 1.000 Comprimidos Recubiertos, llevarán el mismo texto. Los envases son de Uso Hospitalario Exclusivo.

  
anmat  
HRYCIUK Nadina  
CUIL 27205366208

  
anmat  
ECHEVERRIA Paula Fernanda  
CUIL 27177154259

  
**Bagó**  
Ética al servicio de la salud



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** ROTULO (UHE) PROD. GLIFOSIN EX-2022-136304611- -APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.04.28 17:37:50 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.04.28 17:37:51 -03:00

## PROYECTO DE PROSPECTO

### **Glifosin** **Dapagliflozina 10 mg** **Comprimidos Recubiertos**

Industria Argentina  
EXPENDIO BAJO RECETA



#### **FÓRMULA**

Cada Comprimido Recubierto contiene: Dapagliflozina (como Dapagliflozina Propanodiol Monohidrato) 10 mg. Excipientes: Lactosa; Anhídrido Silícico Coloidal; Povidona Reticulada; Estearato de Magnesio; Celulosa Microcristalina; Hipromelosa; Dióxido de Titanio; Polietilenglicol, Óxido Férrico Amarillo.

**Este Medicamento es Libre de Gluten.**

#### **ACCIÓN TERAPÉUTICA**

**Fármaco usado en diabetes, inhibidor del cotransportador de sodio-glucosa 2 (SGLT2).** Código ATC: A10BK01.

#### **INDICACIONES**

##### **Diabetes mellitus tipo 2**

**Glifosin** está indicado en adultos para el tratamiento de diabetes *mellitus* tipo 2 insuficientemente controlada, en combinación con la dieta y el ejercicio:

- como monoterapia cuando no se considere adecuado el uso de la metformina debido a intolerancia.
- en adición a otros medicamentos para el tratamiento de la diabetes *mellitus* tipo 2.

##### **Insuficiencia cardíaca**

**Glifosin** está indicado en adultos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica sintomática con fracción de eyección reducida.

##### **Enfermedad renal crónica**

**Glifosin** está indicado en adultos para el tratamiento de la enfermedad renal crónica.

#### **CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS / PROPIEDADES**

##### **Acción farmacológica**

Dapagliflozina es un inhibidor selectivo y reversible muy potente ( $K_i$ : 0,55 nM) de SGLT2. La inhibición de SGLT2 por Dapagliflozina reduce la reabsorción de glucosa del filtrado glomerular en el túbulo proximal renal con una reducción concomitante de la reabsorción de sodio que conduce a la excreción urinaria de glucosa y a la diuresis osmótica. Por lo tanto, Dapagliflozina aumenta el suministro de sodio al túbulo distal, lo que se cree que aumenta la retroalimentación tubuloglomerular y reduce la presión intraglomerular. Esto, combinado con la diuresis osmótica, conduce a una reducción de la sobrecarga de volumen, a una reducción de la presión sanguínea y a una disminución de la precarga y la poscarga, que puede tener efectos beneficiosos en el remodelado cardíaco y en la preservación de la función renal. Otros efectos son el aumento del hematocrito y la reducción del peso corporal. Los beneficios



cardíacos de Dapagliflozina no dependen únicamente del efecto reductor de la glucosa en la sangre y no se limitan a los pacientes con diabetes.

La Dapagliflozina mejora los niveles de glucosa plasmática en ayunas y posprandial reduciendo la reabsorción renal de la glucosa, lo que conduce a la excreción de glucosa en orina. Esta excreción de glucosa (efecto glucosúrico) se observa después de la primera dosis, es continua durante el intervalo de administración de 24 horas y se mantiene durante el tratamiento. La cantidad de glucosa eliminada por el riñón mediante este mecanismo depende de la concentración de glucosa en sangre y de la tasa de filtrado glomerular (TFG).

Por tanto, en sujetos con glucosa sanguínea normal, la Dapagliflozina tiene una baja propensión a causar hipoglucemia. La Dapagliflozina no altera la producción endógena normal de glucosa en respuesta a la hipoglucemia. La Dapagliflozina actúa con independencia de la secreción de insulina y de la acción de la insulina. Se ha observado una mejoría de la evaluación del modelo de homeostasis para la función de las células beta (HOMA en células beta) en los estudios clínicos con Dapagliflozina.

El SGLT2 se expresa de forma selectiva en el riñón. La dapagliflozina no inhibe otros transportadores de glucosa importantes para el transporte de glucosa a los tejidos periféricos y es mayor a 1400 veces más selectiva por el SGLT2 frente al SGLT1, el principal transportador intestinal responsable de la absorción de glucosa.

#### ***Efectos farmacodinámicos***

Se observaron aumentos de la cantidad de glucosa excretada en la orina en sujetos sanos y en sujetos con diabetes *mellitus* tipo 2 después de la administración de Dapagliflozina. Se excretaron aproximadamente 70 g de glucosa en orina al día (equivalente a 280 Kcal/día) con una dosis de Dapagliflozina de 10 mg/día en sujetos con diabetes *mellitus* tipo 2 durante 12 semanas. Se observaron indicios de una excreción de la glucosa sostenida en sujetos con diabetes *mellitus* tipo 2 tratados con Dapagliflozina 10 mg/día hasta 2 años.

Esta excreción urinaria de glucosa con Dapagliflozina también provoca diuresis osmótica y aumenta el volumen de orina en los sujetos con diabetes *mellitus* tipo 2. Los incrementos del volumen de orina observados en sujetos con diabetes *mellitus* tipo 2 tratados con Dapagliflozina 10 mg se mantuvieron a las 12 semanas y ascendieron a aproximadamente 375 ml/día. El aumento del volumen de orina se asoció a una ligera elevación transitoria de la excreción urinaria de sodio que no se asoció a alteraciones de la concentración sérica de sodio.

La excreción urinaria de ácido úrico también aumentó de forma transitoria (durante 3-7 días) y estuvo acompañada de una reducción mantenida de la concentración sérica de ácido úrico. A las 24 semanas, las reducciones de las concentraciones séricas de ácido úrico fueron de -48,3 a -18,3 micromoles/l (-0,87 a -0,33 mg/dl).

#### **Farmacocinética**

##### ***Absorción***

La Dapagliflozina se absorbió bien y con rapidez tras su administración oral. Las concentraciones plasmáticas máximas (C<sub>máx</sub>) de Dapagliflozina, se alcanzaron normalmente en las 2 horas siguientes a la administración en ayunas. La media geométrica en estado estacionario de los valores de la C<sub>máx</sub> y el Área Bajo la Curva (ABC) de Dapagliflozina tras la administración de dosis de 10 mg de Dapagliflozina una vez al día, fueron de 158 ng/ml y 628 ng h/ml, respectivamente. La biodisponibilidad oral absoluta de Dapagliflozina tras la administración de una dosis de 10 mg es del 78%. La administración con una comida rica en grasas redujo la C<sub>máx</sub> de la Dapagliflozina hasta un 50% y prolongó el tiempo en alcanzar la concentración plasmática máxima (T<sub>máx</sub>) en 1 hora aproximadamente, pero no influyó en el ABC en comparación con la administración en ayunas. Se consideró que estos cambios no

fueron clínicamente significativos. Por lo tanto, Dapagliflozina puede administrarse con o sin alimentos.

#### **Distribución**

La Dapagliflozina se une a las proteínas en un 91% aproximadamente. La unión a las proteínas no se modificó en presencia de diversas enfermedades (por ejemplo, insuficiencia renal o hepática). El volumen de distribución en estado estacionario de Dapagliflozina fue de 118 litros.

#### **Biotransformación**

La Dapagliflozina es extensamente metabolizada y produce principalmente Dapagliflozina 3-O-glucurónido, un metabolito inactivo. Ni Dapagliflozina 3-O-glucurónido ni otros metabolitos contribuyen a los efectos hipoglucemiantes. La formación de Dapagliflozina 3-O-glucurónido está mediada por la UGT1A9, una enzima presente en el hígado y el riñón, y el metabolismo mediado por el CYP es una vía de depuración menor en humanos.

#### **Eliminación**

Después de la administración de una dosis oral única de Dapagliflozina 10 mg a sujetos sanos, la vida media plasmática terminal ( $t_{1/2}$ ) de Dapagliflozina fue de 12,9 horas. El *clearance* sistémico total medio de Dapagliflozina administrada vía intravenosa fue de 207 ml/min. La Dapagliflozina y los metabolitos relacionados se eliminan fundamentalmente mediante excreción urinaria y menos del 2% como Dapagliflozina intacta. Tras la administración de una dosis de 50 mg de [14C]-Dapagliflozina, se recuperó el 96%, el 75% en orina y el 21% en heces. En heces, aproximadamente el 15% de la dosis se excretó como fármaco original.

#### **Linealidad**

La exposición a Dapagliflozina se incrementó de forma proporcional al aumento de la dosis de Dapagliflozina en el intervalo de 0,1 a 500 mg, y su farmacocinética no varió en función del tiempo tras la administración diaria durante un período de hasta 24 semanas.

#### **Poblaciones especiales**

##### **Insuficiencia renal**

En el estado estacionario (20 mg de Dapagliflozina una vez al día durante 7 días), los sujetos con diabetes *mellitus* tipo 2 e insuficiencia renal leve, moderada o grave (determinada por el *clearance* plasmático de iohexol) tuvieron exposiciones sistémicas medias a Dapagliflozina que fueron un 32%, 60% y 87% superiores, respectivamente, a las observadas en sujetos con diabetes *mellitus* tipo 2 y función renal normal. La excreción urinaria de glucosa en 24 horas en estado estacionario depende en gran medida de la función renal y 85, 52, 18 y 11 g de glucosa/día fueron excretados por sujetos con diabetes *mellitus* tipo 2 y función renal normal o insuficiencia leve, moderada o grave, respectivamente. No se conoce el efecto de la hemodiálisis sobre la exposición a la Dapagliflozina. El efecto de una función renal reducida sobre la exposición sistémica fue evaluado en un modelo farmacocinético de población. De forma consistente con resultados previos, el modelo predijo que el ABC era mayor en pacientes con enfermedad renal crónica en comparación con pacientes con función renal normal, y que no era significativamente diferente en pacientes con enfermedad renal crónica con o sin diabetes *mellitus* tipo 2.

##### **Insuficiencia hepática**

En los sujetos con insuficiencia hepática leve o moderada (clases A y B de Child-Pugh), los valores medios de  $C_{máx}$  y ABC de Dapagliflozina fueron hasta un 12% y un 36% mayores, respectivamente, en comparación con los sujetos de control sanos equiparados. Estas diferencias no se consideraron clínicamente significativas. En los sujetos con insuficiencia hepática grave (clase C de Child-Pugh), los valores medios de  $C_{máx}$  y el ABC de

Dapagliflozina aumentaron un 40% y un 67%, respectivamente con respecto a los controles sanos equiparados.

*Edad avanzada ( $\geq 65$  años)*

No hay un aumento clínicamente significativo en la exposición en función de la edad en sujetos de hasta 70 años de edad. Sin embargo, cabe esperar un aumento en la exposición debido a la disminución en la función renal relacionada con la edad. No hay suficientes datos para sacar conclusiones sobre la exposición en pacientes mayores de 70 años.

*Población pediátrica*

La farmacocinética y farmacodinámica (glucosuria) en niños con diabetes *mellitus* tipo 2 con edad 10-17 años fue similar a las observadas en adultos con diabetes *mellitus* tipo 2.

*Sexo*

Se ha calculado que el ABCss medio de Dapagliflozina en mujeres es aproximadamente un 22% mayor que en los hombres.

*Raza*

No hay diferencias clínicamente significativas en las exposiciones sistémicas entre las razas blanca, negra o asiática.

*Peso corporal*

Se ha observado que la exposición a Dapagliflozina disminuye con el aumento de peso. En consecuencia, los pacientes con bajo peso corporal pueden presentar una exposición ligeramente aumentada y pacientes con pesos elevados una exposición ligeramente disminuida. Sin embargo, las diferencias en la exposición no se consideraron clínicamente significativas.

**Datos preclínicos de seguridad**

Los datos preclínicos obtenidos en estudios convencionales de seguridad farmacológica, toxicidad a dosis repetidas, genotoxicidad, potencial carcinogénico y fertilidad no muestran ningún riesgo especial para el ser humano. Dapagliflozina no indujo tumores ni en ratones ni en ratas a ninguna de las dosis evaluadas durante los dos años de estudios de carcinogenicidad.

**Toxicidad para la reproducción y el desarrollo**

La administración directa de Dapagliflozina en ratas jóvenes recién destetadas y la exposición indirecta durante el final de la gestación (periodos correspondientes al segundo y tercer trimestres del embarazo humano en relación a la maduración renal) y la lactancia, se asociaron a una mayor incidencia y/o gravedad de las dilataciones de la pelvis y los túbulos renales en la prole.

En un estudio de toxicidad en animales jóvenes, cuando se administró Dapagliflozina directamente a ratas jóvenes desde el día 21 después del nacimiento hasta el día 90 después del nacimiento, se notificaron dilataciones pélvicas y tubulares renales con todas las dosis; la exposición de las crías tratadas con la dosis más baja fue muy superior (15 veces o más) a la exposición observada con la dosis máxima recomendada en humanos. Estos resultados se asociaron a un aumento del peso renal relacionado con la dosis, así como a un aumento macroscópico del volumen renal que se observó con todas las dosis.

Las dilataciones de la pelvis y los túbulos renales observadas en los animales jóvenes no revirtieron totalmente durante el período de recuperación de aproximadamente 1 mes.

En otro estudio independiente de desarrollo pre y post-natal, se trató a ratas gestantes desde el día 6 de la gestación hasta el día 21 después del parto, y las crías estuvieron expuestas indirectamente dentro del útero y durante la lactancia (se realizó un estudio satélite para evaluar la excreción de Dapagliflozina en la leche y la exposición de las crías). Se observó un aumento de la incidencia o la gravedad de la dilatación pélvica renal en la prole adulta de

madres tratadas, aunque solo con la dosis máxima evaluada (la exposición a Dapagliflozina en madres y crías fue 1.415 y 137 veces mayor, respectivamente, que la exposición a la dosis máxima recomendada en humanos). Los efectos tóxicos para el desarrollo adicionales se limitaron a reducciones del peso corporal de las crías relacionadas con la dosis, y se observaron sólo **con** dosis mayores o iguales a 15 mg/kg/día (correspondientes a una exposición de las crías mayor que el valor observado - 29 veces o más- con la dosis máxima recomendada en humanos). La toxicidad materna solo fue evidente con la máxima dosis evaluada y se limitó a una reducción transitoria del peso corporal y del consumo de alimento en la administración. El nivel sin efectos adversos observados (NOAEL) de toxicidad para el desarrollo, que fue la dosis mínima analizada, se asocia a una exposición sistémica materna aproximadamente 19 veces mayor que la exposición a la dosis máxima recomendada en humanos.

En otros estudios sobre el desarrollo embrionario y fetal en ratas y conejos, se administró Dapagliflozina durante intervalos correspondientes a los períodos principales de organogénesis en cada especie. No se observó toxicidad materna ni para el desarrollo en conejos con ninguna de las dosis analizadas; la dosis máxima evaluada se asocia a una exposición sistémica múltiple aproximadamente 1191 veces la exposición humana correspondiente a la dosis máxima recomendada. En ratas, la Dapagliflozina no tuvo efectos embriofetales ni teratógenos con exposiciones hasta 1441 veces la exposición correspondiente a la dosis máxima recomendada en humanos.

## **POSOLOGÍA / DOSIFICACIÓN - MODO DE ADMINISTRACIÓN**

### **Diabetes *mellitus* tipo 2**

La dosis recomendada es de 1 comprimido recubierto de Glifosin (10 mg de Dapagliflozina) una vez al día.

Cuando la Dapagliflozina se usa en combinación con insulina o un secretagogo de la insulina, como una sulfonilurea, puede considerarse una dosis menor de insulina o del secretagogo de la insulina para disminuir el riesgo de hipoglucemia.

### **Insuficiencia cardíaca**

La dosis recomendada es de 1 comprimido recubierto de **Glifosin** (10 mg de Dapagliflozina) una vez al día.

En el estudio pivotal, Dapagliflozina se administró junto con otras terapias para la insuficiencia cardíaca.

### **Enfermedad renal crónica**

La dosis recomendada es de 1 comprimido recubierto de **Glifosin** (10 mg de Dapagliflozina) una vez al día.

En el estudio pivotal, Dapagliflozina se administró junto con otras terapias para la enfermedad renal crónica

### **Modo de administración**

**Glifosin** puede tomarse por vía oral una vez al día, a cualquier hora del día, con o sin alimentos.

### **Poblaciones especiales**

#### ***Insuficiencia renal***

No está indicado ningún ajuste de dosis basado en la función renal.

Debido a la experiencia limitada, no se recomienda iniciar el tratamiento con Dapagliflozina en pacientes con TFG menor a 25 ml/min.

En pacientes con diabetes *mellitus* tipo 2, la eficacia hipoglucemiante de Dapagliflozina se reduce cuando la TFG es menor a 45 ml/min y probablemente sea inexistente en pacientes con

insuficiencia renal grave. Por lo tanto, si la TFG cae por debajo de 45 ml/min, se debe considerar un tratamiento adicional para disminuir la glucosa en pacientes con diabetes *mellitus* tipo 2 si se necesita un control glucémico mayor.

#### **Insuficiencia hepática**

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada. En pacientes con insuficiencia hepática grave, se recomienda una dosis de inicio de 5 mg. Si esta es bien tolerada, se puede aumentar la dosis a 10 mg cuando se indique.

#### **Edad avanzada (mayor o igual a 65 años)**

No se recomienda ningún ajuste de dosis en función de la edad.

#### **Población pediátrica**

No es necesario ajustar la dosis para el tratamiento de la diabetes *mellitus* tipo 2 en niños de 10 años de edad o más. No se dispone de datos en niños menores de 10 años de edad.

No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Dapagliflozina para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca o para el tratamiento de la enfermedad renal crónica en niños de menos de 18 años. No hay datos disponibles.

### **CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los componentes del producto.

### **ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

#### **Insuficiencia renal**

Debido a la experiencia limitada, no se recomienda iniciar el tratamiento con Dapagliflozina en pacientes con TFG menor a 25 ml/min.

La eficacia hipoglucemiante de dapagliflozina depende de la función renal, y esta se reduce en pacientes con TFG menor a 45 ml/min y probablemente sea inexistente en pacientes con insuficiencia renal grave. En un estudio en pacientes con diabetes *mellitus* tipo 2 con insuficiencia renal moderada (TFG < 60 ml/min), una mayor proporción de pacientes tratados con Dapagliflozina presentaron reacciones adversas como aumento en la creatinina, fósforo, hormona paratiroidea (PTH) e hipotensión, en comparación con placebo.

#### **Insuficiencia hepática**

Existe experiencia limitada en estudios clínicos con pacientes con insuficiencia hepática. La exposición a Dapagliflozina aumenta en pacientes con insuficiencia hepática grave.

#### **Uso en pacientes en riesgo de depleción del volumen y/o hipotensión**

Debido a su mecanismo de acción, Dapagliflozina aumenta la diuresis lo que puede conducir a un ligero descenso de la presión arterial observado en los estudios clínicos, más pronunciado en pacientes con concentraciones muy altas de glucosa en sangre.

Se debe tener precaución en pacientes en los que una caída de la presión arterial inducida por la Dapagliflozina pudiera suponer un riesgo, como ser pacientes con tratamiento antihipertensivo, antecedentes de hipotensión o de edad avanzada.

En caso de enfermedades intercurrentes que puedan conducir a una depleción del volumen (por ejemplo, enfermedades gastrointestinales), se recomienda una estrecha monitorización del estado del volumen corporal total (por ejemplo, exploración física, medición de la presión arterial, pruebas analíticas incluyendo hematocrito) y de los electrolitos. Se recomienda la interrupción temporal del tratamiento con Dapagliflozina en pacientes que desarrollen depleción del volumen hasta que ésta se corrija.

#### **Cetoacidosis diabética (CAD)**

Se han notificado casos raros de cetoacidosis diabética (CAD), incluyendo casos mortales y potencialmente mortales, en pacientes tratados con inhibidores del cotransportador de sodio

glucosa 2 (SGLT2), incluida Dapagliflozina. En varios casos, la presentación del cuadro clínico fue atípico con ascenso moderado de los niveles de glucosa en sangre, por debajo de 14 mmol/l (250 mg/dl).

El riesgo de cetoacidosis diabética se debe considerar en el caso de síntomas inespecíficos tales como náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, sed excesiva, dificultad respiratoria, confusión, fatiga o somnolencia inusuales. Si estos síntomas aparecen, se debe evaluar de forma inmediata a los pacientes para valorar si se trata de una cetoacidosis, independientemente de los niveles de glucosa en sangre.

En pacientes en los que se sospeche o diagnostique CAD, se debe interrumpir el tratamiento con Dapagliflozina de inmediato.

Se debe interrumpir el tratamiento en pacientes que están hospitalizados por un procedimiento quirúrgico mayor o enfermedades agudas graves. Se recomienda controlar las cetonas en estos pacientes. Se prefiere la determinación de los niveles de cuerpos cetónicos en sangre a la determinación en orina. El tratamiento con Dapagliflozina se puede reanudar cuando los valores de cuerpos cetónicos sean normales y el estado del paciente se haya estabilizado.

Antes de iniciar el tratamiento con Dapagliflozina, se deben considerar los factores en la historia clínica del paciente que predispongan a cetoacidosis.

Los pacientes que pueden tener mayor riesgo de CAD incluyen pacientes con una baja reserva funcional de las células beta (por ejemplo, pacientes con diabetes tipo 1, pacientes con diabetes tipo 2 con péptido-C disminuido o diabetes autoinmune latente del adulto -LADA- o pacientes con antecedentes de pancreatitis), pacientes con cuadros que conducen a una ingesta restringida de alimentos o deshidratación grave, pacientes para los cuales las dosis de insulina estén reducidas y pacientes con requerimientos aumentados de insulina debido a enfermedad médica aguda, cirugía o alcoholismo. Los inhibidores SGLT2 se deben usar con precaución en estos pacientes.

No se recomienda reiniciar el tratamiento con el inhibidor del SGLT2 en pacientes que experimenten CAD durante el tratamiento con un inhibidor del SGLT2, a menos que se identifique otro factor bien definido que lo desencadenara y se haya resuelto.

En los estudios en diabetes *mellitus* tipo 1 con Dapagliflozina, la CAD fue notificada con frecuencia categoría “frecuente”. Dapagliflozina no se debe usar para el tratamiento de pacientes con diabetes tipo 1.

#### **Fascitis necrotizante del periné (gangrena de Fournier)**

Se han notificado durante la poscomercialización casos de fascitis necrotizante del periné (también conocida como gangrena de Fournier) en pacientes de ambos sexos tratados con inhibidores del SGLT2. Se trata de un acontecimiento raro pero grave y potencialmente mortal que requiere intervención quirúrgica urgente y tratamiento antibiótico.

Se indicará a los pacientes que acudan al médico si presentan una combinación de síntomas como dolor a la palpación, eritema o inflamación en la región genital o perineal, con fiebre o malestar general. Tenga en cuenta que la infección urogenital o el absceso perineal pueden preceder a la fascitis necrotizante. Si se sospecha gangrena de Fournier, se debe interrumpir la Dapagliflozina e instaurar un tratamiento inmediato (incluyendo antibióticos y desbridamiento quirúrgico).

#### **Infecciones del tracto urinario**

La excreción urinaria de glucosa puede asociarse a un aumento del riesgo de infecciones del tracto urinario; por eso se considerará la interrupción temporal de Dapagliflozina durante el tratamiento de una pielonefritis o urosepsis.

### **Edad avanzada**

Los pacientes de edad avanzada pueden presentar mayor riesgo de depleción del volumen y es más probable que sean tratados con diuréticos.

Es más probable que los pacientes de edad avanzada presenten una función renal alterada, y/o estén en tratamiento con medicamentos antihipertensivos que puedan provocar cambios en la función renal tales como inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) y antagonistas del receptor tipo 1 de la angiotensina II (ARA). Se aplican las mismas recomendaciones para la función renal en pacientes de edad avanzada que para los demás pacientes.

### **Insuficiencia cardíaca**

La experiencia en estudios clínicos con Dapagliflozina en la clase IV de la escala de la Asociación Cardiológica de Nueva York (NYHA, por su sigla en inglés) es limitada.

### **Amputación de miembros inferiores**

Se ha observado un aumento de casos de amputación de miembros inferiores (principalmente de dedos del pie) en ensayos clínicos a largo plazo en la diabetes *mellitus* tipo 2 con inhibidores SGLT2. Se desconoce si esto constituye un efecto de clase. Es importante aconsejar a los pacientes con diabetes acerca del cuidado rutinario preventivo del pie.

### **Análisis de orina**

Debido a su mecanismo de acción, los pacientes que estén tomando Dapagliflozina, presentarán resultados positivos para la glucosa en orina.

### **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción**

#### ***Interacciones farmacodinámicas***

##### *Diuréticos*

La Dapagliflozina puede aumentar el efecto diurético de las tiazidas y diuréticos del asa y puede aumentar el riesgo de deshidratación e hipotensión.

##### *Insulina y secretagogos de la insulina*

La insulina y los secretagogos de la insulina, como las sulfonilureas, provocan hipoglucemia. Por lo tanto, puede necesitarse una dosis menor de insulina o de un secretagogo de la insulina para disminuir el riesgo de hipoglucemia cuando se usan en combinación con Dapagliflozina en pacientes con diabetes *mellitus* tipo 2.

#### ***Interacciones farmacocinéticas***

El metabolismo de Dapagliflozina se produce principalmente vía glucuronconjugación mediada por la enzima UDP glucuronosiltransferasa 1A9 (UGT1A9).

En estudios *in vitro*, Dapagliflozina no fue inhibidor del citocromo P450 (CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4), ni inductor de CYP1A2, CYP2B6 o CYP3A4. Por consiguiente, no se espera que Dapagliflozina altere el aclaramiento metabólico de los fármacos que se administren simultáneamente y que sean metabolizados por estas enzimas.

#### ***Efecto de otros medicamentos sobre Dapagliflozina***

Los estudios de interacciones realizados en voluntarios sanos, durante los cuales se administraron principalmente dosis única, indican que la farmacocinética de la Dapagliflozina no se ve alterada por los siguientes fármacos: metformina, pioglitazona, sitagliptina, glimepirida, hidroclorotiazida, bumetanida, valsartán o simvastatina.

Tras la coadministración de Dapagliflozina con rifampicina (un inductor de varios transportadores activos y enzimas metabolizadoras), se observó una disminución del 22% en la exposición sistémica (ABC) a Dapagliflozina, pero sin ningún efecto clínicamente significativo sobre la excreción urinaria de glucosa de 24 horas. No se recomienda ningún

ajuste de dosis. No se espera ningún efecto clínicamente significativo con otros inductores (por ejemplo, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital).

Después de la coadministración de Dapagliflozina con ácido mefenámico (un inhibidor del UGT1A9), se observó un aumento del 55% en la exposición sistémica a Dapagliflozina, pero sin ningún efecto clínicamente significativo sobre la excreción urinaria de glucosa de 24 horas. No se recomienda ningún ajuste de dosis.

#### ***Efecto de la Dapagliflozina sobre otros medicamentos***

Dapagliflozina puede aumentar la excreción renal de litio y reducir así los niveles sanguíneos de litio. Se debe monitorizar la concentración sérica de litio con mayor frecuencia después del inicio del tratamiento y de los cambios de dosis de Dapagliflozina. Se debe remitir al paciente al médico que le prescribió el litio para que le monitorice la concentración sérica de litio.

Los estudios de interacciones realizados en voluntarios sanos, durante los cuales se administraron principalmente dosis única, sugieren que la Dapagliflozina no alteró la farmacocinética de metformina, pioglitazona, sitagliptina, glimepirida, hidroclorotiazida, bumetanida, valsartán, digoxina (sustrato de P-gp) o warfarina (S-warfarina, un sustrato de la CYP2C9), ni los efectos anticoagulantes de la warfarina medidos por la Razón Internacional Normalizada (RIN). La combinación de una dosis única de Dapagliflozina 20 mg y simvastatina (un sustrato de CYP3A4) resultó en un aumento del 19% del ABC de la simvastatina y un 31% del ABC del ácido de simvastatina. El aumento en las exposiciones a simvastatina y ácido de simvastatina no se consideran clínicamente relevantes.

#### ***Ensayo de interferencia con 1,5-anhidroglucitol (1,5-AG)***

No se recomienda la monitorización del control glucémico con el método de 1,5-AG, ya que las medidas del 1,5-AG no son fiables en la evaluación del control glucémico de pacientes que toman inhibidores de la SGLT2. Se aconseja el uso de métodos alternativos para monitorizar el control glucémico.

#### ***Población pediátrica***

Los estudios de interacciones se han realizado solo en adultos.

#### **Fertilidad, embarazo, lactancia**

##### ***Fertilidad***

No se ha estudiado el efecto de la Dapagliflozina sobre la fertilidad en seres humanos. En ratas no se detectó ningún efecto sobre la fecundidad de machos y hembras independientemente de la dosis de Dapagliflozina administrada.

##### ***Embarazo***

No hay datos sobre el uso de Dapagliflozina en mujeres embarazadas. Los estudios realizados en ratas han mostrado toxicidad para el riñón en desarrollo en el periodo de tiempo correspondiente al segundo y tercer trimestres del embarazo humano. Por lo tanto, no se recomienda el uso de Dapagliflozina durante el segundo y tercer trimestre de embarazo.

Si se detecta un embarazo, debe suspenderse el tratamiento con Dapagliflozina.

##### ***Lactancia***

Se desconoce si la Dapagliflozina y/o sus metabolitos se excretan en la leche materna. Los datos farmacodinámicos / toxicológicos disponibles en animales muestran la excreción de Dapagliflozina y/o sus metabolitos en la leche, así como efectos farmacológicos en las crías lactantes. No se puede excluir el riesgo para los recién nacidos o los lactantes. Dapagliflozina no debe utilizarse durante la lactancia.

##### **Pacientes con intolerancia a la lactosa**

Por contener lactosa no debe ser administrado a los pacientes con intolerancia hereditaria a la galactosa, insuficiencia de lactasa Lapp (insuficiencia observada en ciertas poblaciones de Laponia) o malabsorción de glucosa o galactosa.



### Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinarias

La influencia de **Glifosin** sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.

Debe alertarse a los pacientes sobre el riesgo de hipoglucemia cuando se utiliza Dapagliflozina en combinación con una sulfonilurea o insulina.

### REACCIONES ADVERSAS

Las siguientes reacciones adversas han sido identificadas en los estudios clínicos controlados con placebo y en la experiencia poscomercialización. Ninguna ha resultado estar relacionada con la dosis.

En los estudios clínicos en pacientes con diabetes *mellitus* tipo 2, las reacciones adversas notificadas con más frecuencia a través de los estudios clínicos fueron las infecciones genitales.

El perfil de seguridad general de Dapagliflozina en los pacientes con insuficiencia cardíaca y con enfermedad renal crónica fue consistente con el perfil de seguridad conocido de Dapagliflozina.

Las reacciones adversas enumeradas a continuación se clasifican según la frecuencia y clasificación de órgano y sistema. Las categorías de frecuencia se definen como: muy frecuentes ( $\geq 1/10$ ), frecuentes ( $\geq 1/100, < 1/10$ ), poco frecuentes ( $\geq 1/1000, < 1/100$ ), raras ( $\geq 1/10000, < 1/1000$ ), muy raras ( $< 1/10000$ ) y frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles).

**Tabla 1. Reacciones adversas en estudios clínicos controlados con placebo y durante la poscomercialización**

Sistemas de clasificación de órganos	Muy frecuentes	Frecuentes	Poco frecuentes	Raros	Muy raros
Infecciones e infestaciones		Vulvovaginitis, balanitis, e infecciones genitales relacionadas (1), (2), (11). Infección del tracto urinario (1), (3), (11).	Infección por hongos (12).		Fascitis necrotizante del periné (gangrena de Fournier) (1), (8).
Trastornos del metabolismo y la nutrición	Hipoglucemia (cuando se usa con insulina o sulfonilureas)		Depleción del volumen (1), (4). Sed (12).	Cetoacidosis diabética (cuando se emplea en diabetes <i>mellitus</i> tipo 2) (1), (8), (10).	

Trastornos del sistema nervioso		Mareos.			
Trastornos gastrointestinales		Estreñimiento (12). Sequedad de boca (12).			
Trastornos de la piel y del tejido celular subcutáneo		Erupción (9).			Angioedema
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo		Dolor de espalda (11).			
Trastornos renales y urinarios		Disuria Poliuria (5) (11).	Nicturia.		
Trastornos del aparato reproductor y de la mama			Prurito vulvovaginal (12). Prurito genital (12).		
Exploraciones complementarias		Aumento del hematocrito (6). Disminución del <i>clearance</i> renal de creatinina durante el tratamiento inicial (1). Dislipidemia (7).	Aumento de la creatinina sanguínea durante el tratamiento inicial (1), (12). Aumento de la urea sanguínea (12). Disminución del peso (12).		

(1) Ver información adicional a continuación en **Descripción de reacciones adversas seleccionadas**.

(2) Vulvovaginitis, balanitis e infecciones genitales relacionadas incluyen, por ejemplo, los términos preferentes predefinidos: infección micótica vulvovaginal, infección vaginal, balanitis, infección fúngica genital, candidiasis vulvovaginal, vulvovaginitis, balanitis por *Cándida*, candidiasis genital, infección genital, infección genital masculina, infección del pene, vulvitis, vaginitis bacteriana y absceso vulvar.

(3) Infección del tracto urinario incluye los siguientes términos preferentes, listados en orden de frecuencia notificada: infección del tracto urinario, cistitis, infección del tracto urinario por *Escherichia*, infección del tracto genitourinario, pielonefritis, trigonitis, uretritis, infección renal y prostatitis.

(4) La depleción del volumen incluye, por ejemplo, los términos preferentes predefinidos: deshidratación, hipovolemia, hipotensión.

(5) La poliuria incluye los siguientes términos preferentes: polaquiuria, poliuria, aumento de la diuresis.

(6) La variación media del hematocrito respecto del valor inicial fue del 2,3 % en el grupo tratado con Dapagliflozina 10 mg frente al -0,33% con placebo. Los valores de hematocrito >55% fueron notificados en el 1,3% de los sujetos tratados con Dapagliflozina 10 mg frente al 0,4% de los sujetos con placebo.

(7) El porcentaje medio de cambio desde el valor inicial para grupo con Dapagliflozina 10 mg frente al grupo al que se administró placebo, respectivamente, fue de: colesterol total 2,5% frente a -0,0%; colesterol HDL 6,0% frente a 2,7%; colesterol LDL 2,9% frente a -1,0%; triglicéridos -2,7% frente a -0,7%.

(8) Ver “**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**”

(9) La reacción adversa fue identificada durante la vigilancia poscomercialización. Erupción incluye los siguientes términos preferentes, listados en orden de frecuencia en los estudios clínicos: erupción, erupción generalizada, erupción prurítica, erupción macular, erupción maculo-papular, erupción pustular, erupción vesicular y erupción eritematosa. En estudios clínicos controlados con fármaco activo o con placebo, la frecuencia de la erupción fue similar en Dapagliflozina (1,4%) y en el control total (1,4%), respectivamente.

(10) Notificada en el estudio de resultados cardiovasculares en pacientes con diabetes *mellitus* tipo 2. La frecuencia se basa en el promedio anual.

(11) Reacciones adversas notificadas en el 2% o más de los pacientes tratados con 10 mg de Dapagliflozina, con una frecuencia del 1 % o mayor que en el grupo placebo y en al menos 3 pacientes más que en el grupo placebo.

(12) Reacciones adversas notificadas como posiblemente relacionadas, probablemente relacionadas o relacionadas con el tratamiento y notificadas en el 0,2% o más de los pacientes, con una frecuencia igual o mayor al 0,1% que en los pacientes del grupo placebo y en al menos 3 pacientes más que en el grupo placebo.

#### **Descripción de reacciones adversas seleccionadas**

##### ***Vulvovaginitis, balanitis e infecciones genitales relacionadas***

En el conjunto de los 13 estudios de seguridad, se notificó vulvovaginitis, balanitis e infecciones genitales relacionadas en el 5,5% y 0,6% de los sujetos que recibieron Dapagliflozina 10 mg y placebo respectivamente. La mayoría de las infecciones fueron de leves a moderadas y los sujetos respondieron a un ciclo inicial de tratamiento convencional y rara vez ocasionaron la interrupción del tratamiento con Dapagliflozina. Estas infecciones fueron más frecuentes en mujeres (8,4% y 1,2% para Dapagliflozina y placebo, respectivamente), y los sujetos con antecedentes presentaban mayor probabilidad de infección recurrente

##### ***Fascitis necrotizante del periné (gangrena de Fournier)***

Durante la poscomercialización se han notificado casos de gangrena de Fournier en pacientes tratados con inhibidores SGLT2, incluyendo Dapagliflozina.

En un estudio con 17.160 pacientes con diabetes *mellitus* tipo 2 y una mediana de tiempo de exposición de 48 meses, se reportaron un total de 6 casos de gangrena de Fournier, uno en el grupo tratado con Dapagliflozina y 5 en el grupo con placebo.

#### **Hipoglucemia**

La frecuencia de hipoglucemia dependió del tipo de tratamiento de base utilizado en los estudios clínicos en la diabetes *mellitus*.

Para estudios de Dapagliflozina en monoterapia, de adición a metformina o de adición a sitagliptina (con o sin metformina), la frecuencia de episodios menores de hipoglucemia fue similar (< 5%) entre los grupos de tratamiento, incluido el grupo placebo hasta las 102 semanas de tratamiento. En todos los estudios, los acontecimientos mayores de hipoglucemia fueron poco frecuentes y comparables entre los grupos tratados con Dapagliflozina o placebo. Los estudios con tratamientos de adición a sulfonilurea y de adición a insulina presentaron mayor incidencia de hipoglucemia.

En un estudio de adición a glimepirida, en las semanas 24 y 48, se notificaron episodios menores de hipoglucemia más frecuentemente en el grupo tratado con Dapagliflozina 10 mg más glimepirida (6,0% y 7,9%, respectivamente) que en el grupo de placebo más glimepirida (2,1% y 2,1%, respectivamente).

En un estudio de adición a insulina se notificaron episodios de hipoglucemia grave en el 0,5% y 1,0% de los sujetos tratados con Dapagliflozina 10 mg más insulina en las semanas 24 y 104, respectivamente, y en el 0,5% de los sujetos de grupos tratados con placebo más insulina en las semanas 24 y 104. En las semanas 24 y 104, se notificaron episodios de hipoglucemia leve, respectivamente, en el 40,3% y 53,1% de los sujetos que recibieron Dapagliflozina 10 mg más insulina y en el 34,0% y 41,6% de los sujetos que recibieron placebo más insulina.

En un estudio de adición a metformina y una sulfonilurea, de hasta 24 semanas, no se notificaron episodios de hipoglucemia grave. Se notificaron episodios menores de hipoglucemia en el 12,8% de los sujetos que recibieron Dapagliflozina 10 mg más metformina y una sulfonilurea y en el 3,7% de los que recibieron placebo más metformina y una sulfonilurea.

#### **Depleción del volumen**

En el conjunto de los 13 estudios de seguridad, se notificaron reacciones indicativas de depleción del volumen (incluyendo notificaciones de deshidratación, hipovolemia o hipotensión) en el 1,1% y 0,7%, de los sujetos tratados con Dapagliflozina 10 mg, y placebo, respectivamente; las reacciones graves se dieron en < 0,2% de los sujetos, repartidos de forma equilibrada entre Dapagliflozina 10 mg y placebo.

#### **Cetoacidosis diabética en diabetes mellitus tipo 2**

En un estudio clínico cuyo tiempo medio de exposición fue de 48 meses, se informaron eventos de CAD en 27 pacientes del grupo tratado con Dapagliflozina 10 mg y en 12 pacientes en el grupo placebo. Los eventos ocurrieron distribuidos de forma uniforme durante el periodo del estudio. De los 27 pacientes con eventos de CAD en el grupo de Dapagliflozina, 22 recibían insulina como tratamiento concomitante en el momento del evento. Los factores desencadenantes de CAD fueron los esperados en una población de diabetes *mellitus* tipo 2.

En el estudio de prevención de eventos en insuficiencia cardíaca con Dapagliflozina, se notificaron acontecimientos de CAD en 3 pacientes con diabetes *mellitus* tipo 2 en el grupo de Dapagliflozina y ninguno en el grupo placebo.

#### **Infecciones del tracto urinario**

En el conjunto de los 13 estudios de seguridad, las infecciones del tracto urinario se informaron más frecuentemente en el grupo tratado con Dapagliflozina 10 mg en comparación con el grupo que recibió placebo (4,7% frente al 3,5%, respectivamente). La mayoría de las infecciones fueron de leve a moderadas, y los sujetos respondieron a un ciclo inicial de tratamiento convencional y rara vez ocasionaron la interrupción del tratamiento con Dapagliflozina. Estas infecciones fueron más frecuentes en mujeres y los sujetos con antecedentes presentaban mayor probabilidad de infección recurrente.

#### **Aumento de creatinina**

Las reacciones adversas relacionadas con el aumento de creatinina fueron agrupadas en este término para su evaluación (por ejemplo, descenso del *clearance* de creatinina renal, insuficiencia renal, incremento de la creatinina sérica y descenso de la tasa de filtración glomerular). En el conjunto de los 13 estudios de seguridad, esta agrupación de reacciones se notificó en el 3,2% y el 1,8% de los pacientes que recibieron Dapagliflozina 10 mg y placebo, respectivamente. En pacientes con función renal normal o insuficiencia renal leve (valor inicial de TFG estimada mayor o igual a 60 ml/min/1,73m<sup>2</sup>) esta agrupación de reacciones se notificó en el 1,3% y el 0,8% de los pacientes que recibieron Dapagliflozina 10 mg y placebo, respectivamente. Estas reacciones fueron más comunes en pacientes con un valor inicial de TFG estimada mayor o igual a 30 y menor a 60 ml/min/1,73m<sup>2</sup> (18,5% Dapagliflozina 10 mg frente a 9,3% con placebo).

Una evaluación adicional de los pacientes que presentaban eventos adversos relacionados con el riñón mostró que la mayoría presentaba cambios en la creatinina sérica de 0,5 mg/dl o menos desde el valor inicial. Los aumentos en creatinina fueron generalmente transitorios durante el tratamiento continuado o reversible después de la interrupción del tratamiento.

#### **Población pediátrica**

El perfil de seguridad de dapagliflozina observado en un estudio clínico con niños de 10 años de edad o más con diabetes *mellitus* tipo 2 fue similar al observado en los estudios en adultos.

### **SOBREDOSIFICACIÓN**

Dapagliflozina no mostró toxicidad en sujetos sanos con dosis únicas orales de hasta 500 mg (50 veces la dosis máxima recomendada en humanos). Estos sujetos presentaron glucosa detectable en orina durante un periodo de tiempo relacionado con la dosis (al menos 5 días para la dosis de 500 mg), sin ninguna notificación de deshidratación, hipotensión o desequilibrio electrolítico y sin ningún efecto clínicamente significativo sobre el intervalo QTc. La incidencia de hipoglucemia fue similar a la de placebo. En los estudios clínicos en los que se administraron dosis de hasta 100 mg una vez al día (10 veces la dosis máxima recomendada en humanos) durante 2 semanas a sujetos sanos y a sujetos con diabetes *mellitus* tipo 2, la incidencia de hipoglucemia fue ligeramente mayor que con placebo y no estuvo relacionada con la dosis. Las tasas de eventos adversos incluyendo deshidratación o hipotensión fueron similares a las de placebo y no hubo alteraciones relacionadas con la dosis clínicamente significativas en los parámetros de laboratorio, incluyendo electrolitos séricos y biomarcadores de la función renal.

En caso de sobredosis, debe iniciarse el tratamiento de mantenimiento adecuado en función del estado clínico del paciente. No se ha estudiado la eliminación de Dapagliflozina mediante hemodiálisis.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, en especial:

- *Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,*
- *Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,*

- *Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.*

#### **PRESENTACIONES**

Envases conteniendo 15, 30, 60, 500 y 1000 Comprimidos Recubiertos redondos, grabados con GLF y el logo Bagó, color amarillos, siendo las dos últimas presentaciones para uso hospitalario.

**Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 30 °C. Mantener en su envase original.**

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **GLIFOSIN** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Esta especialidad medicinal se encuentra incluida dentro de un Plan de Gestión de Riesgo.

Para información adicional del producto comunicarse con el Servicio de Orientación Integral Bagó al 0800-666-2454 / [infoproducto@bago.com.ar](mailto:infoproducto@bago.com.ar).

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 59.694.  
Prospecto autorizado por A.N.M.A.T. Disp. Nro.

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha en la Página Web de A.N.M.A.T.: <http://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia> o llamar a A.N.M.A.T. Responde 0800-333-1234.



*Ética al servicio de la salud*

#### **LABORATORIOS BAGÓ S.A.**

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.



HRYCIUK Nadina  
CUIL 27205366208



ECHEVERRIA Paula Fernanda  
CUIL 27177154259



*Ética al servicio de la salud*



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** PROSPECTO PROD. GLIFOSIN EX-2022-136304611- -APN-DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.04.28 17:37:40 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.04.28 17:37:41 -03:00

## INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

### **Glifosin** **Dapagliflozina 10 mg** **Comprimidos Recubiertos**

Industria Argentina  
EXPENDIO BAJO RECETA



#### **Este Medicamento es Libre de Gluten.**

**Lea toda la información para el paciente detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.**

- Conserve esta información para el paciente, ya que puede tener que volver a leerla.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarlas.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en esta información para el paciente.

#### **Contenido de la información para el paciente**

- 1. QUÉ ES GLIFOSIN Y PARA QUÉ SE UTILIZA**
- 2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR GLIFOSIN**
- 3. CÓMO USAR GLIFOSIN**
- 4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**
- 5. CONSERVACIÓN DE GLIFOSIN**
- 6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL**

#### **1. QUÉ ES GLIFOSIN Y PARA QUÉ SE UTILIZA**

**Glifosin** contiene el principio activo Dapagliflozina. Pertenecer a un grupo de medicamentos que se denominan "inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2 (SGLT2)". Funcionan bloqueando la proteína SGLT2 en el riñón. Al bloquear esta proteína, el azúcar en la sangre (glucosa), la sal (sodio) y el agua se eliminan del cuerpo a través de la orina.

**Glifosin** está indicado para el tratamiento de:

##### **- Diabetes tipo 2**

- en adultos y niños de 10 años o más.
- si es que la diabetes no se puede controlar con la dieta y el ejercicio.
- **Glifosin** se puede utilizar solo o junto con otros medicamentos para tratar la diabetes.
- es importante que continúe siguiendo las recomendaciones sobre dieta y ejercicio indicadas por su médico.

##### **- Insuficiencia cardíaca**

- en adultos (de 18 años o más) con síntomas debidos a un bombeo débil del corazón.

##### **- Enfermedad renal crónica**

- en adultos con función renal reducida.

**¿Qué es la diabetes tipo 2 y cómo ayuda Glifosin?**



En la diabetes tipo 2 su cuerpo no produce suficiente insulina o no es capaz de utilizar adecuadamente la insulina que produce. Esto conduce a un alto nivel de azúcar en sangre. Esto puede provocar problemas graves como enfermedades cardíacas o renales, ceguera y mala circulación en brazos y piernas.

**Glifosin** funciona eliminando el exceso de azúcar de su cuerpo. También puede ayudar a prevenir enfermedades del corazón.

#### **¿Qué es la insuficiencia cardíaca y cómo ayuda Glifosin?**

Este tipo de insuficiencia cardíaca se produce cuando el corazón está débil y no puede bombear suficiente sangre a los pulmones y al resto del cuerpo. Esto puede conducir a problemas médicos graves y necesidad de atención hospitalaria.

Los síntomas más comunes de la insuficiencia cardíaca son la sensación de falta de aire, sensación de cansancio constante e hinchazón de los tobillos.

**Glifosin** ayuda a proteger el corazón para que no se debilite y mejora sus síntomas. Puede disminuir la necesidad de internación hospitalaria y ayudar a algunos pacientes a vivir más tiempo.

#### **¿Qué es la enfermedad renal crónica y cómo ayuda Glifosin ?**

Al padecer enfermedad renal crónica, sus riñones pueden perder su función gradualmente.

Esto quiere decir que no serán capaces de limpiar y filtrar su sangre como deberían. La pérdida de la función renal puede conducir a problemas médicos graves y la necesidad de internación hospitalaria.

**Glifosin** ayuda a proteger sus riñones disminuyendo o postergando la pérdida de su funcionalidad. Esto puede ayudar a algunos pacientes a vivir más tiempo.

## **2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR GLIFOSIN**

### **No tome Glifosin**

- Si es alérgico a la Dapagliflozina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento.

### **Advertencias y precauciones**

**Consulte a su médico o diríjase inmediatamente al hospital más cercano si durante el tratamiento:**

- Si tiene diabetes y experimenta náuseas o vómitos, tiene dolor de estómago, sed excesiva, respiración rápida y profunda, confusión, somnolencia o cansancio poco habitual, olor dulce en su aliento, un sabor dulce o metálico en la boca, o un olor diferente en su orina o sudor o una pérdida de peso rápida.

Los síntomas anteriores pueden ser señal de “cetoacidosis diabética”, un problema raro pero grave, en ocasiones potencialmente mortal que ocurre con la diabetes debido a un incremento de “cuerpos cetónicos” en su orina o sangre, que se detecta en los análisis.

El riesgo de desarrollar una cetoacidosis diabética se puede incrementar con el ayuno prolongado, consumo excesivo de alcohol, deshidratación, reducciones bruscas en la dosis de insulina, o una necesidad mayor de insulina debido a una cirugía importante o una enfermedad grave.

Cuando está en tratamiento con **Glifosin**, puede ocurrir una cetoacidosis diabética aun cuando su glucosa en sangre sea normal.

La cetoacidosis diabética es de rara presentación en pacientes con diabetes tipo 2.

Si sospecha que tiene una cetoacidosis diabética, contacte con un médico o el hospital más cercano de inmediato y no tome este medicamento.

- Si presenta una combinación de síntomas de dolor, dolor a la palpación, enrojecimiento o inflamación de los genitales o de la zona entre los genitales y el ano, con fiebre o malestar general. Estos síntomas podrían ser un signo de una infección rara pero grave, incluso potencialmente mortal, denominada fascitis necrotizante del periné o gangrena de Fournier, que destruye el tejido que se encuentra inmediatamente debajo de la piel. La gangrena de Fournier se debe tratar inmediatamente.

#### **Consulte a su médico antes de empezar a usar Glifosin**

- si tiene “diabetes tipo 1” (tipo de diabetes que aparece normalmente cuando se es joven y su organismo no produce nada de insulina).
- si tiene diabetes y tiene algún problema de riñón; su médico podrá pedirle que tome un fármaco adicional u otro distinto para controlar su azúcar en sangre.
- si tiene algún problema de hígado.
- si está tomando medicamentos para disminuir su presión arterial (antihipertensivos) o tiene antecedentes de presión arterial baja (hipotensión).
- si tiene niveles muy altos de azúcar en sangre que pueden provocar deshidratación (perder demasiado líquido del organismo). Los posibles signos de la deshidratación son boca muy seca o pegajosa, orinar poca o nula cantidad; latidos cardíacos rápidos. Informe a su médico antes de empezar a tomar **Glifosin** si presenta alguno de estos signos.
- si tiene o desarrolla náuseas, vómitos o fiebre o no es capaz de comer o beber. Estos trastornos pueden provocar deshidratación. Su médico puede pedirle que deje de tomar **Glifosin** hasta que se recupere para prevenir deshidratación.
- si presenta infecciones urinarias a menudo.

#### **Cuidado de los pies**

Al igual que para todos los pacientes diabéticos, es importante que vigile sus pies de forma regular y siga los consejos referentes al cuidado de los pies que le haya proporcionado su médico.

#### **Glucosa en orina**

Debido al modo de acción de **Glifosin**, los análisis de azúcar en la orina darán resultados positivos mientras tome este medicamento.

#### **Niños y adolescentes**

**Glifosin** se puede usar en niños de 10 años de edad o más para el tratamiento de la diabetes tipo 2. No hay datos disponibles en niños menores de 10 años de edad.

**Glifosin** no está recomendado en niños ni adolescentes menores de 18 años de edad para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca o para el tratamiento de la enfermedad renal crónica, debido a que no ha sido estudiado en estos pacientes.

#### **Uso de Glifosin con otros medicamentos**

Informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica o derivados de hierbas.

Siempre debe comunicarle a su médico:

- Si está tomando diuréticos (medicamentos que favorecen la eliminación de agua del organismo), en cuyo caso su médico podría pedirle que suspenda el tratamiento con **Glifosin**.
- Si está recibiendo otros fármacos hipoglucemiantes (medicamentos que reducen la cantidad de azúcar en la sangre), como por ejemplo insulina o una “sulfonilurea”. Su médico podría reducir la dosis de tales medicamentos para evitar episodios de hipoglucemia (bajas concentraciones de azúcar en la sangre).
- Si está tomando litio, ya que **Glifosin** puede reducir la cantidad de litio en su sangre.

#### **Embarazo y lactancia**

Si está embarazada o si piensa que podría estar embarazada o si planea tener un bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. Si queda embarazada, deberá suspender el tratamiento puesto que no se recomienda durante el segundo y tercer trimestre de la gestación. Hable con su médico sobre la mejor forma de controlar la glucemia durante el embarazo. Si desea amamantar o está amamantando, consulte a su médico antes de tomar este medicamento. No debe tomar **Glifosin** si está amamantando. No se sabe si este medicamento pasa a la leche materna.

#### **Información importante sobre los componentes de Glifosin**

Este medicamento contiene lactosa (azúcar de la leche). Si conoce que padece intolerancia a ciertos azúcares, consulte con su médico antes de tomar **Glifosin**.

#### **Efectos sobre la capacidad para conducir y emplear maquinarias**

**Glifosin** no altera, o sólo de manera insignificante, la capacidad para conducir y usar maquinarias. Si toma este medicamento junto con insulina o con otros fármacos denominados “sulfonilureas”, podría sufrir episodios de hipoglucemia (niveles muy bajos de azúcar en la sangre) que pueden dar lugar a síntomas como temblor, sudoración y cambios de la visión y afectar su capacidad para conducir y usar maquinarias. No conduzca y no use maquinarias si se siente mareado después de haber tomado **Glifosin**.

### **3. CÓMO USAR GLIFOSIN**

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico, debiendo tomar la dosis exacta y durante el tiempo que su médico le haya indicado.

Tanto para la diabetes tipo 2 como para la insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal:

- La dosis recomendada es de 1 comprimido recubierto de **Glifosin** (10 mg de Dapagliflozina) al día.
- Su médico puede empezar con una dosis de 5 mg si tiene un problema de hígado.

Su médico podría recetarle **Glifosin** junto con otros medicamentos (fármacos antidiabéticos orales o insulina) para reducir la cantidad de azúcar en la sangre. Recuerde recibir estos otros medicamentos siguiendo las instrucciones de su médico. Esto ayudará a obtener los mejores resultados para su salud.

La dieta y el ejercicio pueden ayudar a su cuerpo a utilizar mejor el azúcar en sangre. Si tiene diabetes, es importante que cumpla la dieta y programa de ejercicios que le recomiende su médico mientras toma **Glifosin**.

#### **Modo de administración**

Los comprimidos recubiertos de **Glifosin** deben ingerirse con cantidad suficiente de líquido, y se pueden tomar con o sin alimentos. Puede tomar el comprimido recubierto a cualquier hora del día. Sin embargo, procure tomarlo a la misma hora cada día ya que esto le ayudará a acordarse de tomarlo.

#### **Si toma más Glifosin del que debe**

Si toma más comprimidos de **Glifosin** de los que debiera, consulte inmediatamente a un médico o acuda al hospital. Lleve el envase del medicamento consigo.

Ante la eventualidad de haber tomado una dosis mayor a la que debiera de **Glifosin** contacte a su médico, concurra al Hospital más cercano o comuníquese con un Centro de Toxicología, en especial:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247;
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115;
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.

### **Si olvidó tomar Glifosin**

Lo que debe hacer si olvidó tomar un comprimido recubierto de **Glifosin** depende de cuánto tiempo falta hasta su siguiente dosis.

- Si quedan 12 horas o más hasta su próxima dosis, tome una dosis de **Glifosin** en cuanto se acuerde. Después tome la siguiente dosis a la hora habitual.
- Si quedan menos de 12 horas hasta la dosis siguiente, no tome la dosis olvidada. Tome la siguiente dosis a la hora habitual.
- No tome una dosis doble de **Glifosin** para compensar las dosis olvidadas.

### **Si interrumpe el tratamiento con Glifosin**

No interrumpa el tratamiento con **Glifosin** sin antes consultar a su médico. Sin el tratamiento, podría aumentar su concentración de azúcar en la sangre.

## **4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS**

Al igual que todos los medicamentos, **Glifosin** puede tener efectos adversos, aunque sólo algunas personas los padecen.

**Consulte con su médico o acuda al hospital más cercano inmediatamente si usted presenta alguno de los siguientes efectos adversos**

***Angioedema (puede afectar hasta 1 de cada 10000 personas)***

Los síntomas y signos de angioedema son: hinchazón de la cara, lengua o garganta; dificultad para tragar; urticaria y problemas para respirar.

***Cetoacidosis diabética (puede afectar hasta 1 de cada 1000 personas)***

**(Ver 2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR GLIFOSIN)**

***Fascitis necrotizante del perineo o gangrena de Fournier (puede afectar hasta 1 de cada 10000 personas)***

**(Ver 2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A USAR GLIFOSIN)**

**Deje de tomar el medicamento y consulte a su médico lo antes posible si presenta alguno de los siguientes efectos adversos graves**

***Infección severa del tracto urinario (puede afectar hasta 1 de cada 10 personas)***

Los síntomas y signos de una infección grave del tracto urinario son: fiebre y/o escalofríos, sensación de ardor al orinar, dolor de espalda o en el costado. Aunque no es muy frecuente, si observa sangre en la orina, informe a su médico inmediatamente.

**Consulte a su médico lo antes posible si presenta alguno de los siguientes efectos adversos**

***Disminución de los niveles de azúcar en sangre (hipoglucemia) (puede afectar a más de 1 de cada 10 personas)***

Se presenta en pacientes con diabetes que toman este medicamento junto con una sulfonilurea o insulina.

Los síntomas y signos de una disminución del azúcar en sangre son: escalofríos, sudoración, ansiedad intensa, latido cardíaco rápido, sensación de hambre, dolor de cabeza, alteraciones de la visión, cambio del estado de ánimo o sensación de confusión.

Su médico le explicará cómo tratar la disminución de los niveles de azúcar en sangre y qué hacer si sufre alguno de los signos anteriores.

**Otros efectos adversos del tratamiento con Glifosin**

***Frecuentes (puede afectar hasta 1 de cada 10 personas):***

- infecciones genitales provocadas por un hongo (micosis) del pene o la vagina (los signos pueden incluir irritación, picazón y flujo u olor anormal).
- dolor de espalda.
- orinar más cantidad de lo normal o necesidad de orinar más frecuentemente.

- cambios en los niveles de colesterol o lípidos en la sangre (según los resultados de los análisis de sangre).
- aumentos en la cantidad de glóbulos rojos en sangre (según los resultados de los análisis de sangre).
- disminución de la depuración renal de creatinina (según los resultados de análisis), al inicio del tratamiento.
- mareos.
- erupción.

***Poco frecuentes (puede afectar hasta 1 de cada 100 personas):***

- pérdida excesiva de líquidos del organismo (deshidratación); los signos pueden ser boca muy seca o pegajosa, orinar poca o nula cantidad; o latidos cardíacos rápidos.
- sed.
- estreñimiento.
- despertares nocturnos por necesidad de orinar.
- sequedad de boca.
- disminución de peso.
- aumento de la creatinina en sangre (análisis de laboratorio que indica cómo funcionan sus riñones), al inicio del tratamiento.
- aumento de la urea (observado en los análisis de sangre).

***Muy raros (puede afectar hasta 1 de cada 10000 personas)***

- inflamación de los riñones (nefritis tubulointersticial).

## **5. CONSERVACIÓN DE GLIFOSIN**

**Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor de 30 °C. Mantener en su envase original.**

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

## **6. CONTENIDO DEL ENVASE E INFORMACIÓN ADICIONAL**

El principio activo de **Glifosin** es Dapagliflozina.

Cada Comprimido Recubierto contiene: Dapagliflozina (como Dapagliflozina Propanodiol Monohidrato) 10 mg. Los demás componentes son: Lactosa; Anhídrido Silícico Coloidal; Povidona Reticulada; Estearato de Magnesio; Celulosa Microcristalina; Hipromelosa; Dióxido de Titanio; Polietilenglicol; Óxido Férrico Amarillo.

**Aspecto del producto y contenido del envase**

Envases conteniendo 15, 30, 60, 500 y 1000 Comprimidos Recubiertos, grabados con GLF y el logo Bagó, color amarillo, siendo las dos últimas presentaciones para uso hospitalario.

**AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, GLIFOSIN DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Esta especialidad medicinal se encuentra incluida dentro de un Plan de Gestión de Riesgo. (Plan especial de Farmacovigilancia para garantizar el uso adecuado y seguro del producto).

Para información adicional del producto comunicarse con el Servicio de Orientación Integral Bagó al 0800-666-2454 / [infoproducto@bago.com.ar](mailto:infoproducto@bago.com.ar).

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 59.694.

Información para el paciente autorizada por A.N.M.A.T. Disp. Nro.

Ante cualquier inconveniente con el producto, puede llenar la ficha en la Página Web de A.N.M.A.T.: <http://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia> o llamar a A.N.M.A.T. Responde 0800-333-1234.



*Ética al servicio de la salud*

**LABORATORIOS BAGÓ S.A.**

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Tel.: (0221) 425-9550/54.



HRYCIUK Nadina  
CUIL 27205366208



ECHEVERRIA Paula Fernanda  
CUIL 27177154259



*Ética al servicio de la salud*



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** INFORMACION PARA EL PACIENTE PROD. GLIFOSIN EX-2022-136304611- -APN-  
DGA#ANMAT

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.04.28 17:38:08 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.04.28 17:38:08 -03:00