



"2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813"

*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

DISPOSICIÓN N° **6717**

BUENOS AIRES, **04 NOV 2013**

VISTO el Expediente N° 1-0047-0000-011630-13-2 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A., solicita la aprobación de nuevos proyectos de prospectos y la información para el paciente para la Especialidad Medicinal denominada VICTOZA / LIRAGLUTIDA, Forma farmacéutica y concentración: SOLUCION INYECTABLE 6 mg/ml, aprobada por Certificado N° 55.564.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición N°: 5904/96 y la Circular ANMAT N° 004/2013.

Que los procedimientos para las modificaciones y/o rectificaciones de los datos característicos correspondientes a un certificado de Especialidad Medicinal otorgado en los términos de la Disposición ANMAT



"2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N° 6717

Nº 5755/96, se encuentran establecidos en la Disposición ANMAT Nº 6077/97.

Que a fojas 203 obra el informe técnico favorable del Departamento de Evaluación de Medicamentos.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por los Decretos Nros.: 1.490/92 y 1271/13.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

5, ARTICULO 1º. - Autorízase el cambio de prospectos y la información para el paciente presentado para la Especialidad Medicinal denominada VICTOZA / LIRAGLUTIDA, Forma farmacéutica y concentración: SOLUCION INYECTABLE 6 mg/ml, aprobada por Certificado Nº 55.564 y Disposición Nº 2468/10, propiedad de la firma NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A., cuyos textos constan de fojas 111 a 179, para los prospectos y de fojas 180 a 194, para la información para el paciente.

ARTICULO 2º. - Sustitúyase en el Anexo II de la Disposición autorizante ANMAT Nº 2468/10 los prospectos autorizados por las fojas 111 a 133 y la

95



"2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

DISPOSICIÓN N°

6717

información para el paciente autorizada por las fojas 180 a 184, de las aprobadas en el artículo 1º, los que integrarán el Anexo de la presente.

ARTICULO 3º. - Acéptase el texto del Anexo de Autorización de modificaciones el cual pasa a formar parte integrante de la presente disposición y el que deberá agregarse al Certificado N° 55.564 en los términos de la Disposición ANMAT N° 6077/97.

ARTICULO 4º. - Regístrese; por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la copia autenticada de la presente disposición conjuntamente con los prospectos, la información para el paciente y Anexos, gírese al Departamento de Registro a los fines de confeccionar el legajo correspondiente, Cumplido, Archívese.

EXPEDIENTE N° 1-0047-0000-011630-13-2

DISPOSICIÓN N°

6717


Dr. OTTO A. ORSINGER
Sub Administrador Nacional
A.N.M.A.T.

js

9
5



"2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

ANEXO DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIONES

El Administrador Nacional de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), autorizó mediante Disposición N°.....**6717** a los efectos de su anexo en el Certificado de Autorización de Especialidad Medicinal N° 55.564 y de acuerdo a lo solicitado por la firma NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A., del producto inscripto en el registro de Especialidades Medicinales (REM) bajo: Nombre comercial / Genérico/s: VICTOZA / LIRAGLUTIDA, Forma farmacéutica y concentración: SOLUCION INYECTABLE 6 mg/ml.- Disposición Autorizante de la Especialidad Medicinal N° 2468/10.- Tramitado por expediente N° 1-47-0000-017798-08-9.-

DATO A MODIFICAR	DATO AUTORIZADO HASTA LA FECHA	MODIFICACION AUTORIZADA
Prospectos, información para el paciente.-	Anexo de Disposición N° 2734/13.-	Prospectos de fs. 111 a 179, corresponde desglosar de fs. 111 a 133. Información para el paciente de fs. 180 a 194, corresponde desglosar de fs. 180 a 184.-

El presente sólo tiene valor probatorio anexo al certificado de Autorización antes mencionado.

Se extiende el presente Anexo de Autorización de Modificaciones del REM a la firma NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A., Titular del



"2013 - Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.

Certificado de Autorización N° 55.564 en la Ciudad de Buenos Aires, a los días **04 NOV 2013**, del mes de.....

Expediente N° 1-0047-0000-011630-13-2

DISPOSICIÓN N°

6717

Dr. OTTO A. ORSINGER
Sub Administrador Nacional
A.N.M.A.T.

9 js

ORIGINAL

6717
novo nordisk



VICTOZA®
LIRAGLUTIDA 6 mg/ml
Solución inyectable

Venta Bajo Receta
Industria Danesa

Presentación

Liraglutida es un análogo del GLP-1 humano. Victoza® se presenta como una solución isotónica (pH 8,15) clara e incolora para inyección subcutánea, en lapiceras pre-llenadas de 3 ml.

Composición

1 ml contiene 6 mg de liraglutida (producida a partir de tecnología de ADN recombinante en *Saccharomyces cerevisiae*).
Cada lapicera contiene 3 ml, equivalentes a 18 mg de liraglutida.

Excipientes: fosfato disódico dihidrato 1,42 mg, propilenglicol 14,0 mg, fenol 5,5 mg y agua para inyección c.s.p. 1 ml.

Acción Terapéutica:

Análogo de GLP-1 humano (Péptido similar al glucagón 1).

Código ATC: A10BX07.

Otros fármacos reductores de los niveles de glucosa en sangre, excluyendo insulinas.

Indicaciones Terapéuticas

Victoza® está indicada en el tratamiento de diabetes tipo 2 en adultos, para alcanzar el control glucémico:

En combinación con:

- Metformina o sulfonilurea, en pacientes con control glucémico insuficiente, a pesar de haber recibido la dosis máxima tolerada de metformina o sulfonilurea en monoterapia.

En combinación con:

- Metformina y sulfonilurea o metformina y tiazolidinediona en pacientes con insuficiente control glucémico a pesar de la terapia dual.

Propiedades farmacológicas

Propiedades farmacodinámicas

Mecanismo de acción

Liraglutida es un análogo del Péptido 1 similar al glucagón humano (GLP-1) con 97% de homología al GLP-1 humano que se une y activa al receptor GLP-1. El receptor GLP-1 es el blanco para GLP-1 nativo, una hormona

Dr. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Apoderado

Victoza® - STF Q2 2013 - 8-9695-00-018-1

Farm. ROMINA L. MAGA
DIRECTORA TÉCNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.



incretina endógena que potencia la secreción de insulina glucosa-dependiente desde las células beta pancreáticas. A diferencia del GLP-1 nativo, liraglutida posee un perfil farmacocinético y farmacodinámico en los seres humanos, adecuado para la administración 1 vez al día. Siguiendo a la administración subcutánea, el perfil de acción prolongado está basado en tres mecanismos: autoasociación, lo cual resulta en una absorción lenta, una unión a la albúmina y una mayor resistencia a la degradación enzimática de la enzima dipeptidil peptidasa IV (DPP-IV) y la enzima endopeptidasa neutra (NEP) resultando en una prolongada vida media plasmática.

La acción de liraglutida está mediada a través de una interacción específica con los receptores de GLP-1, que conduce a un incremento en el AMP cíclico.

Liraglutida estimula la secreción de la insulina de una manera glucosa-dependiente. Simultáneamente, liraglutida disminuye la secreción de glucagon inadecuadamente incrementada, también de una manera glucosa-dependiente. Así, cuando el nivel de glucosa en sangre es alto, se estimula la secreción de la insulina y se inhibe la secreción de glucagon. Inversamente, durante la hipoglucemia, liraglutida disminuye la secreción de insulina y no deteriora la secreción de glucagon. El mecanismo de descenso de la glucosa en sangre también involucra un leve retraso en el vaciamiento gástrico. Liraglutida reduce el peso y la masa grasa del cuerpo a través de los mecanismos que implican disminución del apetito y menor ingesta calórica.

Efectos farmacodinámicos

Liraglutida posee una duración de acción de 24 horas y mejora el control glucémico mediante el descenso de la glucosa tanto en ayunas como post prandial en pacientes con diabetes mellitus tipo 2.

Secreción de insulina dependiente de glucosa

Liraglutida aumenta la secreción de insulina en relación al aumento de concentraciones de glucosa. Usando una infusión gradual de glucosa graduada, la velocidad de secreción de insulina fue incrementada siguiendo una dosis simple de liraglutida en pacientes con diabetes tipo 2 a un nivel comparable a lo observado en sujetos sanos.

Eficacia Clínica

Se realizaron 5 estudios doble ciego, controlados y randomizados, diseñados para evaluar los efectos de Victoza® en el control glucémico. El tratamiento con Victoza® produce mejoría clínica y estadísticamente significativa en la hemoglobina glicosilada A_{1c} (HbA_{1c}), glucosa plasmática en ayunas y glucosa post prandial comparado contra placebo.

Estos estudios incluyeron 3978 sujetos expuestos con Diabetes Tipo 2 (2501 sujetos tratados con Victoza®) 53,7% hombres y 46,3% mujeres, 797 sujetos (508 tratados con Victoza®) de ≥ 65 años y 113 sujetos (66 tratados con Victoza®) de ≥ a 75 años.

También se llevó a cabo un estudio adicional abierto-randomizado controlado

Dr. ALDO A. CHIARELLI

NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.

Apoderado

Victoza® - STF Q2 2013 - 8-9695-00-018-1

Farm. ROMINA L. MAGA

COORDINADORA TÉCNICA

NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.



comparando Victoza® con Exenatida.

En un estudio clínico de 52 semanas, la adición de insulina detemir a 1,8 mg de Victoza® y metformina en pacientes que no alcanzaron los objetivos glucémicos con Victoza® y metformina solos, resultaron en una disminución del 0,54% la HbA_{1c} basal comparado con 0,20% en el grupo control 1,8 mg de Victoza® y metformina. La pérdida de peso fue sostenida.

Control glucémico

Victoza® en terapia combinada con metformina, glimepirida o metformina y rosiglitazona por 26 semanas, resultó en una reducción sustancial y estadísticamente significativa ($p < 0,0001$) de la HbA_{1c} en comparación con pacientes quienes recibieron placebo (Tablas 1 y 2)

Tabla 1 Resultado de dos estudios de 26 semanas. Victoza® en combinación con metformina y Victoza® en combinación con glimepirida

Metformina adicionada a la terapia	1,8 mg liraglutida + metformina ³	1,2 mg liraglutida + metformina ³	placebo + metformina ³	Glimepirida ² + metformina ³
N	242	240	121	242
HbA_{1c} promedio (%)				
Línea de base	8,4	8,3	8,4	8,4
Cambio desde la línea de base	-1,00	-0,97	0,09	-0,98
Pacientes (%) que alcanzaron HbA_{1c} <7%				
Todos los pacientes	42,4	35,3	10,8	36,3
Previo monoterapia con ADOs	66,3	52,8	22,5	56,0
Peso corporal promedio (Kg)				
Línea de base	88,0	88,5	91,0	89,0
Cambio desde la línea de base	-2,79	-2,58	-1,51	0,95
Glimepirida adicionada a la terapia	1,8 mg liraglutida + Glimepirida ²	1,2 mg liraglutida + Glimepirida ²	Placebo + Glimepirida ²	Rosiglitazona ¹ + Glimepirida ²
N	234	228	114	231
HbA_{1c} promedio (%)				
Línea de base	8,5	8,5	8,4	8,4
Cambio desde la línea de base	-1,13	-1,08	0,23	-0,44
Pacientes (%) que alcanzaron HbA_{1c} < 7%				
Todos los pacientes	41,6	34,5	7,5	21,9
Previa Monoterapia ADOs	55,9	57,4	11,8	36,1
Peso corporal promedio (Kg)				
Línea de base	83,0	80,0	81,9	80,6
Cambio desde la línea de base	-0,23	0,32	-0,10	2,11

¹ Rosiglitazona 4 mg/día, ² Glimepirida 4 mg/día, ³ Metformina 2000 mg/día

Tabla 2- Resultados de dos estudios de 26 semanas. Victoza® en combinación con metformina + rosiglitazona y Victoza® en combinación con glimepirida + metformina.


[Handwritten signature]

Dr. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Aprobado

Victoza® - STF Q2 2013 - 8-9695-00-018-1

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
Farm. ROMINA L. MAGA
CO DIRECTORA TÉCNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A. 3



Metformina + rosiglitazona adicionada a la terapia	1,8 mg liraglutida + metformina ² + rosiglitazona ³	1,2 mg liraglutida + metformina ² + rosiglitazona ³	placebo + metformina ² + rosiglitazona ³	N/A
N	178	177	175	
HbA1c promedio (%)				
Línea de base	8,56	8,48	8,42	
Cambio desde la línea de base	-1,48	-1,48	-0,54	
Pacientes (%) que alcanzaron HbA1c <7%				
Todos los pacientes	53,7	57,5	28,1	
Peso corporal promedio (Kg)				
Línea de base	94,9	95,3	98,5	
Cambio desde la línea de base	-2,02	-1,02	0,60	
Metformina + Glimpirida adicionada a la terapia	1,8 mg liraglutida + metformina ² + glimepirida ⁴	N/A	Placebo + metformina ² + glimepirida ⁴	Insulina glargina ¹ + metformina ² + glimepirida ⁴
N	230		114	232
HbA1c promedio (%)				
Línea de base	8,3		8,3	8,1
Cambio desde la línea de base	-1,33		-0,24	-1,09
Pacientes (%) que alcanzaron HbA1c < 7%				
Todos los pacientes	53,1		15,3	45,8
Peso corporal promedio (Kg)				
Línea de base	85,8		85,4	85,2
Cambio desde la línea de base	-1,81		-0,42	1,62

¹ La dosis de insulina glargina fue abierta y fue aplicada de acuerdo a la siguiente guía de titulación. La titulación de la insulina glargina fue manejada por el paciente luego de ser instruido por el investigador.

Guía para la titulación de insulina glargina

Auto-medición glucosa plasmática en ayunas (FPG)	Incremento de la dosis de insulina glargina (Unidad Internacional)
≤ 5,5 mmol/l (≤100 mg/dl) objetivo	Sin ajuste
> 5,5 y < 6,7 mmol/l (>100 y < 120 mg/dl)	0 – 2 ^a UI
≥ 6,7 mmol/l (≥ 120 mg/dl)	2 UI

^a De acuerdo a las recomendaciones individuales dadas por el investigador en la visita previa dependiendo por ejemplo de si el paciente ha experimentado hipoglucemia.

² Metformina 2000 mg/día, ³ Rosiglitazona 4 mg dos veces al día,

⁴ Glimpirida 4 mg/día.

Proporción de pacientes que alcanzaron reducciones de la HbA1c

Tras 26 semanas, Victoza[®] en combinación con metformina, glimepirida o metformina y rosiglitazona tuvo como resultado una mayor proporción estadísticamente significativa ($p \leq 0,0001$) de pacientes que alcanzaron un HbA_{1c} ≤ 6,5 % en comparación con los pacientes que recibieron estos medicamentos solamente.

Glucosa plasmática en ayunas

El tratamiento con Victoza[®] sólo o en combinación con uno o dos antidiabéticos orales, resultó en una reducción de la glucosa plasmática en


Dr. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Agoderado

Victoza[®] - STF Q2 2013 - 8-9695-00-018-1

Farm. ROMINA L. MAGA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.

ORIGINAL

6717



ayunas de 13 – 43,5 mg/dl (0,72 – 2,42 mmol/l). Esta reducción se observó dentro de las 2 primeras semanas de tratamiento.

Glucosa post prandial

Victoza® reduce la glucosa post-prandial en 31-49 mg/dl (1,68 – 2,71 mmol/l) a lo largo de las 3 comidas diarias.

Funcionamiento de las células beta:

Estudios clínicos con Victoza® indican mejora del funcionamiento de las células beta en mediciones tales como el modelo hemostático de evaluación de la función de la célula beta (HOMA-B) y la relación pro insulina a insulina. Luego de 52 semanas de tratamiento con Victoza® fue demostrada una mejora de la primera y segunda fase de la secreción de insulina en un subgrupo de pacientes con diabetes tipo 2 (N=29).

Peso corporal

Victoza® en combinación con metformina, metformina y glimepirida o metformina y rosiglitazona fue asociado con una reducción sustancial de peso durante la duración de los estudios en un rango desde 1,0 Kg a 2,8 Kg.

Se observó una mayor reducción de peso con el incremento del índice de masa corporal (IMC) en la línea de base.

Se observó una reducción del peso corporal independientemente de la aparición de náuseas en pacientes tratados con Victoza®.

Victoza® en combinación con metformina redujo el tejido adiposo visceral en un rango de 13-17%.

Presión sanguínea

A lo largo de la duración de los estudios, Victoza® descendió la presión sanguínea sistólica en un promedio de entre 2,3 a 6,7 mmHg desde la línea de base y comparado al comparador activo el descenso fue 1,9 a 4,5 mmHg.

Otros ensayos clínicos

En un estudio comparando la eficacia y seguridad de Victoza® 1,8 mg y exenatida 10 µg dos veces por día en pacientes controlados inadecuadamente con terapias con metformina y/o sulfonilureas, el tratamiento con Victoza® fue superior a exenatida en reducir HbA_{1c} luego de 26 semanas (-1,12% vs -0,79%, $p < 0,0001$). Significativamente más pacientes alcanzaron HbA_{1c} por debajo de 7% con Victoza® comparado con exenatida (54,2% vs 43,4%, $p = 0,0015$). Ambos tratamientos resultaron en una pérdida de peso corporal promedio de aproximadamente 3 kg. La proporción de pacientes que reportaron náuseas fue menor con Victoza® que con exenatida. La menor tasa de hipoglucemias en el grupo de Victoza® fue significativamente menor comparado con el grupo de exenatida (1932 versus 2600 eventos por sujeto anual, $p = 0,01$). El cambio de pacientes de exenatida a Victoza® después de 26 semanas de tratamiento resultó en una reducción adicional en HbA_{1c} (-0,32%, $p < 0,0001$) en la semana 40, generando también otro 13 % de pacientes por debajo de HbA_{1c} del 7%.

Dr. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Apoderado

Victoza® - STF Q2 2013 - 8-9695-00-018-1

Dr. ROMINA L. MAGA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.



En un estudio comparando la eficacia y seguridad de Victoza® (1,2 mg y 1,8 mg) y sitagliptina (un inhibidor DDP-4, 100 mg) en pacientes controlados inadecuadamente con terapia con metformina, Victoza® en ambas dosis fue superior al tratamiento con sitagliptina en reducir HbA_{1c} luego de 26 semanas (-1,24%, -1,50% vs -0,90%, $p < 0,0001$). Significativamente más pacientes alcanzaron HbA_{1c} por debajo de 7% con Victoza® comparado con sitagliptina (43,7% y 56,0% vs 22,0%, $p < 0,0001$). Pacientes tratados con Victoza® tuvieron una disminución significativa en el peso corporal comparado a los pacientes tratados con sitagliptina (-2,9 kg y -3,4 kg vs -1,0 kg, $p < 0,0001$). Gran proporción de pacientes tratados con Victoza® experimentaron náuseas vs personas tratados con sitagliptina. Sin embargo fue demostrado que las náuseas son transitorias. La menor tasa de hipoglucemia no fue significativamente diferente entre Victoza® y el tratamiento con sitagliptina (0,178 y 0,161 vs 0,106 episodios por sujeto anual). Las reducciones en la HbA_{1c} y la superioridad vs sitagliptina se observó luego de la semana 26 de tratamiento con Victoza® (1,2 mg y 1,8 mg) fueron mantenidos después de 52 semanas de tratamiento (-1,29% y -1,51% vs -0,88%, $p < 0,0001$). El cambio de pacientes de sitagliptina a Victoza® después de 52 semanas de tratamiento resultó en una reducción en HbA_{1c} adicional y estadísticamente significativa (0,24% y 0,45%, 95% IC: 0,41 a 0,07 y -0,67 a 0,23) en la semana 78, aunque un grupo control formal no fue disponible.

Propiedades farmacocinéticas

Absorción

La absorción de liraglutida que sigue a la administración subcutánea es lenta alcanzando la máxima concentración post dosis entre las 8-12 horas. La concentración máxima de liraglutida estimada fue de 9,4 nmol/l para una única dosis subcutánea de liraglutida de 0,6 mg. A la concentración de 1,8 mg de liraglutida, la concentración promedio de liraglutida en estado estacionario (AUC_{0-24}) alcanzó aproximadamente 34 nmol/l. La exposición a liraglutida se incrementó proporcionalmente con la dosis. El coeficiente de variación intra-individual del área bajo la curva (AUC) para liraglutida fue del 11% luego de la administración de una dosis única.

La biodisponibilidad absoluta de liraglutida que sigue a la administración subcutánea es aproximadamente del 55%.

Distribución

El volumen de distribución aparente luego de la administración subcutánea es de 11 -17 litros. El volumen de distribución promedio luego de la administración intravenosa de liraglutida es 0,07 l/kg. Liraglutida está extensivamente ligada a las proteínas plasmáticas (>98%).

Metabolismo

Durante las 24 horas siguientes a la administración de una única dosis de liraglutida [³H] radiomarcada a sujetos sanos, el mayor componente en plasma fue liraglutida intacto. Dos metabolitos menores fueron detectados en

Dr. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.

Autorizado

Victoza® - STF Q2 2013 - 8-9695-00-018-1

Dr. ROMINA L. MAGA
COORDINADORA TÉCNICA 6
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.

ORIGINAL



plasma (< 9% y < 5% del total de plasma expuesto a radioactividad). Liraglutida es metabolizado de forma similar a proteínas grandes sin un órgano específico como mayor vía de eliminación.

Eliminación

Tras la dosis de liraglutida- [³H], no fue detectada liraglutida intacta en orina o heces. Sólo una parte menor de lo administrado radiactivamente fue excretado como metabolitos relacionados con liraglutida en orina o heces (6% y 5%, respectivamente). La orina y heces radiactivas fueron principalmente excretadas durante los primeros 6-8 días, y corresponden a los tres metabolitos menores, respectivamente.

El clearance medio seguido a la administración subcutánea de una dosis única de liraglutida es aproximadamente 1,2 l/h con una vida media de eliminación de aproximadamente 13 horas.

Poblaciones especiales

Ancianos: La edad no tuvo efectos clínicos relevantes sobre la farmacocinética de liraglutida basado en los resultados de estudio de farmacocinética en sujetos sanos y el análisis farmacocinético de los datos de la población de pacientes (18 a 80 años).

Género: El género no tuvo efectos clínicamente relevantes en la farmacocinética de liraglutida basado en los datos de los resultados de los análisis farmacocinéticos en poblaciones de pacientes de sexo femenino y masculino y en un estudio farmacocinético en sujetos sanos.

Raza: La raza no tuvo efectos clínicamente relevantes en la farmacocinética de liraglutida basado en los resultados de los análisis farmacocinéticos de poblaciones los cuales incluyen sujetos de grupos étnicos blancos, negros, asiáticos e hispanos.

Obesidad: El análisis farmacocinético de poblaciones sugiere que el índice de masa corporal (IMC) no tiene efecto significativo en la farmacocinética de liraglutida.

Deterioro hepático: La farmacocinética de liraglutida fue evaluada en sujetos con diversos grados de deterioro hepático en un estudio de dosis única.

La exposición a liraglutida se redujo en 13-23% en sujetos con deterioro de la función hepática media a moderada comparado con sujetos sanos.

La exposición fue significativamente menor (44%) en sujetos con deterioro hepático severo (Child Pugh score >9).

Deterioro renal: La exposición a liraglutida fue reducida en sujetos con deterioro renal comparado con individuos con función renal normal. La exposición a liraglutida descendió a 33%, 14%, 27% y 28% respectivamente, en sujetos con media (Clearance de creatinina CrCl 50-80 ml/min), moderada (Clearance de creatinina CrCl 30-50 ml/min), y severa (Clearance de creatinina CrCl <30 ml/min) deterioro renal y en el estadio final de la enfermedad renal que requiere de diálisis.

Dr. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Aprobado

Victoza® - STF Q2 2013 - 8-9695-00-018-1

Dr. ROMINA L. MAGA
COORDINADORA TÉCNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.

7



Datos de seguridad preclínica

Los datos No-clínicos no revelan peligro especial para los seres humanos basados en estudios convencionales de seguridad farmacológica, toxicidad o genotoxicidad.

Se han observado tumores no letales en células C de tiroides en ratas y ratones en estudios de carcinogenicidad de 2 años. En ratas, no se observó un "nivel de efecto adverso no observado (NOAEL)". Estos tumores no se observaron en estudios en monos tratados durante 20 meses. Estos hallazgos en roedores son causados por un mecanismo mediado por receptor GLP-1 específico no-genotóxico, por el cual los roedores son particularmente sensibles. La relevancia en humanos sería baja pero no puede ser completamente descartada. No fueron encontrados otros tumores relacionados al tratamiento.

Estudios en animales no indicaron efectos perjudiciales directos con respecto a la fertilidad, pero a dosis más altas se produjo un ligero aumento de las muertes embrionarias tempranas. La dosificación con Victoza[®] durante la etapa media de la gestación causó una reducción en el peso materno y el crecimiento fetal con efectos equívocos en costillas en ratas y variación esquelética en conejos. El crecimiento neonatal fue reducido en ratas durante la exposición al Victoza[®] y persistió en el período posterior al destete en el grupo de dosis altas. Se desconoce si estos efectos están relacionados a efectos directos de GLP-1 o a una disminución en la producción de leche materna por una ingesta calórica reducida.

Posología y forma de administración

Posología

La dosis inicial de liraglutida es de 0,6 mg al día. Luego de al menos una semana, la dosis debería ser incrementada a 1,2 mg. Algunos pacientes pueden verse beneficiados por un incremento de dosis de 1,2 mg a 1,8 mg y basado en la respuesta clínica y luego de al menos una semana, la dosis puede ser incrementada a 1,8 mg para mejorar el control glucémico. No se recomiendan dosis diarias mayores de 1,8 mg.

Victoza[®] puede ser adicionado a una terapia de metformina existente o a una terapia combinada de metformina y tiazolidindiona. La dosis actual de metformina y tiazolidindiona puede ser continuada sin cambios.

Victoza[®] puede ser adicionada a una sulfonilurea existente o a una terapia combinada con metformina y sulfonilurea. En esta terapia deberá considerarse bajar la dosis de sulfonilurea para reducir el riesgo de hipoglucemia (ver Precauciones y advertencias especiales para su uso)

El auto-monitoreo de glucosa en sangre no es necesario para el ajuste de la dosis de Victoza[®]. Sin embargo, cuando se inicia el tratamiento con Victoza[®] en combinación con una sulfonilurea, el auto-monitoreo glucémico puede ser necesario para ajustar la dosis de sulfonilurea.

Grupos especiales de pacientes

Ancianos (>65 años): No se requiere ajuste de la dosis acorde a la edad.

Dr. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.

Apoderado
Victoza[®] - STF Q2 2013 - 8-9695-00-018-1

Fabi. ROMINA L. MAGA
CD DIRECTORA TECNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.

ORIGINAL



La experiencia terapéutica en pacientes de mayores de 75 años es limitada (ver propiedades farmacocinéticas)

Pacientes con deterioro (insuficiencia) renal: Para pacientes con deterioro (insuficiencia) renal leve no se requiere ajuste de la dosis. Hay experiencia limitada en pacientes con deterioro renal moderado. Victoza® puede actualmente no ser recomendado para el uso en pacientes con deterioro renal moderado a severo incluyendo pacientes con deterioro renal en estadio terminal (ver propiedades farmacocinéticas).

Pacientes con deterioro (insuficiencia) hepático: La experiencia terapéutica en pacientes con deterioro (insuficiencia) hepático es demasiado limitada como para recomendar el uso en pacientes con deterioro hepático leve, moderado o severo. (Ver propiedades farmacocinéticas)

Niños y adolescentes: No se recomienda el uso de Victoza® en pacientes de menos de 18 años de edad debido a falta de datos.

Forma de Administración

Victoza® se administra en cualquier momento una vez al día, independiente de las comidas, y puede ser inyectado de forma subcutánea en el abdomen, en el muslo o el antebrazo. Los sitios de inyección y horarios pueden ser cambiados sin ajustar la dosis. Sin embargo es preferible que Victoza® se inyecte a la misma hora cuando se haya elegido un horario conveniente.

Para más instrucciones de uso (ver precauciones especiales para su uso).

Victoza® no debe administrarse en forma intravenosa o intramuscular.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad a liraglutida o a cualquiera de sus excipientes.

Precauciones y advertencias especiales para su uso

Victoza® no debe ser usada en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o en el tratamiento de cetoacidosis diabética.

Victoza® no es un sustituto de la insulina.

La adición de liraglutida en pacientes ya tratados con insulina no ha sido evaluada.

Existe experiencia limitada en pacientes con falla cardíaca congestiva de clase I-II según la Asociación Cardíaca de New York (NYHA). No hay experiencia en pacientes con falla cardíaca congestiva de clase III-IV (NYHA). Existe experiencia limitada en pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria y gastroparesia diabética y Victoza® es por lo tanto no recomendada en estos pacientes. El uso de Victoza® está asociado a reacciones adversas gastrointestinales transitorias que incluyen náuseas, vómitos y diarreas.

El uso de otro GLP-1 análogo ha sido asociado con el riesgo de pancreatitis. Hubo pocos eventos de pancreatitis aguda reportados. Los pacientes deben ser informados de las características de los síntomas de la pancreatitis aguda: dolor abdominal persistente y severo. Si se sospecha pancreatitis, Victoza® y otros productos medicinales que se contemplen como posibles causantes deben ser discontinuados.

Dr. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Apoderado

Victoza® - STF Q2 2013 - 8-9695-00-018-1

Farm. ROMINA L. MAGA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.

En estudios clínicos han sido reportados eventos adversos tiroideos, incluyendo incremento de la calcitonina en sangre, bocio y neoplasma tiroideo, en particular en pacientes con alteraciones tiroideas pre-existentes (ver efectos adversos).

Han sido reportados signos y síntomas de deshidratación, incluyendo disfunción renal y falla renal aguda, en pacientes tratados con Victoza®.

Se debe advertir a los pacientes tratados con Victoza® de que existe riesgo potencial de deshidratación relacionado con los efectos adversos gastrointestinales y de que tomen precauciones para evitar la pérdida de líquidos.

Pacientes que reciben Victoza® en combinación con sulfonilurea pueden tener un incremento del riesgo de hipoglucemia (Ver efectos adversos).

El riesgo de hipoglucemia puede ser disminuido con la reducción de la dosis de sulfonilurea.

Interacciones con otros productos medicinales y otras formas de interacción

In vitro, liraglutida ha demostrado muy bajo potencial de estar implicado en interacciones farmacocinéticas con otras sustancias activas relacionadas con el citocromo P450 y la unión a proteínas plasmáticas.

El leve retraso en el vaciamiento gástrico causado por liraglutida puede influenciar la absorción de productos medicinales administrados oralmente en forma concomitante. Estudios de interacción no mostraron retrasos en la absorción clínicamente relevantes. Pocos pacientes tratados con liraglutida reportaron al menos un episodio de diarrea severa. La diarrea puede afectar la absorción de productos medicinales administrados por vía oral en forma concomitante.

Paracetamol

Liraglutida no cambió la exposición general a paracetamol luego de la administración de una dosis única de 1000 mg. El C_{max} de paracetamol descendió en 31% y el t_{max} medio se retrasó hasta 15 minutos. No se requirió ajuste de la dosis con el uso concomitante con paracetamol.

Atorvastatina

Liraglutida no cambió la exposición general a atorvastatina en un grado clínicamente relevante, luego de la administración de una dosis única de atorvastatina 40 mg. Por lo tanto, no se requiere ajuste de la dosis de atorvastatina cuando se administra con liraglutida. El C_{max} de atorvastatina descendió a 38% y el t_{max} se retrasó de 1 hora a 3 horas con liraglutida.

Griseofulvina

Liraglutida no cambió la exposición general a griseofulvina luego de la administración de una dosis única de griseofulvina 500 mg. El C_{max} de griseofulvina aumentó un 37% mientras que el t_{max} medio no cambió. No se requiere ajuste de la dosis de griseofulvina y otros compuestos con baja solubilidad y alta permeabilidad.

Dr. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Apoderado

Victoza® - STF Q2 2013 - 8-9695-00-018-1

Fern. ROMANA L. MAGA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.

ORIGINAL



Digoxina

La administración de una dosis única de 1 mg de digoxina con liraglutida produjo una reducción en la AUC de digoxina de un 16 %; la C_{max} disminuyó un 31 %. Se produjo un retraso en el t_{max} medio de la digoxina de 1 h a 1,5 horas. No es necesario un ajuste de dosis de digoxina en base a estos resultados.

Lisinopril

La administración de dosis única de lisinopril 20 mg con liraglutida mostró reducción del área bajo la curva (AUC) de lisinopril en 15%; el C_{max} descendió un 27%. El t_{max} medio de lisinopril fue retrasado de 6 horas a 8 horas con liraglutida; Basado en los resultados obtenidos no se requieren ajustes de las dosis de lisinopril.

Anticonceptivos orales

Liraglutida redujo el C_{max} de etinilestradiol y levonorgestrel en 12% y 13% respectivamente. Luego de la administración de una única dosis de un producto anticonceptivo oral. La t_{max} fue 1,5 horas más tarde con liraglutida para los dos compuestos. No hubo efectos clínicamente relevantes en la exposición general de etinilestradiol o levonorgestrel. Por lo tanto, el efecto anticonceptivo demuestra no ser afectado con la administración concomitante con liraglutida.

Warfarina y otros derivados de la cumarina

No se han realizado estudios de interacción. A partir del inicio del tratamiento con Victoza[®] en pacientes tratados con warfarina u otros derivados cumarínicos se recomienda un monitoreo más frecuente del INR (relación normalizada internacional)

Insulina

No se observaron interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas entre liraglutida e insulina detemir cuando se administró una dosis simple de insulina detemir de 0,5 U/Kg con 1, 8 mg de liraglutida en pacientes en estado estable con diabetes tipo 2.

Embarazo y lactancia

Embarazo

No se cuenta con información suficiente acerca del uso de Victoza[®] en mujeres embarazadas. Estudios en animales han mostrado toxicidad reproductiva (Ver datos de seguridad preclínica). Se desconoce el riesgo potencial en humanos.

Victoza[®] no debe ser utilizado durante el embarazo, por lo que se recomienda el uso de insulina. Si una paciente planea un embarazo, o el embarazo ocurre, el tratamiento con Victoza[®] debe ser discontinuado.

Lactancia

Se desconoce si Victoza[®] se excreta a través de la leche materna. Estudios

D. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Aponderado

Victoza[®] - STF Q2 2013 - 8-9695-00-018-1

FARRUCIA L. MAGA
CO-DIRECTORA TÉCNICA 11
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.



en animales han mostrado que la transferencia a la leche, de Victoza[®] y metabolitos con cercana relación estructural, es baja. Por falta de experiencia, Victoza[®] no debe ser administrado en el período de lactancia.

Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas

No han sido realizados estudios de los efectos sobre la capacidad de manejar y de usar maquinarias. Los pacientes deberían ser advertidos de tomar precauciones mientras conducen o manejan máquinas para evitar el riesgo de hipoglucemia, en particular cuando Victoza[®] se utiliza en combinación con sulfonilurea.

Efectos adversos

En 5 estudios clínicos a largo plazo, alrededor de 2500 pacientes recibieron tratamiento con Victoza[®] sola o en combinación con metformina, una sulfonilurea (con o sin metformina) o metformina + rosiglitazona. Las frecuencias se definen de la siguiente forma: muy frecuente ($\geq 1/10$), frecuente ($\geq 1/100$ a $< 1/10$), poco frecuente ($\geq 1/1.000$ a $< 1/100$), raro ($\geq 1/10.000$ a $< 1/1.000$), muy raro ($< 1/10.000$), no conocido (no puede ser estimado a partir de los datos disponibles). Dentro de cada grupo de frecuencia, los efectos indeseables se presentan en orden de seriedad decreciente.

Los eventos adversos más frecuentes reportados en los estudios clínicos fueron desórdenes gastrointestinales: náuseas y diarreas fueron muy comunes, vómitos, constipación, dolor abdominal y dispepsia fueron muy frecuente. Al comienzo del tratamiento con Victoza[®], pueden ocurrir más frecuentemente reacciones adversas gastrointestinales. Estas reacciones usualmente disminuyen dentro de los pocos días o semanas de tratamiento.

En la tabla 3 se enumeran las reacciones adversas reportadas en ensayos controlados de larga duración de fase III y reportes espontáneos (post-marketing) con Victoza[®]. En la tabla se presentan las reacciones adversas identificadas en estudios de larga duración de fase III que se produjeron con una frecuencia $> 5\%$ si la frecuencia fue superior en los pacientes tratados con Victoza[®] que en los pacientes tratados con comparador. En la tabla se incluyen también las reacciones adversas con una frecuencia $\geq 1\%$ si la frecuencia fue > 2 veces la frecuencia de los sujetos tratados con comparador.

Las frecuencias para relacionar reportes espontáneos (post-marketing) han sido calculados basados en su incidencia en estudios clínicos de fase III.

Tabla 3 Listado de reacciones adversas identificadas de estudios controlados de Fase III a largo plazo y reportes espontáneos (post-marketing)

Reacción adversa	Frecuencia de la reacción adversa por grupo de tratamiento				
	Liraglutida con metformina	Liraglutida con glimepirida	Liraglutida con metformina y glimepirida	Liraglutida con metformina y rosiglitazona	Notificación espontánea
Infecciones e infestaciones					
Nasofaringitis		Frecuente		Frecuente	


[Handwritten signature]

Dr. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Apoderado

Victoza[®] - STF Q2 2013 - 8-9695-00-018-1

[Handwritten mark]

Farm. ROMINA L. MAGA
CO-DIRECTORA TECNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
12



Bronquitis			Frecuente		
Trastornos del metabolismo y la nutrición					
Hipoglucemia		Frecuente	Muy frecuente	Frecuente	
Anorexia	Frecuente	Frecuente	Frecuente	Frecuente	
Disminución del apetito	Frecuente			Frecuente	
Trastornos del sistema nervioso					
Dolor de cabeza	Muy frecuente		Frecuente	Frecuente	
Mareo	Frecuente				
Trastornos gastrointestinales					
Náuseas	Muy frecuente	Frecuente	Muy frecuente	Muy frecuente	
Diarrea	Muy frecuente	Frecuente	Muy frecuente	Muy frecuente	
Vómitos	Frecuente	Frecuente	Frecuente	Muy frecuente	
Dispepsia	Frecuente	Frecuente	Frecuente	Frecuente	
Dolor abdominal superior			Frecuente		
Estreñimiento		Frecuente	Frecuente	Frecuente	
Gastritis	Frecuente				
Flatulencia				Frecuente	
Distensión abdominal				Frecuente	
Enfermedad de reflujo gastroesofágico				Frecuente	
Malestar abdominal		Frecuente			
Dolor de muelas			Frecuente		
Gastroenteritis vírica				Frecuente	
Pancreatitis (incluye pancreatitis necrosante)					Muy raro
Trastornos del sistema inmunológico					
Reacciones Anafilácticas					Rara
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración					
Fatiga				Frecuente	
Malestar					Poco frecuente
Fiebre				Frecuente	
Reacciones en	Frecuente	Frecuente	Poco	Frecuente	

Dr. ALDO A. CHIARELLI
 NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
 Apoderado
 Victoza® - STF Q2 2013 - 8-9695-00-018-1

Farm. ROMINA L. MAGA
 CO-DIRECTORA TÉCNICA
 NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.

el lugar de inyección			frecuente	
Trastornos renales y urinarios				
Fallo renal agudo #				Poco frecuente
Insuficiencia renal #				Poco frecuente
Trastornos del metabolismo y de la nutrición				
Deshidratación#				Poco frecuente
Trastornos de piel y del tejido subcutáneo				
Urticaria				Poco frecuente
Rash				Frecuente
Prurito				Poco frecuente
Trastornos cardíacos				
Aumento de la frecuencia cardíaca				Frecuente

Ver "Advertencias y precauciones especiales de uso"

Hipoglucemia

La mayor parte de los episodios de hipoglucemia confirmados en estudios clínicos fueron menores. No se observaron hipoglucemias mayores en el estudio con Victoza® usada como monoterapia. Hipoglucemia mayor puede ocurrir de forma no común y ha sido principalmente observada cuando Victoza® se combina con sulfonilurea (0,02 eventos/sujeto/año). Muy pocos episodios (0,001 evento/sujeto/año) fueron observados con la administración de Victoza® en combinación con antidiabéticos orales distintos a sulfonilurea. No se observaron hipoglucemias mayores cuando se adicionó insulina detemir a 1,8 mg de liraglutida y metformina. El índice de episodios menores de hipoglucemias fue 0,286 eventos/sujeto/año. En el grupo comparador tratado con liraglutida 1,8 mg y metformina, el índice de eventos menores de hipoglucemias fue de 0,029 y 0,129 eventos/sujeto/año respectivamente.

Reacciones adversas gastrointestinales

La mayor parte de los episodios de náuseas fueron leves a moderados, transitorios y raramente condujeron a la discontinuación de la terapia. Los pacientes de más de 70 años pueden evidenciar más efectos gastrointestinales cuando se tratan con Victoza®. Los pacientes con trastornos renales leves (clearance de creatinina 60-90 ml/min) pueden evidenciar mas efectos gastrointestinales cuando se tratan con Victoza®.

Discontinuación de la terapia

La incidencia de discontinuación de la terapia debida a reacciones adversas fue del 7,8% en pacientes tratados con Victoza® y 3,4% en pacientes tratados con el comparador, en estudios clínicos controlados de largo plazo (26 semanas o más). Las reacciones adversas más frecuentes que provocaron la

Dr. ALDO A. CHIARELLI
 NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
 Apoderado

S

FRANCISCA ROMINA L. MAGA
 COORDINADORA TECNICA
 NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.
 14

ORIGINAL

6717



discontinuación del tratamiento en los pacientes fueron náuseas (2,8% de los pacientes) y vómitos (1,5%).

Inmunogenicidad

Consistentemente con las propiedades potencialmente inmunogénicas de productos medicinales que contienen proteínas o péptidos, los pacientes pueden desarrollar anticuerpos anti-liraglutida luego del tratamiento con Victoza®. En promedio, 8,6% de los pacientes desarrollaron anticuerpos. La formación de anticuerpos no ha sido asociada con la eficacia reducida de Victoza®.

Pancreatitis

Pocos casos (<0,2%) de pancreatitis aguda han sido reportados durante estudios clínicos a largo plazo con Victoza®. Pancreatitis también fue reportada durante su uso comercial. Una relación causal entre Victoza® y pancreatitis no ha podido ser establecida ni excluida.

Eventos tiroideos

La tasa general de eventos adversos tiroideos en estudios clínicos de mediano y largo plazo son 33,5, 30,0 y 21,7 eventos por cada 1.000 sujetos/año de exposición para liraglutida total, placebo y comparadores totales; 5,4, 2,1 y 1,2 eventos respectivamente fueron relacionados a eventos adversos tiroideos serios.

Los eventos adversos tiroideos más frecuentes fueron neoplasias tiroideas, aumento de la calcitonina en sangre y bocio. En los pacientes en tratamiento con liraglutida, las tasas por 1000 pacientes/años de exposición fueron de 6,8, 10,9 y 5,4, en los tratados con placebo 6,4, 10,7 y 2,1 y en los tratados con comparadores 2,4, 6,0 y 1,8 respectivamente.

Reacciones alérgicas

Las reacciones alérgicas que han sido reportadas durante el uso comercial de Victoza® incluyen urticaria, rash y prurito.

Pocos casos de reacciones anafilácticas con síntomas adicionales tales como hipotensión, palpitaciones, disnea, edema, han sido reportados durante el uso comercial de Victoza®.

Sobredosis

Durante los estudios clínicos y el uso comercial se han reportado sobredosis de más de 40 veces la dosis recomendada de mantenimiento (72 mg). Efectos de la sobredosis incluyeron náuseas severas y vómitos. No fue reportada hipoglucemia severa. Todos los pacientes se recuperaron sin complicaciones. En el caso de sobredosis, debería iniciarse un tratamiento de soporte apropiado de acuerdo a los síntomas y los signos clínicos del paciente.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: 011 4962-6666/2247.

Dr. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Apoderado

Victoza® - STF Q2 2013 - 8-9695-00-018-1

Farm. ROMINA L. MAGA
COORDINADORA TÉCNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.

ORIGINAL



Hospital A. Posadas: 011 4654-6648/4658-7777.

Incompatibilidades

Las sustancias agregadas a Victoza® pueden provocar su degradación. En ausencia de estudios de compatibilidad, Victoza® no debe ser mezclado con otros productos medicinales.

Vida útil

Luego del primer uso: 1 mes

Precaución especial de almacenamiento

Conservar en heladera (2°C – 8°C). No colocar en freezer o cercano al compartimiento congelador. No congelar

Luego del primer uso: Almacenar por debajo de 30°C o en heladera (2°C a 8°C).

No congelar.

Con el fin de protegerlo de la luz, mantener el capuchón de la lapicera colocado.

Presentación

Cartuchos (vidrio tipo 1) con un émbolo (bromobutil) y un tapón (Bromobutil/poliisopreno) contenido en una lapicera pre-llenada multidosis desechable hecha de poliolefina y poliacetal.

Cada lapicera contiene 3 ml de solución, que administran 30 dosis de 0,6 mg, 15 dosis de 1,2 mg o 10 dosis de 1,8 mg.

El envase contiene 1, 2 o 3 lapiceras prellenadas. Quizás no todos los envases se comercialicen.

Precaución especial para la administración y otros manejos

Victoza® no debería ser usado si la solución no aparece clara e incolora.

Victoza® no debería ser usado si se ha congelado.

Victoza® puede ser administrada con agujas de una longitud de hasta 8 mm y tan delgadas como 32G. Las lapiceras prellenadas están diseñadas para ser usadas con agujas desechables NovoFine® o NovoTwist®.

Las agujas no están incluidas en este envase.

Los pacientes deberían ser instruidos para descartar las agujas de acuerdo a los requerimientos locales luego de cada inyección y almacenar las lapiceras de Victoza® sin la aguja colocada. Esto previene la contaminación, infecciones y pérdidas por goteo. Esto también asegura que la dosis sea la correcta.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Disposición N°

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 55.564

Dr. ALDO A. CHIARINI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
A poderado

Victoza® - STF Q2 2013 - 8-9695-00-018-1

Farm. ROMINA L. MAGA
CO-DIRECTORA TECNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.
16

ORIGINAL



Importado por:

Novo Nordisk Pharma Argentina S.A.

Av. Del Libertador 2740, Olivos, (B1636DSU) Pcia. de Buenos Aires.

Tel: 6393-6686

Dirección Técnica: Aldo A. Chiarelli – Farmacéutico.

Elaborado por


Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Dinamarca.


Victoza[®], NovoFine[®] y NovoTwist[®] son marcas registradas propiedad de Novo Nordisk A/S, Dinamarca.

©2013

Novo Nordisk A/S



DR ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Apoderado



Farm. NORMA L. MAGA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.





Instrucciones de uso de la lapicera Victoza®.

Sírvase leer estas instrucciones atentamente antes de usar la lapicera de Victoza®.


Su lapicera Victoza® contiene 18 mg de liraglutida. Ud. puede seleccionar dosis de 0,6 mg, 1,2 mg y 1,8 mg.

La lapicera Victoza® está diseñada para ser usada con agujas descartables NovoFine® o NovoTwist® de una longitud de hasta 8 mm y tan delgadas como las 32G.



Preparación de su lapicera Victoza®

A Extraiga el capuchón.





B Extraiga el disco de papel de una aguja nueva desechable. Enrosque la aguja recta y firmemente en su lapicera.

D. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Aprobado


ROMINA L. MAGA
COORDINADORA TÉCNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.

ORIGINAL


6717



C Extraiga la tapa externa de la aguja y resérvela para más tarde.



D Extraiga la tapa interna de la aguja y deséchela.



- Δ Siempre use una nueva aguja con cada inyección para prevenir contaminación.
- Δ Tenga cuidado de no doblar ni dañar la aguja.
- Δ Para reducir el riesgo de pinchazos no deseados, nunca coloque la tapa interna de la aguja nuevamente en la aguja.

Verificación del flujo


Siempre realice la siguiente verificación antes de inyectarse con una nueva lapicera

E Gire el selector de dosis hasta que el símbolo de control de flujo se alíe con el indicador de dosis.


Dr. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Apoderado

Farm. ROMINA OMAGA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.


ORIGINAL



F Mantenga la lapicera con la aguja hacia arriba. Realice pequeños golpecitos con su dedo en el cartucho. Esto hará que las burbujas de aire se agrupen en el extremo del cartucho.



G Manteniendo la aguja hacia arriba presione el botón pulsador hasta que el número cero se alíe con el indicador de dosis hasta la línea de 0 mg. Repita los pasos E a G hasta que una gota de liraglutida aparezca en la punta de la aguja. Si no aparece una gota luego de realizar esta operación 6 veces cambie la aguja y repita los pasos E a G por 6 veces más. Si aún no aparece una gota en la punta de la aguja, la lapicera es defectuosa y debe utilizar una nueva lapicera.



Δ Si su lapicera se ha golpeado contra una superficie dura o sospecha de mal funcionamiento, siempre coloque una nueva aguja y realice los pasos de verificación antes de inyectarse.


Selección de la dosis

Siempre verifique que el indicador de dosis se encuentre en 0 mg.

Dr. ALDO A. C...
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Apoderado


Victoza® - STF Q2 2013 - 8-9695-00-018-1

Firma ROMINA L. MAGA
CO-ORDINADORA TECNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A. 20



H

Gire el selector de dosis hasta que el indicador de su dosis necesaria se aliñe con el indicador de dosis (0,6 mg, 1,2 mg o 1,8 mg). Si Ud. selecciona una dosis equivocada por error, simplemente cámbiela girando el selector de dosis en un sentido o en el otro hasta que la dosis correcta se aliñe con el indicador de dosis. Tenga cuidado de no presionar el botón pulsador cuando gire el selector de dosis, ya que puede perderse liraglutida.



Si el selector de dosis se detiene antes de alcanzar la marcación de su dosis necesaria significa que no hay liraglutida suficiente para el total de una dosis. Entonces Ud. puede:

Dividir su dosis en dos inyecciones:

Gire el selector de dosis hasta alcanzar la línea de 0,6 mg o 1,2 mg en el indicador de dosis. Inyecte la dosis.

Prepare una nueva lapicera e inyecte el remanente número de mg hasta completar su dosis.

Inyectar la totalidad de la dosis con una nueva lapicera:


Si el selector de dosis se detiene antes alinear 0,6 mg con el indicador de dosis, prepare una nueva lapicera e inyecte la totalidad de la dosis con la nueva lapicera.

Dr. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Appderado

Victoza® - STF Q2 2013 - 8-9695-00-018-1

Farm. ROMINA L. MAGA
CO-DIRECTORA TECNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.

ORIGINAL




- Δ El selector de dosis emite un click cuando se gira. Ud. no debe usar este sonido para seleccionar la cantidad de liraglutida a inyectar.
- Δ No use la escala del cartucho para medir la dosis de liraglutida a inyectar - ya que esto no es seguro.
- Δ No trate de seleccionar otra dosis que 0,6 mg, 1,2 mg o 1,8 mg. Los números en el visor deben alinearse precisamente con el indicador de dosis para asegurar la administración de la dosis correcta.


Forma de inyección

Inserte la aguja bajo su piel usando la técnica que le indicó su médico o enfermera. Entonces siga las siguientes instrucciones:

I Presione el botón pulsador para inyectar hasta que la línea de 0 mg se alíne con el indicador. Tenga cuidado de no tocar el visor con sus otros dedos o presionar el selector de dosis cuando Ud. inyecta ya que puede bloquear la inyección. Mantenga el botón pulsador totalmente presionado y deje la aguja bajo la piel por al menos 6 segundos. Esto asegura la administración total de la dosis.





J Extraiga la aguja. Luego de esto Ud. puede observar una gota de liraglutida en la punta de la aguja. Esto es normal y no afecta la dosis que Ud. acaba de aplicarse.



K Guíe la punta de la aguja dentro de la tapa externa sin tocar la tapa externa de la aguja.


Dr. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Apoderado

Farm. ROMINA OMAGA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.



L Cuando la aguja está cubierta, cuidadosamente coloque la tapa externa de la aguja. Entonces desenrosque la aguja. Cuidadosamente extraiga la aguja y coloque el capuchón de la lapicera nuevamente.

Quando la lapicera esté vacía, deséchela cuidadosamente sin aguja colocada. Sírvase desechar la lapicera y las agujas cumpliendo con los requerimientos locales.



Δ Siempre quite la aguja luego de cada inyección y almacene su lapicera Victoza® sin aguja colocada.

Δ Esto previene la contaminación, infecciones o pérdidas por goteo de liraglutida. Esto también asegura que la dosis sea la correcta.

Δ Aquellas personas que cuidan al paciente deberían también ser muy cuidadosos cuando manipulan agujas de forma de evitar pinchazos involuntarios.

Cuidados para su lapicera Victoza®

Su lapicera Victoza® es segura y fácil de usar. Pero Ud. debe tener cuidado de:

- No trate de reparar o abrir su lapicera.
- Mantenga su lapicera lejos del polvo, suciedad o toda clase de líquidos.
- Limpie su lapicera con un algodón embebido con un detergente suave. No lo lave, sumerja o lubrique, esto puede dañar su mecanismo.


Δ Información importante

- No comparta su lapicera Victoza® con otra persona.
- Mantenga su lapicera Victoza® fuera del alcance de otras personas, especialmente de niños.

Dr. ARDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Buenos Aires

Farm. ROMINA L. MAGA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.

ORIGINAL



Proyecto de Prospecto: información para el paciente

**Victoza®
Liraglutida 6 mg/ml**

**Solución inyectable en lapicera pre-llenada
Venta Bajo Receta**

Industria Danesa

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este producto.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico, enfermero o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
- Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico.

Contenido del prospecto:

1. Qué es Victoza® y para qué se utiliza
2. Antes de usar Victoza®
3. Cómo usar Victoza®
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de Victoza®
6. Información adicional

Al dorso: Instrucciones de uso de Victoza®

1. Qué es Victoza® y para qué se utiliza

Victoza® contiene el principio activo liraglutida. Ayuda a su cuerpo a reducir su nivel de azúcar en sangre únicamente cuando este nivel de azúcar está demasiado elevado. Además hace más lento el paso de los alimentos por su estómago.

Victoza® se utiliza para tratar a adultos con diabetes mellitus tipo 2 cuando:

- metformina o una sulfonilurea (como glimepirida o glibenclamida) solos no son suficientes para controlar sus niveles de azúcar en sangre, a pesar de estar tomando las dosis máximas toleradas.
- metformina en combinación con una sulfonilurea (como glimepirida o glibenclamida) o metformina en combinación con una glitazona (como pioglitazona) no son suficientes para controlar sus niveles de azúcar en sangre.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Victoza®

No use Victoza®

- si es alérgico a liraglutida o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en Información Adicional).

Consulte a su médico, enfermero o farmacéutico antes de empezar a usar Victoza®.

Tenga especial cuidado si...


- también toma una sulfonilurea (como glimepirida o glibenclamida), su médico puede pedirle que controle sus niveles de azúcar en sangre. Esto ayudará a su médico a decidir si se debe cambiar la dosis de la sulfonilurea.

Victoza® no debe utilizarse si tiene diabetes tipo 1 o cetoacidosis diabética. Victoza® no es una insulina.

Dr. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Apoderado

Farm. ROMINA L. MAGA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.

ORIGINAL



No se recomienda el uso de Victoza® en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y/o gastroparesia diabética.

Si presenta síntomas de pancreatitis aguda, como dolor abdominal intenso y continuo, debe consultar a su médico.

En algunos casos, cuando se inicia un tratamiento con Victoza®, se puede experimentar una deshidratación (pérdida de líquidos), por ejemplo, en caso de sufrir vómitos, náuseas y diarrea. Es importante evitar la deshidratación bebiendo mucho líquido. Hable con su médico si tiene alguna duda.

Niños y adolescentes

Victoza® no está recomendado en niños y adolescentes menores de 18 años ya que la seguridad y eficacia no se han establecido todavía en estos grupos de edad.

Otros medicamentos y Victoza®

Informe a su médico, enfermero o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento.

En concreto, informe a su médico, enfermero o farmacéutico si está utilizando medicamentos para la diabetes que contengan alguno de los siguientes principios activos:

- Insulina. No se recomienda Victoza® si ya está utilizando insulina.
- Sulfonilurea (como glimepirida o glibenclamida). Puede sufrir hipoglucemia (nivel de azúcar en sangre bajo) cuando utilice Victoza® junto con una sulfonilurea ya que la sulfonilurea aumenta el riesgo de hipoglucemia. Cuando empiece a utilizar estos medicamentos juntos por primera vez, su médico puede indicarle que reduzca la dosis de sulfonilurea. Para consultar los síntomas de aviso de una hipoglucemia, ver sección Posible Efectos Adversos.

Uso de Victoza® con las comidas

Se puede utilizar Victoza® independientemente de las comidas.

Embarazo y lactancia

Informe a su médico de si está embarazada, si cree que puede estarlo o si planea estarlo. Victoza® no debe utilizarse durante el embarazo. Se desconoce si Victoza® podría dañar al feto.

Se desconoce si Victoza® pasa a la leche materna. No utilice Victoza® durante el periodo de lactancia.

Consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento si está embarazada o en período de lactancia.

Conducción y uso de máquinas

El bajo nivel de azúcar en sangre (hipoglucemia) puede reducir su capacidad de concentración. Evite conducir o manejar maquinaria si experimenta síntomas de hipoglucemia. Ver sección Posibles Efectos Adversos, para síntomas de aviso de una hipoglucemia. Consulte a su médico para más información.

3. Cómo usar Victoza®

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. Consulte a su médico, enfermero o farmacéutico si tiene dudas.


- La dosis inicial es **0,6 mg** una vez al día, durante al menos una semana.
- Su médico le indicará cuándo aumentar esa dosis a **1,2 mg** una vez al día.
- Su médico puede indicarle que siga aumentando la dosis a **1,8 mg** una vez al día, si su glucosa en sangre no se controla adecuadamente con una dosis de 1,2 mg.

No cambie la dosis a menos que su médico se lo indique.

Dr. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Aprobado

Farm. DOMINA L. MAGA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.

ORIGINAL



Victoza[®] se administra como una inyección bajo la piel (subcutánea). No la inyecte en una vena o músculo. Las mejores zonas para la inyección son la parte frontal del muslo, la zona del abdomen o la parte superior del brazo.

Puede administrarse la inyección en cualquier momento del día, con independencia de las comidas. Es preferible que Victoza[®] se inyecte a la misma hora cuando se haya elegido un horario conveniente.

Antes de utilizar la pluma por primera vez, su médico o enfermero le mostrarán cómo utilizarla.

En la otra cara de este prospecto encontrará instrucciones detalladas sobre su uso.

Si usa más Victoza[®] del que debiera

Si usa más Victoza[®] del que debiera, consulte con su médico inmediatamente. Puede que necesite tratamiento médico. Puede que experimente náuseas o vómitos.

Si olvidó usar Victoza[®]

Si olvida una dosis, use Victoza[®] tan pronto como se acuerde.

Sin embargo, si han pasado más de 12 horas desde que debería haber usado Victoza[®], sátese la dosis olvidada. Adminístrese la siguiente dosis, al día siguiente, como de costumbre.

No use una dosis doble o aumente la dosis del día siguiente para compensar la dosis olvidada.

Si interrumpe el tratamiento con Victoza[®]

No interrumpa el tratamiento con Victoza[®] sin consultar con su médico. Si lo interrumpe, puede que aumenten sus niveles de azúcar en sangre.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este producto, pregunte a su médico, enfermero o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Las frecuencias de ocurrencia de los efectos adversos se definen de la siguiente manera:

- Muy Frecuentes: pueden afectar a más 1 de cada 10 pacientes.
- Frecuentes: pueden afectar 1 de cada 10 pacientes en 100.
- Poco frecuentes: pueden afectar 1 de cada 10 pacientes en 1000.
- Raro: pueden afectar a 1 en 10 pacientes en 10000.
- Muy raro: pueden afectar a menos de 1 paciente en 10000.
- Desconocida: No es posible determinar la frecuencia con los datos disponibles.

Efectos adversos muy frecuentes

- Náuseas. Este efecto desaparece normalmente con el tiempo.
- Diarrea. Este efecto desaparece normalmente con el tiempo.

Efectos adversos frecuentes


• Hipoglucemia (nivel de azúcar en sangre bajo). Los síntomas de aviso de una hipoglucemia pueden aparecer repentinamente e incluir: sudor frío, piel fría y pálida, dolor de cabeza, palpitaciones, náuseas, apetito excesivo, trastornos visuales, somnolencia, sensación de debilidad, nerviosismo, ansiedad, confusión, dificultad de concentración y temblores. Su médico le indicará cómo tratar el bajo nivel de azúcar en sangre y qué tiene que hacer en el caso de que observe estos síntomas de aviso. Si ya toma una sulfonilurea al empezar a usar Victoza[®], su médico puede indicarle que reduzca la dosis de la sulfonilurea.

- Anorexia
- Disminución del apetito
- Dolor de cabeza
- Vómitos

Dr. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
A. Poderado

F. ROMINA L. MAGA
CO-DIRECTORA TECNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.

ORIGINAL



- Indigestión
- Estómago inflamado (gastritis). Los síntomas incluyen dolor de estómago, náuseas y vómitos.
- Enfermedad de reflujo gastroesofágico (ERGE). Los síntomas incluyen pirosis.
- Vientre (abdomen) hinchado o dolor abdominal
- Malestar abdominal
- Estreñimiento
- Gases (flatulencia)
- Eructos
- Infección vírica del estómago
- Bronquitis
- Infección de las vías respiratorias altas
- Reacciones en el lugar de la inyección (cardenales, dolor, irritación, picor y sarpullido)
- Reacciones alérgicas tales como prurito (picor)
- Aumento de la frecuencia cardíaca (taquicardia)
- Resfriado común
- Mareos
- Fatiga
- Fiebre
- Dolor de muelas

Efectos adversos poco frecuentes

- Acontecimientos tiroideos: como nódulos, aumento de calcitonina en sangre y bocio.
- Reacciones alérgicas tales como prurito (picor) y urticaria (un tipo de rash cutáneo)
- Malestar (no sentirse bien)
- Deshidratación, a veces con un descenso de la función renal.

Efectos adversos raros

- Una reacción alérgica grave (reacción anafiláctica) con síntomas adicionales tales como problemas respiratorios, hinchazón de la garganta y de la cara, palpitaciones, etc. Si nota alguno de estos síntomas, busque ayuda médica inmediatamente y consulte a su médico tan pronto como sea posible.
- Angioedema (hinchazón de la cara, labios, lengua etc.)

Efectos adversos muy raros

- Inflamación del páncreas (pancreatitis). Pancreatitis puede ser una condición médica seria y potencialmente letal.

Si cualquiera de estos efectos adversos se agrava o si usted nota efectos adversos aún si no están mencionados en este prospecto, por favor informe a su médico, enfermero o farmacéutico.

Sobredosis

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurra al Hospital más cercano o comuníquese con los centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666/2247.

Hospital A. Posadas (011) 4654-6648/4658-7777

5. Conservación de Victoza®


Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta y en el estuche luego de 'EXP'. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Dr. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Aprobado

Farm. ROMINA L. MAGA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.

ORIGINAL



Antes de usar:

Conservar en heladera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Mantener alejado del congelador.

Durante el uso:

Puede conservar la lapicera durante un mes si se almacena por debajo de 30°C o en heladera (entre 2°C y 8°C), alejado del congelador. No congelar.

Cuando no se utilice, conservar la lapicera con el capuchón puesto para protegerla de la luz.

No utilice este medicamento si observa que la solución no es transparente e incolora.

6. Información adicional

Composición de Victoza®

- El principio activo es liraglutida. 1 ml de solución inyectable contiene 6 mg de liraglutida. Una lapicera pre-llenada contiene 18 mg de liraglutida.

- Los demás componentes son fosfato disódico dihidrato, propilenglicol, fenol y agua para preparaciones inyectables.

Aspecto del producto y contenido del envase

Victoza® se suministra como una solución inyectable transparente e incolora en una lapicera pre llenada. Cada lapicera contiene 3 ml de solución, pudiendo suministrar 30 dosis de 0,6 mg, 15 dosis de 1,2 mg o 10 dosis de 1,8 mg.

Victoza® está disponible en envases de 1, 2, y 3 lapiceras pre-llenadas. Puede que solamente algunas presentaciones estén comercializadas.

Ante cualquier inconveniente con el producto, el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> o llamar a ANMAT responde al 0800-333-1234

Mantener fuera del alcance de los niños.

Disposición N°

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°

Fabricado por:

Novo Nordisk A/S
Novo Allé
DK-2880 Bagsværd
Dinamarca

Importado por:

Novo Nordisk Pharma Argentina S.A.
Av. Del Libertador 2740, Olivos, (B1636DSU) Pcia. de Buenos Aires.
Tel: 6393-6686
Dirección Técnica: Aldo A. Chiarelli – Farmacéutico.
Servicio de Atención al Cliente:
Tel: 0800-345-NOVO (6686)
atencioncli@novonordisk.com

Dr. ALDO A. CHIARELLI
NOVO NORDISK PHARMA ARG. S.A.
Aprobado

Farm. ROMINA L. MACA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
NOVO NORDISK PHARMA ARGENTINA S.A.