



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Disposición

Número:

Referencia: EX-2022-85844931-APN-DGA#ANMAT

VISTO el EX-2022-85844931-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma JANSSEN CILAG FARMACEUTICA S.A. solicita la aprobación de nuevos rótulos, prospecto e información para el paciente para la Especialidad Medicinal denominada UPTRAVI / SELEXIPAG; forma farmacéutica y concentración: Comprimidos recubiertos / SELEXIPAG 200 mcg, Comprimidos recubiertos / SELEXIPAG 400 mcg, Comprimidos recubiertos / SELEXIPAG 600 mcg, Comprimidos recubiertos / SELEXIPAG 800 mcg, Comprimidos recubiertos / SELEXIPAG 1000 mcg, Comprimidos recubiertos / SELEXIPAG 1200 mcg, Comprimidos recubiertos / SELEXIPAG 1400 mcg, Comprimidos recubiertos / SELEXIPAG 1600 mcg; aprobada por Certificado N° 58.818.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición N°: 5904/96 y Circular N° 4/13.

Que por Disposición A.N.M.A.T. N° 680/13 se adoptó el SISTEMA DE GESTION ELECTRÓNICA CON FIRMA DIGITAL para el trámite de SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESPECIALIDADES MEDICINALES (REM) encuadrada en el Decreto N° 150/92 (t.o. 1993) para ingredientes activos (IFA'S) de origen sintético y semisintético, otorgándose certificados firmados digitalmente.

Que la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. – Autorízase a la firma JANSSEN CILAG FARMACEUTICA S.A. propietaria de la Especialidad Medicinal denominada UPTRAVI / SELEXIPAG; forma farmacéutica y concentración: Comprimidos recubiertos / SELEXIPAG 200 mcg, Comprimidos recubiertos / SELEXIPAG 400 mcg, Comprimidos recubiertos / SELEXIPAG 600 mcg, Comprimidos recubiertos / SELEXIPAG 800 mcg, Comprimidos recubiertos / SELEXIPAG 1000 mcg, Comprimidos recubiertos / SELEXIPAG 1200 mcg, Comprimidos recubiertos / SELEXIPAG 1400 mcg, Comprimidos recubiertos / SELEXIPAG 1600 mcg, los nuevos rótulos obrantes en los documentos IF-2022-112165586-APN-DERM#ANMAT, IF-2022-112165157-APN-DERM#ANMAT, IF-2022-112165045-APN-DERM#ANMAT, IF-2022-112164581-APN-DERM#ANMAT, IF-2022-112165710-APN-DERM#ANMAT, IF-2022-112164914-APN-DERM#ANMAT, IF-2022-112164822-APN-DERM#ANMAT, IF-2022-112164715-APN-DERM#ANMAT, IF -2022-113243269-APN-DERM#ANMAT, IF-2022-113243101-APN-DERM#ANMAT, IF-2022-113242740-APN-DERM#ANMAT, IF-2022-113242607-APN-DERM#ANMAT, IF-2022-113242303-APN-DERM#ANMAT, IF-2022-113242118-APN-DERM#ANMAT, IF-2022-113241727-APN-DERM#ANMAT, IF-2022-113241306-APN-DERM#ANMAT; el nuevo prospecto obrante en el documento IF-2022-112165808-APN-DERM#ANMAT e información para el paciente obrante en el documento IF-2022-112165894-APN-DERM#ANMAT.

ARTICULO 2º. – Extiéndase por la Dirección de Gestión de Información Técnica el Certificado actualizado N° 58.818, consignando lo autorizado por el/los artículo/s precedente/s, cancelándose la versión anterior.

ARTICULO 3º. - Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición conjuntamente con los rótulos, prospecto e información para el paciente. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2022-85844931-APN-DGA#ANMAT

mb

ab

PROYECTO DE ROTULO
Envase secundario

UPTRAVI®
SELEXIPAG 200 microgramos
Comprimidos recubiertos

Vía Oral

60 comprimidos recubiertos *

Venta bajo receta archivada

Industria alemana

Composición: Cada comprimido recubierto contiene: Selexipag 200 mcg.
Excipientes: manitol, almidón de maíz, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, hidroxipropilcelulosa, estearato de magnesio, hipromelosa, propilenglicol, dióxido de titanio, óxido de hierro amarillo, cera carnauba.

Información sobre el producto: Ver prospecto adjunto.

Conservar a temperatura ambiente entre 20°C y 25°C. Se permiten desvíos de temperatura entre 15°C y 30°C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Excella GmbH & Co. KG, Nuernberger Strasse 12, Feucht, Alemania.

Acondicionado por: Allpack Group AG Pfeffingerstrasse 45, Reinach, Suiza.

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A., Mendoza 1259 - C1428DJG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 58.818

Directora Técnica: Farm. Georgina Rodriguez

janssen 

LOTE:

VENCIMIENTO:

*Este rótulo también será aplicable a las presentaciones conteniendo 140 comprimidos recubiertos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULO 2 (200 mcg) PROD. UPTRAVI EX-2022-85844931- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.24 10:25:14 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.24 10:25:15 -03:00

PROYECTO DE ROTULO
Envase secundario

UPTRAVI[®]
SELEXIPAG 1400 microgramos
Comprimidos recubiertos

Vía Oral

60 comprimidos recubiertos

Venta bajo receta archivada

Industria alemana

Composición: Cada comprimido recubierto contiene: Selexipag 1400 mcg.
Excipientes: manitol, almidón de maíz, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, hidroxipropilcelulosa, estearato de magnesio, hipromelosa, propilenglicol, dióxido de titanio, óxido de hierro amarillo, cera carnauba.

Información sobre el producto: Ver prospecto adjunto.

Conservar a temperatura ambiente entre 20°C y 25°C. Se permiten desvíos de temperatura entre 15°C y 30°C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Excella GmbH & Co. KG, Nuernberger Strasse 12, Feucht, Alemania.

Acondicionado por: Allpack Group AG Pfeffingerstrasse 45, Reinach, Suiza.

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A., Mendoza 1259 - C1428DJG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N°: 58.818
Directora Técnica: Farm. Georgina Rodriguez

janssen 

LOTE:

VENCIMIENTO:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULO 2° (1400 mcg) PROD. UPTRAVI EX-2022-85844931- -APN-DGA#ANMAT.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.24 10:23:40 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.24 10:23:41 -03:00

PROYECTO DE ROTULO
Envase secundario

UPTRAVI[®]
SELEXIPAG 1200 microgramos
Comprimidos recubiertos

Vía Oral

60 comprimidos recubiertos

Venta bajo receta archivada

Industria alemana

Composición: Cada comprimido recubierto contiene: Selexipag 1200 mcg.
Excipientes: manitol, almidón de maíz, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, hidroxipropilcelulosa, estearato de magnesio, hipromelosa, propilenglicol, dióxido de titanio, óxido de hierro rojo, óxido de hierro negro, cera carnauba.

Información sobre el producto: Ver prospecto adjunto.

Conservar a temperatura ambiente entre 20°C y 25°C. Se permiten desvíos de temperatura entre 15°C y 30°C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Excella GmbH & Co. KG, Nuernberger Strasse 12, Feucht, Alemania.

Acondicionado por: Allpack Group AG Pfeffingerstrasse 45, Reinach, Suiza.

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A., Mendoza 1259 - C1428DJG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N°: 58.818
Directora Técnica: Farm. Georgina Rodriguez

janssen 

LOTE:

VENCIMIENTO:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULO 2° (1200 mcg) PROD. UPTRAVI EX-2022-85844931- -APN-DGA#ANMAT.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.24 10:24:06 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.24 10:24:06 -03:00

PROYECTO DE ROTULO
Envase secundario

UPTRAVI®
SELEXIPAG 1000 microgramos
Comprimidos recubiertos

Vía Oral

60 comprimidos recubiertos

Venta bajo receta archivada

Industria alemana

Composición: Cada comprimido recubierto contiene: Selexipag 1000 mcg.
Excipientes: manitol, almidón de maíz, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, hidroxipropilcelulosa, estearato de magnesio, hipromelosa, propilenglicol, dióxido de titanio, óxido de hierro rojo, óxido de hierro amarillo, cera carnauba.

Información sobre el producto: Ver prospecto adjunto.

Conservar a temperatura ambiente entre 20°C y 25°C. Se permiten desvíos de temperatura entre 15°C y 30°C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Excella GmbH & Co. KG, Nuernberger Strasse 12, Feucht, Alemania.

Acondicionado por: Allpack Group AG Pfeffingerstrasse 45, Reinach, Suiza.

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A., Mendoza 1259 - C1428DJG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N°: 58.818
Directora Técnica: Farm. Georgina Rodriguez

janssen 

LOTE:

VENCIMIENTO:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Creacion de documento, peticion desde Expediente Electrónico EX-2022-85844931- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.24 10:24:17 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.24 10:24:17 -03:00

PROYECTO DE ROTULO
Envase secundario

UPTRAVI®
SELEXIPAG 800 microgramos
Comprimidos recubiertos

Vía Oral

60 comprimidos recubiertos

Venta bajo receta archivada

Industria alemana

Composición: Cada comprimido recubierto contiene: Selexipag 800 mcg.
Excipientes: manitol, almidón de maíz, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, hidroxipropilcelulosa, estearato de magnesio, hipromelosa, propilenglicol, dióxido de titanio, óxido de hierro negro, óxido de hierro amarillo, cera carnauba.

Información sobre el producto: Ver prospecto adjunto.

Conservar a temperatura ambiente entre 20°C y 25°C. Se permiten desvíos de temperatura entre 15°C y 30°C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Excella GmbH & Co. KG, Nuernberger Strasse 12, Feucht, Alemania.

Acondicionado por: Allpack Group AG Pfeffingerstrasse 45, Reinach, Suiza.

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A., Mendoza 1259 - C1428DJG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N°: 58.818
Directora Técnica: Farm. Georgina Rodriguez

janssen 

LOTE:

VENCIMIENTO:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULO 2° (800 mcg) PROD. UPTRAVI EX-2022-85844931- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.24 10:24:36 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.24 10:24:37 -03:00

PROYECTO DE ROTULO
Envase secundario

UPTRAVI®
SELEXIPAG 600 microgramos
Comprimidos recubiertos

Vía Oral

60 comprimidos recubiertos

Venta bajo receta archivada

Industria alemana

Composición: Cada comprimido recubierto contiene: Selexipag 600 mcg.
Excipientes: manitol, almidón de maíz, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, hidroxipropilcelulosa, estearato de magnesio, hipromelosa, propilenglicol, dióxido de titanio, óxido de hierro rojo, óxido de hierro negro, cera carnauba.

Información sobre el producto: Ver prospecto adjunto.

Conservar a temperatura ambiente entre 20°C y 25°C. Se permiten desvíos de temperatura entre 15°C y 30°C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Excella GmbH & Co. KG, Nuernberger Strasse 12, Feucht, Alemania.

Acondicionado por: Allpack Group AG Pfeffingerstrasse 45, Reinach, Suiza.

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A., Mendoza 1259 - C1428DJG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 58.818

Directora Técnica: Farm. Georgina Rodriguez

janssen 

LOTE:

VENCIMIENTO:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULO 2° (600 mcg) PROD. UPTRAVI EX-2022-85844931- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.24 10:24:44 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.24 10:24:45 -03:00

PROYECTO DE ROTULO
Envase secundario

UPTRAVI[®]
SELEXIPAG 400 microgramos
Comprimidos recubiertos

Vía Oral

60 comprimidos recubiertos

Venta bajo receta archivada

Industria alemana

Composición: Cada comprimido recubierto contiene: Selexipag 400 mcg.
Excipientes: manitol, almidón de maíz, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, hidroxipropilcelulosa, estearato de magnesio, hipromelosa, propilenglicol, dióxido de titanio, óxido de hierro rojo, cera carnauba.

Información sobre el producto: Ver prospecto adjunto.

Conservar a temperatura ambiente entre 20°C y 25°C. Se permiten desvíos de temperatura entre 15°C y 30°C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Excella GmbH & Co. KG, Nuernberger Strasse 12, Feucht, Alemania.

Acondicionado por: Allpack Group AG Pfeffingerstrasse 45, Reinach, Suiza.

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A., Mendoza 1259 - C1428DJG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 58.818

Directora Técnica: Farm. Georgina Rodriguez

janssen 

LOTE:

VENCIMIENTO:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULO 2 (400 mcg) PROD. UPTRAVI EX-2022-85844931- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.24 10:25:03 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.24 10:25:03 -03:00

PROYECTO DE ROTULO
Envase primario

UPTRAVI[®]
SELEXIPAG 1000 microgramos
Comprimidos recubiertos

Vía Oral

Industria alemana

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A.

janssen 

LOTE:

VENCIMIENTO:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULO 1° (1000 mcg) PROD. UPTRAVI EX-2022-85844931- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.20 14:06:58 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.20 14:06:59 -03:00

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



**UPTRAVI®
SELEXIPAG
200 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg, 1000 mcg, 1200 mcg, 1400 mcg y 1600 mcg
Comprimidos recubiertos**

Vía oral
Industria alemana

Venta bajo receta archivada

COMPOSICIÓN

UPTRAVI® 200 mcg

Cada comprimido recubierto contiene: selexipag 200 mcg.

Excipientes: manitol, almidón de maíz, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, hidroxipropilcelulosa, estearato de magnesio, hipromelosa, propilenglicol, dióxido de titanio, óxido de hierro amarillo, cera carnauba.

UPTRAVI® 400 mcg

Cada comprimido recubierto contiene: selexipag 400 mcg.

Excipientes: manitol, almidón de maíz, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, hidroxipropilcelulosa, estearato de magnesio, hipromelosa, propilenglicol, dióxido de titanio, óxido de hierro rojo, cera carnauba.

UPTRAVI® 600 mcg

Cada comprimido recubierto contiene: selexipag 600 mcg.

Excipientes: manitol, almidón de maíz, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, hidroxipropilcelulosa, estearato de magnesio, hipromelosa, propilenglicol, dióxido de titanio, óxido de hierro rojo, óxido de hierro negro, cera carnauba.

UPTRAVI® 800 mcg

Cada comprimido recubierto contiene: selexipag 800 mcg.

Excipientes: manitol, almidón de maíz, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, hidroxipropilcelulosa, estearato de magnesio, hipromelosa, propilenglicol, dióxido de titanio, óxido de hierro negro, óxido de hierro amarillo, cera carnauba.

UPTRAVI® 1000 mcg

Cada comprimido recubierto contiene: selexipag 1000 mcg.

Excipientes: manitol, almidón de maíz, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, hidroxipropilcelulosa, estearato de magnesio, hipromelosa, propilenglicol, dióxido de titanio, óxido de hierro rojo, óxido de hierro amarillo, cera carnauba.

UPTRAVI® 1200 mcg

Cada comprimido recubierto contiene: selexipag 1200 mcg.

Excipientes: manitol, almidón de maíz, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, hidroxipropilcelulosa, estearato de magnesio, hipromelosa, propilenglicol, dióxido de titanio, óxido de hierro rojo, óxido de hierro negro, cera carnauba.

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



UPTRAVI® 1400 mcg

Cada comprimido recubierto contiene: selexipag 1400 mcg.

Excipientes: manitol, almidón de maíz, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, hidroxipropilcelulosa, estearato de magnesio, hipromelosa, propilenglicol, dióxido de titanio, óxido de hierro amarillo, cera carnauba.

UPTRAVI® 1600 mcg

Cada comprimido recubierto contiene: selexipag 1600 mcg.

Excipientes: manitol, almidón de maíz, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, hidroxipropilcelulosa, estearato de magnesio, hipromelosa, propilenglicol, dióxido de titanio, óxido de hierro rojo, óxido de hierro negro, óxido de hierro amarillo, cera carnauba.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Grupo farmacoterapéutico: Agentes antitrombóticos, inhibidores de la agregación plaquetaria excluyendo heparina, código ATC: B01AC27.

INDICACIONES

Hipertensión arterial pulmonar

UPTRAVI® está indicado para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP, OMS Grupo 1), para demorar la progresión de la enfermedad y reducir el riesgo de hospitalización por HAP.

Se estableció la efectividad en un estudio a largo plazo conducido en pacientes con HAP con síntomas de la clase funcional II-III de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los pacientes tenían HAP idiopática y hereditaria (58%), HAP asociada con enfermedades del tejido conectivo (29%), HAP asociada con enfermedades cardíacas congénitas con derivaciones corregidas (10%) (ver “Estudios clínicos”).

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Mecanismo de acción

Selexipag es un agonista oral del receptor de la prostaciclina (receptor IP) que es estructuralmente diferente de la prostaciclina. Selexipag es hidrolizado por la carboxilesterasa 1 para producir su metabolito activo, que es aproximadamente 37 veces más potente que selexipag. Selexipag y el metabolito activo son selectivos para el receptor IP frente a otros receptores prostanoideos (EP₁₋₄, DP, FP y TP).

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



Farmacodinamia

Electrofisiología cardiaca

Con la dosis máxima tolerada de 1600 mcg dos veces al día, selexipag no prolonga el intervalo QT en ningún grado clínicamente relevante.

Agregación plaquetaria

Tanto selexipag como su metabolito activo causaron una inhibición de la agregación plaquetaria *in vitro* dependiente de la concentración con un IC₅₀ de 5,5 µM y 0,21 µM, respectivamente. Sin embargo, en concentraciones clínicamente relevantes, no hubo ningún efecto sobre los parámetros de la prueba de agregación plaquetaria como se observó tras la administración de dosis múltiples de selexipag en sujetos sanos con dosis de 400 mcg hasta 1800 mcg dos veces al día.

Hemodinamia pulmonar

Un estudio clínico de fase 2 evaluó las variables hemodinámicas después de 17 semanas de tratamiento en pacientes con HAP con clase funcional OMS II-III que recibían concomitantemente antagonistas de los receptores de la endotelina (AREs) y/o inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (IPDE-5). Los pacientes titulando selexipag hasta una dosis tolerada en forma individual (incrementos de 200 mcg dos veces al día hasta alcanzar los 800 mcg dos veces al día) (N = 33) lograron una media en la reducción estadísticamente significativa de la resistencia vascular pulmonar de 30,3% (intervalo de confianza del 95% [IC] -44,7%, -12,2%) y un aumento en el índice cardiaco (mediana del efecto del tratamiento) de 0,41 L/min/m² (IC del 95%: 0,10; 0,71) en comparación con el placebo (N=10).

Interacciones medicamentosas

En un estudio realizado en sujetos sanos, selexipag (400 mcg dos veces al día) no influyó en el efecto farmacodinámico de la warfarina en la razón internacional normalizada.

Farmacocinética

Se estudió la farmacocinética de selexipag y de su metabolito activo principalmente en sujetos sanos. La farmacocinética de selexipag y del metabolito activo, después de la administración tanto de dosis únicas como de dosis múltiples, fue proporcional a la dosis hasta una dosis única de 800 mcg y dosis múltiples de hasta 1800 mcg dos veces al día.

En sujetos sanos, la variabilidad intersujeto en la exposición (área bajo la curva a lo largo de un intervalo de dosificación, AUC) en estado estacionario fue de 43% y 39% para selexipag y el metabolito activo, respectivamente. La variabilidad intrasujeto en la exposición fue de 24% y 19% para selexipag y el metabolito activo, respectivamente.

Las exposiciones a selexipag y al metabolito activo en estado estacionario en pacientes con HAP y sujetos sanos fueron similares. La farmacocinética de selexipag y del metabolito activo en pacientes con HAP no fueron influenciados por la severidad de la enfermedad y no cambiaron con el transcurso del tiempo.

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



Tanto en sujetos sanos como en pacientes con HAP, después de la administración oral, la exposición en estado estacionario al metabolito activo es de aproximadamente 3 a 4 veces la de selexipag. La exposición al metabolito activo es aproximadamente 30% mayor después de la administración oral en comparación con la misma dosis intravenosa en sujetos sanos.

Absorción

La biodisponibilidad absoluta de selexipag es de aproximadamente el 49%. Tras la administración oral, las concentraciones plasmáticas máximas observadas de selexipag y de su metabolito activo se alcanzan en aproximadamente 1 a 3 horas y en 3-4 horas, respectivamente.

En presencia de alimentos, la absorción de selexipag fue prolongada, lo cual resulta en un retraso del tiempo hasta alcanzar la concentración máxima (T_{max}) y una menor concentración plasmática máxima (C_{max}) de aproximadamente ~30%. La exposición a selexipag y al metabolito activo (AUC) no cambió significativamente en presencia de alimentos.

Distribución

El volumen de distribución de selexipag en estado estacionario es 11,7 litros.

Selexipag y su metabolito activo se unen mayoritariamente a las proteínas plasmáticas (aproximadamente un 99% en total y en la misma medida a la albúmina y a la alfa 1-glicoproteína ácida).

Metabolismo

Selexipag es hidrolizado por carboxilesterasas para producir su metabolito activo, (ácido carboxílico libre) en el hígado y en el intestino. El metabolismo oxidativo, catalizado principalmente por CYP2C8 y en menor medida por CYP3A4, conduce a la formación de derivados hidroxilados y desalquilados. Las enzimas UGT1A3 y UGT2B7 están involucradas en la glucuronidación del metabolito activo. Excepto para el metabolito activo, ninguno de los metabolitos circulantes en el plasma humano superó el 3% del total de materiales relacionados con el medicamento.

Eliminación

La eliminación de selexipag se realiza predominantemente a través del metabolismo, con una vida media terminal promedio de 0,8-2,5 horas. La vida media terminal de eliminación del metabolito activo es 6,2-13,5 horas. Existe una mínima acumulación del metabolito activo tras la administración repetida dos veces al día, lo que sugiere que la vida media efectiva se encuentra en el rango de las 3-4 horas. El aclaramiento corporal total de selexipag es de 17,9 L/hora.

Excreción

En un estudio realizado en sujetos sanos con selexipag radiomarcado, aproximadamente el 93% del material del medicamento radiactivo fue eliminado en las heces y sólo un 12% en la orina. Ni selexipag ni su metabolito activo se encontraron en la orina.

Poblaciones específicas

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



No se observaron efectos clínicamente relevantes del sexo, raza, edad o peso corporal sobre la farmacocinética de selexipag ni de su metabolito activo en sujetos sanos ni en pacientes con HAP.

Edad

Las variables farmacocinéticas (C_{max} y AUC) fueron similares en los sujetos adultos y de edad avanzada de hasta 75 años. No hubo ningún efecto de la edad sobre la farmacocinética de selexipag ni del metabolito activo en pacientes con HAP.

Insuficiencia hepática

En sujetos con insuficiencia hepática leve (clase A de Child-Pugh) o moderada (clase B de Child-Pugh), la exposición a selexipag fue de 2 y 4 veces la observada en los sujetos sanos. La exposición al metabolito activo de selexipag permaneció prácticamente invariable en los sujetos con insuficiencia hepática leve y se duplicó en los sujetos con insuficiencia hepática moderada (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo – Insuficiencia hepática”).

Sobre la base de un modelo farmacocinético de datos procedentes de un estudio realizado en sujetos con insuficiencia hepática, se espera que la exposición al metabolito activo en estado estacionario en sujetos con insuficiencia hepática moderada (clase B de Child-Pugh) después de la administración de un régimen de dosificación de una vez al día sea similar a la observada en sujetos sanos que recibieron un régimen de dosificación de dos veces al día. Se prevé que la exposición a selexipag en estado estacionario en estos pacientes durante un régimen de dosificación de una vez al día sea de aproximadamente 2 veces más que la observada en sujetos sanos que recibieron un régimen de dosificación de dos veces al día.

Insuficiencia renal

Se observó un incremento del 40-70% en la exposición (concentración plasmática máxima y área bajo la curva de concentración plasmática-tiempo) a selexipag y su metabolito activo en sujetos con insuficiencia renal grave (tasa de filtrado glomerular estimada ≥ 15 ml/min/1,73 m² y < 30 ml/min/1,73 m²) (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo – Insuficiencia renal”).

Estudios de interacción medicamentosa

Estudios in vitro

Selexipag es hidrolizado por carboxilesterasas para producir su metabolito activo. Tanto selexipag como su metabolito activo sufren un metabolismo oxidativo mediado principalmente por CYP2C8 y, en menor medida, por CYP3A4. Las enzimas UGT1A3 y UGT2B7 catalizan la glucuronidación del metabolito activo. Selexipag y su metabolito activo son sustratos de los transportadores OATP1B1 y OATP1B3. Selexipag es un sustrato de la glucoproteína P (P-gp) y el metabolito activo es un sustrato del transportador de la proteína de resistencia del cáncer de mama (BCRP, por sus siglas en inglés).

Selexipag y su metabolito activo no inhiben ni inducen las enzimas del citocromo P450 ni las proteínas transportadoras, en concentraciones clínicamente relevantes.

Los resultados de estudios de interacciones *in vivo* se presentan en las Figuras 1 y 2.

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP


HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
 Nro de registro: 58.818



Figura 1: Efecto de otros medicamentos sobre UPTRAVI® y su metabolito activo



*Datos de ARE e IPDE-5 del estudio GRIPHON.

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP


HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



Figura 2: Efecto de UPTRAVI® sobre otros medicamentos



DATOS PRECLÍNICOS SOBRE SEGURIDAD

En estudios sobre toxicidad inducida por la administración de dosis repetidas realizados en roedores, la importante disminución de la tensión arterial como resultado de una farmacología exagerada provocó signos clínicos transitorios, una disminución en la ingesta alimentaria y una ganancia de peso. En perros adultos y jóvenes, se identificaron los intestinos y huesos / médula ósea como los principales órganos diana tras el tratamiento con selexipag. Se observó un retraso en el cierre de la placa de crecimiento epifisaria femoral o tibial en perros jóvenes. No se ha establecido un nivel en el que no se observen efectos secundarios. En perros jóvenes, se observó esporádicamente una intususcepción debida a efectos asociados a la prostaciclina en la motilidad intestinal. Los márgenes de seguridad adaptados a la potencia del receptor IP para el metabolito activo fueron el doble (basándose en la exposición total) respecto a la exposición terapéutica en humanos. Este hallazgo no se produjo en los estudios de toxicidad realizados en ratones o ratas. Debido a la tendencia específica de especie de los perros a desarrollar una intususcepción, este hallazgo no se considera relevante para los humanos adultos.

El aumento en la osificación del hueso y los cambios asociados en la médula ósea observados en los estudios realizados en perros se consideran debidos a la activación de los receptores EP₄ en perros. Dado que los receptores EP₄ humanos no son activados por selexipag o su metabolito activo, este efecto es específico de especie y, por tanto, no resulta relevante en humanos.

Selexipag y su metabolito activo no son genotóxicos considerando la totalidad de los datos obtenidos en los estudios sobre genotoxicidad realizados.

En estudios sobre carcinogénesis de 2 años de duración, selexipag provocó un aumento en la incidencia de adenomas tiroideos en ratones y de adenomas de células de Leydig en ratas. Los mecanismos son específicos de los roedores. Se observó tortuosidad en las arteriolas retinianas tras 2 años de tratamiento, únicamente en ratas. A nivel de mecanismo, el efecto se considera

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



inducido por una vasodilatación crónica y los posteriores cambios en la hemodinámica ocular. Únicamente se observaron otras alteraciones histopatológicas de selexipag con exposiciones consideradas superiores a la máxima humana, lo que indica poca relevancia para su uso en humanos.

En un estudio sobre fertilidad realizado en ratas, se observó una prolongación de los ciclos estrales que dio lugar a un aumento en los días transcurridos hasta la cópula con exposiciones de 173 veces superiores a las terapéuticas (basándose en las exposiciones totales), mientras que el nivel en que no se observaron efectos fue 30 veces superior a las exposiciones terapéuticas. Por otro lado, los parámetros de fertilidad no se vieron afectados.

Selexipag no resultó teratogénico en ratas y conejos (márgenes de exposición por encima de la exposición terapéutica 13 veces superior para selexipag y 43 veces para el metabolito activo, basándose en la exposición total). Los márgenes de seguridad para los efectos potenciales sobre la reproducción relacionados con el receptor IP fueron de 20 para la fertilidad y 5 y 1 (en base a la no exposición) para el desarrollo embrio-fetal en ratas y conejos cuando se adaptaron las diferencias en la potencia del receptor. En el estudio sobre desarrollo pre y posnatal realizado en ratas, selexipag no provocó ningún efecto sobre la función reproductiva materna y fetal.

POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

El tratamiento debe ser iniciado y supervisado únicamente por un médico con experiencia en el tratamiento de la HAP.

Posología

Ajuste individualizado de la dosis

Se debe ajustar la dosis de cada paciente hasta alcanzar la dosis más alta tolerada de forma individual, que puede oscilar entre 200 microgramos administrados dos veces al día y 1600 microgramos administrados dos veces al día (dosis de mantenimiento individualizada).

La dosis inicial recomendada es de 200 microgramos administrados dos veces al día, con un intervalo entre tomas de aproximadamente 12 horas. La dosis se aumenta en incrementos de 200 microgramos administrados dos veces al día, generalmente con intervalos de una semana. Al inicio del tratamiento y en cada fase de aumento progresivo de la dosis, se recomienda la administración de la primera dosis por la noche. Durante el ajuste de la dosis pueden presentarse reacciones adversas que reflejan el mecanismo de acción de UPTRAVI® (como cefalea, diarrea, náuseas y vómitos, dolor mandibular, mialgia, dolor en las extremidades, artralgia y rubefacción). Estas suelen ser transitorias o controlables con un tratamiento sintomático (ver “Reacciones adversas”). Sin embargo, si un paciente alcanza una dosis que no puede tolerar, esta debe reducirse al nivel de dosis previo.

En los pacientes en que el aumento progresivo de la dosis se vea limitado por razones ajenas a las reacciones adversas que reflejan el mecanismo de acción de UPTRAVI®, se puede considerar un

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



segundo intento para continuar con el aumento progresivo de la dosis hasta la dosis más alta tolerada de forma individual hasta una dosis máxima de 1600 microgramos administrados dos veces al día.

Dosis de mantenimiento individualizada

Se debe mantener la dosis más alta tolerada alcanzada durante el ajuste de la dosis. Si con el tiempo el tratamiento se tolera por una dosis determinada, se debe considerar el tratamiento sintomático y/o la reducción de la dosis hasta el nivel inmediatamente inferior.

Interrupciones y suspensiones

En caso de olvidar tomar una dosis, esta se debe tomar lo antes posible. La dosis olvidada no se debe tomar en caso de que la siguiente dosis programada deba tomarse en las siguientes 6 horas aproximadamente.

En caso de interrumpir el tratamiento durante 3 o más días, se debe volver a tomar UPTRAVI® a una dosis inferior y a continuación ajustar la dosis.

Se dispone de escasa experiencia sobre la suspensión brusca del tratamiento con UPTRAVI® en pacientes con HAP. No se han observado casos de rebote agudo.

Sin embargo, si se toma la decisión de retirar el tratamiento con UPTRAVI®, se debe hacer de forma gradual a la vez que se introduce un tratamiento alternativo.

Ajuste de la dosificación con la coadministración de inhibidores moderados del CYP2C8

Cuando se coadministra con inhibidores moderados del CYP2C8 (por ejemplo, clopidogrel, deferasirox y teriflunomida), reducir la dosis de UPTRAVI® a una vez al día. Si la terapia no es tolerada a una determinada dosis, se debería considerar un tratamiento sintomático y/o reducción a siguiente dosis más baja. La frecuencia de dosificación de UPTRAVI® debe revertirse a dos veces al día cuando se suspenda la administración conjunta de inhibidor moderado de CYP2C8 (ver “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”).

Poblaciones especiales

Pacientes de edad avanzada (≥65 años)

No se requieren ajustes de la dosis en pacientes de edad avanzada (ver “Propiedades farmacológicas – Farmacocinética”). Existe una experiencia clínica limitada en pacientes mayores de 75 años; por lo tanto, UPTRAVI® se debe utilizar con precaución en esta población (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”).

Insuficiencia hepática

No se debe administrar UPTRAVI® en pacientes con insuficiencia hepática grave (clase C de Child-Pugh, ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). En pacientes con insuficiencia hepática moderada (clase B de Child-Pugh), la dosis inicial de UPTRAVI® debe ser de 200 microgramos administrados una vez al día, y se debe aumentar con intervalos semanales mediante incrementos de 200 microgramos administrados una vez al día hasta que se experimenten reacciones adversas que reflejen el mecanismo de acción de selexipag que no sean tolerables o no

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



se puedan tratar médicamente. No se requiere un ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia hepática leve (clase A de Child-Pugh).

Insuficiencia renal

No se requiere un ajuste de la dosis en pacientes con insuficiencia renal leve o moderada. No se requiere modificar la dosis inicial en pacientes con insuficiencia renal grave (tasa de filtración glomerular estimada [TFGe] < 30 ml/min/1,73 m²); el ajuste de la dosis debe realizarse con precaución en estos pacientes (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”).

Población pediátrica (< 18 años)

No se ha establecido todavía la seguridad y la eficacia de UPTRAVI® en niños entre 0 y 18 años. No se dispone de datos. No se recomienda la administración de selexipag en la población pediátrica. Los estudios realizados en animales mostraron un mayor riesgo de intususcepción, aunque se desconoce la relevancia clínica de estos hallazgos (ver “Datos preclínicos sobre seguridad”).

Modo de administración

Vía oral.

Los comprimidos recubiertos se deben administrar por vía oral por la mañana y por la noche. Para mejorar la tolerabilidad se recomienda tomar UPTRAVI® junto con las comidas y, al inicio de cada fase de aumento progresivo de la dosis, tomar la primera dosis aumentada por la noche.

No se deben partir, triturar ni masticar los comprimidos; estos se deben ingerir con agua.

Se indicará a los pacientes con mala visión o no videntes que soliciten ayuda de otra persona para tomar UPTRAVI® durante el periodo de ajuste de la dosis.

CONTRAINDICACIONES

- Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes incluidos en la sección “Composición”.
- Cardiopatía isquémica grave o angina inestable.
- Infarto de miocardio en los 6 últimos meses.
- Insuficiencia cardíaca descompensada sin estricta supervisión médica.
- Arritmias graves.
- Acontecimientos cerebrovasculares (por ejemplo, accidente isquémico transitorio o accidente cerebrovascular) en los 3 últimos meses.
- Defecto valvular congénito o adquirido, con alteraciones clínicamente relevantes en la función miocárdica no relacionadas con la hipertensión pulmonar.
- Uso concomitante con inhibidores potentes de CYP2C8 (por ejemplo, gemfibrozilo; ver “Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción”).

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE EMPLEO

Hipotensión

Selexipag tiene propiedades vasodilatadoras que pueden resultar en una disminución de la presión arterial. Antes de prescribir UPTRAVI®, el médico debe considerar con detenimiento la posibilidad de que los pacientes con determinadas enfermedades subyacentes pudieran verse afectados negativamente por los efectos vasodilatadores (por ejemplo, los pacientes en tratamiento con antihipertensivos o con hipotensión en reposo, hipovolemia, obstrucción grave del flujo de salida del ventrículo izquierdo o disfunción autonómica) (ver “Reacciones adversas”).

Hipertiroidismo

Se han observado hipertiroidismo con UPTRAVI®. Se recomienda la realización de pruebas de la función tiroidea en presencia de síntomas o signos de hipertiroidismo (ver “Reacciones adversas”).

Enfermedad pulmonar venooclusiva

Se han notificado casos de edema pulmonar con vasodilatadores (principalmente con prostaciclina) cuando son usados en pacientes con enfermedad pulmonar venooclusiva. Por consiguiente, si se presentan signos de edema pulmonar cuando se administra UPTRAVI® a pacientes con HAP, debe valorarse una posible enfermedad pulmonar venooclusiva. En caso de que se confirme, debe discontinuarse el tratamiento con UPTRAVI®.

Pacientes de edad avanzada (≥ 65 años)

Se dispone de escasa experiencia clínica sobre el tratamiento con selexipag en pacientes mayores de 75 años; por lo tanto, UPTRAVI® debe administrarse con precaución en esta población de pacientes (ver “posología y modo de administración”).

Insuficiencia hepática

No se dispone de experiencia clínica con selexipag en pacientes con insuficiencia hepática grave (clase C de Child-Pugh); por tanto, no debe administrarse UPTRAVI® en estos pacientes. La exposición a selexipag y su metabolito activo resulta aumentada en los pacientes con insuficiencia hepática moderada (clase B de Child-Pugh; ver “Propiedades farmacológicas, Farmacocinética”). En los pacientes con insuficiencia hepática moderada, se debe administrar UPTRAVI® una vez al día (ver “Posología y modo de administración”).

Insuficiencia renal

En pacientes con insuficiencia renal grave (TFGe < 30 ml/min/1,73 m²), se debe prestar especial atención durante la fase de ajuste de la dosis. No se dispone de experiencia en relación al

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



tratamiento con UPTRAVI® en pacientes sometidos a diálisis (ver “Propiedades farmacológicas, Farmacocinética”), por lo que no se debe administrar UPTRAVI® a estos pacientes.

Mujeres en edad fértil

Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con selexipag (ver “Fertilidad, embarazo y lactancia”).

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN

Efecto de otros medicamentos sobre selexipag

Selexipag se hidroliza para dar lugar a su metabolito activo mediante carboxilesterasas (ver “Propiedades farmacológicas, Farmacocinética”). Tanto selexipag como su metabolito activo están sujetos al metabolismo oxidativo llevado a cabo principalmente por CYP2C8 y en menor medida por CYP3A4. La glucuronidación del metabolito activo es catalizada por UGT1A3 y UGT2B7. Selexipag y su metabolito activo son sustratos de OATP1B1 y OATP1B3. Selexipag es un sustrato débil de la bomba de extrusión P-gp. El metabolito activo es un sustrato débil de la proteína de resistencia del cáncer de mama (BCRP).

La farmacocinética de selexipag y su metabolito activo no se ve afectada por la warfarina.

Inhibidores de CYP2C8

En presencia de gemfibrozilo 600 mg, un inhibidor potente de CYP2C8, administrado dos veces al día, la exposición a selexipag aumentó 2 veces de forma aproximada, mientras que la exposición al metabolito activo, el mayor contribuyente a la eficacia, aumentó 11 veces de forma aproximada. La administración concomitante de UPTRAVI® con inhibidores potentes de CYP2C8 (por ejemplo, gemfibrozilo) está contraindicada (ver “Contraindicaciones”).

La administración concomitante de UPTRAVI® con clopidogrel (dosis de carga de 300 mg o dosis de mantenimiento de 75 mg una vez al día), un inhibidor moderado de CYP2C8, no tuvo un efecto relevante en la exposición al selexipag, pero aumentó la exposición al metabolito activo aproximadamente 2,2 y 2,7 veces luego de la dosis de carga y la dosis de mantenimiento, respectivamente. La frecuencia de dosificación de UPTRAVI® debe reducirse a una vez al día cuando se administra conjuntamente con inhibidores moderados de CYP2C8 (por ejemplo, clopidogrel, deferasirox, teriflunomida). La frecuencia de dosificación de UPTRAVI® debe revertirse a dos veces al día cuando se suspenda la administración conjunta de inhibidor moderado de CYP2C8 (ver “Posología y forma de administración”).

Inductores de CYP2C8

En presencia de rifampicina 600 mg, un inductor de CYP2C8 (y enzimas UGT), administrado una vez al día, la exposición a selexipag no se modificó, mientras que la exposición al metabolito

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



activo se redujo a la mitad. Se debe considerar un ajuste de la dosis de selexipag cuando se administra con inductores de CYP2C8 (por ejemplo, rifampicina, carbamazepina, fenitoína).

Inhibidores de UGT1A3 y UGT2B7

No se ha estudiado el efecto de los inhibidores potentes de UGT1A3 y UGT2B7 (ácido valproico, probenecid y fluconazol) sobre la exposición a selexipag y su metabolito activo. Se requiere precaución al administrar estos medicamentos de forma concomitante con UPTRAVI®. No se puede excluir una posible interacción farmacocinética con inhibidores potentes de UGT1A3 y UGT2B7.

Inhibidores e inductores de CYP3A4

En presencia de lopinavir/ritonavir 400/100 mg (un inhibidor potente de CYP3A4) administrado dos veces al día, la exposición a selexipag aumentó hasta aproximadamente doblarse, mientras que la exposición al metabolito activo de selexipag no se modificó. Teniendo en cuenta la potencia 37 veces mayor del metabolito activo, este efecto no resulta clínicamente relevante. No se prevé un efecto de los inductores de CYP3A4 sobre la farmacocinética del metabolito activo, ya que un inhibidor potente de CYP3A4 no afecta a su farmacocinética, lo que indica que la vía de CYP3A4 no resulta importante en la eliminación del metabolito activo.

Tratamientos específicos de la HAP

En el ensayo de Fase 3 controlado con placebo realizado en pacientes con HAP, el tratamiento con selexipag en combinación con un ARE y un IPDE-5 dio lugar a una disminución del 30 % en la exposición al metabolito activo.

Inhibidores del transportador (lopinavir/ritonavir)

En presencia de lopinavir/ritonavir 400/100 mg, administrado dos veces al día, un inhibidor potente de OATP (OATP1B1 y OATP1B3) y de P-gp, la exposición a selexipag aumentó hasta aproximadamente doblarse, mientras que la exposición al metabolito activo de selexipag no se modificó. Teniendo en cuenta que la mayor parte del efecto farmacológico se debe al metabolito activo, este efecto no resulta clínicamente relevante.

Efecto de selexipag sobre otros medicamentos

Selexipag y su metabolito activo no inhiben ni inducen las enzimas del citocromo P450 y las proteínas transportadoras a concentraciones clínicamente relevantes.

Anticoagulantes o inhibidores de la agregación plaquetaria

Selexipag es un inhibidor de la agregación plaquetaria in vitro. En el estudio Fase 3 controlado con placebo realizado en pacientes con HAP, no se detectó un aumento del riesgo de hemorragia con selexipag en comparación con el placebo, incluyendo los casos en que selexipag se administró junto con anticoagulantes (como la heparina o anticoagulantes de tipo cumarina) o inhibidores de la agregación plaquetaria. En un estudio realizado en sujetos sanos, selexipag (400 microgramos dos veces al día) no alteró la exposición a S-warfarina (sustrato de CYP2C9) o R-warfarina (sustrato de CYP3A4) tras la administración de una única dosis de 20 mg de warfarina. Selexipag

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



no alteró el efecto farmacodinámico de la warfarina sobre la razón internacional normalizada (RIN).

Midazolam

En el estado estacionario tras alcanzar la dosis máxima de 1600 microgramos de selexipag dos veces al día, no se observaron cambios clínicamente relevantes sobre la exposición a midazolam, sustrato sensible de CYP3A4 en el intestino y el hígado, o a su metabolito, 1-hidroimidazolam. La administración concomitante de selexipag con sustratos del CYP3A4 no requiere ajuste de dosis.

Anticonceptivos hormonales

No se han realizado estudios específicos de interacción con los anticonceptivos hormonales. Teniendo en cuenta que selexipag no afecta a la exposición a los sustratos del CYP3A4, midazolam y R- warfarina, o al sustrato de CYP2C9, S-warfarina, no se prevé una disminución de la eficacia de los anticonceptivos hormonales.

FERTILIDAD, EMBARAZO Y LACTANCIA

Mujeres en edad fértil

Las mujeres en edad fértil deben utilizar métodos anticonceptivos efectivos durante el tratamiento con selexipag.

Embarazo

No se dispone de datos sobre el tratamiento con selexipag en mujeres embarazadas. Los estudios llevados a cabo en animales no indican ningún efecto perjudicial directo o indirecto en relación a la toxicidad para la reproducción. Selexipag y su metabolito principal presentaron una potencia *in vitro* del receptor de prostaciclina (IP) entre 20 y 80 veces inferior en especies animales en un modelo de toxicidad para la reproducción comparada con humanos. Por tanto, los márgenes de seguridad para los posibles efectos asociados al receptor IP sobre la reproducción son menores a los efectos no asociados al IP (ver sección “Datos preclínicos sobre seguridad”).

No se recomienda el uso de UPTRAVI® durante el embarazo y en mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticonceptivos.

Lactancia

Se desconoce si selexipag o sus metabolitos se excretan en la leche materna. En ratas, selexipag o sus metabolitos, se excretan en la leche (ver sección “Datos preclínicos sobre seguridad”). No puede excluirse un riesgo para el lactante. UPTRAVI® no debe utilizarse durante la lactancia.

Fertilidad

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



No se dispone de datos clínicos. En estudios realizados en ratas, selexipag a altas dosis provocó alteraciones transitorias en los ciclos estrales que no afectaron a la fertilidad (ver sección “Datos preclínicos sobre seguridad”). Se desconoce la relevancia en humanos.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y UTILIZAR MÁQUINAS

La influencia de UPTRAVI® sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es pequeña. Se debe tener en cuenta el estado clínico del paciente y el perfil de reacciones adversas de selexipag (como cefalea, hipotensión) a la hora de considerar la capacidad del paciente para conducir y utilizar máquinas.

REACCIONES ADVERSAS

Resumen del perfil de seguridad

Las reacciones adversas que se observan con mayor frecuencia son cefalea, diarrea, náuseas y vómitos, dolor mandibular, mialgia, dolor en las extremidades, artralgia y rubefacción. Estas reacciones son más frecuentes durante la fase de aumento de la dosis. La mayor parte de estas reacciones son de intensidad leve o moderada.

La seguridad de selexipag se ha evaluado en un ensayo Fase 3 controlado con placebo a largo plazo en 1156 pacientes con HAP sintomática. La duración media del tratamiento fue de 76,4 semanas (mediana 70,7 semanas) en los pacientes en tratamiento con selexipag frente a 71,2 semanas (mediana 63,7 semanas) en los pacientes con placebo. La exposición a selexipag fue de hasta 4,2 años.

Tabla de reacciones adversas

Las reacciones adversas obtenidas del estudio clínico pivotal se muestran en la tabla debajo. Las reacciones adversas fueron agrupadas según la frecuencia dentro del sistema de clasificación de órganos (SCO) y presentadas en orden de gravedad decreciente.

Las frecuencias son definidas como muy frecuentes ($\geq 1/10$), frecuentes ($\geq 1/100$ a $< 1/10$), poco frecuentes ($\geq 1/1000$ a $< 1/100$), raras ($\geq 1/10000$ a $< 1/1000$), muy raras ($< 1/10000$).

Sistema de clasificación de órganos	Muy frecuentes	Frecuentes	Poco frecuentes
Trastornos de la sangre y del sistema linfático		Anemia Disminución de la hemoglobina	
Trastornos endocrinos		Hipertiroidismo Disminución de la hormona	

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
 Nro de registro: 58.818



		estimuladora de la tiroides	
Trastornos del metabolismo y de la nutrición		Disminución del apetito Pérdida de peso	
Trastornos del sistema nervioso	Cefalea*		
Trastornos cardíacos			Taquicardia sinusal
Trastornos vasculares	Rubefacción*	Hipotensión	
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos	Nasofaringitis (de origen no infeccioso)	Congestión nasal	
Trastornos gastrointestinales	Diarrea* Vómitos* Náuseas*	Dolor abdominal Dispepsia	
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo		Erupción Urticaria Eritema	
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo	Dolor mandibular* Mialgia* Artralgia* Dolor en las extremidades*		
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración		Dolor	

*Ver sección "Descripción de reacciones adversas seleccionadas".

Descripción de reacciones adversas seleccionadas

Efectos farmacológicos relacionados con el ajuste de la dosis y el tratamiento de mantenimiento

Las reacciones adversas seleccionadas con el mecanismo de acción de selexipag se han observado con frecuencia, en particular durante la fase de ajuste individualizado de la dosis, y se enumeran en la siguiente tabla:

Reacciones adversas relacionadas con la prostaciclina	Ajuste de la dosis		Mantenimiento	
	Selexipag	Placebo	Selexipag	Placebo
Cefalea	64%	28%	40%	20%
Diarrea	36%	12%	30%	13%
Náuseas	29%	13%	20%	10%
Dolor mandibular	26%	4%	21%	4%
Mialgia	15%	5%	9%	3%
Dolor en las extremidades	14%	5%	13%	6%
Vómitos	14%	4%	8%	6%
Rubefacción	11%	4%	10%	3%
Artralgia	7%	5%	9%	5%

Estos efectos suelen ser transitorios o controlables mediante tratamiento sintomático. El 7,5 % de los pacientes en tratamiento con selexipag abandonaron el tratamiento a causa de estas reacciones

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



adversas. La tasa aproximada de reacciones adversas que resultaron ser graves fue del 2,3 % en el grupo de tratamiento con selexipag y del 0,5 % en el grupo con placebo. En la práctica clínica, se ha observado que los acontecimientos gastrointestinales responden al tratamiento con medicamentos antidiarreicos, antieméticos y antinauseosos y/o medicamentos para los trastornos gastrointestinales funcionales. Los acontecimientos relacionados con dolor se han tratado con frecuencia con medicamentos analgésicos (como paracetamol).

Disminución de la hemoglobina

En un estudio de fase III controlado con placebo realizado en pacientes con HAP, la media de los cambios absolutos en la hemoglobina en las visitas periódicas en comparación con los niveles iniciales osciló entre -0,34 y -0,02 g/dl en el grupo de selexipag frente a -0,05 y 0,25 g/dl en el grupo de placebo. Se observó una disminución en la concentración de hemoglobina respecto al nivel inicial hasta niveles inferiores a 10 g/dl en el 8,6% de los pacientes tratados con selexipag y en el 5,0% de los pacientes tratados con placebo.

En un estudio de fase 3 controlado con placebo en pacientes con diagnóstico reciente de HAP, los cambios medios absolutos en la hemoglobina en las visitas periódicas en comparación con el valor inicial oscilaron entre 1,77 y 1,26 g/dl en el grupo de terapia triple (selexipag, macitentan, tadalafilo) en comparación con 1,61 y 1,28 g/dl en el grupo de terapia doble (placebo, macitentan y tadalafilo). Se notificó una disminución de la concentración de hemoglobina por debajo de 10 g/dl en el 19,0% de los pacientes del grupo de terapia triple y en el 14,5% del grupo de terapia doble. La anemia se notificó con una frecuencia muy común (13,4%) en el grupo de terapia triple en comparación con la frecuencia común (8,3%) en el grupo de terapia doble.

Pruebas de la función tiroidea

El estudio de Fase 3 controlado con placebo realizado en pacientes con HAP, se observó hipertiroidismo en el 1,6% de los pacientes en el grupo de selexipag, frente a ningún caso en el grupo placebo (ver “Advertencias y precauciones especiales de empleo”). Se observó una reducción (hasta -0,3 MU/l respecto a la mediana basal de 2,5 MU/l) en la mediana de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) en la mayoría de las visitas realizadas en los pacientes incluidos en el grupo de selexipag. En el grupo de placebo se observó un cambio mínimo en los valores medianos. No se observaron cambios en la triyodotironina (T3) o tiroxina (T4).

Aumento de la frecuencia cardíaca

En el estudio de Fase 3 controlado con placebo realizado en pacientes con HAP, se observó un aumento transitorio en la frecuencia cardíaca media de 3–4 lpm a las 2–4 horas tras la administración de una dosis. Las exploraciones mediante electrocardiograma mostraron taquicardia sinusal en el 11,3% de los pacientes en el grupo de selexipag frente al 8,8% en el grupo de placebo (ver también “Advertencias y precauciones especiales de empleo”).

Hipotensión

En el estudio Fase 3 controlado con placebo en pacientes con HAP, se reportó hipotensión en el 5,8% de los pacientes del grupo selexipag en comparación con el 3,8% del grupo placebo. Los cambios absolutos medios en la presión sanguínea sistólica en visitas regulares en comparación con los valores basales fueron desde -2,0 a -1,5 mmHg en el grupo selexipag en comparación a -

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



1,3 a 0,0 mmHg en el grupo placebo, y en la presión sanguínea diastólica fueron de -1,6 a -0,1 mmHg en el grupo selexipag en comparación a -1,1 a 0,3 mmHg en el grupo placebo. Se registró una disminución de la presión sanguínea sistólica por debajo de los 90 mmHg en el 9,7% de los pacientes en el grupo selexipag en comparación al 6,7% en el grupo placebo.

Dispepsia

En un estudio de fase 3 controlado con placebo en pacientes recién diagnosticados de HAP, se notificó dispepsia con una frecuencia muy común (16,8%) en los pacientes que recibieron la terapia triple (selexipag, macitentan, tadalafilo) en comparación con la frecuencia común (8,3%) en los pacientes que recibieron la terapia doble (placebo, macitentan y tadalafilo).

Seguridad a largo plazo

De los 1156 pacientes que participaron en el estudio pivotal, 709 pacientes ingresaron al estudio de extensión a largo plazo abierto (330 pacientes que continuaron con selexipag del estudio GRIPHON y 379 pacientes que recibieron placebo en GRIPHON y se cambiaron a selexipag). El seguimiento a largo plazo de los pacientes tratados con selexipag por una mediana de duración del tratamiento de 30,5 meses y por un máximo de hasta 103 meses mostró un perfil de seguridad que fue similar al observado en el estudio clínico pivotal descrito arriba.

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Es importante notificar las sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio / riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas al través del sistema nacional de notificación.

SOBREDOSIFICACIÓN

Se han notificado casos aislados de sobredosis por encima de 3200 microgramos. La única consecuencia informada fueron náusea leve y transitoria. En caso de sobredosis deben adoptarse las medidas de apoyo necesarias. Es poco probable que la diálisis resulte efectiva, ya que selexipag y su metabolito activo se encuentran mayoritariamente unidos a las proteínas.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología de:

Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez – Tel: (011) 4962-6666 / 2247
Hospital A. Posadas – Tel: (011) 4654-6648 y 4658-7777

ESTUDIOS CLÍNICOS

Hipertensión arterial pulmonar

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



Se demostró el efecto de selexipag sobre la progresión de la HAP en un estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, determinado por los eventos (estudio GRIPHON) realizado en 1156 pacientes con HAP sintomática (clase funcional OMS I [0,8%], II [46%], III [53%] y IV [1%]). Los pacientes fueron aleatorizados para recibir placebo (N = 582) o UPTRAVI® (N = 574). Se aumentó la dosis en intervalos semanales en incrementos de 200 mcg dos veces al día hasta alcanzar la dosis más alta tolerada de hasta 1600 mcg dos veces al día.

El criterio de valoración primario del estudio fue el tiempo transcurrido desde la primera ocurrencia del evento hasta la finalización del tratamiento de: a) fallecimiento, b) hospitalización por HAP, c) empeoramiento de la HAP resultando en la necesidad de trasplante pulmonar o septostomía auricular con balón, d) inicio de una terapia con prostanoides parenterales u oxigenoterapia crónica u e) otros eventos de progresión de la enfermedad sobre la base de una disminución del 15% con respecto al estado basal en la PM6M (Prueba de marcha de seis minutos) más el empeoramiento de la clase funcional o la necesidad de una terapia específica para la HAP adicional.

La edad promedio fue de 48 años; la mayoría de los pacientes eran blancos (65%) y mujeres (80%). Casi todos los pacientes tenían clase funcional OMS II y III en el estado basal.

La HAP hereditaria o idiopática fue la etiología más frecuente en la población del estudio (58%), seguida por la HAP asociada con enfermedades del tejido conectivo (29%), la HAP asociada con enfermedades cardíacas congénitas con derivaciones reparadas (10%), medicamentos y toxinas (2%), y el VIH (1%).

En el estado basal, la mayoría de los pacientes enrolados (80%) fueron tratados con una dosis estable de un antagonista de receptor de endotelina (15%), un IPDE-5 (32%) o ambos (33%).

Los pacientes tratados con selexipag alcanzaron dosis dentro de los siguientes grupos: 200-400 mcg (23%), 600-1000 mcg (31%) y 1200-1600 mcg (43%).

El tratamiento con UPTRAVI® resultó en una reducción del 40% (IC del 99%: 22 a 54%; rango logarítmico bilateral, valor de $p < 0,0001$) de la ocurrencia de eventos del criterio de valoración primario en comparación con el placebo (Tabla 1; Figura 3). El efecto beneficioso de UPTRAVI® se debió principalmente a una reducción en la hospitalización por HAP y a una reducción en los demás eventos de progresión de la enfermedad (Tabla 1). El beneficio observado de UPTRAVI® fue similar, independientemente de la dosis alcanzada, cuando se ajustó la dosis de los pacientes a la dosis más alta tolerada (ver “Posología y modo de administración”).

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP


HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
 Nro de registro: 58.818



Figura 3: Estimaciones de Kaplan-Meier del primer evento de morbilidad-mortalidad en el estudio GRIPHON



Pacientes tratados con UPTRAVI®:

en riesgo	574	455	361	246	171	101	40
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Pacientes tratados con placebo:

en riesgo	582	433	347	220	149	88	28
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
 Nro de registro: 58.818



Tabla 1: Criterios de valoración primarios y componentes relacionados en el estudio GRIPHON

	UPTRAVI® N=574		Placebo N=582		Cociente de riesgos (IC del 99%)	Valor p
	n	%	n	%		
Eventos del criterio de valoración primario hasta la finalización del tratamiento						
Todos los eventos del criterio de valoración primario	155	27,0	242	41,6	0,60 [0,46;0,78]	<0,0001
Como primer evento:						
• Hospitalización por HAP	78	13,6	109	18,7		
• Otro evento de progresión de la enfermedad (disminución en la distancia PM6M más el empeoramiento de la clase funcional o necesidad de otra terapia)	38	6,6	100	17,2		
• Fallecimiento	28	4,9	18	3,1		
• Terapia con prostanoides parenterales u oxigenoterapia crónica	10	1,7	13	2,2		
• Empeoramiento de la HAP que resulta en la necesidad de trasplante pulmonar o septostomía auricular con balón	1	0,2	2	0,3		

Se desconoce si el exceso en la cantidad de fallecimientos en el grupo de selexipag está relacionado con el medicamento porque hubo muy pocos fallecimientos y no se observó el desequilibrio hasta 18 meses después en el estudio GRIPHON.

Las figuras 4A, B y C muestran los análisis del tiempo transcurrido hasta el primer evento de los componentes del criterio de valoración primario de hospitalización por HAP (A), otro evento de progresión de la enfermedad (B) y fallecimiento (C) - todos censurados 7 días después de cualquier evento del criterio de valoración primario (debido a que muchos pacientes tratados con placebo pasaron a UPTRAVI® a etiqueta abierta en este período).

El desequilibrio entre los grupos de tratamiento para el análisis del punto final muerte hasta el fin de tratamiento (Figura 4C) puede haberse visto afectado por la censura informativa y, por lo tanto, debe interpretarse con precaución.

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP


HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
 Nro de registro: 58.818



Figura 4A: Hospitalización por HAP como primer criterio de valoración en el estudio GRIPHON



Pacientes tratados con UPTRAVI®:

en riesgo	574	455	361	246	171	101	40
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Pacientes tratados con placebo:

en riesgo	582	433	347	220	149	88	28
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP


HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
 Nro de registro: 58.818



Figura 4B: Progresión de la enfermedad como primer criterio de valoración en el estudio GRIPHON



Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP


HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
 Nro de registro: 58.818



Figura 4C: Fallecimiento como primer criterio de valoración en el estudio GRIPHON



	0	6	12	18	24	30	36
Pacientes tratados con UPTRAVI®:							
en riesgo	574	455	361	246	171	101	40
Pacientes tratados con placebo:							
en riesgo	582	433	347	220	149	88	28

El efecto del tratamiento de UPTRAVI® sobre el tiempo transcurrido hasta el primer evento primario fue coherente independientemente de la terapia de base para la HAP (es decir, en combinación con un ARE, IPDE-5, ambos o sin terapia de base) (Figura 5).

Specialist: NP


MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Figura 5: Análisis de los subgrupos del criterio de valoración primario en el estudio GRIPHON



Nota: El grupo racial "Otros" no se muestra en el análisis, ya que la población es menor a 30. EU = cantidad de pacientes tratados con UPTRAVI® con eventos, NU = cantidad de pacientes aleatorizados para recibir UPTRAVI®, EP = cantidad de pacientes tratados con placebo con eventos, NP = cantidad de pacientes aleatorizados para recibir placebo, HR = cociente de riesgos, IC = intervalo de confianza, el tamaño de los cuadrados representa la cantidad de pacientes en el subgrupo.

Nota: La figura que se muestra arriba presenta los efectos en distintos subgrupos, todos los cuáles son características basales y fueron todos preestablecidos. Los límites de confianza del 99% que se muestran no tienen en cuenta la cantidad de comparaciones realizadas ni reflejan el efecto de un factor en particular luego del ajuste de todos los demás factores. No se deberá interpretar más de lo necesario la homogeneidad o heterogeneidad aparente entre los grupos.

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



Prueba de marcha de seis minutos (PM6M)

La capacidad de realizar ejercicio se evaluó como criterio de valoración secundario. La mediana del cambio absoluto desde el estado basal hasta la semana 26 en la PM6M medida en el nivel mínimo (es decir, aproximadamente 12 horas después de administrarse la dosis) fue de +4 metros con UPTRAVI® y de -9 metros en el grupo de placebo. Esto resultó en una mediana del efecto del tratamiento corregido con placebo de 12 metros (IC del 99%: 1, 24 metros; p bilateral = 0,005).

Tratamiento a largo plazo de la HAP

En el seguimiento a largo plazo de los pacientes que fueron tratados con UPTRAVI® en el estudio pivotal y en la extensión abierta (N=574), estimaciones de Kaplan-Meier de supervivencia de estos pacientes a lo largo del estudio GRIPHON y el estudio de extensión a largo plazo a los 1, 2, 5 y 7 años fueron 92%, 85%, 71%, y 63%, respectivamente. La mediana de exposición a UPTRAVI® fue 3 años. Estas observaciones no controladas no permiten la comparación con un grupo control que no recibió UPTRAVI® y no pueden utilizarse para determinar el efecto a largo plazo de UPTRAVI® sobre la mortalidad.

INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE

Aconseje al paciente que lea el prospecto de información para el paciente.

Informe a los pacientes:

- Qué hacer si se olvidan de tomar una dosis
- Que no deben partir, triturar ni masticar los comprimidos

PRESENTACIÓN

Los comprimidos recubiertos de UPTRAVI® (selexipag) se presentan en las siguientes configuraciones:

Concentración (mcg)	Color	Grabado	Contenido del envase
200	Amarillo claro	2	60 comprimidos recubiertos 140 comprimidos recubiertos (Kit o empaque para titulación de la dosis)*
400	Rojo	4	60 comprimidos recubiertos
600	Violeta claro	6	60 comprimidos recubiertos
800	Verde	8	60 comprimidos recubiertos
1000	Naranja	10	60 comprimidos recubiertos
1200	Violeta oscuro	12	60 comprimidos recubiertos
1400	Amarillo oscuro	14	60 comprimidos recubiertos
1600	Marrón	16	60 comprimidos recubiertos

* El kit o empaque para titulación de la dosis contiene una guía de titulación que proporciona información sobre el proceso de titulación o incremento progresivo de la dosis permitiendo registrar el número de tabletas que el paciente ingiere cada día.

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura ambiente entre 20°C y 25°C. Se permiten desvíos de temperatura entre 15°C y 30°C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Excella GmbH & Co. KG, Nuernberger Strasse 12, Feucht, Alemania.

Acondicionado por: Allpack Group AG Pfeffingerstrasse 45, Reinach, Suiza.

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A. Mendoza 1259 - C1428DJG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N°: 58.818

Directora Técnica: Farm. Georgina Rodriguez

Centro de Atención al Cliente

Por correo electrónico: infojanssen@janar.jnj.com

Por teléfono: 0800 122 0238

www.janssen.com

® Marca Registrada

Fecha de última revisión:

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PI_EUPI May-22+USPI Oct-21_V2.0_es



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: PROSPECTO PROD. UPTRAVI EX-2022-85844931- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 27 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.20 14:07:06 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.20 14:07:06 -03:00

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

UPTRAVI®

SELEXIPAG

200 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg, 1000 mcg, 1200 mcg, 1400 mcg y 1600 mcg

Comprimidos recubiertos

Vía oral
Industria alemana

Venta bajo receta archivada

Lea todo el prospecto detenidamente antes de tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto (ver sección 4).

Contenido del prospecto

1. Qué es UPTRAVI® y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar UPTRAVI®
3. Cómo tomar UPTRAVI®
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de UPTRAVI®
6. Contenido del envase e información adicional

1. Qué es UPTRAVI® y para qué se utiliza

UPTRAVI® es un medicamento que contiene el principio activo selexipag. Actúa en los vasos sanguíneos de forma similar a la sustancia natural prostaciclina, haciendo que se relajen y ensanchen.

UPTRAVI® se utiliza en el tratamiento a largo plazo de la hipertensión arterial pulmonar (HAP) en pacientes adultos. UPTRAVI® puede ser utilizado en combinación con otro tipo de medicamentos para la HAP conocidos como antagonistas del receptor de la endotelina e inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. UPTRAVI® puede ser utilizado por sí solo si el paciente no es candidato a estos medicamentos.

La HAP es una enfermedad caracterizada por la alta presión arterial que afecta a los vasos sanguíneos que transportan la sangre del corazón a los pulmones (las arterias pulmonares). En las personas con HAP, estas arterias son más estrechas, por lo que el corazón debe trabajar más para

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PIL-PT_EUPI May-22_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



bombear la sangre. Esto puede hacer que se sientan cansadas, mareadas, con dificultad para respirar o que experimenten otros síntomas.

De la misma manera que la prostaciclina, UPTRAVI® ensancha las arterias pulmonares y reduce su endurecimiento. Esto hace que al corazón le resulte más fácil bombear la sangre a lo largo de las arterias pulmonares. Alivia los síntomas de la HAP y mejora el curso de la enfermedad.

2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar UPTRAVI®

No tome UPTRAVI®

- si es alérgico a selexipag o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6)
- si tiene algún trastorno en el corazón, como:
 - flujo sanguíneo disminuido a los músculos cardíacos (cardiopatía isquémica grave o angina inestable); los síntomas pueden incluir dolor torácico
 - infarto de miocardio en los 6 últimos meses
 - debilidad cardíaca (insuficiencia cardíaca descompensada) sin estricta supervisión médica
 - latido cardíaco irregular grave
 - defecto en las válvulas cardíacas (congénito o adquirido) que hace que el corazón funcione con dificultad (no relacionado con la hipertensión pulmonar)
- si ha sufrido algún accidente cerebrovascular (ictus) en los 3 últimos meses, o cualquier otro evento de reducción del flujo sanguíneo al cerebro (por ejemplo, accidente isquémico transitorio)
- si está tomando gemfibrozilo (medicamento utilizado para reducir el nivel de grasas [lípidos] en la sangre)

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico antes de empezar a tomar UPTRAVI® en caso de que:

- esté tomando medicamentos para la hipertensión (tensión arterial alta)
- tenga tensión arterial baja asociada a síntomas como mareo
- haya sufrido recientemente una pérdida importante de sangre o pérdida de líquidos como una diarrea severa o vómitos
- tenga problemas en la glándula tiroides
- tenga problemas graves en los riñones o esté siendo tratado con diálisis
- tenga o haya tenido problemas graves en el funcionamiento correcto del hígado

Si experimenta alguno de los signos anteriores o su enfermedad se modifica, informe inmediatamente a su médico.

Niños y adolescentes

No administrar este medicamento a niños menores de 18 años de edad, ya que UPTRAVI® no se ha evaluado en niños.

Pacientes de edad avanzada

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PIL-PT_EUPI May-22_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



Se dispone de escasa experiencia sobre UPTRAVI® en pacientes mayores de 75 años. UPTRAVI® se debe utilizar con precaución en pacientes de este grupo de edad.

Otros medicamentos y UPTRAVI®

Informe a su médico si está tomando, ha tomado recientemente o prevé tomar algún otro medicamento.

Tomar otros medicamentos puede afectar al funcionamiento de UPTRAVI®.

Informe a su médico especialista en HAP si está tomando alguno de los medicamentos que se indican a continuación:

- Gemfibrozilo (medicamento utilizado para reducir los niveles de grasas [lípidos] en la sangre)
- Clopidogrel (medicamento utilizado para prevenir la formación de coágulos sanguíneos (trombos) en la enfermedad de las arterias coronarias)
- Deferasirox (medicamento utilizado para eliminar el exceso de hierro del organismo)
- Teriflunomida (medicamento utilizado para tratar la esclerosis múltiple remitente recurrente)
- Carbamazepina (medicamento utilizado para tratar ciertos tipos de epilepsia, neuralgia o para ayudar a controlar trastornos graves del comportamiento cuando otros medicamentos no funcionen)
- Fenitoína (medicamento utilizado para tratar la epilepsia)
- Ácido valproico (medicamento utilizado para tratar la epilepsia)
- Probenecid (medicamento utilizado para tratar la gota)
- Fluconazol, rifampicina o rifapentina (antibióticos utilizados para tratar las infecciones)

Embarazo y lactancia

No se recomienda el uso de UPTRAVI® durante el embarazo y la lactancia. Si es mujer y puede quedar embarazada, debe utilizar un método anticonceptivo eficaz mientras esté tomando UPTRAVI®. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

UPTRAVI® puede provocar efectos adversos como cefaleas y disminución de la tensión arterial (ver sección 4), que pueden afectar a su capacidad para conducir; los síntomas de su enfermedad pueden también disminuir su capacidad para conducir.

3. Cómo tomar UPTRAVI®

El tratamiento con UPTRAVI® debe ser iniciado y controlado por un médico que tenga experiencia en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (HAP).

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PIL-PT_EUPI May-22_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



Informe a su médico si experimenta efectos adversos, ya que su médico podría recomendarle que cambie su dosis de UPTRAVI®.

Informe a su médico si está tomando otros medicamentos, ya que su médico podría recomendarle que tome UPTRAVI® solamente una vez al día.

Si tiene mala visión o experimenta cualquier tipo de ceguera, solicite ayuda de otra persona para tomar UPTRAVI® durante el periodo de ajuste de la dosis.

Ajuste de la dosis adecuada para usted

Al inicio del tratamiento, tomará la dosis más baja. Esta es de un comprimido de **200 microgramos por la mañana y otro comprimido de 200 microgramos por la noche**, con unas 12 horas de diferencia. Se debe iniciar el tratamiento por la noche. Su médico le indicará que debe aumentar progresivamente la dosis. Es lo que se denomina ajuste de la dosis, y permite a su cuerpo adaptarse al nuevo medicamento. El objetivo del ajuste de la dosis es alcanzar la dosis más adecuada. Esta será la dosis más alta que pueda tolerar, pudiendo llegar a alcanzar la dosis máxima de 1.600 microgramos por la mañana y por la noche.

La primera caja de comprimidos que reciba contendrá los comprimidos de color amarillo claro de 200 microgramos.

Su médico le indicará que aumente la dosis en fases, generalmente cada semana, aunque el intervalo entre incrementos puede ser mayor.

En cada fase, añadirá un comprimido de 200 microgramos a la dosis matutina y otro comprimido de 200 microgramos a la dosis nocturna. La primera toma de la dosis aumentada debe realizarse por la noche. El diagrama siguiente muestra el número de comprimidos que debe tomar cada mañana y cada noche en las primeras 4 fases.

Specialist: NP


MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PIL-PT_EUPI May-22_V2.0_es

Cada fase del ajuste de la dosis dura aproximadamente 1 semana



Si su médico le indica que siga aumentando la dosis, añadirá un comprimido de 200 microgramos a la dosis matutina y un comprimido de 200 microgramos a la dosis nocturna en cada nueva fase. Se recomienda realizar la primera toma de la dosis aumentada por la noche.

Si su médico le indica que siga aumentando la dosis y proceda a la fase 5, puede hacerlo tomando un comprimido verde de 800 microgramos y un comprimido amarillo claro de 200 microgramos por la mañana y un comprimido de 800 microgramos y un comprimido de 200 microgramos por la noche.

La dosis máxima de Uptravi es de 1.600 microgramos por la mañana y 1.600 microgramos por la noche. Sin embargo, no todos los pacientes alcanzarán esta dosis, cada paciente requiere una dosis distinta.

El diagrama de abajo muestra el número de comprimidos que debe tomar cada mañana y cada noche en cada fase, empezando por la fase 5.

Specialist: NP


MAF revision: EM

HA approval date:

QC: REP

AR_SELE_FCT_PIL-PT_EUPI May-22_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



El envase para el ajuste de la dosis (UPTRAVI® 200 mcg envase con 140 comprimidos recubiertos) contiene también una guía que proporciona información sobre el proceso de ajuste de la dosis y le permite anotar el número de comprimidos que toma diariamente.

Recuerde anotar el número de comprimidos que toma cada día en su diario de ajuste de la dosis. Las fases de ajuste suelen durar aproximadamente 1 semana. Si su médico le indica que prolongue cada fase de ajuste por encima de 1 semana, dispone de páginas adicionales en el diario que le permiten hacerlo. **Recuerde comunicarse con su médico especialista en HAP de forma periódica durante la fase de ajuste de la dosis.**

Disminución de la dosis debido a efectos adversos

Durante el ajuste de la dosis, puede experimentar efectos adversos como dolor de cabeza, diarrea, sensación de malestar (náuseas), malestar (vómitos), dolor mandibular, dolor muscular, dolor en las extremidades inferiores, dolor articular o enrojecimiento facial (ver sección 4). Si estos efectos adversos le resultan difíciles de tolerar, consulte con su médico la forma de controlarlos o tratarlos. Hay tratamientos disponibles para ayudarle a aliviar estos efectos adversos. Por ejemplo, analgésicos como el paracetamol pueden ayudarle a tratar el dolor y el dolor de cabeza.

Si no se pueden tratar los efectos adversos, o estos no mejoran gradualmente con la dosis que está tomando, su médico puede ajustar la dosis reduciendo el número de comprimidos de color amarillo claro de 200 microgramos que toma, quitando un comprimido por la mañana y otro por la noche.

Specialist: NP


MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PIL-PT_EUPI May-22_V2.0_es

El esquema siguiente muestra cómo reducir la dosis. Esto se debe realizar únicamente en caso de que así lo indique su médico.



Si los efectos adversos que experimenta pueden controlarse tras la reducción de la dosis, su médico puede decidir que debe mantener esa dosis. Para obtener información adicional, consulte la sección “Dosis de mantenimiento” a continuación.

Dosis de mantenimiento

La dosis más alta que pueda tolerar durante la fase de ajuste de la dosis se convertirá en su dosis de mantenimiento. Su dosis de mantenimiento es la dosis que debe seguir tomando de forma habitual.

Su médico le recetará un único comprimido con la potencia adecuada para su dosis de mantenimiento. Esto le permite tomar un comprimido por la mañana y otro por la noche, en lugar de varios comprimidos cada vez. Para consultar la descripción completa de los comprimidos de Upravi, incluyendo los colores y el grabado, ver sección 6 en este prospecto.

Con el tiempo, su médico puede ajustar su dosis de mantenimiento si fuera necesario.

Si en cualquier momento, tras tomar la misma dosis durante un largo periodo, experimenta efectos adversos que no puede tolerar o efectos adversos que afectan a las actividades de la vida diaria, contacte con su médico, ya que puede requerir una reducción de la dosis. El médico puede, en ese caso, recetarle una concentración menor. Recuerde desechar los comprimidos no utilizados (ver sección 5).

Tome UPTRAVI® una vez por la mañana y otra por la noche, con un intervalo de aproximadamente 12 horas.

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PIL-PT_EUPI May-22_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



Tome los comprimidos junto con las comidas, ya que esto puede ayudarle a tolerar mejor el medicamento. La cubierta de los comprimidos sirve de protección. Trague los comprimidos enteros con ayuda de un vaso de agua. No parta, triture ni mastique los comprimidos.

Si toma más UPTRAVI® del que debe

Si toma más comprimidos de los que debe, consulte inmediatamente a su médico.

Si olvidó tomar UPTRAVI®

Si olvidó tomar UPTRAVI®, tome una dosis tan pronto como se acuerde, y a continuación siga tomando los comprimidos en el horario habitual. En caso de que sea casi el momento de tomar su siguiente dosis (en un plazo de 6 horas antes de la hora en que suele tomarla), debe dejar de tomar la dosis olvidada y continuar tomando el medicamento en el horario habitual. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

Si interrumpe el tratamiento con UPTRAVI®

La interrupción brusca del tratamiento con UPTRAVI® puede hacer que sus síntomas empeoren. No deje de tomar UPTRAVI®, salvo que su médico se lo indique. Su médico puede indicarle que reduzca la dosis gradualmente antes de interrumpir el tratamiento por completo.

Si, por alguna razón, deja de tomar UPTRAVI® durante más de 3 días consecutivos (si ha olvidado 3 dosis matutinas y 3 dosis nocturnas, o 6 dosis seguidas o más), **contacte con su médico inmediatamente, ya que puede tener que ajustar la dosis para evitar efectos adversos.** Su médico puede decidir volver a empezar el tratamiento a una dosis inferior, para incrementarla gradualmente hasta alcanzar su dosis de mantenimiento.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico.

4. Posibles efectos adversos

Igual que todos los medicamentos, UPTRAVI® puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Puede experimentar efectos adversos, no solo durante la fase de ajuste de la dosis, durante la cual se está aumentando su dosis, sino también más adelante, tras haber tomado la misma dosis durante un largo período.

Si experimenta alguno de los siguientes efectos adversos: dolor de cabeza, diarrea, sensación de malestar (náuseas), malestar (vómitos), dolor mandibular, dolor muscular, dolor en las extremidades inferiores, dolor articular o enrojecimiento facial, que no puede tolerar o no es tratable, debe contactar con su médico, ya que la dosis que está tomando puede ser demasiado alta para usted y puede requerir una reducción.

Efectos adversos muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas)

- Dolor de cabeza
- Rubefacción (enrojecimiento facial)
- Náuseas y vómitos

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PIL-PT_EUPI May-22_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



- Diarrea
- Dolor mandibular, dolor muscular, dolor articular, dolor en las extremidades inferiores
- Nasofaringitis (congestión nasal)

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas)

- Anemia (nivel bajo de glóbulos rojos)
- Hipertiroidismo (glándula tiroides hiperactiva)
- Disminución del apetito
- Pérdida de peso
- Hipotensión (tensión arterial baja)
- Dolor de estómago, incluyendo indigestión
- Dolor
- Cambios en algunos resultados analíticos, incluyendo los que miden los niveles de células sanguíneas y la función tiroidea
- Erupciones, incluida la urticaria, que pueden provocar sensación de quemazón o de escozor y enrojecimiento de la piel

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas)

- Aumento de la frecuencia cardíaca

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del sistema nacional de notificación. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de UPTRAVI®

No utilice UPTRAVI® después de la fecha de vencimiento que aparece en la caja y en el blister. La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica.

Conserve los comprimidos de UPTRAVI® a temperatura ambiente entre 20°C y 25°C. Se permiten desvíos de temperatura entre 15°C y 30°C.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de UPTRAVI®

- El principio activo es selexipag.
- Los demás componentes son: manitol, almidón de maíz, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, hidroxipropilcelulosa, estearato de magnesio, hipromelosa, propilenglicol, dióxido de titanio, cera de carnauba y óxidos de hierro (ver abajo).

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PIL-PT_EUPI May-22_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



UPTRAVI® 200 microgramos contiene óxido de hierro amarillo.
UPTRAVI® 400 microgramos contiene óxido de hierro rojo.
UPTRAVI® 600 microgramos contiene óxido de hierro rojo y óxido de hierro negro.
UPTRAVI® 800 microgramos contiene óxido de hierro amarillo y óxido de hierro negro.
UPTRAVI® 1000 microgramos contiene óxido de hierro rojo y óxido de hierro amarillo.
UPTRAVI® 1200 microgramos contiene óxido de hierro negro y óxido de hierro rojo.
UPTRAVI® 1400 microgramos contiene óxido de hierro amarillo.
UPTRAVI® 1600 microgramos contiene óxido de hierro negro, óxido de hierro rojo y óxido de hierro amarillo.

Aspecto de UPTRAVI® y contenido del envase

Los comprimidos recubiertos de UPTRAVI® se presentan en blister, en las siguientes configuraciones:

Concentración (mcg)	Color	Grabado	Contenido del envase
200	Amarillo claro	2	60 comprimidos recubiertos 140 comprimidos recubiertos (Kit o empaque para titulación de la dosis)*.
400	Rojo	4	60 comprimidos recubiertos
600	Violeta claro	6	60 comprimidos recubiertos
800	Verde	8	60 comprimidos recubiertos
1000	Naranja	10	60 comprimidos recubiertos
1200	Violeta oscuro	12	60 comprimidos recubiertos
1400	Amarillo oscuro	14	60 comprimidos recubiertos
1600	Marrón	16	60 comprimidos recubiertos

* El kit o empaque para titulación de la dosis contiene una guía de titulación que proporciona información sobre el proceso de titulación o incremento progresivo de la dosis permitiendo registrar el número de comprimidos que el paciente ingiere cada día.

Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>

o

llamar a ANMAT responde 0800-333-1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Excella GmbH & Co. KG, Nuernberger Strasse 12, 90537 Feucht, Alemania.

Acondicionado por: Allpack Group AG Pfeffingerstrasse 45, 4153 Reinach, Suiza.

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PIL-PT_EUPI May-22_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A. Mendoza 1259 - C1428DJG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N°: 58.818
Directora Técnica: Farm. Georgina Rodriguez

Centro de Atención al Cliente

Por correo electrónico: infojanssen@janar.jnj.com

Por teléfono: 0800 122 0238

www.janssen.com

® Marca Registrada

Fecha de última revisión:

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PIL-PT_EUPI May-22_V2.0_es



Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



GUÍA PARA EL AJUSTE DE DOSIS

Página 1

UPTRAVI® SELEXIPAG 200 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg, 1000 mcg, 1200 mcg, 1400 mcg y 1600 mcg Comprimidos recubiertos	
Vía oral	
Industria alemana	Venta bajo receta archivada
Guía para el ajuste de la dosis	
Inicio del tratamiento con UPTRAVI®	
Por favor, lea el prospecto adjunto antes de empezar el tratamiento. Informe a su médico si experimenta efectos adversos, ya que su médico podría recomendarle cambiar su dosis de UPTRAVI®. Informe a su médico si esta tomando otros medicamentos, ya que su médico podría recomendarle que tome UPTRAVI® una vez al día.	

Página 2

Página 3

Índice		
¿Cómo tomar UPTRAVI®?.....	4	Cambio a la dosis de mantenimiento..... 14
¿Cómo aumentar la dosis?.....	6	Si olvida tomar UPTRAVI®..... 16
¿Cuáles son las fases?.....	8	Si interrumpe el tratamiento con UPTRAVI®... 17
¿Cuándo debe disminuir la dosis?.....	10	Diario para el ajuste de la dosis..... 18
Disminución de la dosis.....	12	

Página 4

Página 5

¿Cómo tomar UPTRAVI®? UPTRAVI® es un medicamento que se debe tomar por la mañana y por la noche para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar, también denominada HAP. La dosis inicial de UPTRAVI® es de 200 microgramos por la mañana y por la noche.	Hay 2 fases de tratamiento con UPTRAVI®: Ajuste de la dosis Durante las primeras semanas, su médico necesitará su colaboración para hallar la dosis de UPTRAVI® más adecuada para usted. Su médico puede aumentarle la dosis a partir de la dosis inicial. Su médico puede disminuirle la dosis. Este
---	---

Specialist: NP

MAF revision: EM

QC: REP

HA approval date:

AR_SELE_FCT_PIL-PT_EUPI May-22_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
Nro de registro: 58.818



<p>La primera toma de UPTRAVI® se debe realizar por la noche.</p> <p>Debe tomar cada dosis con un vaso de agua, preferentemente durante las comidas.</p>	<p>proceso se conoce como ajuste de la dosis, y permite a su cuerpo adaptarse gradualmente al medicamento.</p> <p>Mantenimiento Una vez su médico haya encontrado la dosis adecuada para usted, esta será la dosis que tomará de forma habitual. Esta se denomina dosis de mantenimiento.</p>
--	--

Página 6

<p>¿Cómo aumentar la dosis?</p> <p>El tratamiento empezará a una dosis de 200 microgramos por la mañana y por la noche, y tras discutirlo con su médico aumentará la dosis hasta la siguiente fase.</p> <p>La primera toma de la dosis aumentada se debe realizar por la noche. Cada fase de ajuste suele durar aproximadamente 1 semana. Puede tardar varias semanas en encontrar la dosis adecuada para usted.</p> <p>El objetivo es alcanzar la dosis más adecuada para su tratamiento. Esta dosis será su dosis de mantenimiento.</p>

Página 7

<p>Cada paciente con HAP es distinto. No todos los pacientes acabarán teniendo la misma dosis de mantenimiento.</p> <p>Algunos pacientes podrán tomar 200 microgramos por la mañana y por la noche como dosis de mantenimiento, mientras que otros alcanzarán la dosis máxima de 1600 microgramos por la mañana y por la noche.</p> <p>Otros pueden alcanzar una dosis de mantenimiento en algún punto entre ambas. Lo importante es alcanzar la dosis más adecuada para su propio tratamiento.</p>
--

Specialist: NP


MAF revision: EM

HA approval date:

QC: REP

AR_SELE_FCT_PIL-PT_EUPI May-22_V2.0_es

Página 8



Página 9

Página 10

↓ ¿Cuándo debe disminuir la dosis?

Como con todos los medicamentos, puede experimentar efectos adversos a medida que aumenta la dosis de UPTRAVI®.

Consulte a su médico si presenta efectos adversos. Hay tratamientos disponibles para ayudarle a aliviarlos.

Los efectos adversos más frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas) que puede experimentar mientras toma UPTRAVI® son:

- Dolor de cabeza
- Diarrea
- Náuseas
- Vómitos
- Dolor mandibular
- Dolor muscular
- Dolor en las extremidades inferiores
- Dolor articular
- Enrojecimiento facial

Consulte el prospecto para obtener la lista completa de los efectos adversos e información adicional.


Página 11

Si no puede tolerar los efectos adversos incluso después de que su médico los haya intentado tratar, puede que le recomiende que disminuya la dosis.


Si su médico le indica que disminuya la dosis, tome un comprimido de 200 microgramos menos por la mañana y otro menos por la noche.

Únicamente debe disminuir la dosis tras consultar con su médico. Este proceso de disminución de la dosis le ayudará a encontrar la dosis adecuada para usted, también denominada dosis de mantenimiento.

Página 12



Página 13



Specialist: NP

MAF revision: EM

HA approval date:

QC: REP

AR_SELE_FCT_PIL-PT_EUPI May-22_V2.0_es

Página 14

Página 15

<p>Cambio a la dosis de mantenimiento</p> <p>La dosis más alta que pueda tolerar durante la fase de ajuste de la dosis se convertirá en su dosis de mantenimiento. Su dosis de mantenimiento es la dosis que debe seguir tomando de forma habitual. Su médico o enfermero le recetará un único comprimido con la potencia equivalente para su dosis de mantenimiento.</p> <p>Esto le permite tomar un único comprimido por la mañana y otro por la noche, en lugar de varios comprimidos para cada dosis.</p>	<p>Por ejemplo, si su dosis más alta tolerada durante la fase de ajuste de la dosis fue de 1200 microgramos una vez por la mañana y otra por la noche:</p>  <p>Con el tiempo, su médico puede ajustar su dosis de mantenimiento si fuera necesario.</p>
---	--

Página 16

Página 17

<p>Si olvida tomar UPTRAVI®</p> <p>Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde, y a continuación siga tomando los comprimidos en el horario habitual. En caso de que se acuerde en las 6 horas previas a la hora en que debería tomar la siguiente dosis, debe dejar de tomar la dosis olvidada y continuar tomando el medicamento en el horario habitual. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.</p>	<p>Si interrumpe el tratamiento con UPTRAVI®</p> <p>No deje de tomar UPTRAVI®, salvo que su médico se lo indique. Si, por alguna razón, deja de tomar UPTRAVI® durante más de 3 días consecutivos (si ha olvidado 6 dosis seguidas o más), contacte con su médico inmediatamente, ya que puede tener que ajustar la dosis para evitar los efectos adversos.</p> <p>Su médico puede decidir volver a empezar el tratamiento a una dosis inferior, para incrementarla gradualmente hasta alcanzar su dosis de mantenimiento previa.</p>
---	---

Página 18

Página 19

<p>Diario para el ajuste de la dosis</p> <p>Lea detenidamente las instrucciones contenidas en el prospecto.</p> <p>Las siguientes páginas del diario le ayudarán a mantener un registro del número de comprimidos que debe tomar por la mañana y por la noche durante el ajuste de la dosis.</p>	<p>Recuerde comunicarse con su médico especialista en HAP de forma regular.</p> <p>Anote las indicaciones de su médico:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--	---

Specialist: NP

MAF revision: EM

HA approval date:

QC: REP

AR_SELE_FCT_PIL-PT_EUPI May-22_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
 Nro de registro: 58.818



<p>Utilícelas para anotar el número de comprimidos que toma por la mañana y por la noche.</p> <p>Cada fase suele durar aproximadamente 1 semana, salvo que su médico le indique lo contrario. Si las fases de ajuste de la dosis duran más de una semana, dispone de páginas adicionales en su diario para registrarlos.</p> <p> Utilice las páginas 20 a 27 para registrar las primeras semanas de tratamiento, cuando recibe únicamente comprimidos de 200 microgramos (fases 1-4).</p> <p> Si le han recetado comprimidos tanto de 200 como de 800 microgramos, utilice las páginas 30 a 37. (fases 5-8)</p>	<p>Teléfono del médico:</p> <p>Correo electrónico del médico:</p> <p>Notas:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---	---

Página 20

Página 21

<p>Nº DE SEMANA 1</p> <p>Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Hablé con mi médico el <u>DD/MM/AA</u></p> <p>Fecha:</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">200 microgramos</td> <td style="width: 5%;">0</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">200 microgramos</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">La primera vez que tome Upravi deberá ser por la noche</p>		200 microgramos	0	#	#	#	#	#	#	#	#		200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	#	<p>Nº DE SEMANA #</p> <p>Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda. Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma mañana y por la noche. Hablé con mi médico el <u>DD/MM/AA</u></p> <p>Fecha:</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">200 microgramos</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">200 microgramos</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">La primera vez que tome una dosis aumentada de Upravi deberá ser p</p>		200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	#		200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	200 microgramos	0	#	#	#	#	#	#	#	#																																			
	200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	#																																			
	200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	#																																			
	200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	#																																			

Página 22

Página 23

<p>Nº DE SEMANA #</p> <p>Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda. Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma mañana y por la noche. Hablé con mi médico el <u>DD/MM/AA</u></p> <p>Fecha:</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">200 microgramos</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">200 microgramos</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> </tr> </table>		200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	#		200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	#	<p>Nº DE SEMANA #</p> <p>Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda. Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma mañana y por la noche. Hablé con mi médico el <u>DD/MM/AA</u></p> <p>Fecha:</p> <table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">200 microgramos</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;">200 microgramos</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> <td style="width: 5%;">#</td> </tr> </table> <p style="font-size: small;">Pase a la página 28 si su médico le receta los comprimidos de 800 mic</p>		200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	#		200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	#
	200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	#																																			
	200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	#																																			
	200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	#																																			
	200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	#																																			

Página 24

Página 25

Specialist: NP

HA approval date:

MAF revision: EM

QC: REP

AR_SELE_FCT_PIL-PT_EUPI May-22_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
 Nro de registro: 58.818



<p>Nº DE SEMANA #</p> <p>Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda. Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Háble con mi médico el DD/MM/AA</p> <p>Fecha: _____</p> <table border="1"> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">Mañana ☀️ 200 microgramos</td> <td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">Noche 🌙 200 microgramos</td> <td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td> </tr> </table> <p>Pase a la página 28 si su médico le receta los comprimidos de 800 microgramos</p>	Mañana ☀️ 200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	Noche 🌙 200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	<p>Nº DE SEMANA #</p> <p>Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda. Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Háble con mi médico el DD/MM/AA</p> <p>Fecha: _____</p> <table border="1"> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">Mañana ☀️ 200 microgramos</td> <td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">Noche 🌙 200 microgramos</td> <td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td> </tr> </table> <p>Pase a la página 28 si su médico le receta los comprimidos de 800 mic</p>	Mañana ☀️ 200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	Noche 🌙 200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#
Mañana ☀️ 200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#																													
Noche 🌙 200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#																													
Mañana ☀️ 200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#																													
Noche 🌙 200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#																													

Página 26

Página 27

<p>Nº DE SEMANA #</p> <p>Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda. Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Háble con mi médico el DD/MM/AA</p> <p>Fecha: _____</p> <table border="1"> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">Mañana ☀️ 200 microgramos</td> <td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">Noche 🌙 200 microgramos</td> <td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td> </tr> </table> <p>Pase a la página 28 si su médico le receta los comprimidos de 800 microgramos</p>	Mañana ☀️ 200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	Noche 🌙 200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	<p>Nº DE SEMANA #</p> <p>Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda. Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Háble con mi médico el DD/MM/AA</p> <p>Fecha: _____</p> <table border="1"> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">Mañana ☀️ 200 microgramos</td> <td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e0e0e0;">Noche 🌙 200 microgramos</td> <td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td> </tr> </table> <p>Pase a la página 28 si su médico le receta los comprimidos de 800 mic</p>	Mañana ☀️ 200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#	Noche 🌙 200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#
Mañana ☀️ 200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#																													
Noche 🌙 200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#																													
Mañana ☀️ 200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#																													
Noche 🌙 200 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	#																													

Página 28

Página 29

<p>Utilice las siguientes páginas del diario si su médico le receta comprimidos de 800 microgramos además de los comprimidos de 200 microgramos.</p> <p>En las páginas del diario, compruebe que ha tomado un comprimido de 800 microgramos cada día por la mañana y por la noche junto con el número de comprimidos de 200 microgramos que se le ha recetado.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>☀️ Comprimido de 200 microgramos</p> <p>🌙 Comprimido de 800 microgramos (Utilícelos de la fase 5 a la 8 para reducir el número de comprimidos que se necesitan por toma.)</p> </div>	<p>Recuerde comunicarse con su médico especialista en HAP de forma regular.</p> <p>Anote las indicaciones de su médico: </p> <p>Teléfono del médico:</p> <p>Correo electrónico del médico:</p> <p>Notas: </p>
--	--

Specialist: NP

MAF revision: EM

HA approval date:

QC: REP

AR_SELE_FCT_PIL-PT_EUPI May-22_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
 Nro de registro: 58.818



Página 30

Nº DE SEMANA #	Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda. Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Háble con mi médico el DD/MM/AA							30						
Fecha:														
Mañana ☀️ 200 microgramos ● 800 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	1	1	1	1	1	1	1
Noche 🌙 200 microgramos ● 800 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	1	1	1	1	1	1	1

Página 31

Nº DE SEMANA #	Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda. Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Háble con mi médico el DD/MM/AA												
Fecha:													
Mañana ☀️ 200 microgramos ● 800 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	1	1	1	1	1	1
Noche 🌙 200 microgramos ● 800 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	1	1	1	1	1	1

Página 32

Nº DE SEMANA #	Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda. Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Háble con mi médico el DD/MM/AA							32					
Fecha:													
Mañana ☀️ 200 microgramos ● 800 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	1	1	1	1	1	1
Noche 🌙 200 microgramos ● 800 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	1	1	1	1	1	1

Página 33

Nº DE SEMANA #	Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda. Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Háble con mi médico el DD/MM/AA												
Fecha:													
Mañana ☀️ 200 microgramos ● 800 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	1	1	1	1	1	1
Noche 🌙 200 microgramos ● 800 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	1	1	1	1	1	1

Página 34

Nº DE SEMANA #	Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda. Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Háble con mi médico el DD/MM/AA							34					
Fecha:													
Mañana ☀️ 200 microgramos ● 800 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	1	1	1	1	1	1
Noche 🌙 200 microgramos ● 800 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	1	1	1	1	1	1

Página 35

Nº DE SEMANA #	Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda. Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Háble con mi médico el DD/MM/AA												
Fecha:													
Mañana ☀️ 200 microgramos ● 800 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	1	1	1	1	1	1
Noche 🌙 200 microgramos ● 800 microgramos	#	#	#	#	#	#	#	1	1	1	1	1	1

Specialist: NP

MAF revision: EM

HA approval date:

QC: REP

AR_SELE_FCT_PIL-PT_EUPI May-22_V2.0_es

Producto: UPTRAVI®
 Nro de registro: 58.818



Página 36

Página 37

<p>N° DE SEMANA #</p> <p>Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda. Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Hable con mi médico el DD/MM/AA</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Mañana 200 microgramos 800 microgramos</p> <p>Noche 200 microgramos 800 microgramos</p>	<p>N° DE SEMANA #</p> <p>Anote el número de la semana del tratamiento en la esquina superior izquierda. Escriba cada día en las casillas de abajo la cantidad de comprimidos que toma por la mañana y por la noche. Hable con mi médico el DD/MM/AA</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Mañana 200 microgramos 800 microgramos</p> <p>Noche 200 microgramos 800 microgramos</p>																																																
36	36																																																
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table>	#	#	#	#	#	#	#	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td><td>#</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td> </tr> </table>	#	#	#	#	#	#	#	#	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
#	#	#	#	#	#	#	#																																										
1	1	1	1	1	1	1	1																																										
1	1	1	1	1	1	1	1																																										
#	#	#	#	#	#	#	#																																										
1	1	1	1	1	1	1	1																																										
1	1	1	1	1	1	1	1																																										

Página 38

Página 39

<p>Notas</p>	<p>MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS</p> <p>Elaborado por: Excella GmbH & Co. KG, Nuernberger Strasse 12, 90537 Feucht, Alemania. Acondicionado por: Allpack Group AG Pfeffingerstrasse 45, Reinach, Suiza. Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A. Mendoza 1259 - C1428DJG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°: 58.818 Directora Técnica: Farm. Georgina Rodriguez Centro de Atención al Cliente Por correo electrónico: infojanssen@janar.jnj.com Por teléfono: 0800 122 0238 ® Marca Registrada www.janssen.com Fecha de última revisión:</p>
--------------	---

Nota: La presente Guía para el Ajuste de la Dosis se incluirá en la caja de UPTRAVI® 200 mcg x 140 comprimidos recubiertos junto al Prospecto.

Specialist: NP

MAF revision: EM

HA approval date:

QC: REP

AR_SELE_FCT_PIL-PT_EUPI May-22_V2.0_es



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: INFORMACION PARA EL PACIENTE PROD. UPTRAVI EX-2022-85844931- -APN-DGA#ANMAT.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 19 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.20 14:07:13 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.20 14:07:14 -03:00

PROYECTO DE ROTULO
Envase secundario

UPTRAVI[®]
SELEXIPAG 1600 microgramos
Comprimidos recubiertos

Vía Oral

60 comprimidos recubiertos

Venta bajo receta archivada

Industria alemana

Composición: Cada comprimido recubierto contiene: Selexipag 1600 mcg.
Excipientes: manitol, almidón de maíz, hidroxipropilcelulosa de bajo grado de sustitución, hidroxipropilcelulosa, estearato de magnesio, hipromelosa, propilenglicol, dióxido de titanio, óxido de hierro rojo, óxido de hierro negro, óxido de hierro amarillo, cera carnauba.

Información sobre el producto: Ver prospecto adjunto.

Conservar a temperatura ambiente entre 20°C y 25°C. Se permiten desvíos de temperatura entre 15°C y 30°C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Elaborado por: Excella GmbH & Co. KG, Nuernberger Strasse 12, Feucht, Alemania.

Acondicionado por: Allpack Group AG Pfeffingerstrasse 45, Reinach, Suiza.

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A., Mendoza 1259 - C1428DJG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N°: 58.818
Directora Técnica: Farm. Georgina Rodriguez

janssen 

LOTE:

VENCIMIENTO:



GIORLANDO Veronica Dana
CUIL 27345065879



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULO 2° (1600 mcg) PROD. UPTRAVI EX-2022-85844931- -APN-DGA#ANMAT.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.24 10:23:11 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.24 10:23:11 -03:00

PROYECTO DE ROTULO
Envase primario

UPTRAVI[®]
SELEXIPAG 1600 microgramos
Comprimidos recubiertos

Vía Oral

Industria alemana

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A.

janssen 

LOTE:

VENCIMIENTO:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULO 1 (1600 mcg) PROD. UPTRAVI EX-2022-85844931- -APN-DGA#ANMAT.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.20 14:05:32 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.20 14:05:33 -03:00

PROYECTO DE ROTULO
Envase primario

UPTRAVI[®]
SELEXIPAG 1400 microgramos
Comprimidos recubiertos

Vía Oral

Industria alemana

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A.

janssen 

LOTE:

VENCIMIENTO:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULO 1 (1400 mcg) PROD. UPTRAVI EX-2022-85844931- -APN-DGA#ANMAT.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.20 14:05:41 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.20 14:05:41 -03:00

PROYECTO DE ROTULO
Envase primario

UPTRAVI[®]
SELEXIPAG 1200 microgramos
Comprimidos recubiertos

Vía Oral

Industria alemana

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A.

janssen 

LOTE:

VENCIMIENTO:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULO 1 (1200 mcg) PROD. UPTRAVI EX-2022-85844931- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.20 14:05:48 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.20 14:05:49 -03:00

PROYECTO DE ROTULO
Envase primario

UPTRAVI[®]
SELEXIPAG 600 microgramos
Comprimidos recubiertos

Vía Oral

Industria alemana

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A.

janssen 

LOTE:

VENCIMIENTO:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULO 1 (600 mcg) PROD. UPTRAVI EX-2022-85844931- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.20 14:06:00 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.20 14:06:01 -03:00

PROYECTO DE ROTULO
Envase primario

UPTRAVI[®]
SELEXIPAG 400 microgramos
Comprimidos recubiertos

Vía Oral

Industria alemana

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A.

janssen 

LOTE:

VENCIMIENTO:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULO 1 (400 mcg) PROD. UPTRAVI EX-2022-85844931- -APN-DGA#ANMAT.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.20 14:06:10 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.20 14:06:11 -03:00

PROYECTO DE ROTULO
Envase primario

UPTRAVI[®]
SELEXIPAG 200 microgramos
Comprimidos recubiertos

Vía Oral

Industria alemana

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A.

janssen 

LOTE:

VENCIMIENTO:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULO 1 (200 mcg) PROD. UPTRAVI EX-2022-85844931- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.20 14:06:47 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.20 14:06:48 -03:00

PROYECTO DE ROTULO
Envase primario

UPTRAVI[®]
SELEXIPAG 800 microgramos
Comprimidos recubiertos

Vía Oral

Industria alemana

Importado por: Janssen Cilag Farmacéutica S.A.

janssen 

LOTE:

VENCIMIENTO:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: ROTULO 1 (800 mcg) PROD. UPTRAVI EX-2022-85844931- -APN-DGA#ANMAT.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.10.20 14:05:21 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.10.20 14:05:22 -03:00