



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Disposición**

**Número:**

**Referencia:** 1-47-2002-000640-23-2

---

VISTO el Expediente N° 1-47-2002-000640-23-2 del Registro de la ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma SINERGIUM BIOTECH S.A. solicita la autorización de nuevos proyectos de rótulos y prospectos para la Especialidad Medicinal denominada FLUXVIR/ VACUNA ANTIINFLUENZA, ANTÍGENOS DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA GRIPE INACTIVADOS, CON ADYUVANTE MF59C.1, forma farmacéutica: SUSPENSIÓN INYECTABLE, autorizada por Certificado N° 56.807.

Que lo presentado se encuadra dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos N° 16.463, Decreto N° 150/92.

Que obra el informe técnico de evaluación favorable de la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos del Instituto Nacional de Medicamentos.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1.490/92 y sus modificatorios.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase a la firma SINERGIUM BIOTECH S.A. los nuevos rótulos y prospectos para la Especialidad Medicinal denominada FLUXVIR/ VACUNA ANTIINFLUENZA, ANTÍGENOS DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA GRIPE INACTIVADOS, CON ADYUVANTE MF59C.1, forma farmacéutica: SUSPENSIÓN INYECTABLE, autorizada por Certificado N° 56.807, que constan como: IF-2023-138338536-APN-DECBR#ANMAT e IF-2023-138338351-APN-DECBR#ANMAT.

ARTICULO 2° . - Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 56.807, cuando el mismo se presente acompañado de la presente Disposición.

ARTICULO 3° . - Regístrese. Notifíquese electrónicamente al interesado la presente Disposición, rótulos y prospectos. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica. Cumplido, archívese.

Expediente N° 1-47-2002-000640-23-2

ml

Digitally signed by LIMERES Manuel Rodolfo  
Date: 2023.11.30 12:58:37 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2023.11.30 12:58:39 -03:00

PROYECTO DE RÓTULOS:

- Estuche Secundario -

(Frente)

**FLUXVIR<sup>®</sup>**

**Vacuna Anti Influenza (Antígenos de superficie del virus de la gripe inactivados, con adyuvante MF59C.1)**

**Cepas OMS  
temporada 2023  
para hemisferio sur**

10 jeringas prellenadas conteniendo 10 dosis (1 dosis - 0,5mL)

Escanear el código QR  
para acceder al prospecto  
(CÓDIGO QR)

<http://www.sinergiumbiotech.com/>

MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN

**PROHIBIDA SU VENTA**

Venta bajo receta

(Dorso)

**Fórmula:** Cada dosis (0,5 ml) contiene:

Ingredientes activos: Antígenos de superficie del virus de la gripe (hemaglutinina y neuraminidasa) cultivados en huevos fertilizados de gallinas sanas, con adyuvante MF59C.1, a partir de las siguientes cepas:

A/Sydney/5/2021 (H1N1)pdm09 - (cepa análoga: A/Sydney/175/2022, IVR-235)

15 microgramos HA\*;

A/Darwin/9/2021 (H3N2) - (cepa análoga: A/Darwin/6/2021, IVR-227)

15 microgramos HA\*;

B/Austria/1359417/2021 (linaje B/Victoria) - (cepa análoga: B/Austria/1359417/2021, BVR-26)

15 microgramos HA\*;

\*hemaglutinina

Adyuvante: MF59C.1 es un adyuvante exclusivo, preparado en escualeno, polisorbato 80, trioleato de sorbitan, citrato de sodio, ácido cítrico, agua para inyectables c.s.p. 0,5 ml.

Excipientes: cloruro de sodio, cloruro de potasio, fosfato de potasio dihidrogenado, fosfato de sodio dibásico dihidratado, cloruro de magnesio hexahidratado, cloruro de calcio dihidratado, agua para inyectables c.s.p. 0,5 ml.

**Administración:** Por inyección intramuscular. Suspensión Inyectable.  
La vacuna deberá administrarse a temperatura ambiente.

**Posología:** Según prescripción médica, leer atentamente el prospecto interno. Agitar la jeringa antes del uso. No inyectar por vía intravascular /subcutánea.

**Condiciones de conservación y almacenamiento:** Conservar en refrigerador (+2°C / +8°C). NO CONGELAR. Proteger de la luz. No usar la vacuna después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS.**

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud - Certificado N° 56.807.

Elaborado en:

**Sinergium Biotech S.A.** Ruta 9 km 38,7. Garín, Pcia. de Buenos Aires. Argentina  
Director Técnico: Sebastián Enrique Comellas – Farmacéutico

**(Lateral Largo 1)**

**FLUXVIR®**

**Vacuna Anti Influenza**

**Antígenos de superficie del virus de la gripe inactivados, con adyuvante MF59C.1**

10 jeringas prellenadas conteniendo 10 dosis (1 dosis - 0,5mL)

**(Lateral Largo 2)**

**FLUXVIR®**

**Vacuna Anti Influenza**

**Antígenos de superficie del virus de la gripe inactivados, con adyuvante MF59C.1**

**(Lateral Apertura)**

**FLUXVIR®**

**Vacuna Anti Influenza**

**Antígenos de superficie del virus de la gripe inactivados, con adyuvante MF59C.1**

- Etiqueta -

**FLUXVIR®**

**Vacuna Anti Influenza**

**Antígenos de superficie del virus de la gripe inactivados, con adyuvante MF59C.1**

CEPAS OMS/ TEMPORADA 2023

PARA HEMISFERIO SUR

1 dosis (0,5 mL)

Suspensión Inyectable - Inyección intramuscular.

Agite antes de usar.

Conservar en refrigerador (+2°C/+8°C).

No congelar. Proteger de la luz.

Elaborado en: Sinergium Biotech S.A.

Argentina.

Certificado N° 56.807

Lote:

Vto.:



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Rotulo FLUXVIR

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2023.11.21 12:57:42 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2023.11.21 12:57:43 -03:00

**FLUXVIR®**  
**VACUNA ANTI INFLUENZA, ANTÍGENOS DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA**  
**GRIPE INACTIVADOS, CON ADYUVANTE MF59C.1**  
**SUSPENSIÓN INYECTABLE**

**Venta Bajo Receta**

**CEPAS OMS**  
**TEMPORADA 2023**  
**PARA HEMISFERIO SUR**

**FÓRMULA**

Cada dosis (0,5 ml) contiene:

Ingredientes activos: Antígenos de superficie de los virus de la gripe (hemaglutinina y neuraminidasa) cultivados en huevos fertilizados de gallinas sanas, con adyuvante MF59C.1, a partir de las siguientes cepas:

A/Sydney/5/2021 (H1N1)pdm09 - (cepa análoga: A/Sydney/175/2022, IVR-235)

15 microgramos HA\*;

A/Darwin/9/2021 (H3N2) - (cepa análoga: A/Darwin/6/2021, IVR-227)

15 microgramos HA\*;

B/Austria/1359417/2021 (linaje B/Victoria) - (cepa análoga: B/ Austria/1359417/2021, BVR-26)

15 microgramos HA\*;

\*hemaglutinina

Adyuvante: MF59C.1 es un adyuvante exclusivo, preparado en escualeno 9,75 mg; polisorbato 80 1,175 mg; trioleato de sorbitan 1,175 mg; citrato de sodio 0,66 mg; ácido cítrico 0,04 mg; agua para inyectables c.s.p. 0,5 ml.

Excipientes: cloruro de sodio 4,00 mg; cloruro de potasio 0,10 mg; fosfato de potasio dihidrogenado 0,10 mg; fosfato de sodio dibásico dihidratado 0,66 mg; cloruro de magnesio hexahidratado 0,05 mg; cloruro de calcio dihidratado 0,06 mg; agua para inyectables c.s.p. 0,5 ml.

**FORMA FARMACÉUTICA**

Suspensión inyectable por vía intramuscular.

La vacuna se presenta como una suspensión blanquecina lechosa.

**ACCIÓN TERAPÉUTICA**

Vacuna contra la influenza.

Código ATC (Clasificación terapéutica): J07 B B02.

## INDICACIONES

Inmunización activa contra la influenza en personas de 65 años de edad y mayores; especialmente aquellas con un mayor riesgo de complicaciones asociadas (por ejemplo, pacientes afectados por enfermedades crónicas subyacentes como diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias).

El uso de Fluxvir<sup>®</sup> debe basarse en las recomendaciones oficiales.

## CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS / PROPIEDADES

La seroprotección se obtiene generalmente en 2 a 3 semanas. La duración de la inmunidad después de la vacunación a las cepas homólogas o a cepas estrechamente relacionadas a las cepas contenidas en la vacuna, varía, pero usualmente es de 6 a 12 meses.

Aunque no se han realizado ensayos clínicos comparativos de eficacia, la respuesta de anticuerpos a Fluxvir<sup>®</sup> esta aumentada cuando se compara con la respuesta con otras vacunas que carecen de adyuvante, y es más pronunciada para los antígenos de la influenza B y A/H3N2.

Esta respuesta aumentada se ha observado particularmente en adultos mayores con títulos de pre-vacunación bajos y/o con enfermedades subyacentes (diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias) quienes tienen mayor riesgo de complicaciones por la influenza. Se ha observado un perfil de inmunogenicidad similar después de una segunda y tercera vacunación con Fluxvir<sup>®</sup>. Después de la inmunización con Fluxvir<sup>®</sup> se genera una respuesta significativa de anticuerpos contra de cepas heterovariantes, antigénicamente distintas de las incluidas en la vacuna.

### *Eficacia clínica en ancianos*

La eficacia clínica de Fluxvir<sup>®</sup> se evaluó en dos estudios observacionales llevados a cabo en Italia y en Canadá.

El primer estudio fue un estudio observacional y prospectivo de cohortes realizado en 5 distritos sanitarios del Norte de Italia durante las temporadas de influenza 2006-7, 2007-8 y 2008-9. Los objetivos del estudio eran evaluar el riesgo relativo de hospitalizaciones por influenza o neumonía durante la temporada de influenza entre sujetos de 65 años de edad o mayores que habían recibido Fluxvir<sup>®</sup> o bien una vacuna sin adyuvante. La elección de la vacuna contra la influenza para cada sujeto del estudio, ya sea Fluxvir<sup>®</sup> o la vacuna sin adyuvante, se dejó a criterio del médico tratante de acuerdo con la política local de vacunación contra la influenza. Este estudio de múltiples años enroló a 107.661 sujetos ancianos de 65 años de edad, 43.667 de los cuales participaron durante más de 1 año. En total se administraron 88.449 dosis de Fluxvir<sup>®</sup> y 82.539 dosis de la vacuna sin adyuvante. Debido a la política local de inmunización, los sujetos que recibieron Fluxvir<sup>®</sup> tenían a menudo un peor estado de salud basal que los sujetos que recibieron una vacuna sin adyuvante. Luego de ajustar las variables de confusión (estado de salud basal y otras), el riesgo de hospitalización por influenza o por neumonía fue un 25% menor para Fluxvir<sup>®</sup> en comparación con la vacuna sin adyuvante (riesgo relativo = 0,75; intervalo de confianza del 95%: 0,57, 0,98).

El segundo estudio fue un estudio de casos y controles que evaluó la eficacia de Fluxvir<sup>®</sup>, de un comparador sin adyuvante o de la falta de vacunación en sujetos de 65 años de edad o mayores en tres distritos de la autoridad sanitaria de Canadá. La mayoría de los participantes informó al menos una enfermedad crónica (89%). Las categorías de enfermedad crónica más frecuentemente informadas



fueron las cardíacas (72%), seguidas por las neurológicas (39%) y las patologías respiratorias (30%). Los casos se definieron como influenza confirmada por RT-PCR luego del inicio de la enfermedad tipo influenza (ETI). Los controles eran individuos con características similares, pero con pruebas de influenza negativas. Luego de ajustar las variables de confusión (edad, sexo, residencia en centros de asistencia prolongada, enfermedades crónicas, región y semana de la prueba), la eficacia absoluta de la vacuna fue del 58% (IC: 5-82,  $p < 0,04$ ) para Fluxvir<sup>®</sup> y la vacuna sin adyuvante fue inefectiva. La eficacia relativa de la vacuna fue del 63% (IC: 4-86,  $p < 0,04$ ) para Fluxvir<sup>®</sup> en comparación con la vacuna contra la influenza sin adyuvante.

### **POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN**

Una sola dosis de 0,5 ml debe ser administrada por inyección intramuscular a nivel del músculo deltoides.

En ausencia de estudios de compatibilidad, Fluxvir<sup>®</sup> no debe ser mezclado en la misma jeringa, con otros productos inyectables.

### **Instrucciones de uso y manipulación**

Se debe permitir que Fluxvir<sup>®</sup> alcance temperatura ambiente antes de usar.

Agitar suavemente antes de usar. Después de agitar, la apariencia normal de Fluxvir<sup>®</sup> es una suspensión blanca lechosa.

Inspeccionar visualmente el contenido de cada jeringa prellenada de Fluxvir<sup>®</sup> para detectar partículas o decoloración antes de la administración. Si se observara alguna de estas condiciones, no usar el contenido.

### **CONTRAINDICACIONES**

No administrar a personas con conocida hipersensibilidad a los ingredientes activos, componentes del adyuvante, excipientes, residuos (por ejemplo, huevo o proteínas del pollo, como la ovoalbúmina) o a cualquier persona que haya tenido una reacción anafiláctica en la vacunación previa contra la influenza.

La vacuna puede contener residuos de las siguientes sustancias: bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB), formaldehído, sulfato de kanamicina y neomicina e hidrocortisona.

Deberá posponerse la vacunación en personas con enfermedad febril o infección aguda.

### **ADVERTENCIAS**

La respuesta de los anticuerpos podría ser insuficiente en pacientes que sufran de inmunodeficiencia endógena (debida a enfermedad) o iatrogénica (debida a medicamentos).

### **PRECAUCIONES**

Como con todas las vacunas inyectables, siempre deben estar rápidamente disponibles la supervisión y tratamiento médico adecuado en caso de que se produzca una reacción anafiláctica inusual tras la administración de la vacuna.

Puede no generarse una respuesta protectora en todos los vacunados.

**Información importante sobre algunos de los componentes de Fluxvir®:**

Fluxvir® no contiene más de 0,2 µg de ovoalbúmina por dosis de 0,5 ml.

**Embarazo, Lactancia y Población Pediátrica**

No administrar a mujeres embarazadas o en período de lactancia, ni a la población pediátrica.

**INTERACCIONES**

No hay datos clínicos disponibles sobre la administración concomitante con otras vacunas. Si se necesita administrar Fluxvir® al mismo tiempo que otras vacunas, la vacunación se debe realizar en diferentes extremidades del cuerpo. La administración simultánea podría intensificar las reacciones adversas.

Es posible que la respuesta inmunológica se vea reducida en pacientes bajo tratamiento con inmunosupresores.

Se han observado resultados falsos positivos, tras la vacunación anti influenza en pruebas serológicas para identificar anticuerpos contra VIH1, Hepatitis C y más que nada HTLV1 por medio del método ELISA. La técnica del Western Blot permite identificar los falsos positivos de los resultados del método de ELISA. Las reacciones falsas positivas transitorias podrían deberse a las IgM de respuesta a la vacuna.

**Efectos en la capacidad de conducir y usar máquinas**

No es probable que Fluxvir® tenga algún efecto en la capacidad de conducir y usar máquinas.

**REACCIONES ADVERSAS**

Como todos los medicamentos, Fluxvir® puede tener efectos indeseables.

Después de la inmunización con Fluxvir® se ha evidenciado una incidencia de reacciones leves más elevada con respecto a las vacunas anti influenza sin adyuvante.

**Reacciones adversas reportadas durante los estudios clínicos**

Los efectos adversos aquí indicados han sido clasificados en base a las siguientes frecuencias:

Muy frecuentes ( $\geq 1/10$ ); frecuentes ( $\geq 1/100$ ,  $<1/10$ ); poco frecuentes ( $\geq 1/1000$ ,  $<1/100$ ); raras ( $\geq 1/10000$ ,  $< 1/1000$ ); muy raras ( $< 1/10000$ ), incluyendo informes aislados.

*Alteraciones del sistema nervioso:*

Muy frecuentes ( $\geq 1/10$ ): Dolor de cabeza

*Alteraciones gastrointestinales:*

Frecuentes ( $\geq 1/100$ ,  $<1/10$ ): Náuseas, diarrea, vómitos

*Alteraciones dérmicas y del tejido subcutáneo:*

Frecuentes ( $\geq 1/100$ ,  $<1/10$ ): Sudoración

Poco frecuentes ( $\geq 1/1000$ ,  $<1/100$ ): Rash

*Alteraciones musculoesqueléticas y del tejido conectivo:*

Muy frecuentes ( $\geq 1/10$ ): Mialgia  
Frecuentes ( $\geq 1/100, <1/10$ ): Artralgia

*Alteraciones generales y condiciones en el lugar de administración:*

Muy frecuentes ( $\geq 1/10$ ): Sensibilidad, dolor en el sitio de inyección, fatiga

Frecuentes ( $\geq 1/100, <1/10$ ): Fiebre, malestar, escalofríos.

Reacciones locales: Enrojecimiento, inflamación, equimosis, induración.

La mayoría de las reacciones son leves o moderadas y desaparecen espontáneamente al cabo de 1 o 2 días.

**Reacciones adversas post-comercialización:**

Debido a que estos eventos fueron reportados voluntariamente por una población de tamaño incierto, no es posible estimar de manera fiable su frecuencia o establecer, para todos los eventos, una relación causal con la exposición a la vacuna.

Adicionalmente, los siguientes eventos adversos han sido reportados durante la vigilancia post comercialización de Fluxvir<sup>®</sup>.

*Alteraciones de la sangre y del sistema linfático*

Trombocitopenia (algunos casos, muy raros, fueron graves con recuento plaquetario inferior a 5.000 por  $\text{mm}^3$ ), linfadenopatía.

*Alteraciones generales y condiciones del sitio de administración*

Tumefacción extensa del miembro inyectado, hinchazón periférica, reacción similar a la celulitis en el sitio de inyección y astenia.

*Alteraciones del sistema inmune*

Reacciones alérgicas incluyendo shock anafiláctico (en raros casos), anafilaxia.

*Alteraciones musculoesqueléticas y del tejido conectivo*

Debilidad muscular y dolor en la extremidad.

*Alteraciones del sistema nervioso*

Encefalomielitis, síndrome de Guillain Barré, convulsiones, neuritis, neuralgia, parestesia, síncope, presíncope y mareos.

*Alteraciones dérmicas y de tejido subcutáneo*

Reacciones generalizadas de la piel incluyendo eritema multiforme, urticaria, prurito o rash no específico, angioedema.

*Alteraciones vasculares:*

Vasculitis que puede estar asociada con compromiso renal transitorio.

Si estas reacciones aparecen, consultar a un médico.

Es importante informar al médico si se observa alguna reacción adversa que no se describe en el instructivo.

### **Información para profesionales médicos**

FLUXVIR<sup>®</sup> se encuentra incluido dentro de un Plan de Gestión de Riesgo (conjunto de actividades en Farmacovigilancia para prevenir o minimizar riesgos relacionados con productos medicinales)

### **SOBREDOSIFICACIÓN**

No existen experiencias de sobredosis con Fluxvir<sup>®</sup>.

**Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:**

**Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247**

**Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777**

### **CONDICIONES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO:**

La información sobre el producto medicinal deberá estar siempre disponible, por lo tanto, conserve la caja y el prospecto.

Conservar en refrigerador (+2°C/ +8°C). NO CONGELAR. No usar la vacuna si ha sido congelada. Proteger de la luz.

El periodo de validez de la vacuna es de 1 año.

No usar este medicamento después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

### **MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y LA VISTA DE LOS NIÑOS**

### **PRESENTACIONES**

Envases conteniendo 1 y 10 jeringas prellenadas monodosis de 0,5 ml, con aguja.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud - Certificado N° 56.807

<sup>®</sup> Marca registrada.

Elaborado en:

**Sinergium Biotech S.A.** Ruta 9 km 38,7. Garín, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.

Director Técnico: Sebastián Enrique Comellas - Farmacéutico.

Industria Argentina

Fecha de la última revisión: Septiembre 2023



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** Prospecto FLUXVIR

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
Date: 2023.11.21 12:57:33 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL  
ELECTRONICA - GDE  
Date: 2023.11.21 12:57:34 -03:00