



"2011 - Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.7.

DISPOSICIÓN N° **7193**
BUENOS AIRES, 19 OCT 2011

VISTO el Expediente N° 1-0047-0000-015545-11-1 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A. solicita la aprobación de nuevos proyectos de prospectos para el producto LUPRON DEPOT / ACETATO DE LEUPROLIDA, forma farmacéutica y concentración: INYECTABLE LIOFILIZADO 11,25 mg, autorizado por el Certificado N° 38.507.

Que los proyectos presentados se adecuan a la normativa aplicable Ley 16.463, Decreto N° 150/92 y Disposiciones N°: 5904/96 y 2349/97.

Que a fojas 123 obra el informe técnico favorable de la Dirección de Evaluación de Medicamentos.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1.490/92 y del Decreto N° 425/10.



DISPOSICIÓN N° **7 1 9 3**

"2011 - Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores"

*Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos
A.N.M.A.T.*

Por ello:

EL INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:


ARTICULO 1º. - Autorízase los proyectos de prospectos de fojas 57 a 107, desglosando de fojas 57 a 73, para la Especialidad Medicinal denominada LUPRON DEPOT / ACETATO DE LEUPROLIDA, forma farmacéutica y concentración: INYECTABLE LIOFILIZADO 11,25 mg, propiedad de la firma ABBOTT LABORATORIES ARGENTINA S.A., anulando los anteriores.

ARTICULO 2º. - Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 38.507 cuando el mismo se presente acompañado de la copia autenticada de la presente Disposición.

ARTICULO 3º. - Regístrese; gírese al Departamento de Registro a sus efectos, por Mesa de Entradas notifíquese al interesado y hágase entrega de la copia autenticada de la presente Disposición. Cumplido, archívese PERMANENTE.

Expediente N° 1-0047-0000-015545-11-1

DISPOSICIÓN N° **7 1 9 3**


Dr. OTTO A. ORSINGER
SUB-INTERVENTOR
A.N.M.A.T.

9



**PROYECTO DE PROSPECTO**

LISTA: M357

**LUPRON DEPOT 11, 25 mg
ACETATO DE LEUPROLIDA**

Inyectable liofilizado - Expendio bajo receta - Industria Japonesa

COMPOSICION

Cada frasco ampolla contiene: Acetato de Leuprolida 11,25 mg; Acido poliláctico, 99.3 mg, D-Manitol, 19.45 mg. Cada ampolla de diluyente contiene: Carboximetilcelulosa sódica, 7.5 mg; D-Manitol, 75 mg; Polisorbato 80, 1.5 mg; Agua para inyectables c.s. y Acido acético glacial para pH.

ACCION TERAPEUTICA

Potente inhibidor de la secreción de gonadotrofinas con supresión de la esteroidogénesis ovárica y testicular.

INDICACIONES

Hombres - Cáncer de próstata: El Acetato de Leuprolida 11,25 - 3 meses - está indicado para el tratamiento del cáncer de próstata avanzado. Ofrece un tratamiento alternativo para el cáncer de próstata cuando la orquiectomía o la administración de estrógenos no están indicadas o no son aceptadas por el paciente. En estudios clínicos, la seguridad y eficacia del Acetato de Leuprolida para Suspensión Depot no difiere de la de la dosificación inyectable subcutánea diaria.

Mujeres - Endometriosis y Endometriosis con recurrencia de síntomas: Lupron Depot 11,25 mg. -3 meses- está indicado para el tratamiento de la endometriosis por un período de 6 meses. Puede ser utilizado como única terapéutica o como tratamiento auxiliar de la cirugía. El Acetato de Leuprolida con Acetato de Noretindrona u otra terapia de reemplazo hormonal está indicado para el tratamiento inicial de la endometriosis y para el tratamiento de la recurrencia de síntomas.

Leiomiomatosis uterina (fibromas): Lupron Depot 11,25 mg. -3 meses- está indicado también en el tratamiento de los fibromas uterinos por un período de hasta 6 meses. La terapéutica puede ser antes de la miomectomía o histerectomía o puede proporcionar alivio sintomático para las mujeres perimenopáusicas que no desean la cirugía.

Cáncer de mama: El Acetato de Leuprolida 11,25 - 3 meses - está indicado para el tratamiento del cáncer de mama en mujeres pre y perimenopáusicas en quienes esté indicada la terapia hormonal.


Niños - Pubertad Precoz Central: El Acetato de Leuprolida está indicado en el tratamiento de niños con pubertad precoz central (PPC).

FARMACOLOGIA CLINICA

Farmacodinamia: El Acetato de leuprolida, un agonista de la hormona liberadora de gonadotropina, es un potente inhibidor de la secreción de gonadotrofinas cuando se lo administra en forma continua y a dosis terapéuticas. Estudios en animales y seres humanos indican que después de una estimulación inicial, la administración crónica de Acetato de leuprolida produce la supresión de la esteroidogénesis ovárica y testicular. Este efecto es reversible una vez interrumpido el tratamiento. En seres humanos, la administración de Acetato de leuprolida produce un incremento inicial en los niveles circulantes de la hormona luteinizante y de la hormona folículo-estimulante, lo que lleva a un aumento transitorio en los niveles de los esteroides gonadales (testosterona y dihidrotestosterona en los hombres, y de estrona y estradiol en las mujeres premenopáusicas). Sin embargo, la administración continua de Acetato de leuprolida reduce los niveles de la hormona luteinizante y de la folículo-estimulante, así como de los esteroides sexuales. En los hombres, la testosterona se reduce a los niveles de castración o prepúberales. En las mujeres premenopáusicas, los estrógenos se reducen a los niveles posmenopáusicos. Estos cambios hormonales se producen dentro del mes de iniciado el tratamiento con el fármaco a las dosis recomendadas.

Farmacocinética: El Acetato de leuprolida no es activo cuando se lo administra por vía oral. La biodisponibilidad de este agente después de la administración subcutánea es comparable con la de la administración intramuscular.

Absorción: Después de una administración única de Acetato de Leuprolida Suspensión Depot 11,25 mg - 3 meses, se observó un rápido aumento de la concentración de Acetato de Leuprolida. Se observó una concentración plasmática máxima media de Leuprolida de 21,82 (\pm 11,24) ng/mL tres horas después de la inyección. El Acetato de Leuprolida alcanzó niveles estables dentro de los 7 a 14 días después de la inyección. En la semana cuatro, se observó una concentración plasmática media de Leuprolida de 0,26 (\pm 0,10) ng/mL, que descendió luego a una concentración plasmática media de 0,17 (\pm 0,08) ng/mL a las 12 semanas. Luego de una sola inyección de la formulación de tres meses de Acetato de Leuprolida Suspensión Depot 11,25 mg - 3 meses a pacientes mujeres, se observó una concentración plasmática media de Leuprolida de 36,3 ng/mL en 4 horas. La Leuprolida se liberó a un ritmo constante tras alcanzar los niveles de estado estable durante la tercera semana después de la administración y luego la concentración media descendió gradualmente hasta casi el límite inferior de detección a las 12 semanas. La concentración media de Leuprolida (\pm desviación standard) de 3, a 12 semanas fue de 0,23 \pm 0,09 ng/mL. Sin embargo, no se pudo distinguir


Dra. María Alejandra Blanc
Farmacéutica - Co - Directora Técnica
Abbott Laboratories Argentina S.A.

celma.marun@abbott.com
Planta Industrial: Av. Valentín Vergara 7969
B1891EUE, Ing. Allan. Florencio Varela, Bs. As. Argentina

Tel.: 54 11 4229 4245
Fax: 54 11 4229 4366


Dra. Mónica E Yoshida
Farmacéutica - Directora Técnica
Abbott Laboratories Argentina S.A.

 **Abbott**



La prueba intacta ni un metabolito principal inactivo en el ensayo que se utilizó en el estudio. La elevación inicial, seguida de un rápido descenso al nivel de estado estable, fue similar al patrón de liberación observado con la formulación mensual.

Distribución: El volumen de distribución medio a estado constante de Acetato de leuprolida luego de la administración de un bolo intravenoso a varones voluntarios sanos fue de 27 litros. La unión a proteínas plasmáticas humanas in vitro osciló entre 43 y 49%.

Metabolismo: En hombres voluntarios sanos un bolo de 1 mg de leuprolida administrado IV reveló que el clearance sistémico medio fue de 7.6 litros/hora, con una vida media terminal de eliminación de aproximadamente 3 horas basadas en un modelo de dos compartimientos. Las concentraciones plasmáticas del principal metabolito (M-I) medidas en 5 pacientes con cáncer prostático a los que se les administró Acetato de leuprolida en suspensión depot alcanzaron una concentración máxima 2 a 6 horas después de la dosis y fue aproximadamente el 6% de la concentración pico de la droga madre. Una semana después de la dosis las concentraciones plasmáticas medias de M-I fueron aproximadamente el 20% de las concentraciones medias de leuprolida.

Excreción: Luego de la administración de suspensión depot Acetato de leuprolida 3.75 mg. a 3 pacientes fue recuperada menos del 5% de la dosis como droga madre y metabolito M-I durante 27 días.

Poblaciones Especiales: No se ha determinado la farmacocinética de la droga en pacientes con disminución de la función renal y hepática.

POSOLOGIA - FORMA DE ADMINISTRACION

General

Lupron Depot deberá ser administrado bajo supervisión médica. Una vez reconstituida, la suspensión debe descartarse si no se emplea inmediatamente. Como otras drogas administradas por inyección los sitios de la misma deben variarse periódicamente.

Guía de administración:

Cáncer de próstata, Endometriosis y Endometriosis con recurrencia de síntomas, Leiomiomatosis uterina (fibromas) y Cáncer de Mama: Reconstituir las microesferas inmediatamente antes de la administración y administrar como una única inyección intramuscular o subcutánea cada tres meses.

Pubertad Precoz Central (PPC): La dosis de Acetato de Leuprolida para Suspensión Depot debe ser personalizada para cada niño. La dosis se basa en una relación de mg/kg del medicamento según el peso corporal. Los niños más pequeños requieren dosis más altas según la relación de mg/kg. La dosis se administra como una inyección intramuscular o subcutánea una vez por mes.

Dosis inicial: Puede haber diferentes regímenes posológicos para la PPC pero la dosificación deberá comenzar con la dosis más baja posible. La dosis inicial recomendada de Acetato de Leuprolida para Suspensión Depot es de 0,3 mg/kg durante 4 semanas (mínimo de 7,5 mg) administrada por vía intramuscular o subcutánea. La dosis inicial estará determinada por el peso del niño según se indica en la tabla a continuación:


Peso del niño	Dosis efectiva	Dosis total
≤ 25 kg	3,75 mg x 2; 7,5* mg x 1	7,5 mg
> 25 a 37,5 kg	3,75 mg x 3; 11,25* mg x 1	11,25 mg
> 37,5 kg	3,75 mg x 4; 15 mg* x 1	15 mg

* Concentración no disponible en todos los mercados. **Nota:** Cuando se necesiten dos inyecciones para obtener la dosis total deseada, ésta deben administrarse al mismo tiempo.

Dosis de mantenimiento: La primera dosis que produzca supresión hormonal adecuada, probablemente se pueda mantener por la duración del tratamiento en la mayoría de los niños. Sin embargo, no hay datos suficientes para proporcionar una guía de ajuste de dosis debido a que los pacientes cambian a categorías superiores de peso después de comenzar el tratamiento a edades muy jóvenes y dosis bajas. Se recomienda verificar la adecuada supresión hormonal en los pacientes cuyo peso haya aumentado significativamente durante el tratamiento. Si no se logra la supresión clínica y hormonal adecuada, la dosis deberá aumentarse a 11,25 ó 15 mg en la siguiente inyección mensual hasta alcanzar la supresión adecuada. Una dosis efectiva será considerada como la dosis de mantenimiento.

Reconstitución: El vial de Lupron Depot 11,25 mg. deberá ser reconstituido inmediatamente antes de la administración y administrarse cada tres meses como una única inyección intramuscular o subcutánea de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. Empleando una jeringa con aguja calibre 23G (Lupron Depot 11,25 mg), extraer 2 ml de la ampolla de diluyente e inyectarlo al frasco-ampolla (se proporciona más diluyente del necesario debiendo descartarse cualquier sobrante).
2. Agitar bien para dispersar totalmente las partículas hasta obtener una suspensión homogénea. La suspensión ofrecerá un aspecto lechoso.


Dra. María Alejandra Blanc
Farmacéutica - Co - Directora Técnica
Abbott Laboratories Argentina S.A.

celina.marun@abbott.com
Planta Industrial: Av. Valentín Vergara 7999
B1891EUE, Ing. Allan. Florencio Varela, Bs. As. Argentina

Tel.: 54 11 4229 4245
Fax: 54 11 4229 4366


Dra. Mónica E. Yoshida
Farmacéutica - Directora Técnica
Abbott Laboratories Argentina S.A.

 **Abbott**



Reconstituir todo el contenido del frasco-ampolla a la jeringa e inyectar en el momento de la reconstitución. A pesar de que la solución ha demostrado ser estable durante 24 horas después de su reconstitución, se deberá desechar la suspensión no empleada inmediatamente, debido a que el producto no contiene conservadores.

No se deberá usar ningún otro líquido para la reconstitución de Lupron Depot 11.25 mg.

CONTRAINDICACIONES

Lupron Depot está contraindicado en pacientes con conocida hipersensibilidad al Acetato de leuprolida, a nonapéptidos similares o a cualquiera de sus excipientes. Se han informado casos aislados de anafilaxia con la formulación mensual. También está contraindicado en mujeres embarazadas o que puedan quedar embarazadas mientras reciban la droga. Existe la posibilidad de aborto espontáneo si la droga es administrada durante el embarazo. El Acetato de Leuprolida no deberá ser administrado a pacientes con sangrado vaginal anormal no diagnosticado.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Todas las poblaciones: Durante la etapa inicial del tratamiento, las gonadotropinas y esteroides sexuales se elevan por encima del nivel basal debido al efecto estimulante natural del medicamento. Por lo tanto, es posible que se observe un aumento de los signos y síntomas clínicos (véase Farmacología Clínica). Durante las primeras semanas de tratamiento, los signos y síntomas preexistentes pueden empeorar. La exacerbación de los síntomas puede derivar en parálisis con o sin complicaciones mortales. No se ha establecido la seguridad del empleo de Acetato de Leuprolida durante el embarazo en estudios clínicos. Antes de comenzar el tratamiento con Acetato de Leuprolida, se aconseja determinar si la paciente está embarazada. El Acetato de Leuprolida no es un anticonceptivo. En caso de necesitar utilizar un método anticonceptivo, se deberá emplear un método no hormonal.

Densidad mineral ósea: Pueden producirse cambios en la densidad mineral ósea durante cualquier estado hipoestrogénico en las mujeres y en el tratamiento prolongado para el cáncer de próstata en los hombres. No se dispone de datos respecto de la reversibilidad después del retiro del acetato de Leuprolida en hombres. En las mujeres, la pérdida de la densidad mineral ósea puede ser reversible al suspender el Acetato de Leuprolida (véase Reacciones Adversas, Mujeres)

Convulsiones: Se han observado convulsiones en informes posteriores a la comercialización en pacientes tratados con Acetato de Leuprolida. Estos incluyeron pacientes mujeres y niños, pacientes con antecedentes de convulsiones, epilepsia, trastornos cerebrovasculares, anomalías del sistema nervioso central o tumores y pacientes tratados con medicaciones concomitantes que han sido asociadas con convulsiones tales como el Bupropión e ISRS. También se han informado convulsiones en pacientes sin las condiciones arriba mencionadas.


Hombres - Cáncer de próstata: Durante las primeras semanas de tratamiento, el Acetato de Leuprolida, como otros agonistas LHRH, aumenta los niveles séricos de la testosterona aproximadamente un 50% por encima del valor basal. Durante las primeras semanas de tratamiento con Acetato de Leuprolida puede desarrollarse, ocasionalmente, empeoramiento transitorio de los síntomas o la aparición de signos y síntomas adicionales de cáncer de próstata. Un reducido número de pacientes puede presentar un aumento temporario del dolor óseo, el que puede ser tratado sintomáticamente. Como con otros agonistas LHRH, se observaron casos aislados de obstrucción ureteral y compresión de la médula ósea, lo que puede contribuir a la parálisis con o sin complicaciones fatales. En pacientes de riesgo, se podrá considerar iniciar la terapéutica con inyecciones diarias de Acetato de Leuprolida durante las primeras dos semanas para facilitar la suspensión del tratamiento. Los pacientes con lesiones vertebrales metastásicas y/o obstrucción de las vías urinarias deberán ser estrechamente controlados durante las primeras semanas de tratamiento.

Han sido reportados hiperglucemia y un riesgo elevado de desarrollar Diabetes, en hombres recibiendo agonistas LHRH. La hiperglucemia puede representar el desarrollo de Diabetes Mellitus o agravamiento del control de glucemia en pacientes con diabetes. El nivel de glucemia y/o hemoglobina glicosilada (HbA1c) debe monitorearse periódicamente en pacientes que reciben agonistas LHRH y seguir las prácticas habituales de tratamiento para hiperglucemia o diabetes.

Un elevado riesgo de desarrollar infarto de miocardio, muerte súbita de origen cardíaco y ataque cerebral han sido reportados en asociación con el uso de agonistas LHRH en hombres. El riesgo impresiona ser bajo basado en los OR (Odds ratios) reportados y debe ser evaluado cuidadosamente junto a los factores de riesgo cardiovascular cuando se opte por un tratamiento para pacientes con cáncer de próstata. Los pacientes que reciben agonistas LHRH deben ser monitoreados para síntomas y signos sugestivos de desarrollar una enfermedad cardiovascular y deben tener un seguimiento de acuerdo a la práctica clínica habitual.

Efecto sobre el intervalo QT/QTc: Se ha observado una prolongación del QT durante la terapia a largo plazo con privación de andrógenos. El médico debe considerar si los beneficios de una terapia con privación de andrógenos son mayores a los potenciales riesgos en pacientes con Síndrome de QT prolongado congénito, anomalías electrolíticas, insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes tomando medicación antiarrítmica clase IA (por ejemplo: Quinidina, procainamida) o clase III (por ejemplo: Amiodarona, Sotalol)

Pruebas de laboratorio: Deberá controlarse la respuesta al Acetato de Leuprolida mediante dosajes de los niveles séricos


Dra. María Alejandra Blanc
Farmacéutica - Co - Directora Técnica
Abbott Laboratories Argentina S.A.

celina.marun@abbott.com
Planta Industrial: Av. Valentín Vergara 7989
B1891EUE, Ing. Allan. Florencio Varela, Bs. As. Argentina

Tel.: 54 11 4229 4245
Fax: 54 11 4229 4366


Dra. Mónica E Yoshida
Farmacéutica - Directora Técnica
Abbott Laboratories Argentina S.A.

 **Abbott**

Abbott Laboratories Argentina S.A.
Ing. E. Butty 240 13° Piso C1001AFB
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel. 54 11 5776 7200
Fax 54 11 5776 7217



testosterona y del antígeno prostático específico. En la mayoría de los pacientes, los niveles de testosterona aumentaron sobre los basales durante la primera semana, disminuyendo posteriormente hasta los niveles basales o por debajo hacia el final de la segunda semana de tratamiento. Se alcanzaron niveles de castración en 2 a 4 semanas y una vez obtenidos se mantuvieron mientras los pacientes continuaron recibiendo sus inyecciones puntualmente.

Mujeres - Endometriosis/Fibromas uterinos: Durante la etapa inicial del tratamiento, los esteroides sexuales aumentan transitoriamente por encima del nivel basal debido al efecto fisiológico de la droga. Por lo tanto, podrá observarse una exacerbación de los signos y síntomas clínicos en los primeros días de tratamiento, que irán desapareciendo con la continuación del mismo en dosis adecuadas. No obstante, se han informado casos de sangrado vaginal abundante que requirieron intervención médica y/o quirúrgica en el tratamiento a largo plazo de fibromas submucosos. No se ha establecido aún la seguridad del empleo del Acetato de Leuprolida durante el embarazo en estudios clínicos. Antes de comenzar el tratamiento con Acetato de Leuprolida, se aconseja determinar si la paciente está embarazada. El Acetato de Leuprolida no es un anticonceptivo. En caso de necesitar utilizar un método anticonceptivo, se deberá emplear un método no hormonal.

Niños: El incumplimiento del tratamiento o una dosificación inadecuada podrían derivar en un control inadecuado del proceso puberal. Las consecuencias de un control deficiente incluyen la reaparición de los signos puberales, tales como menstruación, desarrollo mamario y crecimiento testicular. Se desconocen las consecuencias a largo plazo del control inadecuado de la secreción de esteroides gonadales, pero éstas podrían incluir un mayor compromiso de la estatura a edad adulta.

Pruebas de laboratorio: La respuesta al Acetato de Leuprolida deberá controlarse 1-2 meses después del comienzo del tratamiento con una prueba de estimulación con GnRH y niveles de esteroides sexuales. La medición de la edad ósea para evaluar el progreso debe ser realizada cada 6-12 meses. Si la dosis es inadecuada, los esteroides sexuales pueden aumentar o exceder los niveles prepuberales. Una vez que la dosis terapéutica ha sido establecida, los niveles de esteroides sexuales y de gonadotropinas declinarán a niveles prepuberales.

Carcinogenicidad - Mutagenicidad - Teratogénesis - Daño a la Fertilidad: Se ha tratado a pacientes con Acetato de leuprolida durante un máximo de 3 años con dosis de hasta 10 mg/día y por 2 años con dosis de hasta 20 mg/día sin anomalías hipofisarias detectables. Se han llevado a cabo estudios de mutagenicidad utilizando Lupron Depot en sistemas bacterianos y células de mamíferos. Dichos estudios no demostraron evidencia de potencial mutagénico. El Acetato de Leuprolida puede reducir la fertilidad masculina y femenina. La administración de Acetato de Leuprolida a ratas machos y hembras a una dosis de 0,024, 0,24 y 2,4 mg/kg mensualmente durante 3 meses (tan bajo como 1/300 de la dosis mensual estimada para humanos) causó atrofia de los órganos reproductivos y supresión de la función reproductiva. Los estudios clínicos y farmacológicos con Acetato de leuprolida y análogos similares han demostrado una completa reversibilidad de la supresión de la fertilidad cuando se interrumpió el fármaco después de una administración continua por periodos de hasta 24 semanas.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se han realizado estudios de interacción farmacocinética droga-droga con Acetato de leuprolida en suspensión depot. Sin embargo, debido a que el Acetato de leuprolida es un péptido principalmente degradado por la peptidasa y no por las enzimas del citocromo P-450 según estudios específicos, y a que la droga se liga sólo en un 46% a las proteínas plasmáticas, no sería dable esperar que se produzcan interacciones farmacológicas.

Interacciones entre fármacos/análisis de laboratorio: La administración de Acetato de Leuprolida Depot a mujeres provocó una supresión del sistema hipofiso-gonadal. La función normal habitualmente se restablece dentro de los 3 meses de la suspensión del tratamiento con Lupron Depot. Por lo tanto, los resultados de los análisis diagnósticos de la función hipofisaria gonadotrófica y gonadal realizados durante el tratamiento y hasta 3 meses después de la suspensión del Acetato de Leuprolida Depot pueden llevar a interpretaciones falsas.

EMBARAZO Y LACTANCIA

Embarazo: Véase Contraindicaciones y Advertencias y Precauciones, Mujeres.

Lactancia: Se desconoce si el Acetato de Leuprolida se excreta en la leche materna. Por lo tanto, **no deberá utilizarse** en mujeres en período de lactancia.

REACCIONES ADVERSAS

Los siguientes eventos adversos comúnmente están asociados con las acciones farmacológicas del Acetato de Leuprolida sobre la esteroidogénesis:

Hombres

Neoplasia benigna, maligna y no especificada (incluyendo quistes y pólipos): exacerbación del tumor de próstata, agravación del cáncer de próstata.

Trastornos metabólicos y nutricionales: aumento de peso, pérdida de peso


Ora. María Alejandra Blanc
Farmacéutica - Co - Directora Técnica
Abbott Laboratories Argentina S.A.

celina.marun@abbott.com
Planta Industrial: Av. Valentín Vergara 7989
B1891EUE, Ing. Allan. Florencio Varela, Bs. As. Argentina

Tel.: 54 11 4229 4245
Fax: 54 11 4229 4366

Dra. Mónica E Yoshida
Farmacéutica - Directora Técnica
Abbott Laboratories Argentina S.A.

Abbott



Trastornos psiquiátricos: pérdida o disminución de la libido, aumento de la libido.
Trastornos del sistema nervioso: cefalea, debilidad muscular.
Trastornos vasculares: vasodilatación, sofocos, hipotensión, hipotensión ortostática.
Trastornos de piel y tejido subcutáneo: sequedad de la piel, hiperhidrosis, erupción cutánea, urticaria, crecimiento anormal del vello, trastorno capilar, sudores nocturnos, hipotricosis, trastorno de la pigmentación, sudor frío, hirsutismo.
Trastornos del aparato reproductor y mamas: hiperestesia mamaria, disfunción eréctil, dolor testicular, agrandamiento mamario, mastodinia, dolor prostático, inflamación del pene, trastorno del pene, atrofia testicular.
Trastornos generales y en el sitio de la administración: sequedad de las mucosas.
Estudios complementarios: aumento de PSA, disminución de la densidad ósea
Exposición prolongada (6 a 12 meses): diabetes mellitus, intolerancia a la glucosa, aumento del colesterol total, aumento del colesterol LDL, aumento de triglicéridos, osteoporosis.

Mujeres

Trastornos metabólicos y nutricionales: aumento de peso, pérdida de peso.
Trastornos psiquiátricos: pérdida o disminución de la libido, aumento de la libido, labilidad afectiva.
Trastornos del sistema nervioso: cefalea.
Trastornos vasculares: sofocos, vasodilatación, hipotensión.
Trastornos de piel y tejido subcutáneo: acné, seborrea, sequedad de la piel, urticaria, olor anormal de la piel, hiperhidrosis, crecimiento anormal del vello, hirsutismo, trastorno capilar, eccema, trastorno capilar, trastorno ungueal, sudores nocturnos.
Trastornos del aparato reproductor y mamas: ginecomastia, hemorragia vaginal, dismenorrea, trastorno menstrual, agrandamiento mamario, congestión mamaria, atrofia mamaria, secreción genital, flujo vaginal, galactorrea, mastodinia, metrorragia, síntomas menopáusicos, dispareunia, trastorno uterino, vaginitis, menorragia.
Trastornos generales y en el sitio de la administración: sensación de ardor, irritabilidad.
Estudios complementarios: disminución de la densidad ósea.
Exposición prolongada (6 a 12 meses): diabetes mellitus, intolerancia a la glucosa, aumento del colesterol total, aumento del colesterol LDL, aumento de triglicéridos, osteoporosis.

Niños

Trastornos psiquiátricos: labilidad afectiva.
Trastornos del sistema nervioso: cefalea.
Trastornos vasculares: vasodilatación.
Trastornos de piel y tejido subcutáneo: acné/seborrea, erupción cutánea incluido eritema multiforme.
Trastornos del aparato reproductor y mamas: hemorragia vaginal, flujo vaginal, vaginitis.
Trastornos generales y en el sitio de la administración: dolor, reacciones en el sitio de la inyección incluido absceso.

Experiencia clínica y post-comercialización: Las siguientes secciones presentan los eventos adversos observados en estudios clínicos o en la experiencia después de la comercialización.

Hombres - Cáncer de próstata: En la mayoría de los pacientes los niveles de testosterona aumentaron por encima del valor basal durante la primera semana, disminuyendo posteriormente al límite normal o por debajo de éste al finalizar la segunda semana del tratamiento. La exacerbación potencial de los signos y síntomas durante las primeras semanas de tratamiento puede ser un factor preocupante en pacientes con metástasis vertebrales y/u obstrucción urinaria o hematuria, que de agravarse, podrían desencadenar problemas neurológicos tales como debilidad temporal y/o parestesia de los miembros inferiores o empeoramiento de los síntomas urinarios (véase Advertencias y Precauciones). La Tabla 1 presenta todas las reacciones adversas al medicamento (RAM) y las frecuencias [muy común ($\geq 1/10$); común ($\geq 1/100$ a $< 1/10$); infrecuente ($\geq 1/1000$ a $< 1/100$) desconocido (no se ha podido estimar la frecuencia con los datos disponibles)] de los estudios clínicos en cáncer de próstata y de la experiencia post-comercialización. Un espacio en blanco indica que no se observó la RAM en esa categoría en particular.

Tabla 1: Cáncer de Próstata

Clase de sistema orgánico	Término preferido	11,25 mg (EC001, EC002, n = 181)	Post Comercialización
		Frecuencia	Frecuencia
Infecciones e infestaciones	Infección		Desconocido
	Bronquitis	Común	
	Infección urinaria	Común	Desconocido
	Quiste infectado	Infrecuente	
	Infección viral	Infrecuente	
	Candidiasis	Infrecuente	
	Sepsis	Infrecuente	
	Faringitis		Desconocido

Dra. María Alejandra Blanc
Farmacéutica - Co - Directora Técnica
Abbott Laboratories Argentina S.A.

celina.marun@abbott.com
Planta Industrial: Av. Valentin Vergara 7989
B1891EUE, Ing. Allan. Florencio Varela, Bs. As. Argentina

Tel.: 54 11 4229 4245
Fax: 54 11 4229 4366

Dra. Mónica E Yoshida
Farmacéutica - Directora Técnica
Abbott Laboratories Argentina S.A.





Clase de sistema orgánico	Término preferido	11,25 mg (EC001, EC002, n = 181)	Post Comercialización
	Neumonía	Frecuencia	Frecuencia
			Desconocido
Tumores benignos, malignos y no especificados (Incl. quistes y pólipos)	Pseudotumor	Infrecuente	Desconocido
	Cáncer de piel		Desconocido
Trastornos del sistema hemolinfático	Anemia	Común	Desconocido
	Eosinofilia	Infrecuente	
Trastornos del sistema inmunitario	Hipersensibilidad	Infrecuente	
	Reacción anafiláctica		Desconocido
Trastornos endocrinos	Bocio		Desconocido
	Apoplejía hipofisaria		Desconocido
Trastornos metabólicos y nutricionales	Anorexia	Común	
	Diabetes mellitus		Desconocido
	Aumento del apetito		Desconocido
	Hiper glucemia	Infrecuente	
	Hipoglucemia	Infrecuente	Desconocido
	Deshidratación	Infrecuente	Desconocido
	Hiperlipidemia		Desconocido
	Hipertensión		Desconocido
	Hipoproteinemia		Desconocido
	Disminución anormal de peso	Común	
	Aumento anormal de peso	Muy común	
Trastornos psiquiátricos	Distonias		Desconocido
	Nerviosismo		Desconocido
	Disminución de la libido	Muy común	
	Aumento de la libido		Desconocido
	Insomnio	Común	Desconocido
	Trastornos del sueño		Desconocido
	Depresión	Común	Desconocido
	Ansiedad		Desconocido
	Delirio		Desconocido
	Ideas suicidas		Desconocido
	Intento de suicidio		Desconocido
Trastornos del sistema nervioso	Mareos	Infrecuente	Desconocido
	Cefalea	Común	Desconocido
	Parestesia	Común	Desconocido
	Letargo		Desconocido
	Somnolencia	Infrecuente	
	Trastornos de la memoria		Desconocido
	Disgeusia		Desconocido
	Hipoestesia		Desconocido
	Síncope		Desconocido
	Tembor	Infrecuente	
	Epilepsia parcial simple	Infrecuente	
	Neuropatía periférica		Desconocido
	Accidente cerebrovascular		Desconocido
	Pérdida del conocimiento		Desconocido
	Ataque isquémico transitorio		Desconocido
	Parálisis		Desconocido
	Neuromiopatía		Desconocido
	Convulsiones		Desconocido
Trastornos oftalmológicos	Visión borrosa		Desconocido
	Trastornos oculares		Desconocido
	Deterioro visual		Desconocido
	Ambliopía		Desconocido
	Xerofalimia		Desconocido
Trastornos del oído y laberinto	Tinnitus		Desconocido
	Trastornos auditivos		Desconocido
Trastornos cardíacos	Insuficiencia cardíaca congestiva		Desconocido
	Arritmia		Desconocido
	Infarto de miocardio		Desconocido
	Angina de pecho	Infrecuente	Desconocido
	Taquicardia		Desconocido
	Insuficiencia cardíaca	Infrecuente	
	Muerte súbita cardíaca		Desconocido

Marjane
 Dra. María Alejandra Blanc
 Farmacéutica - Co - Directora Técnica
 Abbott Laboratories Argentina S.A.

cel:ha.marun@abbott.com
 Planta Industrial: Av. Valentin Vergara 7969
 B1891EUE, Ing. Allan. Florencio Varela, Bs. As. Argentina

Mónica E Yoshida
 Dra. Mónica E Yoshida
 Farmacéutica - Directora Técnica
 Abbott Laboratories Argentina S.A.

Tel.: 54 11 4229 4245
 Fax: 54 11 4229 4366



Abbott Laboratories Argentina S.A.
 Ing. E. Butty 240 13° Piso C1001AFB
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel. 54 11 5776 7200
 Fax 54 11 5776 7217



Clase de sistema orgánico	Término preferido	11,25 mg (EC001, EC002, n = 181)	Post Comercialización	
		Frecuencia	Frecuencia	
Trastornos vasculares	Bradicardia	Infrecuente	Desconocido	
	Bloqueo aurículo-ventricular	Infrecuente		
	Sofocos	Muy común		
	Linfedema	Común	Desconocido	
	Hipertensión	Común	Desconocido	
	Tromboflebitis	Común		
	Flebitis		Desconocido	
	Trombosis		Desconocido	
	Aneurisma	Infrecuente		
	Cotapso circulatorio	Infrecuente		
	Rubefacción	Infrecuente		
	Hematoma	Infrecuente		
	Hipotensión		Desconocido	
	Varices		Desconocido	
	Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos	Frote pleural		Desconocido
Fibrosis pulmonar			Desconocido	
Epistaxis			Desconocido	
Disnea		Común	Desconocido	
Hemoptisis			Desconocido	
Tos		Infrecuente	Desconocido	
Asma		Común		
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica		Infrecuente		
Derrame pleural			Desconocido	
Infiltración pulmonar			Desconocido	
Trastorno respiratorio			Desconocido	
Congestión sinusal			Desconocido	
Embolia pulmonar			Desconocido	
Enfermedad Pulmonar Intersticial			Desconocido	
Trastornos gastrointestinales		Constipación	Común	Desconocido
	Náuseas	Común	Desconocido	
	Vómitos		Desconocido	
	Gastritis	Infrecuente		
	Hemorragia gastrointestinal		Desconocido	
	Distensión abdominal		Desconocido	
	Diarrea		Desconocido	
	Disfagia		Desconocido	
	Xerostomía		Desconocido	
	Úlcera duodenal		Desconocido	
	Trastorno gastrointestinal		Desconocido	
	Úlcera péptica		Desconocido	
	Pólipo rectal		Desconocido	
	Trastornos hepatobiliares	Función hepática anormal		Desconocido
		Hepatitis colestásica	Infrecuente	
Lesión hepatocelular		Infrecuente		
Trastornos de piel y tejido subcutáneo	Ictericia		Desconocido	
	Alopecia	Infrecuente	Desconocido	
	Equimosis		Desconocido	
	Erupción cutánea	Infrecuente	Desconocido	
	Sequedad de la piel	Infrecuente	Desconocido	
	Reacción de fotosensibilidad		Desconocido	
	Urticaria		Desconocido	
	Hiperhidrosis	Muy común		
	Dermatitis		Desconocido	
	Crecimiento anormal del vello		Desconocido	
	Prurito	Común	Desconocido	
	Trastorno de la pigmentación		Desconocido	
	Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo	Lesión cutánea		Desconocido
		Dolor óseo	Muy común	
		Mialgia	Infrecuente	Desconocido
Tumefacción ósea			Desconocido	
Artralgia		Común	Desconocido	

M. Marun

Dra. María Alejandra Blanc
 Farmacéutica - Co - Directora Técnica
 Abbott Laboratories Argentina S.A

celina.marun@abbott.com
 Planta Industrial: Av. Valentín Vergara 7989
 B1691EUE, Ing. Allan. Florencio Varela, Bs. As. Argentina

M. Yoshida

Dra. Mónica E Yoshida
 Farmacéutica - Directora Técnica
 Abbott Laboratories Argentina S.A

Tel.: 54 11 4229 4245
 Fax: 54 11 4229 4366





Clase de sistema orgánico	Término preferido	11,25 mg (EC001, EC002, n = 161)	Post Comercialización	
		Frecuencia	Frecuencia	
	Dorsalgia	Común		
	Debilidad muscular	Común		
	Fasciculación muscular			
	Dolor en las extremidades	Común		
	Espasmos musculares	Infrecuente		
	Espondilitis anquilosante		Desconocido	
	Tenosinovitis		Desconocido	
	Incontinencia urinaria	Infrecuente	Desconocido	
	Disuria	Común		
	Polaquiuria	Infrecuente	Desconocido	
Trastornos renales y urinarios	Urgencia miccional		Desconocido	
	Hematuria	Común	Desconocido	
	Nicturia	Muy común		
	Retención urinaria	Infrecuente		
	Trastorno miccional	Infrecuente		
	Espasmo vesical		Desconocido	
	Trastorno de las vías urinarias		Desconocido	
	Obstrucción de las vías urinarias		Desconocido	
	Ginecomastia	Común	Desconocido	
	Hiperestesia mamaria		Desconocido	
Trastornos del aparato reproductor y mamas	Disfunción eréctil	Muy común		
	Atrofia testicular		Desconocido	
	Dolor testicular		Desconocido	
	Mastodinia		Desconocido	
	Trastorno testicular	Muy común	Desconocido	
	inflamación del pene		Desconocido	
	Trastorno peniano		Desconocido	
	Dolor prostático		Desconocido	
	Dolor	Común	Desconocido	
	Dolor torácico	Infrecuente		
Trastornos generales y en el sitio de administración	Edema		Desconocido	
	Edema periférico	Común		
	Edema gravitacional	Infrecuente		
	Sequedad de mucosas	Infrecuente		
	Astenia	Común	Desconocido	
	Fatiga	Muy común		
	Pirexia		Desconocido	
	Reacción en el sitio de la inyección	Muy común	Desconocido	
	Inflamación en el sitio de la inyección		Desconocido	
	Masa en el sitio de la inyección	Común		
	Dolor en el sitio de la inyección	Común	Desconocido	
	Edema en el sitio de inyección	Común		
	Induración en el sitio de la inyección		Desconocido	
	Absceso estéril en el sitio de la inyección		Desconocido	
	Hematoma en el sitio de la inyección		Desconocido	
	Escalofríos		Desconocido	
	Nódulos		Desconocido	
	Sed		Desconocido	
	Malestar	Infrecuente		
	Enfermedad pseudogripal	Común		
	Trastornos en la marcha	Infrecuente		
	Inflamación		Desconocido	
	Fibrosis pélvica		Desconocido	
	Estudios complementarios	Elevación de la urea en sangre		Desconocido
		Elevación de uricemia		Desconocido
Elevación de creatinemia			Desconocido	
Eritrosedimentación elevada		Infrecuente		
Elevación de calcemia			Desconocido	
Elevación de fosfatasa alcalina en sangre		Común		
Elevación de lactato deshidrogenasa en sangre		Común		
Aumento del antígeno prostático		Común		

Dra. María Alejandra Bianchi
 Farmacéutica - Co - Directora Técnica
 Abbott Laboratories Argentina S.A.

celina.marun@abbott.com
 Planta Industrial: Av. Valentín Vergara 7989
 B1891EUE, Ing. Altan, Florencio Varela, Bs. As. Argentina

Tel: 54 11 4229 4245
 Fax: 54 11 4229 4366

Dra. Mónica E. Yoshida
 Farmacéutica - Directora Técnica
 Abbott Laboratories Argentina S.A.





Clase de sistema orgánico	Término preferido	11,25 mg (EC001, EC002, n = 181)	Post Comercialización
	específico	Frecuencia	Frecuencia
	Elevación de alanina aminotransferasa/ALT	Común	
	Elevación de aspartato aminotransferasa/AST	Común	
	Elevación de gammaglutamiltransferasa	Común	
	Electrocardiograma anormal	Común	Desconocido
	Signos ECG de isquemia miocárdica		Desconocido
	Aumento de testosterona en sangre	Infrecuente	
	Pruebas de la función hepática anormal		Desconocido
	Disminución de plaquetas		Desconocido
	Disminución de potasemia		Desconocido
	Elevación del recuento de leucocitos		Desconocido
	Disminución del recuento de leucocitos		Desconocido
	Tiempo de protrombina prolongado		Desconocido
	Tiempo de tromboplastina parcial activada prolongado		Desconocido
	Elevación de transaminasas		Desconocido
	Soplo cardíaco		Desconocido
	Elevación de lipoproteínas de baja densidad		Desconocido
	Elevación de trigliceridemia		Desconocido
	Elevación de bilirrubinemia		Desconocido
Lesión, intoxicación y complicaciones de procedimientos	Fractura	Infrecuente	
	Fractura de columna		Desconocido
	Traumatismo craneal	Infrecuente	
	Caída	Infrecuente	
	Oclusión del dispositivo	Infrecuente	

Mujeres: La Tabla 2 presenta las RAM y frecuencias [muy común ($\geq 1/10$); común ($\geq 1/100$ a $< 1/10$); infrecuente ($\geq 1/1000$ a $< 1/100$) desconocido (no se ha podido estimar la frecuencia con los datos disponibles)] de los estudios clínicos en endometriosis, fibroma uterino y cáncer de mama y de la experiencia post-comercialización. Un espacio en blanco indica que no se observó la RAM en esa categoría en particular. Se han reportado casos serios de tromboembolismo arterial y venoso, incluyendo trombosis de venas profundas, embolismo pulmonar, infarto de miocardio, ataque cerebral y accidente isquémico transitorio. Aunque una relación temporal fue reportada en algunos casos, en la mayoría, se presentaron al mismo tiempo otros factores de riesgo o uso de medicación concomitante. Se desconoce si existe una asociación causal entre el uso de agonistas LHRH y estos eventos.

Cambios en la densidad ósea: En los estudios clínicos controlados, las pacientes con endometriosis (seis meses de tratamiento) o fibromas uterinos (tres meses de tratamiento) fueron tratadas con Leuprolida Depot 3,75 mg. En las pacientes con endometriosis, la densidad ósea vertebral medida por absorciometría de rayos x de energía dual (DEXA) disminuyó en un promedio de 3,9% a los seis meses en comparación con el valor pretratamiento. En aquellas pacientes que fueron examinadas seis o doce meses después de la suspensión del tratamiento, la densidad ósea media retornó al nivel dentro del 2% del valor pretratamiento. Cuando se administró Leuprolida Depot 3,75 mg durante tres meses a pacientes con fibromas uterinos, la evaluación de la densidad mineral del hueso trabecular vertebral por radiografía digital cuantitativa (QDR) reveló una disminución promedio de 2,7% en comparación con el valor basal. Seis meses después de la suspensión del tratamiento, se observó una tendencia hacia la recuperación.

Tabla 2: Indicaciones en mujeres

Clase de sistema orgánico	Término preferido	Endometriosis (3,75, 11,25: M88-031, M88-039, n = 188)	Fibromas (3,75, 11,25: M88-034, M88049, M88-082, M940-411, n = 187)	Cáncer de mama (11,25: CPH-101, B02/EC 008, n = 365)	Add-back (3,75, 11,25: M82-878, M97-777, n = 191)	Post Comercialización
		Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia
Infecciones e infestaciones	Infeción	Infrecuente			Infrecuente	Desconocido
	Rinitis		Infrecuente		Infrecuente	
	Infeción respiratoria alta			Infrecuente		
	Pielonefritis	Infrecuente				
	Forúnculo	Infrecuente				
	Infeción urinaria				Común	Desconocido
	Candidiasis vulvovaginal		Infrecuente		Común	
	Gripe		Infrecuente		Común	
	Faringitis				Común	Desconocido
Neumonía					Desconocido	

Dra. María Alejandra Bienc
Farmacéutica - Co - Directora Técnica
Abbott Laboratories Argentina S.A.

celina.marun@abbott.com
Planta Industrial: Av. Valentin Vergara 7989
B1891EJE, Ing. Allan. Florencio Varela, Bs. As. Argentina

Tel.: 54 11 4229 4245
Fax: 54 11 4229 4366

Dra. Mónica E. Yeshida
Farmacéutica - Directora Técnica
Abbott Laboratories Argentina S.A.





Clase de sistema orgánico	Término preferido	Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia
		Endometriosis (3,75, 11,25: M86-031, M86-039, n = 166)	Fibromas (3,75, 11,25: M86-034, M86049, M86-062, M940-411, n = 167)	Cáncer de mama (11,25: CPH-101, B02/EC 008, n = 365)	Add-back (3,75, 11,25: M92-878, M97-777, n = 191)	Post Comercialización
Tumores benignos, malignos y no especificados (incl. quistes y pólipos)	Tumor mamario				Infrecuente	
	Cáncer de piel					Desconocido
Trastornos del sistema hemolinfático	Leucopenia			Infrecuente		
	Anemia					Desconocido
	Linfadenopatía				Infrecuente	
	Coagulopatía				Infrecuente	
Trastornos del sistema inmunitario	Reacción anafiláctica					Desconocido
Trastornos endocrinos	Bocio					Desconocido
	Tiroiditis				Común	
	Apoplejía hipofisaria					Desconocido
Trastornos metabólicos y nutricionales	Anorexia	Infrecuente		Infrecuente		
	Diabetes mellitus					Desconocido
	Aumento del apetito	Infrecuente	Infrecuente	Muy común	Común	Desconocido
	Disminución del apetito			Común		
	Hipoglucemia					Desconocido
	Dehidratación					Desconocido
	Hiperlipidemia					Desconocido
	Hipercolesterolemia	Común				
	Hiperfosfatemia					Desconocido
	Hipoproteinemia					Desconocido
	Aumento anormal de peso	Muy común	Común	Muy común	Muy común	
	Pérdida anormal de peso	Común	Común	Muy común	Común	
Trastornos psiquiátricos	Labilidad afectiva	Muy común	Común		Muy común	
	Distimias			Muy común		Desconocido
	Trastorno de la personalidad	Infrecuente				
	Nerviosismo	Muy común	Común	Muy común	Muy común	Desconocido
	Disminución de la libido	Muy común	Común		Común	
	Aumento de la libido					Desconocido
	Insomnio	Muy común	Común	Muy común	Muy común	Desconocido
	Trastornos del sueño			Común		Desconocido
	Depresión	Muy común	Común	Muy común	Muy común	Desconocido
	Depresión mayor	Común				
	Ansiedad	Común	Infrecuente		Común	Desconocido
	Delirio	Infrecuente				Desconocido
	Pensamiento anormal	Infrecuente			Común	
	Estado confusional	Común			Infrecuente	
	Estado de ánimo eufórico	Infrecuente				
	Hostilidad	Común			Infrecuente	
	Apatía	Infrecuente				
	Agitación				Común	
	Nerviosismo/ansiedad	Muy común				
	Preferir gritos				Infrecuente	
	Ideas suicidas					Desconocido
	Intento de suicidio					Desconocido
Trastornos del sistema nervioso	Mareos	Muy común	Común	Muy común	Común	Desconocido
	Mareo postural			Común		
	Cefalea	Muy común	Muy común	Muy común	Muy común	Desconocido
	Parestesia	Común	Común	Común	Común	Desconocido
	Letargo					Desconocido
	Somnolencia	Infrecuente		Común	Común	
	Trastornos de la memoria			Común		Desconocido
	Amnesia	Infrecuente				
	Disgeusia		Infrecuente		Infrecuente	Desconocido
	Hipoestesia			Común	Común	Desconocido
	Síncope	Infrecuente			Común	Desconocido

María Blanc
Dra. María Alejandra Blanc
Farmacéutica - Co - Directora Técnica
Abbott Laboratories Argentina S.A.

celina.marun@abbott.com
Planta Industrial: Av. Valentín Vergara 7989
B1891EUE, Ing. Allan. Florencio Varela, Bs. As. Argentina

Mónica E Yoshida
Dra. Mónica E Yoshida
Farmacéutica - Directora Técnica
Abbott Laboratories Argentina S.A.

Tel.: 54 11 4229 4245
Fax: 54 11 4229 4366





Clase de sistema orgánico	Término preferido	Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia
		Endometriosis (3,75, 11,25: M86-031, M86-039, n = 166)	Fibromas (3,75, 11,25: M86-034, M86049, M86-062, M840-411, n = 187)	Cáncer de mama (11,25: CPH-101, B02/EC 008, n = 365)	Add-back (3,75, 11,25: M92-878, M97-777, n = 191)	Post Comercialización
	Migraña	Común	Infrecuente		Muy común	
	Hipertensión	Común	Común		Común	
	Ataxia	Infrecuente				
	Tembor			Común	Común	
	Coordinación anormal				Común	
	Hiperquinesia				Común	
	Neuropatía periférica					Desconocido
	Accidente cerebrovascular					Desconocido
	Pérdida del conocimiento					Desconocido
	Ataque isquémico transitorio					Desconocido
	Parálisis					Desconocido
	Neuromiopatía					Desconocido
	Convulsiones					Desconocido
Trastornos oftalmológicos	Visión borrosa					Desconocido
	Trastornos oculares	Infrecuente				Desconocido
	Deterioro visual	Común				Desconocido
	Ambliopía	Común			Común	Desconocido
	Dolor ocular	Infrecuente				Desconocido
	Conjuntivitis		Infrecuente	Común		Desconocido
	Xeroftalmia					Desconocido
Trastornos del oído y laberinto	Otalgia					Infrecuente
	Vértigo	Común				
	Sordera			Común		
	Cinetosis			Común		
	Inflamación auricular			Común		
	Tinnitus					Desconocido
	Hipoacusia					Desconocido
Trastornos cardíacos	Insuficiencia cardíaca congestiva					Desconocido
	Arritmia					Desconocido
	Infarto de miocardio					Desconocido
	Angina de pecho					Desconocido
	Taquicardia	Infrecuente	Infrecuente		Común	Desconocido
	Palpitaciones	Común		Común	Común	Desconocido
	Bradycardia					Desconocido
Trastornos vasculares	Sofocos			Muy común		
	Vasodilatación	Muy común	Muy común		Muy común	
	Linfedema					Desconocido
	Hipertensión				Común	Desconocido
	Flebitis					Desconocido
	Trombosis					Desconocido
	Hipotensión					Desconocido
	Varices					Desconocido
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos	Frote pleural					Desconocido
	Fibrosis pulmonar					Desconocido
	Epistaxis	Infrecuente		Común		Desconocido
	Disnea			Común		Desconocido
	Hemoptisis					Desconocido
	Distonia	Infrecuente			Infrecuente	
	Aumento del esputo			Común		
	Tos			Común		Desconocido
	Laringoespasmo				Infrecuente	
	Demame pleural					Desconocido
	Infiltración pulmonar					Desconocido
	Trastorno respiratorio					Desconocido
	Congestión sinusal					Desconocido
	Embolia pulmonar					Desconocido
Trastornos gastrointestinales	Constipación	Común	Infrecuente	Común	Común	Desconocido
	Náuseas	Muy común	Común	Muy común	Muy común	Desconocido
	Vómitos		Infrecuente	Común	Común	Desconocido
	Náuseas y vómitos	Común	Infrecuente		Común	

Marijuan

Maria Yoshida


Dra. María Alejandra Blanc
 Farmacéutica - Co - Directora Técnica
 Abbott Laboratories Argentina S.A.

Dra. Mónica E Yoshida
 Farmacéutica - Directora Técnica
 Abbott Laboratories Argentina S.A.

celina.marun@abbott.com
 Planta Industrial: Av. Valentín Vergara 7989
 B1891EUE, Ing. Allan. Florencio Varela, Bs. As. Argentina

Tel.: 54 11 4229 4245
 Fax: 54 11 4229 4366





Clase de sistema orgánico	Término preferido	Endometriosis (3,75, 11,25: M86-031, M86-039, n = 166)	Fibromas (3,75, 11,25: M86-034, M86-049, M86-062, M86-411, n = 167)	Cáncer de mama (11,25: CPH-101, B02/EC 008, n = 365)	Add-back (3,75, 11,25: M92-878, M97-777, n = 191)	Post Comercialización
		Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia
Trastornos gastrointestinales	Hemorragia gastrointestinal					Desconocido
	Distensión abdominal	Infrecuente		Común	Común	Desconocido
	Diarrea	Común	Común	Común	Común	Desconocido
	Disfagia					Desconocido
	Gingivitis			Común	Común	
	Dispepsia	Infrecuente			Común	
	Flatulencia	Infrecuente	Común		Común	
	Gastritis	Infrecuente		Común		
	Sangrado gingival	Infrecuente				
	Xerostomía	Común	Infrecuente		Infrecuente	Desconocido
	Dolor abdominal	Común	Común		Común	
	Dolor abdominal alto			Común		
	Dolor abdominal bajo			Común		
	Estomatitis			Común		
	Arcadas			Común		
	Melena				Común	
	Colitis				Infrecuente	
	Úlcera duodenal					Desconocido
Trastorno gastrointestinal					Desconocido	
Úlcera péptica					Desconocido	
Pólipo rectal					Desconocido	
Trastornos hepatobiliares	Hígado doloroso a la palpación	Infrecuente				
	Función hepática anormal			Común		Desconocido
	Esteatosis hepática			Común		
	Ictericia					Desconocido
Trastornos de piel y tejido subcutáneo	Eritema			Común		
	Alopecia	Común		Común	Común	Desconocido
	Equimosis	Común			Común	Desconocido
	Acné	Muy común		Común	Muy común	
	Seborrea	Común				
	Erupción cutánea	Común	Común	Común	Común	Desconocido
	Eritema maculopapular	Infrecuente				
	Sequedad de la piel	Común	Común		Común	Desconocido
	Reacción de fotosensibilidad	Infrecuente				Desconocido
	Urticaria				Infrecuente	Desconocido
	Olor anormal de la piel		Infrecuente			
	Hiperhidrosis	Común	Común	Muy común	Muy común	
	Dermatitis					Desconocido
	Crecimiento anormal del vello					Desconocido
	Hirsutismo	Común	Infrecuente		Infrecuente	
	Trastorno capilar	Infrecuente			Común	
	Eccema			Común		
	Prurito				Común	Desconocido
	Trastorno ungueal		Infrecuente		Común	
	Decoloración de la piel		Infrecuente		Infrecuente	
Trastorno cutáneo				Infrecuente		
Nódulo cutáneo				Común		
Dermatitis bullosa		Infrecuente				
Trastorno de la pigmentación					Desconocido	
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo	Lesión cutánea					Desconocido
	Dolor óseo			Común		
	Mialgia	Infrecuente	Infrecuente		Común	Desconocido
	Turnefacción ósea					Desconocido
	Artropatía	Común	Común		Común	Desconocido
	Aralgia	Común	Común	Muy común	Común	Desconocido
	Dorsalgia	Común	Común	Muy común	Común	
	Osteoartritis			Común		
	Artritis	Infrecuente				
	Rigidez de nuca	Común			Infrecuente	
Dolor de nuca	Común		Común	Infrecuente		

María Blanc
Dra. María Alejandra Blanc
Farmacéutica - Co - Directora Técnica
Abbott Laboratories Argentina S.A

celina.marun@abbott.com
Planta Industrial: Av. Valentín Vergara 7989
B1691EUE, Ing. Allan, Florencio Varela, Bs. As. Argentina

Tel: 54 11 4229 4245
Fax: 54 11 4229 4366

Mónica E Yoshida
Dra. Mónica E Yoshida
Farmacéutica - Directora Técnica
Abbott Laboratories Argentina S.A



Abbott Laboratories Argentina S.A.
 Ing. E. Butty 240 13° Piso C1001AFB
 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel. 54 11 5776 7200
 Fax 54 11 5776 7217



Clase de sistema orgánico	Término preferido	Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia	Post Comercialización
	Debilidad muscular			Común		
	Rigidez musculoesquelética			Común		
	Fasciculación muscular			Común	Infrecuente	
	Espasmos musculares				Común	
	Espondilitis anquilosante					Desconocido
Trastornos renales y urinarios	Tenosinovitis					Desconocido
	Incontinencia urinaria	Infrecuente				Desconocido
	Disuria	Común			Infrecuente	
	Polaquiuria	Infrecuente		Común		Desconocido
	Urgencia miccional					Desconocido
	Hematuria					Desconocido
	Dolor renal				Común	
	Espasmo vesical					Desconocido
	Trastorno de las vías urinarias					Desconocido
	Obstrucción de las vías urinarias					Desconocido
Trastornos del aparato reproductor y mamas	Ginecomastia					Desconocido
	Hiperestesia mamaria					Desconocido
	Hemorragia vaginal				Infrecuente	Desconocido
	Dismenorrea				Común	
	Trastorno menstrual		Infrecuente			Desconocido
	Agrandamiento mamario	Infrecuente			Común	
	Congestión mamaria	Infrecuente				
	Atrofia mamaria	Común			Común	
	Secreción genital	Común				
	Flujo vaginal			Común		
	Galactorrea	Infrecuente			Común	
	Mastodinia	Común	Común	Común	Muy común	Desconocido
	Dolor pélvico	Común	Infrecuente		Común	
	Metrorragia		Infrecuente	Común	Infrecuente	Desconocido
	Síntomas menopáusicos			Común		
	Dispareunia				Común	
	Trastorno uterino				Infrecuente	
	Vaginitis	Muy común	Muy común	Común	Muy común	
	Menorragia		Infrecuente			
	Trastornos generales y en el sitio de administración	Dolor	Común	Común		Muy común
Dolor torácico		Común	Infrecuente	Común	Común	
Edema		Común	Infrecuente	Común		Desconocido
Edema periférico		Común	Común	Común	Común	
Edema facial		Infrecuente				
Edema generalizado		Infrecuente			Común	
Astenia		Común	Común	Muy común	Muy común	Desconocido
Fatiga				Común		
Pirexia				Común	Común	Desconocido
Reacción en el sitio de la inyección		Infrecuente		Común	Común	Desconocido
Inflamación en el sitio de la inyección						Desconocido
Masa en el sitio de la inyección		Infrecuente	Infrecuente			
Dolor en el sitio de la inyección		Común	Común	Muy común	Común	Desconocido
Induración en el sitio de la inyección				Muy común		Desconocido
Prurito en el sitio de la inyección				Común		
Eritema en el sitio de la inyección				Común		
Absceso estéril en el sitio de la inyección						Desconocido
Sangrado en el sitio de la inyección						Desconocido
Hematoma en el sitio de la inyección					Desconocido	
Escalofríos	Común	Común		Común	Desconocido	

Maria Blanc

Dra. María Alejandra Blanc
 Farmacéutica - Co - Directora Técnica
 Abbott Laboratories Argentina S.A

celina.marun@abbott.com
 Planta Industrial: Av. Valentín Vergara 7989
 B1691EUE, Ing. Allan. Florencio Varela, Bs/As. Argentina

Monica Yoshida

Dra. Mónica E Yoshida
 Farmacéutica - Directora Técnica
 Abbott Laboratories Argentina S.A

Tel.: 54 11 4229 4245
 Fax: 54 11 4229 4366





Clase de sistema orgánico	Término preferido	Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia	Frecuencia	Post Comercialización
	Nódulo					Desconocido
	Hipersensibilidad en el sitio de la inyección	Infrecuente				
	Sed	Común				Desconocido
	Deterioro de la salud física general			Muy común		
	Sensación de ardor			Muy común		
	Irritabilidad			Común		
	Malestar			Común	Común	
	Condición agravada		Infrecuente			
	Inflamación					Desconocido
	Fibrosis pélvica					Desconocido
Estudios complementarios	Elevación de la urea en sangre					Desconocido
	Elevación de uricemia					Desconocido
	Elevación de creatinemia					Desconocido
	Elevación de calcemia					Desconocido
	Aumento de la temperatura corporal			Infrecuente		
	Sangre oculta positivo			Común		
	Electrocardiograma anormal					Desconocido
	Signos ECG de isquemia miocárdica					Desconocido
	Pruebas de la función hepática anormal		Común			Desconocido
	Disminución de plaquetas					Desconocido
	Disminución de potasemia					Desconocido
	Elevación del recuento de leucocitos					Desconocido
	Disminución del recuento de leucocitos					Desconocido
	Tiempo de protrombina prolongado					Desconocido
	Tiempo de tromboplastina parcial activada prolongado					Desconocido
	Análisis de laboratorio anormales		Infrecuente			
	Soplo cardíaco					Desconocido
	Elevación de lipoproteínas de baja densidad					Desconocido
Elevación de triglicéridemia					Desconocido	
Elevación de bilirrubinemia					Desconocido	
Lesión, intoxicación y complicaciones de procedimientos	Dolor en el procedimiento			Común		
	Fractura de columna					Desconocido

Niños: La Tabla 3 presenta las RAM y frecuencias [muy común ($\geq 1/10$); común ($\geq 1/100$ a $< 1/10$); infrecuente ($\geq 1/1000$ a $< 1/100$) desconocido (no se ha podido estimar la frecuencia con los datos disponibles)] de los estudios clínicos en PPC y de la experiencia post-comercialización. Un espacio en blanco indica que no se observó la RAM en esa categoría en particular.

Tabla 3: Pubertad Precoz Central

Clase de sistema orgánico	Término preferido	PPC (3,75; 7,5; 11,25; 15; P90-053, M90-518, n=421)	Post Comercialización
Infecciones e infestaciones	Infección urinaria	Infrecuente	Desconocido
	Rinitis	Infrecuente	
	Infección urinaria		Desconocido
	Gripe	Infrecuente	
	Faringitis	Infrecuente	Desconocido
	Neumonía		Desconocido
	Sinusitis	Infrecuente	
	Neoplasia de cuello del útero	Infrecuente	
Tumores benignos, malignos y no especificados (incl. quistes y pólipos)	Cáncer de piel		Desconocido

María Blanc

Dra. María Alejandra Blanc
 Farmacéutica - Co - Directora Técnica
 Abbott Laboratories Argentina S.A.

celina.marun@abbott.com
 Planta Industrial: Av. Valentín Vergara 7989
 B1891EUE, Ing. Allan. Florencio Varela, Bs. As. Argentina

Mónica E Yoshida

Dra. Mónica E Yoshida
 Farmacéutica - Directora Técnica
 Abbott Laboratories Argentina S.A.

Tel.: 54 11 4229 4245
 Fax: 54 11 4229 4366





Clase de sistema orgánico	Término preferido	PPC (3,75; 7,5; 11,25; 15; P90-053, M90-516, n=421)	Post Comercialización
		Frecuencia	Frecuencia
Trastornos del sistema inmunitario	Hipersensibilidad	Infrecuente	
	Reacción anafiláctica		Desconocido
Trastornos endocrinos	Pubertad precoz	Infrecuente	
	Bocio	Infrecuente	Desconocido
	Apoplejía hipofisaria		Desconocido
Trastornos metabólicos y nutricionales	Retardo del crecimiento	Común	
	Aumento anormal de peso	Común	
	Diabetes mellitus		Desconocido
	Aumento del apetito	Infrecuente	Desconocido
	Hipoglucemia		Desconocido
	Deshidratación		Desconocido
	Hiperlipidemia		Desconocido
	Hiperfosfatemia		Desconocido
	Hipoproteinemia		Desconocido
Trastornos psiquiátricos	Labilidad afectiva	Común	
	Diatmias		Desconocido
	Nerviosismo	Infrecuente	Desconocido
	Aumento de la libido		Desconocido
	Insomnio		Desconocido
	Trastornos del sueño		Desconocido
	Depresión	Infrecuente	Desconocido
	Ansiedad		Desconocido
	Delirio		Desconocido
	Mareos		Desconocido
Trastornos del sistema nervioso	Cefalea	Común	Desconocido
	Parestesia		Desconocido
	Letargo		Desconocido
	Somnolencia	Infrecuente	
	Trastornos de la memoria		Desconocido
	Disgeusia		Desconocido
	Hipoestesia		Desconocido
	Síncope	Infrecuente	Desconocido
	Hiperquinesia	Infrecuente	
	Neuropatía periférica		Desconocido
	Accidente cerebrovascular		Desconocido
	Pérdida del conocimiento		Desconocido
	Parálisis		Desconocido
	Neuromiopatía		Desconocido
	Convulsiones		Desconocido
Trastornos oftalmológicos	Visión borrosa		Desconocido
	Trastornos oculares		Desconocido
	Deterioro visual		Desconocido
	Ambliopía		Desconocido
Trastornos del oído y laberinto	Xerofalmia		Desconocido
	Tinnitus		Desconocido
	Hipoacusia		Desconocido
Trastornos cardíacos	Arritmia		Desconocido
	Taquicardia		Desconocido
	Bradicardia	Infrecuente	Desconocido
Trastornos vasculares	Vasodilatación	Común	
	Linfedema		Desconocido
	Hipertensión	Infrecuente	Desconocido
	Trombosis		Desconocido
	Hipotensión		Desconocido
	Hipertensión		Desconocido
	Trastorno vascular periférico	Infrecuente	
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos	Epistaxis	Infrecuente	Desconocido
	Disnea		Desconocido
	Tos		Desconocido
	Asma	Infrecuente	
	Trastorno respiratorio		Desconocido
	Congestión sinusal		Desconocido
Trastornos gastrointestinales	Constipación	Infrecuente	Desconocido

Dra. María Alejandra Blanc
 Farmacéutica - Co - Directora Técnica
 Abbott Laboratories Argentina S.A

celina.marun@abbott.com
 Planta Industrial: Av. Valentín Vergara 7989
 B1891EUE, Ing. Allan. Florencio Varela, Bs. As. Argentina

Tel.: 54 11 4229 4245
 Fax: 54 11 4229 4366

Dra. Mónica E Yoshida
 Farmacéutica - Directora Técnica
 Abbott Laboratories Argentina S.A





Clase de sistema orgánico	Término preferido	Frecuencia	Post Comercialización
	Náuseas		Desconocido
	Vómitos		Desconocido
	Náuseas y vómitos	Infrecuente	
	Hemorragia gastrointestinal		Desconocido
	Distensión abdominal		Desconocido
	Dolor abdominal		Desconocido
	Diarrea		Desconocido
	Difagia	Infrecuente	Desconocido
	Gingivitis	Infrecuente	
	Disepepsia	Infrecuente	
	Xerostomía		Desconocido
	Trastorno gastrointestinal		Desconocido
	Úlcera péptica		Desconocido
Trastornos de piel y tejido subcutáneo	Alopecia	Infrecuente	Desconocido
	Equimosis		Desconocido
	Acné	Común	
	Erupción cutánea	Común	Desconocido
	Sequedad de la piel		Desconocido
	Reacción de fotosensibilidad		Desconocido
	Urticaria		Desconocido
	Olor anormal de la piel	Común	
	Dermatitis		Desconocido
	Crecimiento anormal del vello		Desconocido
	Hirsutismo	Infrecuente	
	Trastorno capilar	Infrecuente	
	Prurito		Desconocido
	Trastorno ungueal	Infrecuente	
	Leucoderma	Infrecuente	
	Hipertrofia cutánea	Infrecuente	
	Púrpura	Infrecuente	
	Trastorno de la pigmentación		Desconocido
	Lesión cutánea		Desconocido
	Tufores de calor		Desconocido
Episodios de rubor		Desconocido	
Hiperhidrosis		Desconocido	
Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo	Mialgia	Infrecuente	Desconocido
	Tumefacción ósea		Desconocido
	Artropatía	Infrecuente	Desconocido
	Miopatía	Infrecuente	
	Artralgia	Infrecuente	
	Tenosinovitis		Desconocido
Trastornos renales y urinarios	Incontinencia urinaria	Infrecuente	Desconocido
	Polaquiuria		Desconocido
	Urgencia miccional		Desconocido
	Hematuria		Desconocido
Trastornos del aparato reproductor y mamas	Ginecomastia	Común	Desconocido
	Vaginitis	Común	
	Hiperestesia mamaria		Desconocido
	Atrfia testicular		Desconocido
	Hemorragia vaginal	Infrecuente	Desconocido
	Trastorno del cuello uterino	Infrecuente	
	Dismenorrea	Infrecuente	
	Trastorno menstrual	Infrecuente	Desconocido
	Agrandamiento mamario	Infrecuente	
	Flujo vaginal	Infrecuente	
	Mastodinia	Infrecuente	Desconocido
	Metrorragia		Desconocido
	Trastorno testicular		Desconocido
	Feminización adquirida	Infrecuente	
Trastornos generales y en el sitio de administración	Dolor prostático		Desconocido
	Dolor	Común	Desconocido
	Edema		Desconocido
	Dolor torácico		Desconocido

Marija Blanc
 Dra. María Alejandra Blanc
 Farmacéutica - Co - Directora Técnica
 Abbott Laboratories Argentina S.A

celina.marun@abbott.com
 Planta Industrial: Av. Valentín Vergara 7989
 B1891EUE, Ing. Allan. Florencio Varela, Bs. As. Argentina

Tel.: 54 11 4229 4245
 Fax: 54 11 4229 4366

Mónica E Yoshida
 Dra. Mónica E Yoshida
 Farmacéutica - Directora Técnica
 Abbott Laboratories Argentina S.A





Clase de sistema orgánico	Término preferido	PPC (3,75; 7,5; 11,25; 15; P90-053, M90-516, n=421)	Post Comercialización
		Frecuencia	Frecuencia
	Edema periférico		Infrecuente
	Astenia		Desconocido
	Pirexia		Desconocido
	Reacción en el sitio de la inyección		Infrecuente
	Inflamación en el sitio de la inyección		Común
	Dolor en el sitio de la inyección		Desconocido
	Induración en el sitio de la inyección		Desconocido
	Absceso estéril en el sitio de la inyección		Desconocido
	Hematoma en el sitio de la inyección		Desconocido
	Hipertrofia		Infrecuente
	Escalofríos		Desconocido
	Nódulo		Desconocido
	Sed		Desconocido
	Condición agravada		Infrecuente
	incremento de peso		Desconocido
	Elevación de la urea en sangre		Desconocido
	Elevación de uricemia		Desconocido
	Elevación de creatinemia		Desconocido
Estudios complementarios	Anticuerpo antinuclear positivo		Infrecuente
	Eritrosedimentación elevada		Infrecuente
	Pruebas de la función hepática anormal		Desconocido
	Elevación del recuento de glóbulos blancos		Desconocido
	Soplo cardíaco		Desconocido
Lesión, intoxicación y complicaciones de procedimientos	Fractura de columna		Desconocido

SOBREDOSIS

No hay ninguna experiencia clínica de los efectos de una sobredosis aguda de Acetato de Leuprolida Suspensión Depot. En estudios en animales, dosis aproximadamente 133 veces la dosis recomendada en seres humanos produjo disnea, disminución de la actividad e irritación local en el sitio de la inyección. En casos de sobredosis, se recomienda estrecho monitoreo de los pacientes y tratamiento sintomático y de apoyo. Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital más cercano o comunicarse en Argentina con los Centros de Toxicología:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez (011) 4962-6666/2247
- Hospital A. Posadas (011) 4654-6648/ 4658-7777

PRESENTACION

Lupron Depot 11,25 mg se presenta en estuches conteniendo un frasco-ampolla de microesferas liofilizadas estériles de Acetato de leuprolida incorporado en un copolímero biodegradable de los ácidos láctico y glicólico, con su correspondiente diluyente, una jeringa descartable con 2 agujas calibre 23G y una toallita embebida en alcohol. Al mezclarse con 2 ml de diluyente, Lupron Depot 11,25 mg se administra como una única inyección cada tres meses.

CONSERVACION

El frasco-ampolla de Lupron Depot y la ampolla del diluyente pueden conservarse a temperatura ambiente (entre 15 y 30°C). Proteger de la luz. No es necesario refrigerar. No congelar.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Medicamento autorizado por el Ministerio de Salud. Certificado N° 38.507.

Elaborado por Takeda Pharmaceutical Industries Ltd., Osaka, Japón - Importado y distribuido por Abbott Laboratories Argentina S.A - Ing. Butty 240 - Piso 13- (C1001AFB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Planta Industrial: Avda. Valentín Vergara 7989 (B1891EUE) Ingeniero Allan - Partido de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, Argentina - Directora Técnica: Mónica Elizabeth Yoshida - Farmacéutica

Fecha de última revisión: Agosto 2011

Mari Blanc
Dra. María Alejandra Blanc
Farmacéutica - Co - Directora Técnica
Abbott Laboratories Argentina S.A

celina.marun@abbott.com
Planta Industrial: Av. Valentín Vergara 7989
B1891EUE, Ing. Allan. Florencio Varela, Bs/As. Argentina

Tel.: 54 11 4229 4245
Fax: 54 11 4229 4366

Mónica Yoshida
Dra. Mónica E Yoshida
Farmacéutica - Directora Técnica
Abbott Laboratories Argentina S.A

Abbott