



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Disposición**

**Número:** DI-2017-11854-APN-ANMAT#MS

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Jueves 23 de Noviembre de 2017

**Referencia:** 1-47-0000-11910-17-7

VISTO el Expediente N° 1-47-0000-11910-17-7 del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y

**CONSIDERANDO;**

Que por las presentes actuaciones la firma BINKA S.A. con RNE N° 010040266, solicita la adecuación del rótulo y la incorporación de nuevas presentaciones del producto denominado Raticida Rodenticida en Base a Granos de Cereal, Marca ULTRA PLUS, inscripto mediante certificado de RNPUD N° 0250003, bajo la categoría de Venta Profesional, en los términos de la Resolución (ex MSyAS) 708/98 y normas complementarias.

Que a fojas 31 obra el informe técnico emitido por el Departamento de Uso Doméstico de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud.

Que la documentación aportada ha satisfecho los requisitos de la normativa vigente.

Que la Dirección de Vigilancia de Productos Para la Salud ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de diciembre de 2015.

Por ello,

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE  
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGIA MEDICA

DISPONE:

ARTICULO 1°.- Autorízase a la firma BINKA S.A. con Registro Nacional de Establecimiento (RNE) N°:010040266, la modificación del rótulo y de las presentaciones del producto denominado Raticida

Rodenticida en Base a Granos de Cereal, Marca ULTRA PLUS, cuyos datos identificatorios característicos se detallan en el Certificado de RNPUD N° 0250003 actualizado, que consta en IF-2017-25016684-APN-DVPS#ANMAT.

ARTICULO 2°.- Autorízase los rótulos que constan en IF-2017-25016684-APN-DVPS#ANMAT, debiendo adecuarse en un todo en lo relativo a textos, tamaño de caracteres y ubicación de las leyendas a lo establecido por la Disposición ANMAT N° 8224/16.

ARTICULO 3°.- En los rótulos autorizados deberá figurar: RNPUD N° 0250003.

ARTICULO 4°.- CANCELASE el Certificado de RNPUD N° 0250003 que obra a fs. 3, otorgado por Expediente N° 1-47-2110-1201-11-8.

ARTICULO 5°.- Regístrese. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a los fines que corresponda. Por Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición, del Certificado de RNPUD N° 0250003 actualizado que se menciona en el artículo 1° y de los rótulos autorizados. Cumplido, archívese.

EXPEDIENTE N° 1-47-0000-11910-17-7

Digitally signed by LEDE Roberto Luis  
Date: 2017.11.23 09:52:00 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Roberto Luis Ledo  
SubAdministrador  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION Y SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUII  
30715117564  
Date: 2017.11.23 09:52:00 -0300



República Argentina  
Ministerio de Salud  
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica

## **Certificado de Inscripción Nacional de Producto Domisanitario**

# **0250003**

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certifica que se autoriza el producto domisanitario con los siguientes datos identificatorios característicos:

1. Denominación: **RATICIDA RODENTICIDA EN BASE A GRANOS DE CEREAL.**
2. Marca: **ULTRA PLUS**
3. Origen: **ARGENTINA**
4. Principios Activos: **BRODIFACOUM 0,005 %**
5. Forma de Presentación: **ESTUCHE X100G(DISPLAY X 10U),500G(ESTUCHE X 2U);  
BLISTER X 100G (C/TIBLE X 10 BLISTERS); FLOWPACK  
100G(C/TIBLE POR 10 BLISTERS); ESTUCHE X 1KG;  
POTE/BALDE X 1KG,2.5, 5, 6, 7.5 Y 10; BOLSA X  
50G,100G,250G,500G; BOLSAX 1,2.5,5,6,7.5 Y 10KG  
APLICADOS EN GEBADERAS DE DIFICIL ACCESO PARA  
NIÑOS Y MASCOTAS**
6. Venta: **VENTA INDUSTRIAL / PROFESIONAL**
7. Titular del Producto: **BINKA S.A.**
8. Domiciliado en: **MEJICO 1060/66 - AVELLANEDA - BUENOS  
AIRES**
9. Establecimiento TITULAR: **RNE N° : 010040266**
10. Inscripción Aprobada por Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud  
Según Expediente Nro.: 1-0047-0000-011910-17-7.




La vigencia del certificado será por el término de 5 (cinco) años a partir del 08/08/2013.



1-47-0-11910-17-7  
SD-LD



Display 10 UNI x 100g  
Vista completa




En contacto con el agua...  
Brodifacoum 0,005% p/p  
RATICIDA IDENTIFICADA ÚNICA  
CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA  
VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES  
O EMPRESAS ESPECIALIZADAS  
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y  
ANIMALES CUIDAR DE EMBAJADORAS PROCEDESIBLES  
Y PERRAS Y PASADIZOS

Brodifacoum 0,005% p/p  
RATICIDA IDENTIFICADA ÚNICA  
CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA  
VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES  
O EMPRESAS ESPECIALIZADAS  
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y  
ANIMALES CUIDAR DE EMBAJADORAS PROCEDESIBLES  
Y PERRAS Y PASADIZOS

Brodifacoum 0,005% p/p  
RATICIDA IDENTIFICADA ÚNICA  
CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA  
VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES  
O EMPRESAS ESPECIALIZADAS  
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y  
ANIMALES CUIDAR DE EMBAJADORAS PROCEDESIBLES  
Y PERRAS Y PASADIZOS

Brodifacoum 0,005% p/p  
RATICIDA IDENTIFICADA ÚNICA  
CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA  
VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES  
O EMPRESAS ESPECIALIZADAS  
PROHIBIDA LA VENTA LIBRE  
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y  
ANIMALES CUIDAR DE EMBAJADORAS PROCEDESIBLES  
Y PERRAS Y PASADIZOS


INFORMACIÓN DE CONTACTO



Lic. Adriana C. Tomalino  
Co-Director Técnico  
BINKA S.A.

Lic. Adriana C. Tomalino  
Apoderado  
BINKA S.A.

IF-2017-25016684-APN-DVPS#ANMAT



de producto de forma segura. Utilice siempre guantes durante el manejo.

**Condiciones de almacenamiento:** Guardar el raticida en su envase original y en lugar seguro y fresco, fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas o en período de lactancia y de los animales domésticos. No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos.

**Riesgo ambiental:** Producto tóxico para mamíferos, aves y peces.


**Indicaciones para uso médico:**

PRODUCTO ANTICOAGUANTE ENERGICO DE ACTIVIDAD PROLONGADA. Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición al raticida.

Las medidas en caso de ingestión son el rescate del tóxico (vómito provocado, carbón activado, un purgante salino). El monitoreo del tiempo de protrombina debe realizarse en las primeras 24 horas y reiterarse a las 72 horas. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente. Grupo Químico: Superwarfarina. Nombre común: Brodifacoum. Antídoto: Vitamina K1. La administración y las dosis están determinadas por la evolución clínica. Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad se almacenan en las grasas e hígado, presentan circulación enterohepática y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA.

Teléfonos de emergencia y Centros Toxicológicos: En Argentina: Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 011 4962-6666 y 4962-2247. Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínicas Posadas: 011 4658-7777 y 4654-6648, número gratuito: 0600-333-0160. Hospital de Niños de La Plata: 0221 51-5555. Ecuador: Centro de Control de Venenos (C4) 256-0300. Panamá: CIMET (507) 268-2741. Paraguay: Centro Toxicológico Nacional (021) 204-800/532. Perú: CICOTOX: 0800-1-3040. República Dominicana: CIOI (1809) 562-6601 ext. 1801. Uruguay: CIAT (02) 1722. Venezuela: UCV (212) 605-2586.



1-47-0-11910-17-7  
(0D-41)

Brodifacoum 0,005% p/p

RATICIDA RODENTICIDA DOSIS ÚNICA  
CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES  
O EMPRESAS ESPECIALIZADAS



PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES COLOCAR EN CEBADERAS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS

Display 10 UNI x 100g



Esmeralda 847, piso 16 (C1007AB) Bs. As., Argentina RNE: 010040266  
Tel./ Fax: 4368-6700/01.  
consultatecnica@binka.com.ar.  
Director Técnico: Dr. Eduardo Passeron, MN 4258.  
Servicio de Atención al Consumidor:  
Línea Gratuita 0800-666-1518



Lea atentamente las instrucciones de uso y la correcta dosificación, así como las precauciones generales y advertencias de la etiqueta antes de utilizar el producto.

Contenido Neto: **10g**  
INDUSTRIA ARGENTINA

*[Handwritten signature]*

Lic. Adriana C. Tomalino  
Co-Director Técnico  
BINKA S.A.

IF-2017-25016684-APN-DV-RS-ANMAT  
Lic. Adriana C. Tomalino  
BINKA S.A.

NUEVO!

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

ULTRA PLUS.



Composición:

Brodifacoum \*.....0,005 %p/p  
Benzoato de denatonió.....0,001 %p/p  
Excipientes y atrayentes...esp.....100% p/p  
\*CAS: 56073-10-0

Registrado en: Argentina: ANMAT-DVS, RNPUD: 0250003. Registrado en SENASA-APAG, Certificado: C-948. Para ser utilizado en establecimientos habitados por SENASA, permitiendo su aplicación exclusivamente en los exteriores de los departamentos para la elaboración de productos comestibles, interiores y exteriores de saherías, de departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomedibles y depósitos de comestibles cuando se hallen vacíos.

En Uruguay: Importado y distribuido por BINKA URUGUAY S.A. Reg. MGAP N° 2399. Reg. DIA N° F2 02. Reg. MSP N° 52569. Reg. IMMSPP N° 297. San Fructuoso 1169, Montevideo. Tel. (02) 209-7143. En Bolivia: Importado y distribuido por VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. SENASAG CR-PUV N° 000977/2005. Av. Píraí N° 493, Santa Cruz. Tel. (03) 352-0261. Dir. Téc.: Ernesto Rojas V. En Panamá: Importado y distribuido por DISTRIVET S.A. M.I.D.A Reg. N° RQ-312-08, Juan Díaz calle 1b. Tel. 507-2206821. distribvet@cableonda.net. Dir. Téc.: Dra. Enilda Pinto ID. 728. En Paraguay: Importado por CRESUR S.A. DNS Reg. N° DD183-01-D2. Av. J.F. Bogado 1482 RUC: 80014725-1. ATC (021)333-407. Establecimiento 0100 0096 01 07 12 Tel. de emergencias: (021) 204-908/9 - IPS (021) 209-150. Perú: Autorización Sanitaria N°1972-2015/DEPA/DIGESA/SA; comercializado por YETNOVA S.A., Alameda del Corregidor 2720 Urb. La Capilla-La Molina, Lima, Perú. Tel. 3657625. República Dominicana: Ministerio de Agricultura Certificado N° 3560-55-B. Distribuido por FLEXEMPAQUES S.R.L. Calle 16 de agosto N°1, Los Pepines, Santiago de los Caballeros, Santiago, República Dominicana. Tel (809) 241-3095/233-3222. En Venezuela: Importado por REPRESENTACIONES ADALCA, C.A. Rif: J-30295110-0. Reg. N° Mat-D-III-1432. Tel. (0241) 871-6071 / 7340, Valencia. Asesora Técnica: Dra. Carmen Cavet, CPE.

Lote/Fab/Vio: ver envase.

Display 10 UNI x 100g

UltraPLUS - 50 x 100g cto.



NUEVO!

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

ULTRA PLUS.




Brodifacoum  
0,005% p/p

RATICIDA RODENTICIDA DOSIS ÚNICA  
CEBO EN BLOQUES DE PARAFINA

1-47-0-11910-7-7

Z

(6D-4)



Eficacia del producto: ULTRA@PLUS es un raticida rodenticida elaborado como cebo en granos de cereal, monodésico, de acción anticoagulante y efecto retardado. ULTRA@PLUS no genera sospechas, los primeros roedores mueren a partir de los 3 a 5 días de haberlo comido y lejos de donde fue colocado el veneno.

Es eficaz para el control de roedores tales como: Laucha o ratón doméstico (*Mus musculus*), Rata negra o de los techos (*Rattus rattus*), Rata parda, noruega o de las cloacas (*Rattus norvegicus*).

CUIDADO. PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.

Modo y dosis de aplicación: Realizar una cuidadosa inspección del área infestada y de la vecindad (se pueden observar excrementos de roedores, manchas grasosas, pelos, pisadas) para determinar los lugares de entrada, anidación y alimentación. El cebado para ratón doméstico ó laucha, el radio de acción es limitado, son más difíciles de controlar ya que sus hábitos son erráticos, por lo cual es de suma importancia la exploración previa del área.


Para el control de ratas: colocar la cantidad de 10 a 50 g de cebo en cebaderas colocadas cada 5 metros. Para el control de roedores ó lauchas: colocar la cantidad de bloques equivalente a 80 g de cebo en cebaderas colocadas cada 2 metros.

COLOCAR EL CEBO DENTRO DE CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BLANCO, LAS CUALES DEBEN SER INVOLUCABLES Y PROTEGER EL CEBO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

Revisar periódicamente los sitios de cebado (cada 5 da 7 días) y reponer el cebo consumido hasta que no se evidencien signos de presencia de roedores. El control se logra, en general, luego de 3 a 4 reposiciones. Se aplicará 1,5 kg/ha para ratas y 0,75 kg/ha para ratones y lauchas. Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura. Dado que existe la posibilidad que las superparatubas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser esta la posible fuente de contaminación se recomienda una permanente limpieza del lugar de raticado. Informar a los usuarios de las instalaciones que se está realizando la aplicación del raticida, la formulación y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.

Precauciones generales: En caso de ingestión no provoque el vómito. Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios. No comer, beber ni fumar durante la aplicación. En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o rótulo del producto. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. Mantener el producto en su envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes. Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. Después de aplicar el producto y en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Aplicar en lugares inaccesibles para niños y animales domésticos. No aplicar en conductos de aire o fuentes de ventilación que permitan la liberación del rodenticida al ambiente. Las mujeres embarazadas no pueden manipular el rodenticida. Conservar el lugar raticado en perfectas condiciones de limpieza. Usar guantes, máscara y protección ocular. Producto tóxico para mamíferos, aves y peces. No se debe contaminar los cursos de agua.

Tiempo de reingreso a los lugares desinfestados: no hay consideraciones especiales para reingresar a los lugares raticados con ULTRA@PLUS dadas las características y modo de aplicación del producto. Modo de eliminación: Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos



Lic. Adriana C. Tomalino  
Co-Director Técnico  
BINKA S.A.

Lic. Adriana C. Tomalino  
Apoderado  
BINKA S.A.

Mister / carton blowpacks transparente



**NUEVO!** SUPERWARFARINICO - MONODOSICO

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

**ULTRA PLUS**

1-47-0-11910-17-7

(60-4)




Brodifacoum 0,005% p/p

RATICIDA - RODENTICIDA DOSIS ÚNICA - CEBO EN GRANOS DE CEREAL

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE




MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES  
COLOCAR EN CEBADERAS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS




Lea atentamente las instrucciones de uso y la correcta dosificación, así como las precauciones generales y advertencias de la etiqueta antes de utilizar el producto.

Contenido Neto: **100g**  
CEREBOS Y GRANOS


INDUSTRIA ARGENTINA 84-APPN-DVPS#ANMAT

  
Lic. Adriana C. Tomalino  
Co-Director Técnico  
BINKA S.A.

  
Lic. Adriana C. Tomalino  
Apoderado  
BINKA S.A.



Lista / carton flow pack transparente



El **cebo** del producto **ULTRA PLUS** es un raticida rodenticida elaborado como cebo en granos de cereal, moradillo, de acción anticoagulante y efecto retardado. **ULTRA PLUS** genera suspensas, los mismos roedores mueran a partir de los 3 a 5 días de haberlo comido y lejos de donde fue colocado el veneno.


Es eficaz para el control de roedores tales como: Lancha o ratón doméstico (*Rattus musculus*), Rata negra o de los techos (*Rattus rattus*), Rata parda, noruega o de las cocinas (*Rattus norvegicus*).

**CUIDADO: PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.**

**Modo y área de aplicación:** Realizar una cuidadosa inspección del área infestada y de la vecindad (se pueden observar excrementos de roedores, manchas grasosas, pelcos, pisadas) para determinar los lugares de entrada, anidación y alimentación. El cebado para ratón doméstico ó lancha, el radio de acción es limitado, son más difíciles de controlar ya que sus hábitos son erráticos, por lo cual es de suma importancia la exploración previa del área.

Para el control de ratas colocar la cantidad de 10 a 50 g de cebo en cebaderas colocadas cada 5 metros. Para el control de ratones ó lanchas: colocar la cantidad de bloques equivalente a 10 g de cebo en cebaderas colocadas cada 2 metros.

**COLOCAR EL CEBO DENTRO DE CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BLANCO; LAS CUALES DEBEN SER INVOLUCABLES Y PROTEGER EL CEBO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.**



Revisar y periódicamente los sitios de cebado (cada 5 ó 7 días) y reponer el cebo consumido hasta que no se evidencien signos de presencia de roedores. El control se logra, en general, luego de 3 a 4 reposiciones. Se aplicará 1,5 kg/ha para ratas y 0,75 kg/ha para ratones y lanchas. Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura. Dado que existe la posibilidad que los superparafinas se encuentren en la materia

fecal de los roedores pudiendo ser esta la posible fuente de contaminación se recomienda una permanente limpieza del lugar desratizado. Informar a los usuarios de las instalaciones que se está realizando la aplicación del raticida, la formulación y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.

**Precauciones generales:** En caso de ingestión no provoque el vómito. Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios. No comer, beber ni fumar durante la aplicación. En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o rótulo del producto. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.** Mantener el producto en su envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes. Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. Después de aplicar el producto y en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Aplicar en lugares inaccesibles para niños y animales domésticos. No aplicar en conductos de aire o fuentes de ventilación que posibiliten la liberación del rodenticida al ambiente. Las mujeres embarazadas no pueden manipular el rodenticida. Conservar el lugar desratizado en perfectas condiciones de limpieza. Usar guantes, máscara y protección ocular. Producto tóxico para mamíferos, aves y peces. No se debe contaminar los cursos de agua.

Tiempo de reingreso a los lugares desratizados: no hay consideraciones especiales para reingresar a los lugares tratados con **ULTRA PLUS** dadas las características y modo de aplicación del producto.

**Modo de eliminación:** Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura. Utilice siempre guantes durante el manejo.

**Condiciones de almacenamiento:** Guardar el raticida en su envase original y en lugar seguro y fresco, fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas o un período de lactancia y de los animales domésticos. No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos.

**Riesgo ambiental:** Producto tóxico para mamíferos, aves y peces.

**Indicaciones para una mujer:**

1-47-0-11910-177

60-0

**PRODUCTO ANTICOAGULANTE ENERGICO DE ACTIVIDAD PROLONGADA.** Las superparafinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de pro trombina, con una duración de hasta meses después de una exposición al raticida. Las medidas en caso de ingestión son el reposo del tóxico (vómito provocado, carbón activado, un purgante salino). El monitoreo del tiempo de pro trombina debe realizarse en las primeras 24 horas y referirse a las 72 horas. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente. Grupo Químico: Superparafina. Nombre común: Brodifacoum. Antídoto: Vitamina K1. La administración y las dosis están determinadas por la evolución clínica. Las superparafinas presentan una elevada liposolubilidad, se almacenan en las grasas e hígado, presentan circulación enterohepática y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA.**

Telefonos de emergencia y Centros Toxicológicos: En Argentina: Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 011 4962-6666 y 4962-2247. Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínica Posadas: 011 4658-7777 y 4654-6648; número gratuito: 0800-333-0160. Hospital de Niños de La Plata: 0221 51-5555. Ecuador: Centro de Control de Venenos (04) 256-0300. Panamá: CIMET (507) 269-2741. Paraguay: Centro Toxicológico Nacional (021) 204-800/532. Perú: CICOTOX: 0800-1-3040. República Dominicana: CEN (1809) 562-6601 ext. 1801. Uruguay: CIAF (02) 1722. Venezuela: UCV (212) 605-2586.

**Composición:**

- Brodifacoum ..... 0,005 %p/p
- Benzato de denatrola ..... 0,081 %p/p
- Excipientes y abarantizantes ..... 100% p/p

\*CAS: 56073-10-0

Registrado en Argentina: ANMAT-INS, TMPLUD: 0250003. Registrado en SENASA-APAC, Certificado: C-948. Para ser utilizado en establecimientos habitados por SENASA, permitiendo su aplicación exclusivamente en los exteriores de los departamentos para la elaboración de productos comestibles, interiores y exteriores de volarías, de departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomedibles y depósitos de comestibles cuando se hallen vacíos. En Uruguay: Importado y distribuido por BINKA URBURUY S.A. Reg. MGAP N° 2398. Reg. CIA N° F2 02. Reg. MSP N° 52549. Reg. INDISSP N° 297. San Francisco 1169, Montevideo. Tel. (02) 209-7143. En Bolivia: Importado y distribuido por VETEROLÓGICA BOLIVIANA S.R.L. SENASA CR-PUN N° 000877/2005. Av. Pira N° 493, Santa Cruz. Tel. (03) 352-0261. Dr. Tito: Ernesto Rojas V. En Panamá: Importado y distribuido por DISTPNET S.A. NADA A Reg. N° RD-312-08. Juan Díaz calle 1b, Tel. 507-2205421. distribuidor@distpnet.net. Of. Tico: Dra. Enda Piro R. 228. En Paraguay: Importado por CRESUR S.A. DRVS Reg. N° 06183-01-02. Av. J.F. Burgalo 1482 PUC. MOU 4725-1. AIC (021)333-407 Establecimiento 0160 0086 01 07 12 del de emergencias: (021) 204-8004 - IPS (021) 205-150. Perú: Autorización Sanitaria N°1472-20150EPN/DIRSASA: comercializado por VETINORA S.A., Alameda del Corregidor 2720 Urb. La Capilla-La Médica, Lima, Perú. Tel. 3657525. República Dominicana: Ministerio de Agricultura Certificado N° 3560-65-B. Distribuido por FLEXEMPAQUES S.R.L. Calle 16 de agosto N°1, Las Peñas, Santiago de los Caballeros, Santiago, República Dominicana. Tel (809) 241-3095/233-3222. En Venezuela: Importado por REPRESENTACIONES ADALCA, C.A. RIE J-30285110-0. Reg. N° Ind-0-B-1432. Tel. (0241) 671-6071 / 7340, Valencia. Asesor Técnico Dra. Carmen Cora, CPE.

**BINKA** Comercial 047, piso 16 (C100748) Bv. Av., Argentina PNE 010044 256  
Tel. Fax 4964-4700/01. correo@binkaconsumo.com.ar  
Director Técnico: Dr. Eduardo Pizarro, MII 4254.  
Servicio de Atención al Consumidor: Línea gratuita 0800-660-1518


Logo/Foto/Vita:



Lic. Adriana C. Tomalino  
Co-Director Técnico  
BINKA S.A.

Lic. Adriana C. Tomalino  
Aporado  
BINKA S.A.

Estrella x 1 kg Mista completa



**NUEVO!**

**ULTRA PLUS**

**Brodifacoum 0,005% p/p**

VENTA RESTRICTA A INSTALACIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

ATENCIÓN: REQUIEREN CERRAJE Y CERRILLO EN CASOS DE CERRAJE

**BINKA**

COMERCIO INTERNACIONAL S.A.

AV. Libertador 1000 Montevideo, Uruguay

Tel: (514) 4111111

Fax: (514) 4111111

www.binka.com.uy

**NUEVO!** SUPERHARRISCO SIMBOLISTICO

HA HUIDO UN ATIPICAH PROHIBICIONARIO

**ULTRA PLUS**

**Brodifacoum 0,005% p/p**

ATENCIÓN: REQUIEREN CERRAJE Y CERRILLO EN CASOS DE CERRAJE

VENTA RESTRICTA A INSTALACIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

**COMERCIO INTERNACIONAL S.A.**

AV. LIBERTADOR 1000 MONTEVIDEO, URUGUAY

Tel: (514) 4111111

Fax: (514) 4111111

www.binka.com.uy

**NUEVO!**

**ULTRA PLUS**

**Brodifacoum 0,005% p/p**

VENTA RESTRICTA A INSTALACIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

ATENCIÓN: REQUIEREN CERRAJE Y CERRILLO EN CASOS DE CERRAJE

**BINKA**

COMERCIO INTERNACIONAL S.A.

AV. Libertador 1000 Montevideo, Uruguay

Tel: (514) 4111111

Fax: (514) 4111111

www.binka.com.uy

**NUEVO!**

**ULTRA PLUS**

**Brodifacoum 0,005% p/p**

VENTA RESTRICTA A INSTALACIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

ATENCIÓN: REQUIEREN CERRAJE Y CERRILLO EN CASOS DE CERRAJE

**BINKA**

COMERCIO INTERNACIONAL S.A.

AV. Libertador 1000 Montevideo, Uruguay

Tel: (514) 4111111

Fax: (514) 4111111

www.binka.com.uy

1-47-C-11910-17-2  
6D-1D

Lic. Adriana C. Tomalino  
Co-Director Técnico  
BINKA S.A.

IF-2017-2501684-APN-DVPS/AMAT  
Aporado  
BINKA S.A.

ANMAT  
FOLIO  
12  
BENEF

1-47-0-11910-17


Estuche de 1 Kg

60-60

**NUEVO!**  
RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA  
**ULTRA PLUS**

Brodifacoum  
0,005% p/p

RATICIDA- RODENTICIDA DOSIS ÚNICA  
CEBO EN GRANOS DE CEREAL



**NUEVO!**  
**ULTRA PLUS**



Eficacia del producto: ULTRA PLUS es un raticida rodenticida elaborado como cebo en granos de cereal, monodosis, de acción anticoagulante y efecto retardado. ULTRA PLUS no genera sospechas, los primeros roedores mueren a partir de los 3 a 5 días de haberlo comido y lejos de donde fue colocado el veneno. Es eficaz para el control de roedores tales como: Lancha o ratón doméstico (*Rattus musculus*), Rata negra o de los techos (*Rattus rattus*), Rata parda, noruega o de las cloacas (*Rattus norvegicus*).

**CUIDADO. PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.**  
Modo y dosis de aplicación: Realizar una cuidadosa inspección del área infestada y de la vecindad (se pueden observar excrementos de roedores, manchas grasosas, pelusa, pisadas) para determinar los lugares de entrada, anidación y alimentación. El cebo para ratón doméstico ó lancha, el ratón de acción es limitado, son más difíciles de controlar ya que sus hábitos son erráticos, por lo cual es de suma importancia la exploración previa del área.


Para el control de ratas: colocar la cantidad de 10 a 50 g de cebo en cebaderos colocados cada 5 metros. Para el control de ratones ó lanchas: colocar la cantidad de bloques equivalente a 80 g de cebo en cebaderos colocados cada 2 metros.

**COLOCAR EL CEBO DENTRO DE CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BLANCO, LAS CUALES DEBEN SER INVOLABLES Y DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES AMBIENTALES.**

Revisar periódicamente los sitios de cebo (cada 5 a 7 días) y reponer el cebo consumido hasta que no se evidencien signos de presencia de roedores. El control se logra, en general, luego de 3 a 4 repeticiones. Se aplicará 1,5 kg/ha para ratas y 0,75 kg/ha para ratones y lanchas. Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura. Dado que existe la posibilidad que las superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser esta la posible fuente de contaminación se recomienda una permanente limpieza del lugar desratizado. Informar a los usuarios de las instalaciones que se está realizando la aplicación del raticida, la formulación y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.

**Precauciones generales:** En caso de ingestión no provoque el vómito. Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios. No comer, beber ni fumar durante la aplicación. En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o rótulo del producto.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.**



Mantener el producto en su envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes. Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. Después de aplicar el producto y en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Aplicar en lugares inaccesibles para niños y animales domésticos. No aplicar en conductos de aire o fuentes de ventilación que posibiliten la liberación del raticida al ambiente. Las mujeres embarazadas no pueden manipular el rodenticida. Conservar el lugar desratizado en perfectas condiciones de limpieza. Usar guantes, máscara y protección ocular. Producto tóxico para mamíferos, aves y peces. No se debe contaminar los cursos de agua. Tiempo de reingreso a los lugares desratizados: no hay consideraciones especiales para reingresar a los lugares tratados con ULTRA PLUS de las características y modo de aplicación del producto. Modo de eliminación: Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura. Usar siempre guantes durante el manejo.

**Condiciones de almacenamiento:** Guardar el raticida en su envase original y en lugar seguro y fresco, fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas o en período de lactancia y de los animales domésticos. No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos.

**Riesgo ambiental:** Producto tóxico para mamíferos, aves y peces.

**Indicaciones para uso médico:**


**PRODUCTO ANTICOAGULANTE ENERGICO DE ACTIVIDAD PROLONGADA.** Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición al raticida. Las medidas en caso de ingestión son el rescate del tóxico (vómito provocado, carbon activado, un purgante salino). El monitoreo del tiempo de protrombina debe realizarse en las primeras 24 horas y reiterarse a las 72 horas. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.

Grupo Químico: Superwarfarina. Nombre común: Brodifacoum.

Antídoto: Vitamina K1. La administración y las dosis están determinadas por la evolución clínica. Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad, se almacenan en las grasas e hígado, presentan circulación enterohepática y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN AGUDA IR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA.**

Teléfonos de emergencia y Centros Toxicológicos. En Argentina: Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 011 4962-6666 y 4962-2247. Centro Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas: 011 4658-7777 y 4654-6646; número gratuito: 0800-333-0160. Hospital de Niños de La Plata: 0221 51-5555. Ecuador: Centro de Control de Venenos (04) 256-0308. Panamá: GIMET (507) 269-2741. Paraguay: Centro Toxicológico Nacional (021) 204-800/532. Pinar: CICOTOX: 0800-1-3040. República Dominicana: CIDI (1808) 562-6601 ext. 1801. Uruguay: CIAT (02) 1722. Venezuela: UCV (212) 605-2586.



*Lic. Adriana C. Tomalino*  
Lic. Adriana C. Tomalino  
Co-Director Técnico  
BINKA S.A.

*Lic. Adriana C. Tomalino*  
Lic. Adriana C. Tomalino  
Apodada ANMAT  
BINKA S.A.

FOLIO 13  
MESA DE ENTABLAS

Estuche x 1 Kg

1-47-C-11910-17-7  
(20-10)

**NUEVO!** SUPERWARFARINICO - MONODOSICO

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

**ULTRA PLUS**

Brodifacoum  
0,005% p/p

RATICIDA-RODENTICIDA DOSIS ÚNICA  
CEBO EN GRANOS DE CEREAL

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES  
O EMPRESAS ESPECIALIZADAS



**NUEVO!**

**ULTRA PLUS**



Composición:  
Brodifacoum ..... 0,005 %p/p  
Benzoato de denatolico ..... 0,001 %p/p  
Excipientes y atrayentes ..... 100% p/p  
\*CAS: 56073-10-0

Registrado en Argentina: ANMAT-DVS. RNPUD: 0250003. Registrado en SENASA-APAC. Certificado C-948. Para ser utilizado en establecimientos habilitados por SENASA, permitiendo su aplicación exclusivamente en los exteriores de los departamentos para la elaboración de productos comestibles. Interiores y exteriores de seberías, de departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomedibles y depósitos de comestibles cuando se hallen vacíos.  
En Uruguay: importado y distribuido por BINKA URUGUAY S.A. Reg. MGAP N° 2389 Reg. DIA N° FZ 02. Reg. MSP N° 52569. Reg. IMSSSP N° 297. San Fructuoso 1369. Montevideo. Tel. (92) 209-7143. En Bolivia: importado y distribuido por VETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. SENASAG CR-PUV N° 000977/2005. Av. Piraí N° 493. Santa Cruz. Tel. (03) 352-0261. Dir. Téc.: Ernesto Rojas V. En Panamá: importado y distribuido por DISTRINET S.A. M.I.D.A. Reg. N° RO-312-08. Juan Díaz calle 1b. Tel. 507-2205821. distribut@cableonda.net. Dir. Téc.: Dra. Enika Pinto ID. 728. En Paraguay: importado por CRESUR S.A. DHSV Reg. N° 00183-01-02. Av. J.F. Bogado 1482 RUC: 80014725-1. ATC (021)393-407. Establecimiento 0180 0096 01 07 12 Tel. de emergencias: (021) 204-908/9 - PS (021) 209-150. Perú: Autorización Sanitaria N°1972-2015/DEPA/DIGESA/SA; comercializado por VETNOVA S.A. Alameda del Corregidor 2720 Urb. La Capilla-La Molina, Lima. Perú. Tel. 3657625. República Dominicana: Ministerio de Agricultura Certificado N° 3560-55-B. Distribuido por FLEXEMPOQUES S.R.L. Calle 16 de agosto N°1, Los Peperes. Santiago de los Caballeros, Santiago, República Dominicana. Tel. (809) 241-3085/233-3222. En Venezuela: importado por REPRESENTADORA ADALCA, C.A. RIF: J-30295110-0. Reg. IP Mat-D-81-1432. Tel. (0241) 871- 6071 / 7340. Valencia. Asesora Técnica: Dra. Carmen Cavet, CPE...



PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES COLOCAR EN CEBADERAS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS



Lea atentamente las instrucciones de uso, las precauciones generales y advertencias del rótulo antes de utilizar el producto.

Contenido Neto: **1Kg**  
CEBOS EN GRANOS  
INDUSTRIA ARGENTINA



Esmeralda 847, piso 16 (C1007AB) Bs. As.  
Argentina RNE: 010040266  
Tel./ Fax: 4368-6700/01.  
consultatecnica@binka.com.ar

Nota/Fab/Vic:

UltraPLUS - 1KG



Director Técnico: Dr. Eduardo Passeron, MN 4258.  
Servicio de Atención al Consumidor:  
Línea Gratuita 0800-658-1518


Lic. Adriana C. Tomalino  
Co-Director Técnico  
BINKA S.A.

Lic. Adriana C. Tomalino  
Apoderado  
BINKA S.A.  
IF-2017-25016684-APN-DVPS#ANMAT



Etiqueta balde x 1kg

**NUEVO!** SUPERWARFARINICO - MONODOSICO  
 RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA  
**ULTRA PLUS**



PRODUCTO ANTICOAGULANTE ENERGICO DE ACTIVIDAD PROLONGADA. Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición al raticida. Las medidas en caso de ingestión son el recorte del tórax (punto provocado, corazón activado, un purgante salino). El monitoreo del tiempo de protrombina debe realizarse en las primeras 24 horas y repetirse a las 72 horas. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente. Grupo Químico Superwarfarina, Nombre comercial: Brodifacoum, A.R. Rodar, Vitarana KI. La administración y las dosis serán determinadas por la evolución clínica. Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad, se almacenan en las grasas e hígado, presentan circulación antemembrana y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada. EN CASO DE INTOXICACION ADQUIERIR INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y LLAMAR A LOS TELEFONOS DE CONSULTA TOXICOLOGICA. Teléfonos de emergencia y Centros Toxicológicos: En Argentina: Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 011 4962-6996 y 4962-2247, Centro Nacional de Intoxicaciones Psiquiátrico Posadas: 011 4659-7777 y 4664-6642, Rosario: 0340-333-0180, Hospital de Niños de La Plata: 0221 51-5555, Ecuador: Centro de Intoxicaciones: 094-256-0300, Panamá: OMET (507) 269-2741, Paraguay: Centro Toxicológico Nacional (021) 204-8030532, Perú: CICOTEC: 0600-1-3040, República Dominicana: CIDN (1809) 562-6661, ext. 1807, Uruguay: CIAT (02) 1722, Venezuela: UCV (212) 605-2586.

**¡CUIDADO! ¡VENENO!**  
 Lea atentamente las instrucciones de uso y la correcta dosificación, así como las precauciones generales y advertencias de la etiqueta antes de utilizar el producto.

**¡NO PEREZA EN CASAR!**  
 Industria Argentina

Brodifacoum 0,005% p/p

RATICIDA - RODENTICIDA DOSIS ÚNICA  
 CEBOS EN GRANOS DE CEREAL

VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES  
 O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE


¡MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES! COLECTAR EN  
 CONTENEDORES IMPERMEABLES PARA NIÑOS Y Mascotas

Contenido Neto: **1kg**  
 INDUSTRIA ARGENTINA


Lic. Adriana C. Tomalino  
 Co-Director Técnico  
 BINKA S.A.

Lic. Adriana C. Tomalino  
 Apoderado  
 BINKA S.A.  
 IF-2017-25016684-APN-DVPS#ANMAT

1-97-0-11910-177  
 605-110








**ESTR**

El Ultra Plus es un medicamento que actúa sobre el sistema nervioso central, produciendo un efecto sedante y relajante. Es indicado para el tratamiento de la ansiedad, el estrés y los trastornos del sueño. Su acción es rápida y de corta duración, permitiendo un uso seguro y eficaz. El Ultra Plus está disponible en varias presentaciones, adaptadas a las necesidades de cada paciente. Consulte siempre a su médico para el uso adecuado de este medicamento.

**ESTR**

El Ultra Plus es un medicamento que actúa sobre el sistema nervioso central, produciendo un efecto sedante y relajante. Es indicado para el tratamiento de la ansiedad, el estrés y los trastornos del sueño. Su acción es rápida y de corta duración, permitiendo un uso seguro y eficaz. El Ultra Plus está disponible en varias presentaciones, adaptadas a las necesidades de cada paciente. Consulte siempre a su médico para el uso adecuado de este medicamento.

Display bolsa x rosp



Lic. Adriana C. Tomalino  
Co-Director Técnico  
BINKA S.A.

IF-2017-25016884-LP-ADVP-ANMAT

Apoderado  
BINKA S.A.



NUEVO!

RÁPIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

# ULTRA PLUS



Composición:  
 Brodifacoum ..... 0,005 %p/p  
 Benzato de denatrinio ..... 0,001 %p/p  
 Excipientes y atrayentes ..... 99,994 %p/p  
 \*CAS: 56073-10-0


Registrado en: **Argentina:** ANMAT-DYS, RNPUD: 0250003. Registrado en SENASA-APAC. Certificado: C-948. Para ser utilizado en establecimientos habitados por SENASA, permitiendo su aplicación exclusivamente en los exteriores de los departamentos para la elaboración de productos comestibles, interiores y exteriores de barberías, de departamentos para la elaboración de productos y subproductos inorgánicos y depósitos de comestibles cuando se hallen vacíos.  
**En Uruguay:** Importado y distribuido por BINKA URUGUAY S.A. Reg. MGAP N° 2399. Reg. DIA N° FZ 02. Reg. MSP N° 52209. Reg. INIA N° 297. San Fructuoso 1169, Montevideo. Tel. (02) 209-7143. **En Bolivia:** Importado y distribuido por YETERQUIMICA BOLIVIANA S.R.L. SENASAG RGR-PIV N° 000577/2005. Av. Píraí N° 493, Santa Cruz. Tel. (03) 352-0261. Dir. Téc.: Ernesto Rojas V. **En Panamá:** Importado y distribuido por DISTRIVET S.A. M.J.D.A Reg. N° RD-312-08. Juan Díaz calle 1b, Tel. 507-2205821. distribvet@cablonde.com. Dir. Téc.: Dra. Enida Pinto ID. 728. **En Paraguay:** Importado por CRESUR S.A. DMS Reg. N° 00183-01-D2. Av. J.F. Bogado 1482 RUC: 80014725-1. ATC (021)333-407. Establecimiento: 0100 0096 01 07 12 Tel. de emergencias: (021) 204-908/9 - IPS (021) 209-150. Permis. Autorización Sanitaria 011972-2015/01EVA/DIGESA/SA; comercializado por VETNOVA S.A., Alameda del Corregidor 2720 Urb. La Capilla-La Molina, Lima, Perú. Tel. 057625. **República Dominicana:** Ministerio de Agricultura Certificado N° 3560-55-B. Distribuido por FLEXEMPAQUES S.R.L. Calle 16 de Agosto N°1, Los Esbores, Santiago de los Caballeros, Santiago, República Dominicana. Tel (809) 241-3095/233-3222. **En Venezuela:** Importado por REPRESENTACIONES ADALCA, C.A. Rif: J-30295110-0. Reg. N° Mat-D-II-1432. Tel. (0241) 871- 6071 / 7340, Valencia. Asesora Técnica: Dra. Carmen Cavett.

### Indicaciones para uso médico:

**PRODUCTO ANTICOAGULANTE ENÉRGICO DE ACTIVIDAD PROLONGADA.** Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición al ratón.  
 Las medidas en caso de ingestión son el rescate del tóxico (vómito provocado, carbón activado, un purgante salino). El monitoreo del tiempo de protrombina debe realizarse en las primeras 24 horas y reiterarse a las 72 horas. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.  
 Grupo Químico: Superwarfarina. Nombre común: Brodifacoum.  
 Antídoto: Vitamina K1. La administración y las dosis están determinadas por la evolución clínica. Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad, se almacenan en las grasas e hígado, presentan circulación enterohepática, y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.  
**EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA.**  
 Teléfonos de emergencia y Centros Toxicológicos: **En Argentina:** Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 011 4862-6666 y 4862-2247; Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas: 011 4658-7777 y 4654-6648; número gratuito: 0600-333-0160. Hospital de Niños de La Plata: 0221 51-5555. **Ecuador:** Centro de Control de Venenos (04) 256-0300. **Panamá:** CIMET (507) 269-2741. **Paraguay:** Centro Toxicológico Nacional (021) 204-830/532. **Perú:** CICOTOX: 0800-1-3040. **República Dominicana:** CDI (1809) 562-6601 ext. 1801. **Uruguay:** CIAT (02) 1722. **Venezuela:** UCV (212) 605-2686.

**Eficacia del producto:** ULTRA@PLUS es un ratóna rodenticida elaborado como cebo en granos de cereal, monoobésico, de acción anticoagulante y efecto retardado. ULTRA@PLUS no genera sospechas, los primeros roedores mueren a partir de los 3 a 5 días de haberlo comido y lejos de donde fue colocado el veneno.  
**Es eficaz para el control de roedores tales como:** Laucha o ratón doméstico (*Rattus muscalus*). Rata negra o de los techos (*Rattus rattus*). Rata parda, nonaga o de las cloacas (*Rattus norvegicus*).  
**CUIDADO. PELIGROSA SU INGESTIÓN, DIFAMACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.**  
**Modo y dosis de aplicación:** Realizar una cuidadosa inspección del área infestada y de la vecindad (se pueden observar excrementos de roedores, manchas grasosas, pelos, pisadas) para determinar los lugares de entrada, anidación y alimentación. El cebado para ratón doméstico ó laucha, el radio de acción es limitado, son más difíciles de controlar ya que sus hábitos son erráticos, por lo cual es de suma importancia la exploración previa del área.

**Para el control de ratas:** colocar la cantidad de 10 a 50 g de cebo en cebaderas colocadas cada 5 metros. **Para el control de ratones ó lauchas:** colocar la cantidad de bloques equivalente a 80 g de cebo en cebaderas colocadas cada 2 metros.



**COLOCAR EL CEBO DENTRO DE CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BLANCO, LAS CUALES DEBEN SER INVOLUCABLES Y PROTEGER EL CEBO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.**

Revisar periódicamente los sitios de cebado (cada 5 da-7 días) y reponer el cebo consumido hasta que no se evidencien signos de presencia de roedores. El control se logra, en general, luego de 3 a 4 reposiciones. Se aplicará 1,5 kg/ha para ratas y 0,75 kg/ha para ratones y lauchas. Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura. Dado que existe la posibilidad que las superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser esta, la posible fuente de contaminación se recomienda una permanente limpieza del lugar desratizado. Informar a los usuarios de las instalaciones que se está realizando la aplicación del ratóna, la formulación y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.

**Precauciones generales:** En caso de ingestión no provoque el vómito. Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios. No comer, beber ni fumar durante la aplicación. En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase original. **MANEJAR FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.** Mantener el producto en su envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado.

Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes. Durante la manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. Después de aplicar el producto y en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Aplicar en lugares inaccesibles para niños y animales domésticos. No aplicar en conductos de aire o fuentes de ventilación que posibiliten la liberación del rodenticida al ambiente. Las mujeres embarazadas no pueden manipular el rodenticida. Conservar el agua desratizada en perfectas condiciones de limpieza. Usar guantes, máscara y protección ocular. Producto tóxico para mamíferos, aves y peces. No se debe contaminar los cursos de agua.

Tiempo de reintegro a los lugares desinfestados: no hay consideraciones especiales para reintegrar a los lugares tratados con ULTRA@PLUS dadas las características y modo de aplicación del producto. Modo de eliminación: Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura. Utilice siempre guantes durante el manipuleo.

**Condiciones de almacenamiento:** Guardar el ratóna en su envase original y en lugar seguro y fresco, fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y de los animales domésticos. No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos.

**Riesgo ambiental:** Producto tóxico para mamíferos, aves y peces.





Lote/Fab/Vto:

**BINKA**  
 Esmeralda 847, piso 16 (C1007AB), Bs. As., Argentina RNE: 010040266  
 Tel / Fax: 4388-6700/01, consulta tecnica@binka.com.ar.  
 Director Técnico: Dr. Eduardo Passeron, MH 4258.  
 Servicio de Atención al Consumidor: Línea Gratuita 0800-666-1518

Lic. Adriana C. Tomalino  
 Apoderado  
 BINKA S.A.  
 Lic. Adriana C. Tomalino  
 Co-Director Técnico  
 BINKA S.A.

display holse x100f





Bolsa x 25  
Brodifacoum 0,005% p/p

**NUEVO!** SUPERWARFARINICO - MORFOLOGICO

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

# ULTRA PLUS



RATICIDA - RODENTICIDA DOSIS ÚNICA  
CEBO EN GRANOS DE CEREALES

VENTA RESTRINGIDA A  
INSTITUCIONES O EMPRESAS  
ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA  
VENTA LIBRE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES  
COLOCAR EN CEBADERAS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS

Eficacia del producto ULTRA PLUS es un raticida rodenticida elaborado sobre base de granos de cereal, morfológico, de acción entoxicante y efecto retardado. ULTRA PLUS no genera resistencia, las primeras ratas mueren a partir de los 3 a 5 días de hecho cuando y luego de otros los cadáveres se ven.

Es eficaz para el control de roedores tales como: Linceo y ratón doméstico (Rattus norvegicus), rata negra y de las techas (Rattus rattus) Pato, ratón, ratón de las charcas (Rattus norvegicus).

**CUIDADO. PELIGROSA SU INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.**

Modo y modo de aplicación: Realizar una cuidadosa inspección del área infestada y de la roedores (se pueden observar excrementos de roedores, excrementos grises, pedos, placentas) para determinar los lugares de entrada, salida y alimentación. El cebado para ratición doméstico (R. norvegicus), el ratón de acción es limitado, son más difíciles de controlar ya que sus hábitos son erráticos, por lo cual es de suma importancia la captación previa del área.

Para el control de ratos colocar la cantidad de 10 a 50 g de cebos en colonetas colocadas cada 2 metros. Para el control de ratones a lugares colocar la cantidad de bloques equivalente a 80 g de cebos en colonetas colocadas cada 2 metros.

**COLOCAR EL CEBO DENTRO DE CEBADERAS DE OFICIO. ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO ELANZO. LAS MUJERES DEBEN USAR PPE, GUALES Y PROTEGER EL CEBO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.**

Revisar periódicamente los cebos de cebado (cada 5 a 7 días) y reponer de ceba consumido hasta que no se evidencie signos de presencia de roedores. El control se logra, en general, luego de 3 a 4 aplicaciones. Se aplican 1.5 litros para ratos y 4,75 litros para ratones y linceos. Cerrar y enterrar los recipientes y eliminar los restos de producto de forma segura. Cuidado que existe la posibilidad que las esparcidas en el exterior de los recipientes puedan ser ingeridas por los animales de la zona, por lo cual es de suma importancia la limpieza del lugar infestado. Informar a las autoridades de las infestaciones que se está realizando la aplicación del raticida, la fumigación y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.

**Precauciones generales:** En caso de ingestión no provocar el vómito. Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. No aplicar sobre las alfombras, alfombras de cuadros, plantas y mascotas. No comer, beber ni fumar durante la aplicación. En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones y Servicio de Salud, nearest al emisor y remitido del producto. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.** Mantener el producto en su empaque original. No volver a utilizar las mismas vasijas. En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a un lugar ventilado. Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes. Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. Después de aplicar el producto y en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Aplicar en lugares frecuentados por ratos y ratones domésticos. No aplicar en ambientes de alto tránsito de personas que permitan la liberación del raticida al ambiente. Las ratas y ratones no pueden desarrollar resistencia. Conservar el lugar desinfectado en perfectas condiciones de limpieza. Usar guantes, mascarilla y protección ocular. Producto tóxico para caracoles, aves y peces. No se debe contaminar los cursos de agua.

Tiempo de retiro: a los lugares desinfectados: no hay consideraciones especiales para restringir a los lugares infestados con ULTRA PLUS debido a las características y modo de aplicación del producto. Modo de eliminación: Cerrar y enterrar los recipientes y eliminar los restos de producto de forma segura. Utilizar siempre guantes durante el manejo. Condiciones de almacenamiento: Guardar el raticida en su empaque original y en lugar seco y fresco, fuera

del alcance de los niños, mujeres embarazadas o en período de lactancia y de los animales domésticos. No transportar ni almacenar con alimentos ni medicinas.

**Uso ambiental:** Producto tóxico para mariposas, aves y peces.

**Indicaciones para uso, ratición:**

**PRODUCTO ANTIOXIDANTE EMERGENCIA DE ACTIVIDAD PROLONGADA.** Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina, con una duración de hasta meses, después de una exposición al raticida. Los síntomas en caso de intoxicación son el resaca del hígado (ictericia), carboxi hemoglobina, carboxi sulfato, un purpura salmógeno. El monitoreo del tiempo de protrombina (pro. Tm), que en las primeras 24 horas y referirse a las 72 horas. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el diagnóstico y el tratamiento del paciente.

Grupo Químico: Superwarfarina. Nombre común: Brodifacoum. Antídoto: Vitamina K1. La administración y las dosis están determinadas por la evolución clínica. Las superwarfarinas presentan una elevada toxicidad, se almacenan en los grasas e hígado, presentan excreción enterohepática y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN AGUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA.**  
Centros de emergencia y Centros Toxicológicos: En Argentina: Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 011 4962-6666 y 4962-2247. Centro Nacional de Intoxicaciones Pédicas Posadas: 011 4650-7777 y 4654-6643; número gratuito: 0800-333-0100. Hospital de Niños de La Plata: 0221 51-5655. Ecuador: Centro de Control de Venenos (CCV) 256-0300. Panamá: CINET (507) 269-2741. Paraguay: Centro Toxicológico Nacional (CTN) 204-800532. Perú: COCOTOC (01) 600-1-3040. República Dominicana: CCI (1809) 562-6601 ext. 1801. Uruguay: CIAJ (02) 1722. Venezuela: UCV (212) 605-2866.

Composición:

Brodifacoum	0,005 %p/p
Benzoato de donato	0,001 %p/p
Excipientes y adyuvantes	100% p/p

\*CAS: 56073-10-3

Registrado en: Argentina: ANMAT-DNS, RPPLD: 022003. Registrado en SENASA-PRC. Certificado: C-948. Para su utilización en establecimientos habilitados por SENASA, permitiendo su aplicación exclusivamente en los edificios de los departamentos para la elaboración de productos comestibles, helados y elaborados de pastelería, de departamentos para la elaboración de productos y subproductos inestables y derivados de carne/carnes se halla excluido. En Uruguay: Importado y distribuido por BINKA URUGUAY S.A. Reg. MGAP Nº 2393. Reg. CIA Nº F2 02. Reg. MSP Nº 52563. Reg. INMESP Nº 287. San Francisco 1189, Montevideo. Tel. (02) 209-7143. En Bolivia: Importado y distribuido por VETEROQUÍMICA BOLIVIANA S.R.L. SENASAG CR-PUN Nº 000377/2005. Av. Píru Nº 493, Santa Cruz, Tel. (03) 2-0261. Dic. Té.: En tests: Sujan V. En Panamá: Importado y distribuido por ESTIMAT S.A. M.L.D.A. Reg. Nº RQ-312-08. Juan Díaz calle 11, Tel. 507-2205821. desinfectado. Dic. Té.: Dra. Enlace Píru tel. 728. En Paraguay: Importado por CREBIR S.A. DNSP Reg. Nº 00163-01-02. Av. J.F. Bogado 1402 RUC: 80014725-LATC (021)333-407 Establecimiento 0100 0036 01 07 12 Tel. de emergencia: (021) 204-9089 - IP: (02) 209-150. Perú: Autorización Sanitaria Nº 1872-2015/DEPARTAMENTO SENASA; comercializado por VETINORA S.A., Alameda del Corregidor y 27 10 Urb. La Capilla-La Mitina, Lima, Perú. Tel. 3657625. República Dominicana: Ministerio de Agricultura Certificado Nº 3560 - S-4. Distribuido por FLEXEMPROLES S.R.L. Calle 16 de agosto Nº 1, Los Peñones, Santiago de los Caballeros, Santiago, República Dominicana. Tel. (809) 241-3065/23-3222. En Venezuela: Importado por REPRESENTACIONES ADMIDA, C.A. Píru: J-30285110-0. Reg. I. No. 0-4-1432. Tel. (0241) 071-6871 / 7343. Valencia. Asesor Técnico Dra. Carmen Caved, OFE.

**BINKA** Esmeralda 847, piso 16 (C1007AB) Bs. As., Argentina FONE: 011 6040266  
Tel./ Fax: 4368-6700/01, consultatecnica@binka.com.ar.

Director Técnico: Dr. Eduardo Passaron, MN 4258.  
Servicio de Atención al Consumidor:  
Línea Gratuita 0800-668-1518

Contenido Neto: **25kg** sube en kilos


Lic. Adriana C. Tomalino  
Co-Director Técnico INDUSTRIA ARGENTINA  
BINKA S.A.



Lea atentamente las instrucciones de uso, las precauciones generales y advertencias del rótulo antes de utilizar el producto.







Sobre x 50 p. do 180

1-47-0-11410-17-7

(50) - (4)

ULTRAPLUS es un radiolítico obtenido a base de calcio en granos de coral, recalcados, de acción antiostragmática. Es eficaz para el control de resacas tales como: Lactia o rabiis distribuidas (flora oscura). Para resaca o de las lactias (flora oscura). Para resaca, o de las lactias (flora oscura).

Modo de aplicación:

Para el control de resaca colocar la cantidad de 10 a 50 g de cuba en cubetas colocadas cada 6 metros.

Para el control de resaca o lactias colocar la cantidad de 10 metros espacados a 60 g de cuba en cubetas colocadas cada 2 metros. COLOCAR EL CERO DENTRO DE CERRAMERAS DE CERIL. ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS. Realice amonestaciones los días de cuba (cada 3 de 7 días) y repasar el cuba con cuidado hasta que no se evidencie signo de presencia de resaca. Quitar o ordenar las resacas sueltas y eliminar las resacas de presencia de resaca. Quitar o ordenar las resacas sueltas. Almacenar en su envase original y en lugar seguro y fresco, fuera del alcance de los niños, niños de alimentos y medicamentos.

Indicaciones para uso médico:

PRODUCTO ANTIOSTRAGMÁTICO ENFERMEDAD DE ACTIVIDAD PROLONGADA. Grupo Químico: Superfosfatos. Nombre común: Bradifosfatos. Análogo: Vitamina K1. EN CASO DE RECOMENDACIÓN AGUIR INMEDIATAMENTE AL MEDICO Y LLAMAR A LOS TELEFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA. Teléfonos de emergencia y Centros Toxicológicos: En Argentina: Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez: 411 4562-6666 y 4562-2247. Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínica Posadas: 011 4556-7777 y 4634-4648. Teléfono gratuito: 0600-333-0150. Hospital de Niños de La Plata: 0221 51-56-55. Ecuador: Centro de Control de Venenos (44) 256-0300. Panamá: ONET (807) 269-2741. Perú: Centro Toxicológico Nacional (021) 204-800/932. Perú: OSGITOK (081) 31-3040. República C: Intoxicación: OEA (1809) 562-5661 ext. 1101. Uruguay: CAN (02) 4722. Venezuela: UCV (212) 605-254.

**BINKA** Emergente 847, plus 16 (2400). In. de. An. Argentina 1982. 0116 10256 - Tel/Fax: 4384-570001 - correo@binka.com.ar. Director Técnico: Dr. Eduardo Penarza, MN 4256. Servicio de Atención al Consumidor: Línea Gratuita 0800-696-4814


Registrado en: Argentina: ANMAT-ONS, REPUBLICA CESARE. Registrado en SENASA-APN, Certificado: C-044. Para ser utilizado en establecimientos habilitados por SENASA, permitiendo su aplicación exclusivamente en los ambientes de los departamentos para la elaboración de productos conestables, fríos y calientes de alimentos, de departamentos para la elaboración de productos y subproductos conestables y depósitos de alimentos en estado de hallar hecho.

LotoFábrica



Co. Tomalino  
Director Técnico  
BINKA S.A.

Lic. Adriana C. Tomalino  
Apoderado  
BINKA S.A.



Display 30 sobres x 50 g

1-470-11910-17-7

670-07

**NUEVO!** SUPERWARFARINICO MONODOSICO  
RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

# ULTRA PLUS.

**Brodifacoum 0,005% p/p**  
Contiene **50g** de **30 SOBRES** de **INDUSTRIA ARGENTINA**

Este es el producto más eficaz que se ha desarrollado hasta ahora para el control de ratas, roedores, ratones, ratas y ratones. Su acción es rápida y efectiva. El producto actúa sobre el sistema nervioso del animal, provocando la muerte por fallo de la actividad eléctrica del sistema nervioso central. El producto actúa sobre el sistema nervioso central, provocando la muerte por fallo de la actividad eléctrica del sistema nervioso central. El producto actúa sobre el sistema nervioso central, provocando la muerte por fallo de la actividad eléctrica del sistema nervioso central.

**INDUSTRIA ARGENTINA**

**NUEVO!** SUPERWARFARINICO MONODOSICO  
RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

# ULTRA PLUS.

**Brodifacoum 0,005% p/p**  
Contiene **50g** de **30 SOBRES** de **INDUSTRIA ARGENTINA**

Este es el producto más eficaz que se ha desarrollado hasta ahora para el control de ratas, roedores, ratones, ratas y ratones. Su acción es rápida y efectiva. El producto actúa sobre el sistema nervioso del animal, provocando la muerte por fallo de la actividad eléctrica del sistema nervioso central. El producto actúa sobre el sistema nervioso central, provocando la muerte por fallo de la actividad eléctrica del sistema nervioso central.

**INDUSTRIA ARGENTINA**

**NUEVO!** SUPERWARFARINICO MONODOSICO  
RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

# ULTRA PLUS.

**Brodifacoum 0,005% p/p**  
Contiene **50g** de **30 SOBRES** de **INDUSTRIA ARGENTINA**

**Brodifacoum 0,005% p/p**  
**RATICIDA - RODENTICIDA DOSIS ÚNICA**  
**CEBO EN GRANOS DE CEREAL**

**VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS**

**PROHIBIDA LA VENTA LIBRE**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES COLOCAR EN CEBADERAS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS**

**INDUSTRIA ARGENTINA**

**NUEVO!** SUPERWARFARINICO MONODOSICO  
RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

# ULTRA PLUS.

**Brodifacoum 0,005% p/p**  
Contiene **50g** de **30 SOBRES** de **INDUSTRIA ARGENTINA**

**INDUSTRIA ARGENTINA**

**INDUSTRIA ARGENTINA**

IF-2017-25016684-APN-ADIBS-GN Tomalino  
Lic. Adriana C. Tomalino  
Co-Directora Técnica  
BINKA S.A. página 19 de 21

NUEVO!

SUPERWARFARINAS MONODOSICO

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

ULTRA PLUS



Eficacia del producto: ULTRA PLUS es un raticida rodenticida elaborado como cebo en granos de cereal, monodosico, de acción anticoagulante y efecto retardado. ULTRA PLUS no genera sospechas, los primeros roedores mueren a partir de los 3 a 5 días de haberlo comido y lejos de donde fue colocado el veneno.

Es eficaz para el control de roedores tales como: Lancha o ratón doméstico (Rattus norvegicus), Rata negra o de los techos (Rattus rattus), Rata parda, noruega o de las cocinas (Rattus norvegicus).

CUIDADO, PELIGROSA SU INGESTIÓN, INHALACIÓN O ABSORCIÓN POR LA PIEL.

Modo y dosis de aplicación: Realizar una cuidadosa inspección del área infestada y de la vecindad (se pueden observar excrementos de roedores, manchas grasosas, pelos, pisadas) para determinar los lugares de entrada, salida y alimentación. El cebo para ratón doméstico ó lancha, el ratón de acción es limitado, son más difíciles de controlar ya que sus hábitos son erráticos por lo cual es de suma importancia la exploración previa del área.


Para el control de ratas: colocar la cantidad de 10 a 50 g de cebo en cebaditas colocadas cada 2 metros. Para el control de ratones ó lanchas: colocar la cantidad de bloques equivalente a 60 g de cebo en cebaditas colocadas cada 2 metros.

COLOCAR EL CEBO DENTRO DE CEBADERAS DE DIFÍCIL ACCESO PARA NIÑOS Y MASCOTAS O ANIMALES NO BLANDO, LAS CUALES DEBEN SER INVOLUCABLES Y PROTEGER EL CEBO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES.

Revisar periódicamente los sobres de cebo (cada 5 días 7 días) y reponer el cebo consumido hasta que no se evidencien signos de presencia de roedores. El control se logra, en general, luego de 3 a 4 repeticiones. Se aplicará 1,5 kg/ha para ratas y 0,75 kg/ha para ratones y lanchas. Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura. Dado que existe la posibilidad que las superwarfarinas se encuentren en la materia fecal de los roedores pudiendo ser esta la posible fuente de contaminación se recomienda una permanente limpieza del lugar desratizado. Informar a los usuarios de las instalaciones que se está realizando la aplicación del raticida, la formulación y las precauciones a adoptar entregando un instructivo escrito.

Precauciones generales: En caso de ingestión no provocar el vómito. Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas y acuarios. No comer, beber ni fumar durante la aplicación. En caso de intoxicación, dirigirse al Centro de Intoxicaciones o Servicio de Salud, llevando el envase o rótulo del producto. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. Mantener el producto en su envase original. No volver a utilizar los envases vacíos. En caso de contacto directo con el producto, lavar la parte afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente. Si se inhala en exceso, retirar a la persona a un lugar ventilado. Advertir a los usuarios sobre las medidas de seguridad y precauciones a tomar para evitar accidentes. Durante su manipulación, usar guantes y evitar el contacto con la piel, boca y ojos. Después de aplicar el producto y en caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón, en contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Aplicar en lugares inaccesibles para niños y animales domésticos. No aplicar en conductos de aire o fuentes de ventilación que permitan la liberación del rodenticida al ambiente. Las mujeres embarazadas no pueden manipular el rodenticida. Conservar el lugar desratizado en perfectas condiciones de limpieza. Usar guantes, mascarar y protección ocular. Producto tóxico para mamíferos, aves y peces. No se debe contaminar los cursos de agua.

Tiempo de regreso a los lugares desratizados: no hay consideraciones especiales para reingresar a los lugares tratados con ULTRA PLUS desde las características y modo de aplicación del producto. Modo de eliminación: Quemar o enterrar los roedores muertos y eliminar los restos de producto de forma segura. Utilizar siempre guantes durante el manipuleo. Condiciones de almacenamiento: Guardar el raticida en su envase original y en lugar seguro y fresco, fuera del alcance de los niños, mujeres embarazadas o en período de lactancia y de los animales domésticos. No transportar ni almacenar con alimentos ni medicamentos. Peligro ambiental: Producto tóxico para mamíferos, aves y peces.




NUEVO!

SUPERWARFARINAS MONODOSICO

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

ULTRA PLUS



Brodifacoum 0,005% p/p

Contiene 30 SOBRES de:

50g

INDUSTRIA ARGENTINA

CEBOS en SOBRES

Indicaciones para uso médico:

PRODUCTO ANTICOAGULANTE ENERGICO DE ACTIVIDAD PROLONGADA. Las superwarfarinas pueden causar síntomas y signos hemorrágicos con prolongación del tiempo de protrombina con una duración de hasta meses, después de una exposición al raticida.

Las medidas en caso de ingestión son el rescate del tóxico (vómito provocado, carbón activado, un purgante salino). El monitoreo del tiempo de protrombina debe realizarse en las primeras 24 horas y reiterarse a las 72 horas. Se aconseja el asesoramiento de un especialista toxicólogo para el seguimiento y tratamiento del paciente.

Grupo Químico Superwarfana. Nombre común: Brodifacoum.

Antídoto: Vitamina K1. La administración y las dosis están determinadas por la evolución clínica. Las superwarfarinas presentan una elevada liposolubilidad, se almacenan en las grasas e hígado, presentan circulación enterohepática y tienen larga vida biológica. La duración del tratamiento puede ser prolongada.

EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y LLAMAR A LOS TELÉFONOS DE CONSULTA TOXICOLÓGICA.

Teléfonos de emergencia y Centros Toxicológicos: En Argentina: Centro de Intoxicaciones del Hospital de Niños Riquelme Gutiérrez: 011 4962-6666 y 4962-2247. Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínica Pasadas: 011 4658-7777 y 4654-6648; número gratuito: 0800-333-0100. Hospital de Niños de La Plata: 0221 51-5555. Ecuador: Centro de Control de Venenos (04) 256-0300. Panamá: CIMET (507) 269-2741. Paraguay: Centro Toxicológico Nacional (021) 204-800/532. Perú: CIDOTOX 0800-1-3040. República Dominicana: CEDI (1839) 562-6601 ext. 1831. Uruguay: CIAI (02) 1722. Venezuela: UCY (212) 605-2366.

Composición:

Brodifacoum \* ..... 0,005 %p/p  
Benzoato de denatolito ..... 0,001 %p/p  
Excipientes y attractantes... csp ..... 100% p/p  
\*CAS: 56073-10-0

Ultra Plus 30 sobres x 50g

Lote/Fab/Vto:



6684-APN-DVPS-ANMAT

7 791140 10235

Lic. Adriana C. Tomalino

Podrado BINKA S.A.

Lic. Adriana C. Tomalino

Co-Director Técnico BINKA S.A.

Display 30 sobres x 50g



1-47-0-11910-17-7  
GD-D

FOLIO 210 DE ENTABLAS

NUEVO! SUPERWARFARINICO MONODOSICO

RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

ULTRA PLUS



Brodifacoum 0,005% p/p

RATICIDA - RODENTICIDA DOSIS ÚNICA  
CEBO EN GRANOS DE CEREAL



VENTA RESTRINGIDA A INSTITUCIONES O EMPRESAS ESPECIALIZADAS

PROHIBIDA LA VENTA LIBRE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES COLOCAR EN CEBADERAS INACCESIBLES PARA NIÑOS Y MASCOTAS



Lea atentamente las instrucciones de uso, las precauciones generales y advertencias del rótulo antes de utilizar el producto.


Contiene 30 SOBRES de 50g  
INDUSTRIA ARGENTINA CEBOS EN GRANOS

Lic. Adriana C. Tomalino  
Co-Director Técnico  
BINKA S.A.

Lic. Adriana C. Tomalino  
Apostada  
BINKA S.A.

NUEVO! SUPERWARFARINICO MONODOSICO  
RATICIDA DE ACTIVIDAD PROLONGADA

ULTRA PLUS



Brodifacoum 0,005% p/p

Contiene 30 SOBRES de 50g  
INDUSTRIA ARGENTINA CEBOS EN GRANOS



Esmeralda 847, piso 16 (C1007AB) Bs. As.,  
Argentina RNE: 910040266  
Tel./ Fax: 4368-6700/01.  
consultatecnica@binka.com.ar.  
Director Técnico: Dr. Eduardo Passeron, MN 4258.

Servicio de Atención al Consumidor:  
Línea Gratuita 0800-666-1518

Registrado en Argentina: ANMAT-DVS, RNFUD: 0250003.  
Registrado en SENASA-APAC, Certificado: C-948. Para ser utilizado en establecimientos habilitados por SENASA, permitiendo su aplicación exclusivamente en los exteriores de los departamentos para la elaboración de productos comestibles, interiores y exteriores de seberías, de departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomedibles y depósitos de comestibles cuando se hallen vacíos.

En Uruguay: Importado y distribuido por BINKA URUGUAY S.A. Reg. MGAP N° 2396. Reg. DIA N° FZ 02. Reg. MSP N° 52569. Reg. INVSSP N° 297. San Fructuoso 1169, Montevideo. Tel. (02) 209-7143. En Bolivia: Importado y distribuido por VETEROFARMACIA BOLIVIANA S.R.L. SENASAG CR-PLUV N° 000977/2005. Av. Píraí N° 493, Santa Cruz. Tel. (03) 352-0261. Dir. Téc.: Ernesto Rojas V. En Panamá: Importado y distribuido por DISTRIVET S.A. M.I.D.A. Reg. N° RD-312-08. Juan Díaz calle 1b, Tel. 507-2205621. distribet@cabloneta.net. Dir. Téc.: Dra. Enilda Pinto ID. 728. En Paraguay: Importado por CRESUR S.A. DVS Reg. N° 00183-01-02. Av. J.F. Bogado 1482 BUC: 80014725-1. ATC (021)333-407 Establecimiento 0100 0096 01 07 12 Tel. de emergencias: (021) 204-908/9 - IPS (021) 209-150. Perú: Autorización Sanitaria N°1972-2015/DEPA/DIGESA/SA; comercializado por VETNOVA S.A., Alameda del Corregidor 2720 Urb. La Capilla-La Molina, Lima, Perú. Tel. 3857625. República Dominicana: Ministerio de Agricultura Certificado N° 3560-55-B. Distribuido por FLEXEMPAQUES S.R.L. Calle 16 de agosto N°1. Los Pinos, Santiago de los Caballeros, Santiago, República Dominicana. Tel. (809) 241-2085/233-3222. En Venezuela: Importado por REPRESENTACIONES ADALCA, C.A. Rif: J-30295110-0. Reg. N° 0209-D-11-1432. Tel. (0241) 871-6071 / 7340, Valencia. Asesor: Dra. Carmen Cayot, CPE.

fos x sobres de display

REG. 2015/01166 DE SENASA-APAC DVS#ANMAT

REG. 0209-D-11-1432. Tel. (0241) 871-6071 / 7340, Valencia. Asesor: Dra. Carmen Cayot, CPE.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2017 - Año de las Energías Renovables

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:** IF-2017-25016684-APN-DVPS#ANMAT

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Lunes 23 de Octubre de 2017

**Referencia:** 11910-17-7

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 21 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,  
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117584  
Date: 2017.10.23 13:08:44 -0300

María José Sánchez  
Directora  
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud  
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología  
Médica

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -  
GDE  
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,  
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE  
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT  
30715117584  
Date: 2017.10.23 13:08:44 -0300