



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Disposición

Número:

Referencia: EX-2022-133409449-APN-DGA#ANMAT

VISTO el EX-2022-133409449-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; y

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma SOUBEIRAN CHOBET S.R.L. solicita la aprobación de nuevos proyectos de información para el paciente para la Especialidad Medicinal denominada MENSALGIN y MESALGIN FORTE / IBUPROFENO - CODEINA FOSFATO, Forma Farmacéutica y Concentración: COMPRIMIDOS / IBUPROFENO 200 mg - CODEINA FOSFATO 12,50 mg y 30 mg (MESALGIN FORTE); aprobada por Certificado N° 47.769.

Que los proyectos presentados se encuadran dentro de los alcances de las normativas vigentes, Ley de Medicamentos 16.463, Decreto 150/92 y la Disposición N°: 5904/96 y Circular N° 4/13.

Que la Dirección de Investigación Clínica y Gestión del Registro de Medicamentos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1490/92 y sus modificatorios.

Por ello:

EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTICULO 1º. – Autorízase a la firma SOUBEIRAN CHOBET S.R.L. propietaria de la Especialidad Medicinal denominada MENSALGIN y MESALGIN FORTE / IBUPROFENO - CODEINA FOSFATO, Forma Farmacéutica y Concentración: COMPRIMIDOS / IBUPROFENO 200 mg - CODEINA FOSFATO 12,50 mg y 30 mg (MESALGIN FORTE); los nuevos proyectos de información para el paciente obrantes en los documentos IF-2023-110261623-APN-DERM#ANMAT e IF-2023-110261393-APN-DERM#ANMAT.

ARTICULO 2º. – Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 47.769, cuando el mismo se presente acompañado de la presente Disposición.

ARTICULO 3º. - Regístrese; por el Departamento de Mesa de Entradas notifíquese al interesado, haciéndole entrega de la presente Disposición e información para el paciente. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2022-133409449-APN-DGA#ANMAT

Js

ab

Digitally signed by GARAY Valéria Teresa
Date: 2023.10.11 15:33:34 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.10.11 15:33:36 -03:00

Proyecto: información para el paciente

Industria Argentina

Venta bajo receta archivada, E lista III

MENSALGIN

IBUPROFENO 200 mg.

CODEINA FOSFATO B.P. 12,50 mg.

Comprimidos

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

¿Qué es Mensalgin comprimidos y para qué se utiliza?

Este medicamento es una asociación de dos analgésicos que su médico le ha indicado para la naturaleza del dolor que usted padece. Este medicamento puede ser perjudicial o estar contraindicado en otros pacientes que padecen dolor.

¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar Mensalgin comprimidos?

No tome Mensalgin comprimidos:

Si es alérgico al Ibuprofeno, aspirina, diclofenac, naproxeno o similares, codeína, o a alguno de los demás componentes de este medicamento.

Si padece dificultades respiratorias relacionadas, asma, insuficiencia respiratoria.


Si usted ha tenido malestar o consecuencias en su salud con medicamentos como antidepresivos, como la fluoxetina, la paroxetina, la fluvoxamina y la venlafaxina, así como los antidepresivos tricíclicos, como nortriptilina, amitriptilina, clomipramina, desipramina e imipramina.

Historia de úlcera péptica.

Embarazo y lactancia.

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.


MARIA VERARDO
SOCIO GERENTE


SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
RITA ALEJANDRA RICCI
FARMACÉUTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172

Constipación crónica.

Tratamiento para la depresión consulte a su médico.

Insuficiencia renal severa.

Insuficiencia hepática severa.

Insuficiencia respiratoria.

Menores de 18 años.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Mensalgin si tiene:

Historia de úlcera péptica.

Constipación crónica.

Tratamiento para la depresión consulte a su médico.

Insuficiencia renal severa.

Insuficiencia hepática severa.

Algún tipo de Insuficiencia respiratoria.

Diarrea

Puede enmascarar síntomas de infección, lo que puede llevar a un retraso en el inicio del tratamiento apropiado y de este modo al empeoramiento de las consecuencias de una infección. Esto ha sido observado en la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) bacteriana y complicaciones bacterianas de la varicela. Cuando se administra para la fiebre o el alivio del dolor relacionadas a una infección, se aconseja el monitoreo de dicha infección.


Es muy importante que informe a su médico si tiene antecedentes de consumo de drogas y alcohol.

Evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento con Mensalgin.

Puede precipitar broncoespasmo en pacientes con historia de asma bronquial o enfermedad alérgica.

Administrar con precaución en pacientes con enfermedad gastrointestinal. Se han reportado casos de nefrotoxicidad por antiinflamatorios no esteroides, requiriéndose precaución en pacientes con disminución de la función renal, cardíaca o hepática. Se requiere precaución en quienes reciben terapia anticoagulante y paciente con incremento de presión intracraneal o con traumatismo de cráneo.

Otros medicamentos y Mensalgin

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.

MARÍA VERARDO
SOCIO GERENTE


SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
RITA ALEJANDRA RICCI
FARMACÉUTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento.

Mensalgin comprimidos puede interaccionar con otros medicamentos. Comuníquese a su médico o farmacéutico si está tomando alguno de los medicamentos siguientes:

Vinculadas al Ibuprofeno:

Otros antiinflamatorios no esteroideos: Aumenta el riesgo de úlcera y hemorragia.

Anticoagulantes orales y heparina: Aumento del riesgo de hemorragia.

Litio: Elevación de la litemia, hasta un umbral tóxico.

Sulfamidas: Aumento del efecto hipoglucemiante.

Diuréticos: Puede disminuir la actividad de los diuréticos.

Vinculadas a la Codeína:

Propranolol: Aumento de los efectos adversos de la Codeína

Benzodiazepinas: aumenta el riesgo de somnolencia, dificultad para respirar (depresión respiratoria), coma y puede ser potencialmente mortal. Debido a esto, el uso concomitante solo debe considerarse cuando otras opciones de tratamiento no son posibles.

Toma de Mensalgin comprimidos con alimentos, bebidas y alcohol

- Durante el tratamiento no debe consumir bebidas alcohólicas. El efecto del alcohol puede potenciar la sedación, y esto puede afectar la capacidad de conducir o utilizar maquinaria

Embarazo y lactancia

La utilización de Mensalgin comprimidos durante el embarazo y la lactancia está contraindicado.

Niños y adolescentes (menores de 18 años)

No está recomendada su utilización en niños y adolescentes menores de 18 años.

Grupos especiales de pacientes

Si su hígado o riñones no funcionan bien diríjase a su médico.

Si padece trastornos respiratorios, póngalo en conocimiento de su médico.

Conducción y uso de máquinas

SOLBEIRAN CHOBET S.R.L.

MARIA VERARDO
SOCIO GERENTE

SOLBEIRAN CHOBET S.R.L.
RITA ALEJANDRA RIVERA
FARMACÉUTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172

Puede alterar su capacidad para conducir o manejar maquinaria, ya que puede producir somnolencia, disminuir su atención o disminuir su capacidad de reacción.

¿Cómo tomar Mensalgin comprimidos?

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. No tome más comprimidos de los indicados por su médico.

Forma de administración

Trague los comprimidos con medio vaso de agua o disueltos en medio vaso de agua el cual debe tragar inmediatamente y por completo. No mastique los comprimidos.

Las dosis, frecuencias de administración y duración del tratamiento deberán ser individualizadas para cada paciente.

A modo de sugerencia, la dosis inicial: 2 comprimidos tomados juntos, con un poco de agua. Luego, si fuese necesario, 1 o 2 comprimidos cada 4-6 horas.

No exceder los 6 comprimidos por día.

¿Qué sucede si toma más Mensalgin comprimidos del que debe?

Si usted ha tomado más mensalgin del que debe, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o acuda al hospital más próximo llevando este prospecto.

Los síntomas esperables por ibuprofeno incluirían: cefalea, vómito, somnolencia e irritación gastrointestinal o sangrado. Por codeína: náuseas, vómitos, depresión respiratoria, hipotensión, pérdida de conocimiento, excitabilidad, convulsiones. Antídoto para Codeína: Naloxona.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame o concurra al Hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (11) 4962-6666

Hospital A. Posadas: (11) 4654-6658

¿Qué sucede si olvidó tomar Mensalgin comprimidos?

No se preocupe si olvidó tomar una dosis.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Tome la dosis inmediatamente, estableciendo la frecuencia de administración a partir de esta toma, sin recurrir a una dosis doble para compensar.

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.

MARIA VERARDO
SUCIO GERENTE

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
RITA ALEJANDRA RICCI
FARMACÉUTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172

¿Qué sucede si interrumpe el tratamiento con Mensalgin comprimidos?

Seguramente tendrá recurrencia del dolor.

Posibles efectos adversos

Vinculadas al Ibuprofeno:

Ocasionalmente pueden producirse náuseas, vómitos, acidez estomacal, constipación, diarrea. Raras veces se ha informado reacciones de erupciones en la piel, prurito, dolor de cabeza, mareos, nerviosismo, depresión, somnolencia, insomnio, edema, visión borrosa.

Vinculadas a la Codeína:

Rara vez, dificultad para respirar, reacciones alérgicas cutáneas, picazón, somnolencia, constipación, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, palpitaciones, retención urinaria, cambios de humor.

Conservación de Mensalgin comprimidos

Conservar a temperatura no mayor a 30°C.

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

Contenido del envase e información adicional

Composición de Mensalgin

Ibuprofeno, Codeína Fosfato, Almidón de Maíz, Croscarmelosa Sódica, Anhídrido Silícico Coloidal, PVP, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina.

Contenido del envase

Envases conteniendo: 2, 4, 10, 12, 20, 30 y 50 comprimidos para venta al público.

Envases conteniendo: 100 y 250 comprimidos para uso hospitalario exclusivo.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA MÉDICA.


SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.

MARIA VERARDO
SOCIO GERENTE

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
RITA ALEJANDRA RICCI
FARMACÉUTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE
SALUD. Certificado N° 47.769 SOUBEIRAN CHOBET SRL. - Iberá 5055 - 1431
Buenos Aires.

Director Técnico: Dr. Silvio L. Gaguine –Farmacéutico

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.

MARIA VERARDO
SOCIO GERENTE


SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
RITA ALEJANDRA RICCI
FARMACEUTICA
CO-DIRECTORA TECNICA
M.N. 12172



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-133409449 PROSP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.09.19 08:53:50 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.09.19 08:53:51 -03:00

Proyecto: información para el paciente

Industria Argentina

Venta bajo receta archivada E lista III

Mensalgin forte

MENSALGIN FORTE

IBUPROFENO 200 mg.

CODEINA FOSFATO B.P. 30 mg.

Comprimidos

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

¿Qué es Mensalgin forte comprimidos y para qué se utiliza?

Este medicamento es una asociación de dos analgésicos que su médico le ha indicado para la naturaleza del dolor que usted padece. Este medicamento puede ser perjudicial o estar contraindicado en otros pacientes que padecen dolor.

¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar Mensalgin forte comprimidos?


No tome Mensalgin forte comprimidos:

Si es alérgico al Ibuprofeno, aspirina, diclofenac, naproxeno o similares, codeína, o a alguno de los demás componentes de este medicamento.


Si padece dificultades respiratorias relacionadas, asma, insuficiencia respiratoria.

Si usted ha tenido malestar o consecuencias en su salud con medicamentos como antidepresivos, como la fluoxetina, la paroxetina, la fluvoxamina y la venlafaxina, así como los antidepresivos tricíclicos, como nortriptilina, amitriptilina, clomipramina, desipramina e imipramina.

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.


MARIA VERARDO
SOCIO GERENTE

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.


RITA ALEJANDRA RICCI
FARMACEUTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172

Historia de úlcera péptica.

Embarazo y lactancia.

Constipación crónica.

Tratamiento para la depresión consulte a su médico.

Insuficiencia renal severa.

Insuficiencia hepática severa.

Insuficiencia respiratoria.

Menores de 18 años.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Mensalgin forte si tiene:

Historia de úlcera péptica.

Constipación crónica.

Tratamiento para la depresión consulte a su médico.

Insuficiencia renal severa.

Insuficiencia hepática severa.

Algún tipo de Insuficiencia respiratoria.

Diarrea.

Puede enmascarar síntomas de infección, lo que puede llevar a un retraso en el inicio del tratamiento apropiado y de este modo al empeoramiento de las consecuencias de una infección. Esto ha sido observado en la neumonía adquirida en la comunidad (NAC) bacteriana y complicaciones bacterianas de la varicela. Cuando se administra para la fiebre o el alivio del dolor relacionadas a una infección, se aconseja el monitoreo de dicha infección.


Es muy importante que informe a su médico si tiene antecedentes de consumo de drogas y alcohol.


Evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento con Mensalgin forte.

Puede precipitar broncoespasmo en pacientes con historia de asma bronquial o enfermedad alérgica.

Administrar con precaución en pacientes con enfermedad gastrointestinal. Se han reportado casos de nefrotoxicidad por antiinflamatorios no esteroides, requiriéndose precaución en pacientes con disminución de la función renal, cardíaca o hepática. Se requiere precaución en quienes reciben terapia anticoagulante y paciente con incremento de presión intracraneal o con traumatismo de cráneo.

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.


MARÍA VERARDO
SOCIO GERENTE


SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
RITA ALEJANDRA RICCI
FARMACÉUTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172

Otros medicamentos y Mensalgin forte

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento.

Mensalgin forte comprimidos puede interaccionar con otros medicamentos. Comuníquese a su médico o farmacéutico si está tomando alguno de los medicamentos siguientes:

Vinculadas al Ibuprofeno:

Otros antiinflamatorios no esteroideos: Aumenta el riesgo de úlcera y hemorragia.

Anticoagulantes orales y heparina: Aumento del riesgo de hemorragia.

Litio: Elevación de la litemia, hasta un umbral tóxico.

Sulfamidas: Aumento del efecto hipoglucemiante.

Diuréticos: Puede disminuir la actividad de los diuréticos.

Vinculadas a la Codeína:

Propranolol: Aumento de los efectos adversos de la Codeína

Benzodiazepinas: aumenta el riesgo de somnolencia, dificultad para respirar (depresión respiratoria), coma y puede ser potencialmente mortal. Debido a esto, el uso concomitante solo debe considerarse cuando otras opciones de tratamiento no son posibles.

Toma de Mensalgin forte comprimidos con alimentos, bebidas y alcohol

- Durante el tratamiento no debe consumir bebidas alcohólicas. El efecto del alcohol puede potenciar la sedación, y esto puede afectar la capacidad de conducir o utilizar maquinaria

Embarazo y lactancia

La utilización de Mensalgin forte comprimidos durante el embarazo y la lactancia está contraindicado.

Niños y adolescentes (menores de 18 años)

No está recomendada su utilización en niños y adolescentes menores de 18 años.

Grupos especiales de pacientes

Si su hígado o riñones no funcionan bien diríjase a su médico.

Si padece trastornos respiratorios, póngalo en conocimiento de su médico.

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.

MARIA VERARDO
SOCIO GERENTE

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
RITA ALEJANDRA RICCI
FARMACEUTICA
CO. DIRECTORA TECNICA
M.N. 12172

Conducción y uso de máquinas

Puede alterar su capacidad para conducir o manejar maquinaria, ya que puede producir somnolencia, disminuir su atención o disminuir su capacidad de reacción.

Mensalgin forte comprimidos contiene lactosa

Este medicamento contiene lactosa. Si usted padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

¿Cómo tomar Mensalgin forte comprimidos?

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. No tome más comprimidos de los indicados por su médico.

Forma de administración

Trague los comprimidos con medio vaso de agua o disueltos en medio vaso de agua el cual debe tragar inmediatamente y por completo. No mastique los comprimidos.

Las dosis, frecuencias de administración y duración del tratamiento deberán ser individualizadas para cada paciente.

Como posología media de orientación, se sugiere:

1-2 comprimidos 1-4 veces por día.

¿Qué sucede si toma más Mensalgin forte comprimidos del que debe?

Si usted ha tomado más Mensalgin forte del que debe, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o acuda al hospital más próximo llevando este prospecto.


Los síntomas esperables por ibuprofeno incluirían: cefalea, vómito, somnolencia e irritación gastrointestinal o sangrado. Por codeína: náuseas, vómitos, depresión respiratoria, hipotensión, pérdida de conocimiento, excitabilidad, convulsiones. Antídoto para Codeína: Naloxona.


En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame o concurra al Hospital más cercano o comuníquese con los centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (11) 4962-6666

Hospital A. Posadas: (11) 4654-6658

¿Qué sucede si olvidó tomar Mensalgin forte comprimidos?

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.

MARIA VERARDO
SOCIO GERENTE

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.

RITA ALEJANDRA RICCI
FARMACÉUTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172

No se preocupe si olvidó tomar una dosis.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Tome la dosis inmediatamente, estableciendo la frecuencia de administración a partir de esta toma, sin recurrir a una dosis doble para compensar.

¿Qué sucede si interrumpe el tratamiento con Mensalgin forte comprimidos?

Seguramente tendrá recurrencia del dolor.

Posibles efectos adversos

Vinculadas al Ibuprofeno:

Ocasionalmente pueden producirse náuseas, vómitos, acidez estomacal, constipación, diarrea. Raras veces se ha informado reacciones de erupciones en la piel, prurito, dolor de cabeza, mareos, nerviosismo, depresión, somnolencia, insomnio, edema, visión borrosa.

Vinculadas a la Codeína:

Rara vez, dificultad para respirar, reacciones alérgicas cutáneas, picazón, somnolencia, constipación, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, palpitaciones, retención urinaria, cambios de humor.

Conservación de Mensalgin forte comprimidos

Conservar a temperatura no mayor a 30°C.

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

Contenido del envase e información adicional

Composición de Mensalgin forte

Ibuprofeno, Codeína Fosfato, Croscarmelosa Sódica, PVP, Estearato de Magnesio, Lactosa.

Contenido del envase


Envases conteniendo: 4, 6, 10, 12, 20, 30 y 50 comprimidos para venta al público.


Envases conteniendo: 100, 250 y 500 comprimidos para uso hospitalario exclusivo.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN NUEVA RECETA MÉDICA.


SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.



MARÍA VERARDO
SOCIO GERENTE


SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
ALEJANDRA RICCI
FARMACÉUTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE
SALUD. Certificado N° 47.769 SOUBEIRAN CHOBET SRL. - Iberá 5055 - 1431
Buenos Aires.

Director Técnico: Dr. Silvio L. Gaguine –Farmacéutico

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.

MARIA VERARDO
SOCIO GERENTE

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
RITA ALEJANDRA RICCI
FARMACÉUTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172




República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2022-133409449 PROSP FORTE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.09.19 08:53:30 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.09.19 08:53:31 -03:00