



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Disposición

Número:

Referencia: EX-2023-132093071-APN-DGA#ANMAT

VISTO el EX-2023-132093071-APN-DGA#ANMAT del Registro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y,

CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones la firma SOUBEIRAN CHOBET S.R.L. solicita la corrección de errores materiales que se habría deslizado en la Disposición DI-2023-9277-APN-ANMAT#MS, por la cual se autorizaron nuevos proyectos de prospectos para la especialidad medicinal denominada AMZIAX CHOBET / ALPRAZOLAM, forma farmacéutica y concentración: COMPRIMIDOS RANURADOS / ALPRAZOLAM 0,5 mg – 1 mg – 2 mg; aprobado por Certificado N° 45.732.

Que los errores detectados recaen en el primer párrafo del considerando y en el artículo 1° en la descripción de la razón social, en la descripción de la forma farmacéutica y en la omisión de autorización de la información para el paciente.

Que dichos errores se consideran subsanables, en los términos de lo normado por el Artículo 101 del reglamento aprobado por Decreto N° 1759/72 (T.O. 1991).

Que la Dirección de Investigación Clínica y Gestión del Registro de Medicamentos ha tomado la intervención de su competencia.

Que se actúa en virtud de las facultades conferidas por el Decreto N° 1.490/92 y sus modificatorios.

Por ello;

LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE

MEDICAMENTOS ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA

DISPONE:

ARTÍCULO 1°. -Rectifícanse los errores materiales detectados en el primer párrafo del considerando de la Disposición DI-2023-9277-APN-ANMAT#MS, en donde dice: "SOUBERAIN CHOBET S.R.L.", debe decir: "SOUBEIRAN CHOBET S.R.L."; donde dice: "COMPRIMIDOS RANURADOS / ALPRAZOLAM 0,5 mg – 1 mg – 2 mg", debe decir: "COMPRIMIDOS RANURADOS – MULTIRANURADOS / ALPRAZOLAM 0,5 mg – 1 mg – 2 mg".

ARTÍCULO 2°. -Rectifícanse los errores materiales detectados en el ARTÍCULO 1° de la Disposición DI-2023-9277-APN-ANMAT#MS, en donde dice: "SOUBERAIN CHOBET S.R.L.", debe decir: "SOUBEIRAN CHOBET S.R.L."; donde dice: "COMPRIMIDOS RANURADOS / ALPRAZOLAM 0,5 mg – 1 mg – 2 mg", debe decir: "COMPRIMIDOS RANURADOS – MULTIRANURADOS / ALPRAZOLAM 0,5 mg – 1 mg – 2 mg"; apruebase e incorpórase la información para el paciente obrante en el documento IF-2024-42851780-APN-DERM#ANMAT.

ARTÍCULO 3°. – Practíquese la atestación correspondiente en el Certificado N° 45.732 siempre que el mismo se presente acompañado de la presente Disposición.

ARTÍCULO 4°. - Regístrese, notifíquese al interesado de la presente Disposición conjuntamente con la información para el paciente. Gírese a la Dirección de Gestión de Información Técnica a sus efectos. Cumplido, archívese.

EX-2023-132093071-APN-DGA#ANMAT

mb

Mbv

Proyecto: información para el paciente

Amziax Chobet
Alprazolam 0,5 mg
Alprazolam 1 mg
Alprazolam 2 mg
Comprimidos

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

¿Qué es Amziax Chobet comprimidos y para qué se utiliza?

El principio activo de este medicamento es alprazolam. Pertenece a un grupo de medicamentos llamados benzodiazepinas (medicamentos ansiolíticos).

Amziax Chobet comprimidos se utiliza para el tratamiento de los síntomas de ansiedad

¿Qué necesita saber antes de empezar a tomar Amziax Chobet comprimidos?


No tome Amziax Chobet comprimidos

Si es alérgico a alprazolam, a las benzodiazepinas o a alguno de los demás componentes de este medicamento.

Si padece dificultades respiratorias relacionadas o no con el sueño (apnea del sueño).

Si padece una enfermedad llamada miastenia gravis que se caracteriza por debilidad muscular.


SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
ING. JUAN H. FERNANDEZ
SOCIO GERENTE


SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
DHA ALEJANDRA RICCI
FARMACÉUTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172

Si padece alteraciones graves del hígado.

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Amziax Chobet

- Si tiene algún problema de pulmón, de riñón o de hígado.
- Si se ha sentido o se siente tan deprimido que ha tenido pensamientos o ideas de suicidio.
- Si durante el tratamiento nota síntomas de manía (estado de sobreexcitación, sensación de euforia o hiperirritabilidad) o hipomanía (estado de excitación y actividad exagerada).

El tratamiento con benzodiazepinas, entre ellas alprazolam, puede causar dependencia, principalmente tras la toma de forma ininterrumpida del medicamento durante largo tiempo.

Para reducir al máximo el riesgo de dependencia deben tenerse en cuenta estas precauciones:

La toma de benzodiazepinas se hará sólo bajo prescripción médica (nunca porque hayan dado resultado en otros pacientes) y nunca se aconsejarán a otras personas.

No aumentar en absoluto las dosis prescritas por el médico, ni prolongar el tratamiento más tiempo del recomendado.

Consultar al médico regularmente para que decida si usted debe continuar con el tratamiento.

No combinar varias benzodiazepinas independientemente de su indicación.

Al cesar el tratamiento con alprazolam, pueden aparecer síntomas parecidos a los que le llevaron a comenzar el tratamiento con alprazolam (efecto rebote). Para evitar esto se recomienda no interrumpir bruscamente el tratamiento, sino reducir gradualmente la dosis, de acuerdo con las instrucciones del médico (ver "Si interrumpe el tratamiento con Amziax Chobet comprimidos").

El uso de alprazolam junto con medicamentos del tipo opioides, puede provocar sedación profunda, depresión respiratoria, coma y muerte.

Las benzodiazepinas pueden ocasionar una pérdida de memoria y reacciones tales como: intranquilidad, agitación, irritabilidad, agresividad, delirios, ataques de ira, pesadillas, alucinaciones, psicosis, comportamiento inadecuado y otros efectos adversos sobre la conducta. En caso de que esto ocurriera, deberá suspender el tratamiento y consultar a su médico.



SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
ING. ADRIÁN F. FERNÁNDEZ
SOCIO GERENTE



SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
RITA ALEJANDRA RICO
FARMACÉUTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172

Es muy importante que informe a su médico si tiene antecedentes de consumo de drogas y alcohol.

Otros medicamentos y Amziax Chobet

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o pudiera tener que tomar cualquier otro medicamento.

Amziax Chobet comprimidos puede interaccionar con otros medicamentos. Comunique a su médico o farmacéutico si está tomando alguno de los medicamentos siguientes:

Depresores del sistema nervioso central, ya que pueden potenciar el efecto sedante de alprazolam:

Tranquilizantes mayores (antipsicóticos).

Inductores del sueño (hipnóticos).

Medicamentos usados para tratar la depresión.

Medicamentos para el tratamiento de la epilepsia (antiepilépticos).

Analgésicos narcóticos y opioides (derivados de la morfina), debido a que pueden aumentar la sensación de euforia, lo que puede llevar a aumentar la dependencia psíquica.

Medicamentos usados para el tratamiento de la ansiedad (ansiolíticos/sedantes).

Anestésicos.

Antihistamínicos (medicamentos para tratar alergias) sedantes.

El uso concomitante de alprazolam y opioides (analgésicos potentes, medicamentos para terapia de sustitución (tratamiento de la adicción a opioides) y algunos medicamentos para la tos) aumenta el riesgo de somnolencia, dificultad para respirar (depresión respiratoria), coma y puede ser potencialmente mortal. Debido a esto, el uso concomitante solo debe considerarse cuando otras opciones de tratamiento no son posibles.

Sin embargo, si su médico le prescribe alprazolam junto con opioides, la dosis y la duración del tratamiento concomitante deben ser limitadas por su médico.

Informe a su médico sobre todos los medicamentos opioides que esté tomando y siga de cerca la recomendación de la dosis de su médico. Puede ser útil informar a amigos o familiares para que estén al tanto de los signos y síntomas indicados anteriormente. Póngase en contacto con su médico si experimenta alguno de estos síntomas.


SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
ING. ADRIÁN H. FERNANDEZ
SOCIO GERENTE


SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
RITA ALEJANDRA RICCI
FARMACÉUTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172

Hay unos grupos de medicamentos que por su acción en el organismo (inhibidores del citocromo P450) pueden interaccionar con alprazolam y en algunos casos aumentar su actividad. Algunos de los medicamentos que pueden interaccionar con alprazolam son:

Medicamentos utilizados para el tratamiento de infecciones por hongos como ketoconazol, itraconazol, posaconazol o voriconazol. No se recomienda tomarlos al mismo tiempo que alprazolam.

Los siguientes antidepresivos: nefazodona, fluvoxamina y fluoxetina.

Protectores gástricos como la cimetidina.

Dextropropoxifeno (analgésico narcótico).

Anticonceptivos orales.

Diltiazem (antihipertensivo).

Antibióticos macrólidos como eritromicina, troleandomicina, claritromicina y telitromicina.

Medicamentos utilizados para el tratamiento del SIDA como ritonavir, etc.

Digoxina (medicamento utilizado para suprimir o prevenir las alteraciones del ritmo del corazón).

Toma de Amziac Chobet comprimidos con alimentos, bebidas y alcohol

- Durante el tratamiento evite las bebidas alcohólicas. El efecto del alcohol puede potenciar la sedación, y esto puede afectar la capacidad de conducir o utilizar maquinaria

Embarazo y lactancia

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

No se recomienda utilizar Amziac Chobet comprimidos durante el embarazo ni tampoco durante la lactancia salvo que, a criterio médico, el beneficio supere el riesgo para el niño.

Si por decisión del médico, se administra alprazolam durante una fase tardía del embarazo o durante el parto, podrán aparecer efectos sobre el recién nacido tales como disminución de la temperatura corporal (hipotermia), disminución del tono muscular (hipotonía) y depresión respiratoria moderada.

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
ING. DORIAN H. FERNANDEZ
SOCIO GERENTE

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
RITA ALEJANDRA RICCI
FARMACEUTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172

Los niños nacidos de madres que toman benzodiazepinas de forma crónica durante el último periodo del embarazo pueden desarrollar dependencia física, pudiendo desencadenarse un síndrome de abstinencia en el periodo postnatal.

Niños y adolescentes (menores de 18 años)

Alprazolam no está recomendado en niños y adolescentes menores de 18 años. Las benzodiazepinas no deben administrarse a los niños a no ser que sea estrictamente necesario y sea prescrito por el médico. No se ha establecido la eficacia y seguridad de alprazolam en menores de 18 años.

Pacientes de edad avanzada (mayores de 65 años)

El Alprazolam puede afectar más a este grupo de pacientes que a los pacientes jóvenes. Si usted pertenece a él, su médico puede reducir la dosis y comprobar su respuesta al tratamiento.

Las benzodiazepinas y productos relacionados deben usarse con precaución en pacientes de edad avanzada, debido al riesgo de sedación y/o debilidad musculoesquelética que puede provocar caídas, a menudo con consecuencias graves en esta población.

Grupos especiales de pacientes

Si su hígado o riñones no funcionan bien diríjase a su médico, quien podría aconsejarle que utilice una dosis menor de alprazolam.

Si padece trastornos respiratorios, póngalo en conocimiento de su médico.

Conducción y uso de máquinas

El Alprazolam puede alterar su capacidad para conducir o manejar maquinaria, ya que puede producir somnolencia, disminuir su atención o disminuir su capacidad de reacción. La aparición de estos efectos es más probable al inicio del tratamiento o cuando se aumenta la dosis. No conduzca ni utilice máquinas si experimenta alguno de estos efectos. Estos efectos pueden potenciarse si simultáneamente se consume alcohol.

Amziac Chobet comprimidos contiene lactosa

Este medicamento contiene lactosa. Si usted padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

¿Cómo tomar Amziac Chobet comprimidos?

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. No tome más comprimidos de los indicados por su médico.


SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
ING. ADRIÁN H. FERNANDEZ
SOCIO GERENTE


SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
DRA. ALEJANDRA RICCO
FARMACEUTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172

Forma de administración

Trague los comprimidos con medio vaso de agua o disueltos en medio vaso de agua el cual debe tragar inmediatamente y por completo. No mastique los comprimidos.

La dosis se ajustará en forma gradual, de acuerdo a la sintomatología y la respuesta obtenida.

Adultos: La dosis inicial es de 0,25 mg. a 0,5 mg. 3 veces por día (mañana, mediodía y noche) que se ajustará progresivamente los días siguientes en función de la eficacia y la tolerancia. La dosis máxima es de 4 mg. por día.

Duración del tratamiento: Será tan breve como sea posible y no deberá sobrepasar las 4 a 12 semanas, incluyendo el período de disminución de la posología. Para discontinuar el tratamiento, la posología se reducirá gradualmente, disminuyendo la dosis en no más de 0,5 mg. cada 3 días, a lo largo de varias semanas.

Insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia respiratoria y ancianos: Se recomienda iniciar el tratamiento con dosis bajas, 0,25 mg. 2 a 3 veces por día, ajustándola según necesidad y tolerancia. En general, la dosis debe ser más bajas que en el adulto, considerándose que la mitad de la posología media puede ser suficiente.

¿Qué sucede si toma más Amziax Chobet comprimidos del que debe?

Si usted ha tomado más alprazolam del que debe, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o acuda al hospital más próximo llevando este prospecto.

La sobredosis con benzodiazepinas se manifiesta generalmente por distintos grados de depresión del sistema nervioso central, que pueden ir desde somnolencia hasta coma. Los síntomas incluyen somnolencia (adormecimiento), trastornos del habla (disartria), alteraciones de la coordinación, confusión, letargia (estado de somnolencia profunda y prolongada), disminución del tono muscular (hipotonía), descenso de la tensión arterial, depresión respiratoria, raramente coma y muy raramente muerte. Las secuelas serias son raras, a menos que alprazolam se tome junto con otros fármacos o alcohol.

En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o llame o concurra al Hospital más cercano o comunicarse con los centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (11) 4962-6666

Hospital A. Posadas: (11) 4654-6658

¿Qué sucede si olvidó tomar Amziax Chobet comprimidos?

No se preocupe si olvidó tomar una dosis.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
ING. ADRIÁN H. FERNANDEZ
SOCIO GERENTE

SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
RITA ALEJANDRA RUCI
FARMACÉUTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172

Si la toma olvidada es reciente tome su dosis inmediatamente y si no, espere a la siguiente dosis, sin tomar una dosis doble para compensar.

¿Qué sucede si interrumpe el tratamiento con Amziac Chobet comprimidos?

El tratamiento con alprazolam puede producir dependencia, por ello al interrumpir la administración de alprazolam de forma brusca pueden aparecer síntomas de retirada.

Los síntomas de retirada que se pueden presentar son: dolor de cabeza, dolores musculares, ansiedad, tensión, intranquilidad, confusión, irritabilidad, estado general de disgusto (disforia), insomnio, intolerancia a la luz, a los sonidos y al contacto físico, hormigueos y calambres en las extremidades y en el abdomen, vómitos, sudoración, temblor, despersonalización, alucinaciones y convulsiones. En caso de que esto ocurriera, deberá consultar inmediatamente a su médico.

Posibles efectos adversos

Los efectos adversos que pueden aparecer durante el tratamiento con alprazolam ocurren predominantemente al comienzo del tratamiento y generalmente desaparecen con la administración continuada o tras una reducción de dosis.

Efectos adversos frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas):

Depresión.

Sedación, somnolencia, trastorno de la coordinación (ataxia), alteración de la memoria, dificultad para articular palabras (disartria), mareo, dolor de cabeza.

Estreñimiento, boca seca.

Fatiga, irritabilidad.

Sensación de confusión, desorientación, alteración del deseo sexual (libido), ansiedad, dificultad para dormir (insomnio), nerviosismo.

Coordinación anormal, alteración del equilibrio, dificultad para concentrarse, sueño excesivo (hipersomnía), estado de somnolencia profunda y prolongada (letargia), temblor.

Náuseas, disminución del apetito.


Visión borrosa.

Dermatitis.

Disfunción sexual.



SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
ADRIÁN H. FERNÁNDEZ
SOCIO GERENTE



SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
RITA ALEJANDRA RICCI
FARMACÉUTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172

Cambios de peso.

Efectos adversos poco frecuentes (pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas):

Trastornos mentales y del comportamiento (manía), alucinaciones, reacciones de ira, agitación, dependencia.

Pérdida de memoria (amnesia).

Pérdida de fuerza en los músculos.

Incapacidad para retener la orina en la vejiga (incontinencia urinaria).

Menstruación irregular.

Síntomas de abstinencia.

Frecuencia no conocida (no puede estimarse a partir de los datos disponibles):

Aumento de los niveles de prolactina en la sangre (hormona encargada de estimular y mantener la lactancia después del parto).

Trastornos mentales y del comportamiento (hipomanía), agresividad, hostilidad, pensamiento anormal, hiperactividad psicomotora, abuso de drogas.

Desequilibrio del sistema nervioso autónomo, contracciones involuntarias de los músculos (disonía).

Trastorno gastrointestinal, hepatitis, alteración de la función del hígado, coloración amarillenta de la piel y del blanco de los ojos (ictericia).

Edema periférico.

Angioedema (hinchazón bajo la superficie de la piel).


Fotosensibilidad (respuesta exagerada a la luz).

Retención de orina en la vejiga.

Presión intraocular elevada.



SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
ING. ADRIÁN H. FERNANDEZ
SOCIO GERENTE



SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
RHA ALEJANDRA RICCI
FARMACÉUTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172

Con el uso de las benzodiazepinas pueden aparecer:

Somnolencia, falta de reacción ante estímulos emocionales (embotamiento afectivo), reducción del estado de alerta, confusión, fatiga, dolor de cabeza, mareo, debilidad muscular, ataxia o visión doble. Estos fenómenos ocurren predominantemente al comienzo del tratamiento y generalmente desaparecen con la administración continuada. Pueden ocurrir ocasionalmente alteraciones gastrointestinales, cambios en el deseo sexual o reacciones en la piel.

Puede desarrollarse una pérdida de memoria (amnesia) que puede asociarse a conductas inadecuadas.

La utilización de benzodiazepinas puede desenmascarar una depresión ya existente.

Al utilizar benzodiazepinas o compuestos similares pueden aparecer reacciones tales como intranquilidad, agitación, irritabilidad, agresividad, delirio, ataques de ira, pesadillas, alucinaciones, psicosis, comportamiento inadecuado y otras alteraciones de la conducta. Dichas reacciones pueden ser graves y aparecen más frecuentemente en niños y pacientes de edad avanzada.

La administración de benzodiazepinas (incluso a dosis habituales) puede conducir al desarrollo de dependencia física. La interrupción del tratamiento puede conducir al desarrollo de fenómenos de retirada o rebote. Puede producirse dependencia psíquica. Se han comunicado casos de abuso.

Conservación de Amziax Chobet comprimidos

Conservar a temperatura no mayor a 30°C.

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.

Contenido del envase e información adicional

Composición de Amziax Chobet

El principio activo es Alprazolam 0,5mg. Excipientes: Almidón de maíz, Anhídrido silícico coloidal, Povidona, Estearato de magnesio, Azul brillante, Lactosa.

El principio activo es Alprazolam 1mg. Excipientes: Almidón de maíz, Anhídrido silícico coloidal, Povidona, Estearato de magnesio, Eritrosina, Lactosa.

El principio activo es Alprazolam 2mg. Excipientes: Almidón de maíz, Anhídrido silícico coloidal, Povidona, Estearato de magnesio, Lactosa.

Contenido del envase

Envases x: 10; 30; 60 comprimidos.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS ALEJADOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
ING. ADRIÁN H. FERNÁNDEZ
SOCIO GERENTE


SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
RITA ALEJANDRA RICCI
FARMACEÚTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172

ESTE MEDICAMENTO DEBE SER USADO EXCLUSIVAMENTE BAJO
PRESCRIPCIÓN Y VIGILANCIA MÉDICA Y NO PUEDE REPETIRSE SIN
NUEVA RECETA MÉDICA.

ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD.
Certificado N° 45.732 SOUBEIRAN CHOBET SRL. - Iberá 5055 - 1431 Buenos
Aires.

Director Técnico: Dr. Silvio L. Gaguine –Farmacéutico



SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
ING. ADRIEN H. FERNANDEZ
SOCIO GERENTE



SOUBEIRAN CHOBET S.R.L.
D.F.A. ALEJANDRA RICCI
FARMACÉUTICA
CO-DIRECTORA TÉCNICA
M.N. 12172



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: Información para el paciente prod. AMZIAX CHOBET EX-2023-132093071- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.04.26 09:43:47 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.04.26 09:43:48 -03:00